

682 - قلمی نسخہ "انتخاب دوا" اردو ترجمہ

انتخاب دوا

Dr. BHASHAMBER DAS



**SELECT
YOUR
REMEDY**

شیخ محمد بشیر اینڈ سنز
اردو بازار لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ڈاکٹر داس بشمبہر

کی کتاب

سلیکٹڈ یوریمیڈ

کا مکمل اردو ترجمہ

انتخاب دواء

انتخاب دواء

SELECT YOUR REMEDY

ڈاکٹر داس بھمبر

ترجم

حبیب اللہ صدیقی

باہتمام

مکتبہ دانیال، لاہور

سیل پوائنٹ: شیخ محمد بشیر اینڈ سنز

اردو بازار، لاہور۔ فون: 7660736

فہرست

| باب | تفصیل امراض | صفحہ |
|-----|--|------|
| 1 | دماغی امراض | 1 |
| 2 | اعصابی نظام کی بیماریاں | 73 |
| 3 | آنکھیں اور نظر سے متعلق بیماریاں | 130 |
| 4 | کان اور سننے کی بیماریاں | 161 |
| 5 | ناک اور گلے کی بیماریاں | 169 |
| 6 | 'مسوڑھے'، 'دانت'، 'منہ' اور 'زبان' کی بیماریاں | 204 |
| 7 | 'چھاتی'، 'پھیپھڑوں' کی بیماری اور کھانسی | 234 |
| 8 | دل اور خون کی نالیوں کی بیماریاں | 268 |
| 9 | نظام انہضام کی بیماریاں اور پیٹ | 288 |
| 10 | پیشاب کے نظام کی بیماریاں - عام پیشاب، 'مثانہ'، 'گردے' | 362 |
| 11 | آلات تناسل کی بیماریاں - عام بیماریاں، 'سوزاک' | 394 |
| 12 | 'ہڈیوں'، 'جوڑوں' اور 'پٹھوں' کی بیماریاں | 478 |
| 13 | 'جلد'، 'بالوں' اور 'ناخنوں' کی بیماریاں | 503 |
| 14 | عام بخار --- مہیات | 545 |
| 15 | متفرق --- بیشی مرض، 'کمی مرض' | 565 |

عنوانات کی مکمل فہرست صفحہ 663 پر دیکھیں

دیباچہ

رائے بہادر بشبر داس نے اس کتاب میں اپنے پینتیس (35) سالہ دور طبابت میں حاصل کردہ تمام علم و تجربہ کا انچوڑ پیش کر دیا ہے۔ ہومیو پیتھی کو وہ دیکھی انسانیت کی خدمت کا ذریعہ خیال کرتے تھے اور اس طریقہ علاج کو اولاً آسان اور سستا سمجھتے تھے جسے بعد میں انہوں نے انتہائی پیچیدہ اور وقت طلب پایا لیکن اپنی سچی لگن اور اللہ تعالیٰ کی عنایت سے انہیں اس میدان میں بہت عظیم کامیابیاں حاصل ہوئیں۔

ہومیو پیتھی کے معالجین کو ایک بڑی مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب وہ دواؤں کی طاقتوں کا تعین کر رہے ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے مبتدیوں کے پاس سوائے اپنے تجربہ کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ رائے بہادر کا کہنا ہے کہ طاقتوں کے تعین کا انحصار زیادہ تر مریض کی جسمانی ساخت، اعصابی مزاج، اس کی عادات اور ماحول پر ہوتا ہے۔ نامیاتی ادویات کی چھوٹی طاقتوں کی خوراکیں بہترین کارکردگی کی حامل ہوتی ہیں اور یقینی طور پر شاندار نتائج ظاہر کرتی ہیں، ایسی ادویات کو چھوٹے وقفوں کے ساتھ دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ساختیاتی وجوہات کے باعث نامیاتی مادوں میں زیادتی والے مریضوں کا علاج اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ اونچے درجہ کی طاقتوں والی ادویات کے ذریعے سب سے پہلے ساختیاتی امراض کا علاج ادویات کو بلا تواتر دہرائے سے نہ کر لیا جائے۔ اصولاً ادویات 30th ڈائی لیوشن میں استعمال کرنی چاہئیں۔ اس سے اگلی اونچے درجے کی ڈائی لیوشن 200 طاقت کی ہونی چاہئے اور اسے صرف اسی صورت میں دیا جانا چاہئے جبکہ پختی طاقت کے ڈائی لیوشن کے ذریعے مرض میں افادہ رک جائے یا اچھی نشاندہی کی گئی ادویات مرض کا علاج کرنے میں ناکام ثابت ہو گئی ہوں۔ اونچی طاقت کی ادویات ہفتہ سے کم وقفہ میں تواتر کے ساتھ نہیں دہرائی جانی چاہئیں۔ ڈائی لیوشن عموماً '6' '30' '200' '1000' '1M' اور CM طاقتوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ 30 تک کے ڈائی لیوشن پچھلے درجہ میں شمار ہوتے ہیں جبکہ 30 سے اوپر کے تمام ڈائی لیوشن اونچے درجے کے کہلاتے ہیں۔

ادویات کو دہرانے کے لئے وقفوں کا دورانیہ متعین کرنا بھی برابر کا مشکل کام ہے۔ پھوٹی طاقتوں کے ڈاکٹی لیوشن ہر 2 گھنٹوں کے بعد دہرانے چاہئیں۔ لیکن حاد کیسوں میں تیزی کے ساتھ افادہ حاصل کرنے کے لئے ہر 15 منٹ کے بعد بھی دہرائے جاسکتے ہیں۔ ادویات استعمال کرانے کا ذریعہ سٹوف گولیاں اور نکلیاں وغیرہ کے بجائے پانی کو ہٹانا چاہئے۔ رائے بہادر کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے 35 سالہ دور طبابت میں ہمیشہ ادویات کے استعمال کا ذریعہ پانی کو ہٹایا ہے جس سے ہمیشہ بہت اچھے نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ نیز ڈاکٹر ہنی مین جو اس طریقہ علاج کے موجود ہیں، وہ بھی اپنی ایک کتاب ”ادویات کا دستور العمل“ کے پیرا 246 اور 271 میں بڑی سختی سے تاکید کرتے ہیں کہ تمام ہومیوپیتھک ادویات پانی ہی میں دینی چاہئیں اور دیگر ذرائع مثلاً گولیاں، سٹوف وغیرہ کو استعمال کرنے سے روکتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر بشبر داس اپنے پڑھنے والوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ تمام ہومیو ادویات ہمیشہ پانی میں حل کر کے دینی چاہئیں۔

ادویات کی تیاری بھی ایک اہم کام ہے جس سے ایک معالج کو بخوبی آگاہ ہونا چاہئے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر بشبر داس رقمطراز ہیں کہ سب سے پہلے تو مدر ٹنگر تیار کیا جاتا ہے جسے مفرد دوا کی تحلیل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر اس ٹنگر سے آگے ادویات تیار کی جاتی ہیں:

(الف) سوویں حصہ والی ترتیب

ٹنگر کا ایک قطرہ اور الکحل کے 99 قطرے مل کر پہلی طاقت بناتے ہیں۔ پہلی طاقت کا ایک قطرہ اور الکحل کے 99 قطرے ملنے سے دوسری طاقت تیار ہوتی ہے۔ اسی طرز پر عمل کرنے سے اونچی طاقتیں تیار ہوتی چلی جاتی ہیں۔

(ب) اعمشاری (دسویں حصہ والی) ترتیب

مدر ٹنگر کا ایک قطرہ اور مقطر پانی کے 9 قطرے مل کر 1x طاقت بناتے ہیں۔ 1x طاقت کا ایک قطرہ اور الکحل کے 9 قطرے مل کر 2x طاقت بناتے ہیں۔ اسی طرح سے اوپر والے درجوں کی طاقتیں، پچھلی طاقت کے ایک قطرے اور الکحل کے 9 قطرے ملانے سے بنتی چلی جاتی ہیں۔ ”سوویں حصہ والی ترتیب (الف)“ کی ادویات 1، 2، 3، 30 یا 200 وغیرہ کمالاتی ہیں جبکہ ”اعمشاری ترتیب ب“ کی ادویات 1x، 2x، 3x وغیرہ کمالاتی ہیں۔

رائے بہادر بشبر داس نے اپنے دیباچہ کے آخر میں مستورات کے امراض سے متعلق

چند مخصوص نکات کا تذکرہ کیا ہے۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مستورات کے قریب قریب تمام امراض ان کی جنس سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس لئے مستورات کا علاج کرتے ہوئے ایک معالج کو چاہئے کہ جب وہ مستورات سے علامات اکٹھی کرے تو ایسے وقت میں سوالات کرتے ہوئے قطعی طور پر شرمانے سے احتراز کرے اور کسی نہ کسی طرح سے متعلقہ موضوع کی علامات ان سے ضرور حاصل کر لے۔

دیباچہ کے تمام اہم نکات اختصار کے ساتھ درج کر دیئے ہیں۔ اب کتاب کے ترجمہ کے متعلق عرض کر دوں یہ ترجمہ عام قاری کی استعداد کو سامنے رکھ کر آسان ترین الفاظ میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید ہے معالجین حضرات کے علاوہ ایک عام قاری بھی کتاب سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکے گا پھر بھی اگر ضرورت محسوس کریں تو دوا کے انتخاب میں کسی ماہر ہومیو ڈاکٹر سے مشورہ کیا جاسکتا ہے۔ کتاب کے آخر میں علامات جو کتاب میں سرخیوں کی صورت میں موجود ہیں ریچرٹیوں کے طرز پر حروف چھٹی کی ترتیب سے درج کر دی گئی ہیں۔ ایک پریکٹیشنر کے لئے دوا کے انتخاب میں یہ فہرست علامات انتہائی مفید و معاون ثابت ہوگی۔ اپنی آراء سے پبلشر کو ضرور آگاہ فرمائیے۔

مترجم



اہم

طاقت کا انتخاب

اس کتاب میں دی گئی تمام ادویات 'ایک عام اصول کے مطابق' 30 ویں طاقت میں استعمال کی جائیں۔ یا پھر جن ادویات کے ساتھ طاقتیں لکھی گئی ہیں انہیں دی گئی ترتیب کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اگر کسی موقع پر 30 ویں طاقت کی دوا موجود نہ ہو تو چھٹی (6th) یا تیسری (3rd) یا 30 ویں سے کم کوئی سی بھی طاقت کی دوا استعمال کر لی جائے۔ طاقت میں کمی بیشی 'مریض کی جسمانی ساخت کے مطابق' کی جائے گی۔ جب دوا کا مطلوبہ اثر ظاہر نہ ہو رہا ہو یا افادہ بہت سستی کے ساتھ ہو رہا ہو یا رک گیا ہو تو ایسی صورت میں بھی ادویات کی طاقتیں کم و بیش کی جاسکتی ہیں۔

دماغی امراض (Mental Diseases)

غیر حاضر دماغی

(Absent Mindedness)

(نیز دیکھئے ”بھول جانا“ اور ”سوچنا“)

نکس موسکاتا (Nux Moschata): جب نیند سے بے دار ہو تو اسے کچھ پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں ہے اور بات کا کیا جواب دے؟ جیسے نشہ سے مدہوش ہو۔
لیک ٹینیم (Lac Caninum): خریداری کے بعد خریدی ہوئی چیزیں وہیں چھوڑ جائے خط کو ڈاک میں ڈالنے جائے لیکن خط ہاتھ میں پکڑے ہوئے واپس آجائے۔
بووشتا (Bovista): ہتی اچھلنے میں غیر حاضر دماغی۔ سفیدی مائل یا گلابی مائل اہمار، خارش اور جلن کے ساتھ۔
اگنس کاسٹس (Agnus Castus): جنسی بے اعتدالیوں یا جلق کے بعد پڑھنے میں اور خیالات کے تسلسل کو جاری رکھنے میں مشکل پیش آئے۔
ایٹھوزا (Aethusa): سوچنے یا توجہ مرکوز کرنے کی نااہلیت۔
سچرس کنٹورٹریا (Cenchrus Contortia): غیر حاضر دماغی۔ خیالات میں گم رہنے والا۔ بجائے اپنی کار کے کسی دوسرے کی کار لے جائے۔

دشنام طرازی — (Abusiveness)

(نیز دیکھئے ”غصہ“)

اناکارڈیم (Anacardium): کھلی گلوچ کرنے اور قسمیں کھانے کی رغبت۔ یادداشت کا کھو جانا۔
ہائوسائیمس 200، لائی سین 200 (Hyoscyamus 200, Lyssin 200): بغیر کسی

ناگواری (اشتعال وغیرہ) کے گالیاں دینے کی رغبت۔ اگر پہلی دوا کارگر ثابت نہ ہو تب دوسری دوا آزمائیں۔ دونوں دوائیں ہفتہ میں صرف ایک بار ہی دی جائیں۔
 کالی آئیوڈینم (Kali Iod): دشنام ملراز (گالیاں دینے والا)۔ اپنے خاندان کے لوگوں اور اپنے بچوں کے ساتھ سختی اور بد مزاجی سے پیش آئے۔
 لیلیم ٹیگ (Lilium Tig): مشکل ہی سے منذب الفاظ استعمال کر سکے۔ نری سے بلانے پر بھی کاٹ کھانے کو دوڑے، چڑچڑی (سند مزاج)۔ اس کی سہیلیاں بھی اس کے مزاج کو ٹھنڈا کرنے سے قاصر رہیں۔ مذہبی خیالات کا جنون یا مذہبی مانگولیا۔ اسے خوش کرنا ممکن نہ ہو۔

الکحلی۔ الفولیت (Alcoholism)

(نیز دیکھئے ”خواہش“)

ریجن کولس بلبوسس (Ranunculus Bulbosus): شرابیوں کا جنون۔
 کافیا (Coffea): شراب نوشی کے باعث درد سر جیسے کہ سر میں کیل ٹھونکے جا رہے ہوں۔
 کھلی ہوا میں زیادتی ہو۔ بے خوابی، بے اختیاری کی ہنسی اور زندہ دلی۔
 انٹیم کروڈم (Antim Crud): شراب نوشی کے بعد دیر تک مٹکی ہو۔
 کیپسکیم (Capsicum): قے صبح کے وقت۔ معدہ کی مٹکی۔ خوف زدہ کر دینے والے خواب اور ہڈیان۔

زنگم (Zincum): درد سر جو تھوڑی مقدار میں شراب پینے سے ہو۔
 کنٹھارس (Cantharis): پیشاب کی تکلیفات اور جنسی اکساہٹ کے باعث مریض کانٹے کی کوشش کرے۔

اسارم یوروپیم (Asarum European): شراب نوشی کی زبردست خواہش۔
 ایوینا سیٹوا (Avena Sativa): اعصابیت اور بے خوابی۔ شراب نوشی کی خواہش کو دور کرتی ہے۔

سی سی فوگا (Cimicifuga): ذہنی دباؤ اور ہلکے ہڈیان کے ساتھ بے خوابی۔
 نکس وامیکا (Nux Vomica): انگوری شراب یا ایسی شراب پینے کے باعث اعصابیت۔ معمولی شور سے ڈرے اور رات کو ڈراؤنے خواب دیکھ کر ہڑٹا کر جاگ جائے۔ یہ دوا شراب کے برے اثرات کو زائل کرتی ہے۔ جیسے کہ تبخیر معدہ، سر پکھانا، بے چینی وغیرہ۔ اس کی علامات میں رشک اور حسد کا رجحان بھی شامل ہے نیز مریض خود کو گولی مار کر یا چھرا گونپ کر ہلاک کرنا چاہے۔

ایپو سائی نم کینائس (Apocynum Can): حاد (بے تحاشہ 'شدید) شراب نوشی کے لئے۔
ہایوسائیمس (Hyoscyamus): مستقل ہڈیان 'باتونی پن اور بے خوابی کے ساتھ 'یکے بعد
دیکرے مکمل کھلا کر رہے اور روئے۔

کنائس انڈیکا (Cannabis Ind): شراب نوشی کے باعث تشدد اور باتونی پن۔ میالڈ آمیز
موضوعات 'وقت 'خلا وغیرہ سے متعلق توہمات اور قریب ہائے نظر۔ چہرے پر 'تھمناہٹ' آنکھوں
کی پتلیاں پھیلی ہوئیں 'پیٹہ جلد جلد آئے۔

اوپیم (Opium): پرانے پانی قسم کے لوگوں میں بڑھتے ہوئے ہڈیانی دورے 'چہرے سے خوف
اور دہشت کا اظہار۔ سانس میں 'تکلیف' جانوروں اور بھوتوں کے خواب 'پریشان کن نیند کے
ساتھ۔ چہرہ کا رنگ گہرا سرخ 'برانڈی پینے والوں کے لئے 'ان لوگوں کے لئے جنہیں ہلکی
شراب پینے سے بھی نشہ ہو جائے۔

سلفیورک ایسڈ (Sulphuric Acid): مزمن شراب نوشی کے لئے یہ دوا بلند ترین ہے۔
خوراک کی تھوڑی سی مقدار بھی برداشت نہ ہو سکے۔ شراب اور دھسکی ملائے بغیر پانی بھی نہ پی
سکے۔ شراب (برانڈی) کا طلب گار رہے۔ مریض کا رنگ پیلا ہو 'جلد پر جھریاں اور بدن ٹھنڈا
ہو۔

سٹرامونیم (Stramonium): عادی شریبوں کے لئے موزوں۔ ہر کوئے سے جانوروں کو
اپنے اوپر جھپٹتے دیکھے اور ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ چہرہ چمکیلا سرخ۔ توہمات اور قریب
ہائے نظر دہشت اور خوف پیدا کریں۔

کونیم (Conium): انتہائی کم مقدار میں دہی شراب یا انگوری شراب پانی میں ملا کر پینے سے
بھی نشہ ہو جائے۔

کوکا (Coca): نشہ آور شراب پینے کی خواہش۔
سٹیلینیم (Syphillium): کسی بھی قسم کی شراب کی طلب۔ شراب نوشی کا وراثتی رجحان۔

ایومینا (Alumina): انتہائی ہلکی شراب پینے سے بھی آسانی کے ساتھ نشہ ہو جائے۔
لیسیس (Lachesis): بد فطرت لوگ 'پر تشدد جرائم کا رجحان رکھنے والے 'مستم المزاج'
حاسد 'دوسروں کے ساتھ خار رکھنے والے 'خود کو نہیں بلکہ دوسروں کو قتل کرنے کے حربے۔
شراب نوشی سے پہلے اور شراب نوشی کے دوران زبان چلتی رہے۔ (ہست باتیں کرے۔)

پٹرولیم (Petroleum): شریبوں میں نا طاقتی اور بے حوصلگی۔ شراب کے گلاس کو اٹھا
کرنے کے قائل نہ ہو۔ تھوڑی سی شراب زیادہ پینے پر اٹھیاں کرنے لگے۔ شراب پینے کے بعد
ہست باتیں کرے۔

آرسنک البم (Ars Alb): شراب کی پیاس۔ یہ دوا بھی چوٹی کی ہے اور پہلے اسی کو آزمایا جاتے۔ اس میں تے اور اسمال کا رتھان پایا جاتا ہے۔ شرابیوں میں بازوؤں اور ٹانگوں کا کپکپانا۔ چائنا آف (China Off): شراب چھوڑنے کے خواہش مند شرابیوں میں الکوہل (شراب) کی خواہش کو دور کرتی ہے۔ دس سے تیس قطروں کی خوراک دن میں دو مرتبہ دیجئے۔
نوٹ: اوپر درج تمام ادویات پانی میں ملا کر ہر ہفتہ 200 سے کم مقدار میں ہرگز نہ دی جائیں۔
 (یا پھر جو پوٹنسی ادویات کے ساتھ دی گئی ہے اس کے مطابق دوا استعمال کریں) یہاں تک کہ شراب نوشی کی عادت یا شراب کی طلب مکمل طور پر جاتی رہے۔

غصہ — (Anger)

(نزدیکے "جمنہلاہٹ")

سٹیفنی سیکریا (Staphisgria): غصہ اور اس کے برے اثرات کے لئے عمدہ دوا ہے۔ جذبات کے دب جانے کے باعث زبان گنگ ہو جائے۔ سر سے پاؤں تک کانپنے لگے، غینہ اچٹ جائے۔ خود پر قابو نہ پاسکے۔ معمولی سی حرکت یا الفاظ بھی اس کے جذبات کو برہم کر دیں۔ جلد ہی غصہ میں بھر جائے لیکن اپنے غصے کا اظہار شاذ و نادر ہی کر سکے۔

کیموملا (Chamomilla): بچوں میں غصہ جس کے نتائج اسمال، کھانسی اور تشنج کی صورت میں ظاہر ہوں۔ جھگڑاؤں سے بچہ ہر وقت کسی نئی چیز کی خواہش کرے اور جب وہ چیز دی جائے تو لینے سے انکار کر دے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے آیا کے چہرہ پر مارے۔ معمولی معمولی باتوں پر برہم ہو جائے۔ ہفتہ میں ایک خوراک CM یا IM کی دیجئے۔

اورم فولی ایٹم (Aurum Foliatum): جب غصہ کا اظہار نہ کر سکے تو کانپنے لگے۔ کسی بھی شخص کے ساتھ جھگڑا کھڑا کرنے کی کوشش کرے تاکہ اسے برا بھلا کہہ سکے۔

بیوفو (Bufo): اگر اسے سمجھنے میں کسی سے غلطی ہو جائے تو فوراً ناراض ہو جائے۔

کالوسٹھ (Colocynth): جذبات کے خاموشی کے ساتھ بھڑک ہو جانے پر برہمی، جس کے باعث سر میں، آنکھوں میں، بڑی آنت میں اور اعصاب میں شدید اعصابی درد پیدا ہو جائیں۔

کلیکریا کارب (Calcarea Carb): جماع کے بعد غصہ۔

نکس موسکاٹا (Nux Moschata): دوران حمل غصہ۔

اورم میٹ، نکس وامیکا (Aurum Met, Nux Vom): معمولی سے اختلاف (یا ترویدا) پر غصہ۔

آئیوڈیم 200 (Iodium 200): تشدد آمیز غصہ۔ جو بھی نزدیک آئے اسے قتل کرنا

چاہے۔ جب غصہ ختم ہو جائے تو خوش محسوس کرے۔
 ہیسپر سلف (Hepar Sul): جھگڑالو جس کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے کسی چیز سے
 خوش نہ ہو۔ ضرورت سے زیادہ حساسیت ان اشخاص یا جگہوں کے لئے جن کی موجودگی اس کے
 لئے خلل انگیز ہو۔ اشخاص، چیزوں اور ماحول کو تبدیل کرنے کی مستقل خواہش کرتا رہے لیکن
 یہ تبدیلیاں اسے پھر سے ناخوش اور بے چین کرتی رہیں۔
 کالی آئیوڈ (Kali Iod): اعتماد بے کا چڑچڑاہٹ۔ اپنے خاندان، بچوں اور دوسروں کے ساتھ
 انتہائی سخت اور غلامانہ سلوک کرے۔ گالی گلوچ کرے۔
 نیٹرم آرسینیکم (Natrium Ars): معمولی باتوں پر غصہ۔ اختلاف (تردید) سے غضب ناک ہو
 جائے۔ ذہن کند، کھلی ہوا میں بہتر ہو، بستر میں اور رات کے وقت علامات میں شدت آجائے۔
 کروکس سیٹیورا (Crocus Sat): پر تشدد غصہ جس کے بعد ہچکچاتا ہو۔

جھنجھلاہٹ (Annoyance)

شیفنی سیکریا (Staphisagria): تھوڑے سے تھوڑے الفاظ جو غلط محسوس ہوں غصے اور
 برہمی کا باعث بن جائیں۔ معمولی سی تصوراتی جھلپاہٹ کا باعث بننے والے اشخاص پر چیزیں
 پھینکنے کی خواہش۔
 کوکولس انڈیکا (Coculus Indica): معمولی سی خلل اندازی جھلپاہٹ کا سبب بن جائے۔
 آرسینیکم البم (Arsonicum Album): جھنجھلاہٹ کا باعث شور اور روشنی ہوں۔
 کوئیم (Conium): معمولی اور غیر اہم معاملات جھنجھلاہٹ کا باعث بن جائیں۔
 ٹیوبریکولینم 200 (Tuberculinum 200): مشکل اور بد مزاج بچہ۔ کپڑے اٹار پھینکے اور
 دوسرے بچوں کے ساتھ بلاوجہ بد تمیزی کرے۔ اس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہ آئے۔
 خوفناک طوفان کا سا مزاج۔ شدید غصہ کرے اور بلند آواز کے ساتھ بے قابو ہو کر رو سکے ہر
 ہفتہ ایک خوراک تقریباً دو ماہ تک دیجئے اور اگر ضرورت ہو تو دیر تک دہرائی جاسکتی ہے۔
 فاسفورس 200 (Phosphorus 200): وحشیانہ مزاج۔ ذہنی اور جسمانی طور پر طوفانی
 مزاج کے غصے والا۔ سکول میں بچوں اور استادوں کے ساتھ لڑائی کرے۔ قابو میں نہ آنے والا
 بچہ، غصے میں آکر اپنے آپ کو غسل خانہ میں بند کر لے۔ جلد خوف زدہ ہو جائے، خوف سے
 کانپے اور کپکپائے، اندھیرے سے خوف زدہ ہو، جسم دھلا پٹلا اور رنگ دیدہ زب۔
 ایسکولس (Aesculus): جلدی جلدی مزاج برہم ہوں لیکن آہستہ آہستہ واپس آئیں۔

تشویش — (Anxiety)

(دیکھئے۔۔۔ ”خوف“، ”مخاطبہ“)

اندیشہ — (Apprehension)

بے زاری — (Aversion)

اگنیشیا (Ignatia): تفریح سے بے زاری۔ تمباکو کے دھوئیں سے نفرت۔ تمباکو نوشی کو برداشت نہ کر سکے۔

سپیدا (Sepia): خاندان کے افراد، کاروبار یا اپنے پیٹے اور جنس مخالف سے بیزاری، ’چڑچڑاہٹ‘ کیسو (الگ تھلگ رہنے والا) تھکا ہوا۔ اکیلا اندھیرے میں رہنا چاہئے۔ میٹر (شراب) سے نفرت پیدا کرتی ہے۔

پلائینا (platina): اپنے خاندان کے افراد اور دوسرے لوگوں سے بے زار رہے کیونکہ وہ خود گود دوسروں سے بہت اعلیٰ و ارفع خیال کر کے غور کرتی ہو۔

پلساتیلہ (Pulsatilla): عورتوں سے بے زاری، ’جملع‘ سے، اور شادی سے نفرت۔

کیزیم سلف (Cadmium Sulph): ہر قسم کے جسمانی اور ذہنی کام سے بے زاری۔

اکونائٹ۔ این (Aconite N): موسیقی سے نفرت۔

کریٹاٹنس (Graphites): موسیقی اسے دلائے، مریضہ موسیقی کی وجہ سے روئے۔

ریٹے لس (Raphanus): عورتوں میں جنس مخالف سے نفرت۔

نکس وامیکا (Nux Vomica): بد ہضمی کے باعث کام سے نفرت۔ اگر کام کرتی بھی ہے تو ہر کام غلط کرتی ہے۔

پلمبم (Plumbum): کام سے نفرت جب کہ ساتھ میں مزمن قبض بھی ہو۔

سائی کلیمین (Cyclamen): بد ہضمی کے دوران کام سے نفرت، گوشت سے کراہت، روٹی اور کھن سے بے زاری۔ میٹر (شراب) سے نفرت۔

نیٹرم میور (Natrium Mur): روٹی سے بے زاری، پختائی اور مرغن غذاؤں سے نفرت۔

لیک ویک ڈیفیل (Lac Vac Defl): دودھ سے، ’مردوں‘ عورتوں اور بچوں سے بیزاری۔ دودھ نہ پی سکیں کیونکہ یہ انہیں بیمار کر دیتا ہے۔ لوگوں سے ملاقات کرنے اور ان سے گفتگو

کرنے سے بیزاری۔ دودھ پینے سے سر میں درد ہو۔

گلوٹائین (Glonoine): شوہر سے بے زاری۔

چیلی ڈونیم (Chelidonium): کام کرنے سے یا رات کے کھانے کے بعد حرکت کرنے سے نفرت، خیر سے بے زاری۔

ارجنٹم نائٹریکیم، لیکسیس (Argentum Nit, Lachesis): مائٹو لیا میں کام سے نفرت۔ اگر پہلی دوا کار آمد ثابت نہ ہو تو دوسری دوا آزمائیں۔

ایسڈ تھیور (Acid Thior): افراد خانہ سے اور عزیز ترین دوستوں سے بے زاری۔ گھر سے کہیں چلے جانا چاہے۔ عیاش مردوں میں جنسی بے اعتدالیوں کے باعث پست ذہنی۔

کونیئم (Conium): کام نہ کرنا چاہے، کھانے کو ترجیح دے۔ کاجو پوٹم (Cajuputam): بلوائے جانے سے بے زار، گو دوسروں کی بات سننا پسند کرے۔

جن کتابوں کا عام طور سے مطالعہ کرتا رہا ہو ان کتابوں کو کھول کر دیکھنا بھی برداشت نہ کر سکے اپنی ہی صنف کے لوگوں کی مجلس سے بیزاری۔

نیٹرم کارب (Natrium Carb): ضرورت سے زیادہ مطالعہ کرنے کے باعث کام کرنے کی نااہلیت۔ دودھ سے بے زاری جسے پی لینے سے اسال لاحق ہو جائیں۔

پیکرک ایسڈ (Picric Acid): شادی سے نفرت، اگر کبھی خیال بھی آجائے تو ناقابل برداشت ہو جائے۔

کالی بلی کرام (Kali Bich): گوشت سے نفرت، چڑچڑے پن کے ساتھ (یا صفرا کے ساتھ)۔ کوکولس (Cocculus): غذا کھانے اور پینے سے بے زاری۔

کالکیریا کارب (Calcarea Carb): بھوک بہت کم، گوشت سے نفرت اور ایلے ہوئے انڈوں کی رغبت کے ساتھ۔

ایسڈ نائٹریک، ایسڈ میور (Acid Nitric, Acid Mur): گوشت کے دیکھنے یا گوشت کے خیال کو برداشت نہ کر سکے۔ گوشت سے نفرت۔

لائیکو پوڈیم (Lycopodium): کافی اور گوشت سے بیزاری، انہیں کھانے (لینے سے) نفرت کرے۔

ورنٹرم ویرائیڈ (Veratrum Viride): مٹھائیوں سے بے زاری۔ حتیٰ کہ پانی کا ذائقہ بھی مٹھا معلوم ہو۔

ابروٹانم (Abrotanum): سوکھے کے بچوں میں دودھ سے بے زاری۔ ان بچوں میں دودھ میں اہلی ہوئی چیزوں سے بھوک مٹانے کی رغبت ہوتی ہے۔

الیومنا (Alumina): آلوؤں سے بیزاری جو انہیں اس نہیں آتے۔ گوشت سے بے زاری جو انہیں مزہ نہیں دیتا۔ میز شراب سے بے زاری۔

الیمینٹا فاس (Alumina Phos): مجلس آرائی سے بے زاری اور سوالات کے جوابات دینے سے نفرت۔

انٹیم ٹارٹ (Antim Tart): دودھ سے بے زاری جو مریض کو بھار کر دیتا ہے۔ جس کے باعث مٹلی اور تے ہو۔ ہر قسم کی غذا سے بے زاری۔

اوسیم (Osmium): کافی یا تمباکو سے ہزاری۔ ان کی بو سے کراہت۔
پٹرولیم (Petroleum): مرغن غذا گوشت اور مٹلی ہوا سے شدید ہزاری کو بھی کھانے سے زیادتی ہو۔

کیمولہ (Chamomilla): کافی، گرم مشروبات، بخنی اور ملتح غذاؤں سے ہزاری۔

سیلیشیا (Silicea): ماں کے دودھ سے ہزاری اگر پیئے تو تے ہو جائے۔

میکنٹ پولس آسٹریلیس (Magnet Polis Australis): منگٹو کرنے سے بے زاری۔

ایپیکاک (Ipecacuanha): شدید ترین نفرت اور ناپسندیدگی ہر قسم کی غذا سے۔

کاربو ویج (Carbo Veg): قابل ہضم چیزوں اور بہترین غذا سے بے زاری۔ کالی ترش (تیزابی) اشیاء وغیرہ کی خواہش۔

سٹرامونیم (Stramonium): مانتات سے تفر۔ حتیٰ کہ اگر پانی کا گلاس بھی اس کے ہونٹوں کے پاس لایا جائے تو شدید دورے شروع ہو جائیں۔ سیال شے مشکل ہی سے گلے سے نیچے آتاری جاسکے۔

گرینڈیلیا (Grindelia): اندھیرے سے نفرت۔ ساری رات کمرے میں روشنی کرنا چاہے۔
ٹیرنٹولا (Tarentula H): موسیقی کی طرف سے حساس۔ جیسے ہی اس نے موسیقی سنی، چلاٹ لگا کر ناچنا شروع کر دے گی۔

تھیریڈین (Theridion): شور سے بے زاری اور ہر آواز اسے تمام جسم میں گھسکتی ہوئی محسوس ہو جس کے باعث مٹلی ہو اور چکر آئیں۔ آواز دانتوں میں گھس جائے۔ آنکھیں بند کرنے سے تکلیف میں زیادتی ہو۔

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): ہر قسم کی غذا سے بے زاری۔ گوشت سے بے زاری جسے کھانا نامکن ہو۔

ذہنی تکان (Brain Fag)

(دیکھئے۔۔۔ "تکبراہٹ یا پریشانی" اور "اعصابی کمزوری")

کڑھنا — (Brooding)

ایسڈ فاس (Acid Phos): کڑھنا خود اپنی حالت پر۔ محبت میں مایوس ہو کر کڑھے۔
 اگنیشیا (Ignatia): تصوراتی طور پر پیش آنے والے تلخ واقعات اور تکالیف پہ کڑھنا۔
 نکس وامیکا (Nux Vom): کسی ایسی بداعتی نالاش پہ کڑھنا جو ہو سکتا ہے معرض البواس میں
 طے جائے۔
 لیم ٹیگ (Lilium Tig): بے ہمت، احمق (ست) لیکن ٹھیک ٹھکانہ چاہے۔ ماضی سے متعلق
 سوچے اور کڑھے۔

وریرٹرم البم (Veratrum Alb): خاموشی میں کڑھنا۔
 جلیسیم (Gelsimium): بچے کے کھو جانے پر مسلسل کڑھنا۔

دھوکہ دہی — (Cheating)

(دیکھئے۔۔ "فریب یا دغا بازی")

روشن ضمیری — (Clairvoyance)

(غیر موجود چیزوں اور حالات کے متعلق پیشین گوئی کرنا)

آئیوڈم (Iodum): اس وقت یہ دوا چوٹی کی ہوتی ہے جب مریض دیوانگی کے قریب پہنچ
 جائے۔
 لائی سین (Lyssin): مریض ایسی گھڑی یا کلاک کی سوئوں کو دیکھے جو اس کے سامنے نہیں
 ہے۔ مریض کہے کہ وہ جانتا ہے کہ فلاں آدمی جو اس منظر میں نہیں ہے کہاں بیٹھا ہے۔
 اکنائٹس۔ این (Aconite N): مریض کہے کہ اس کی محبوبہ جو کہ میلوں دور ہے فلاں کاکا
 رہی ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): انتہائی پست حوصلگی اور خوف۔ جلد ہی تشویش میں مبتلا ہو
 جائے، غیر موجود چیزوں اور حالات کے متعلق باتیں کرنے کی حالت۔
 اگریکس ایم (Agaricus M): شعر کہنے اور پیشین گوئیاں کرنے کی رغبت۔

رفاقت یا صحبت — (Company)

(تفصلاً)

کالو سنٹس (Colocynthis): دوستوں سے دور رہنے کی کوشش کرے۔

کیک ٹس (Cactus): ہسٹریا میں محبت (Company) سے نفرت۔
 کوئیٹم (Conium): دوران حیض۔ رفاقت سے بے ڈاری لیکن اکیلے پن سے دہشت
 کھائے۔

نیٹرم میور (Natrium Mur): دوران حمل رفاقت سے نفرت۔
 بوفو (Bufo): جلق کا ارمان نکالنے کے لئے رفاقت سے متنفر ہو۔
 اگنیٹیا (Ignatia): اعصابی مریضوں میں رفاقت یا محبت سے نفرت۔
 کاجوپٹم (Cajuputum): عورتوں کی رفاقت (بھلے آرائی) میں بہتر محسوس کرے گو فطرتاً
 شرمیلا ہو۔

پلساٹیل (Pulsatilla): مریضہ منف مخالف کی رفاقت سے نفرت کرے کیونکہ وہ سمجھتی ہے
 کہ کوئی خطرناک بات ظہور پذیر ہو جائے گی۔
 لائیو پوڈیم (Lycopodium): رفاقت سے متنفر ہو لیکن چاہے کہ کوئی شخص ساتھ والے
 کمرے میں اس کے قریب رہے۔

رفاقت کی تمنا (Desire for)

اورم (Aurum): دل کے امراض میں رفاقت کی خواہش کرے۔
 کوئیٹم (Conium): ہسٹریا میں رفاقت کی خواہش۔
 سٹرامونیم (Stramonium): دیوانگی کی حالت میں رفاقت کی تمنا کرے۔ روشنی کی خواہش۔
 ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): اپنی بیوی یا بچے کو رفاقت کی خاطر چکا دے 'اکیلا رہنے
 سے ڈرے۔
 آرسنک البم (Arsenic Alb): رفاقت کی تمنا کرے کیونکہ اس سے اس کے خوف میں کمی
 ہو۔

ارتکاز توجہ (Concentration)

(دیکھیے۔۔۔ "سوچنا" اور "بھول جانا")

اعتماد کا فقدان

(Confidence Loss Of)

اناکارڈیم (Anacardium): خود اعتمادی کا فقدان۔ دیوانگی 'اعتماد میں فقدان کے باعث۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): ہسٹریا میں اعتماد کھو جائے، معالج اور علاج پر اعتماد نہ رہے۔
 اورم مٹالیئم (Aurum Metallium): مریضہ خیال کرے کہ معالجین کے پاس اس کے لئے کوئی دوا نہیں ہے۔ یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو۔

پریشانی — (Confusion "Brain-Fag")

ذہنی تمکاوت

سلفر (Sulphur): صبح کے وقت جاگنے پر پریشانی۔
 ایسکولس ہپ (Aesculus Hip): ذہنی پریشانی کے ساتھ بیدار ہو، پریشانی کے ساتھ کمرے میں چاروں طرف دیکھے، الجھن کا شکار ہو، لوگوں کو نہ جانتا ہو، حیران ہو کہ وہ کہاں ہے اور جو چیزیں اسے نظر آ رہی ہیں ان کے معانی کیا ہیں۔ عظیم اداسی، تنگ مزاجی، یادداشت کا جاتے رہنا اور کام سے بے زاری۔ جن چیزوں کو حاصل کرنا چاہے ان کے نہ ملنے پر اداس ہو جائے۔

زنکم (Zincum): اعصابی امراض، سرخ بخار اور کرم موسم کی تکلیفات سے دماغ پر اثرات مرتب ہوں۔

بیلادونا (Belladonna): ہریان کے بعد ذہنی پریشانی۔

لیکسیس (Lachesis): ڈھیریا میں ذہنی پریشانی۔

نکس وامیکا (Nux Vomica): کھانے کے بعد ذہنی پریشانی۔ فکر مندی اور ذہنی دباؤ کے باعث ذہنی پریشانی، بہت کم جسمانی مشقت کے ساتھ۔

کالی بروم (Kali Borm): ذہنی پریشانی، لیٹھوریا میں کام کی زیادتی اور سنسنی خیزی کے باعث جس میں حواس گم ہو جائیں۔

جلیسی میم (Gelsemium): جلق کرنے والوں میں ذہنی پریشانی۔

سٹرامونیم (Stramonium): آدمی رات کے بعد جاگ جائے اور ادھر ادھر پریشانی میں پھرتا رہے۔ ذہنی پریشانی، چکروں کے ساتھ۔

پیکریک ایسڈ (Picric Acid): ذہنی تمکاوت اور چاند (گدی) میں درد سر نیز گردن کے پھپھلے حصہ میں درد۔ ادبوں اور اساتذہ کی ذہنی تمکاوت، قوت ارادی میں کمی، بات چیت کرنے، سوچنے یا کسی بھی ذہنی مشقت سے بے زاری۔ مریض کے اندر سے چیزوں میں دلچسپی جاتی رہے۔ کسی بھی قسم کی ذہنی مشقت سے چڑچڑاہٹ پیدا ہو۔

پٹرولیم (Petroleum): ذہنی پریشانی اور دوران سر (چکر)۔ ایسا بد حواس ہو کہ گلی میں اپنا

راست ہی کھو دے۔ مریض تصور کرے کہ کچھ اور لوگ بھی اس کے قریب موجود ہیں جب کہ وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ یوں تصور کرے کہ اس کے بازو اور ٹانگیں دو دو کی بجائے چار چار ہیں۔ تصور کرے کہ اس کے بستر میں اس کے علاوہ اور بھی کوئی اس کے ساتھ موجود ہے۔ خواب میں خود کو دو یا دو سے زیادہ دیکھے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): ذہنی پریشانی اور سوچنے کی نااہلیت۔ ڈرے کہ وہ غیر ضروری شخصیت ہے۔ ناکام ہو جانے کا خوف۔ اندرونی تکاؤ۔ عزت نفس کے مجروح ہو جانے پر غمزدہ ہو۔

کوکا (Coca): ذہنی اور جسمانی تکاؤ کے باعث دہلا پلا۔

اسٹیم سیپا (Allium Capa): شراب نوشی کے بعد ذہنی پریشانی۔

الیومینا (Alumina): عقل مندی کی پریشانی، کسی فیصلے پر اثر انداز ہونے کے قابل نہ ہو۔ عقل (بصیرت) میں خلل پڑ جائے۔ جن چیزوں کو وہ جانتا ہے یا جنہیں سب جانتے ہیں کہ وہ حقیقی ہیں، وہ چیزیں اسے غیر حقیقی محسوس ہوں اور وہ ان کے متعلق شک میں مبتلا ہو جائے کہ آیا وہ اسی طرح سے ہیں یا نہیں۔

امبر اگریسیا (Ambra Grisea): ذہنی پریشانی، ایک مضمون سے دوسرے کی طرف چلا جائے۔ ایک سوال پوچھے اور جواب کا انتظار کئے بغیر دوسرا سوال داغ دے۔ ایک موضوع سے کسی دوسرے موضوع کی طرف چھلانگ لگا دے۔ وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو جاتا۔

ہائیڈرو سائیٹک ایسڈ (Hydrocyanic Acid): ایسا محسوس ہو جیسے دماغ پر ہادل تیر رہے ہیں۔

سینٹورا ٹیگٹا (Centaurea Tagana): ذہنی پریشانی اور حماقت۔ کسی ایک چیز پر کبھی بھی توجہ مرکوز نہ کر سکے۔ کوئی ایک کام شروع کرے اور پھر اسے اوجھڑا چھوڑ کر دوسرے کو شروع کر دے اور اسی ڈگر پر چلتا رہے۔ ست ہو اور ارٹاکاز توجہ کے قابل نہ ہو۔ مریض کی یادداشت جاتی رہے، تشویش میں مبتلا رہے اور محسوس کرے کہ وہ اچانک مری جائے گی۔ بدگمان، خیال کرے کہ اس کا شوہر اسے پاگل خانے میں داخل کرانے ہی والا ہے۔ غلط بس یا ریل پکڑ لے یہ جانے بغیر کہ اسے کہاں جانا ہے۔ جب کبھی صحیح رخ کی سواری پر سوار ہو جائے تو مطلوبہ جگہ سے اترے بغیر گزر جائے۔

ڈلکامارا (Dulcamara): ذہنی پریشانی، کسی بات کے لئے بھی مناسب الفاظ نہ مل سکیں۔

ایسٹک ایسڈ (Acetic Acid): ذہنی پریشانی، اپنے بچوں کو بھی نہیں جانتی، قریب کے واقعات کو بھی بھول جائے۔ ذہنی کوفت کے دورے، چڑچڑاپن، خیال کرے کہ کچھ ہوسنے والا

اگریکس ایم (Agaricus M): یہ قوتانہ اور حماقت باتیں کرے۔ بے موقع گائے اور سیٹیاں بھائے، شعر کے اور چشمن گونیاں کرے۔ یا کسی دوسری متضاد حالت میں غرق ہو جائے، اپنے ماحول سے الگ تھلگ رہے۔ خود پسندی، ضدی اور منکبہ بن جائے، غبی، بھونڈا اور بھدا۔

انکارڈیم (Anacardium): ذہنی طور پر کمزور ہو اگرچہ مکمل طور پر فائز العقل نہ ہو۔ ست قسم (بچنے میں بہت دیر لگائے) یا دراشت کمزور، بھلنڈ، افسردگی اور (دماغی) ذہنی سستی، غیر مستقل مزاجی، کوئی فیصلہ نہ کر سکے خواہ اچھا ہو یا برا۔ وہ ہچکچاتا ہی رہے اور اکثر کچھ بھی نہ کر سکے۔

کینابیس سائوا (Cannabis Sat): اپنی ذات کی پہچان سے متعلق ذہنی پریشانی، سر کا چکرانا، ذہنی پریشانی کے ساتھ۔

سیکوتادیر (Cicuta vir): دیکھنے کی حس، سونگھنے کی حس اور دیگر تمام حسیں خلل انداز ہوں اور ذہنی پریشانی میں مبتلا کریں۔ اس کا گھر، شناسا چہرے اور جھجیس، پ، کھائی دیں۔ سیلیسا (Silicea): طویل مہنتوں اور کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی خاطر راتوں کو جاگنے کے باعث طلباء، دکلا اور پادریوں میں ذہنی تھکان۔

دلجوئی یا دلاسا (Consolation)

نیرم میوریکیم (Natrium Muraticum): اداسی اور رونے کی کیفیت میں دلجوئی سے زیادتی ہو۔

لیلیئم ٹیگرینم (Lilium Tigrinum): رحم سے متعلق ذہنی تکلیفات میں دلجوئی سے اضافہ ہو۔

پالسٹیل (Pulsatilla): جب مریض دل جوئی سے بہتری محسوس کرے۔

اگنیٹیا (Ignatia): ہسٹیا کے مریضوں میں دلجوئی سے علامات میں زیادتی ہو۔

سپیٹا (Sepia): جن مریضوں میں قبض، لیکوریا کے ساتھ مشروط ہوتی ہے ان میں دل جوئی کرنے سے علامات میں زیادتی ہو۔

کافیا (Coffea): دل جوئی کرانا نہ چاہے۔ تنہا اپنی بے چارگی سے لطف اندوز ہونا چاہے۔ خوش ہونے یا اپنے خوش کئے جانے کی کسی بھی کوشش پر برا مان جائے۔

سبیل سر (Sabal Ser): ہمدردی اسے ناراض کر دے۔

تضاد یا تردید (Contradiction)

اورم میٹ (Aurum Met): تردید کے نتیجے میں امراض لاحق ہو جائیں۔
 لائیکوپوڈیم (Lycopodium): تردید کو برداشت نہ کر سکے۔
 کافیا (Coffea): تضاد کے باعث درد سر ہو جائے۔
 فیرم مٹلیکیم (Ferrum Metallicum): تردید گوارا نہ ہو، ہنکارا ہو۔

طلب — (Craving)

(دیکھئے۔۔ "خواہش")

موت — (Death)

(یعنی موت۔۔ Conviction Of)

بپتیشیا (Baptisia): ٹائی فائیڈ بخار میں۔
 لیکسیس (Lachesis): تنفس میں تنگی کے دوران۔
 سورینم (Psorinum): ٹائی فائیڈ بخار میں لیکن نکسیر پھوٹ جانے پر افادہ ہو۔
 کامفر (Camphor): تبخیر معدہ میں۔
 آپس (Apis): دل کی عصبوی بیماریوں میں۔
 کافیا (Coffea): درد نہ میں۔
 اکونائٹ این (Aconite N): دوران حمل، موت کے خوف کے ساتھ۔
 ہیلی بوریس نیک (Helleborus Nig): مرنے کے خوف کے بغیر موت کے دن کی پیشین گوئی کرے۔

خوف (موت کا) — (Fear Of)

اکونائٹ این (Aconite N): موت کا ڈر، دوران حمل۔ مرنے کے دن اور گھڑی کی پیشین گوئی کرے۔ مریض کو یقین ہو کہ اس کی بیماری انجام کار مسلک ثابت ہوگی۔
 ڈی جی ٹیلیس (Digitalis): امراض قلب میں۔
 نکس وامیکا (Nux Vomica): خود کشی کے رجحان کے ساتھ لیکن مریض مرنے سے خوف زدہ ہو۔
 الیومنا (Alumina): موت کا خوف، خود کشی کے خیالات کے ساتھ۔

کالی فاس (Kali Phos): زندگی کی صحت کے ساتھ۔
 وریرٹرم ایلیم (Veratrum Album): موت کا خوف ہیضہ میں 'ہاتھ پر ٹھنڈے پینے کے ساتھ۔
 کوکولس (Cocculus): موت کا خوف اور کسی انجانے خطرے کا ڈر۔
 اویئم (Opium): سر پر منڈلائی موت کا ڈر 'خوف اور دہشت کے اظہار کے ساتھ۔
 آرسنک ایلیم (Arsenic Alb): ایسی موت کا خوف جو اچانک آجائے جب وہ اکیلا ہو۔
 اکتیاسپائی کاکٹ (Actea Spicata): مرنے کا خوف 'خاص طور سے رات کے وقت بستر میں۔

خواہش (موت کی) (Longing For)

اورم فول (Aurum Fol): موت کی تمنا 'انتہا درجے کی خوشی کے ساتھ 'کیونکہ مریض سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کے لئے موزوں نہیں ہے۔
 اورم میت (Aurum Met): ذاتی خرابی کے باعث مستقل طور پر خود کشی کرنے کی ٹھانی رہے۔ پرلے درجے کا شدید مانگو لیا 'تصور کرے کہ وہ کسی چیز میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہر کام غلط کرے۔ ناامیدی۔۔۔ اور اسی وجہ سے زندگی سے شدید نفرت کرے۔ خیال کرے کہ وہ اس دنیا کے لئے ناموزوں ہے۔

دھوکہ بازی — (Deceiving)

پلیئم (Plumbum): دھوکہ بازی اور فریب دہی کی طرف مائل رہے۔ ست قسم 'مصنوعی بیماری 'مریض اپنی بیماری کو بڑھا چڑھا کر مبالغہ کے ساتھ بیان کرے۔
 کوکا (Coca): صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی حس جاتی رہے۔ چڑچڑاہٹ کو شہ نشینی اور گمراہی سے خوش ہو۔
 ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): ڈر پوک اور گھبرا جانے والا 'غش کھا جانے والا اور بیجان میں کپکپائے 'دھوکہ بازی کا رجحان۔
 کاسٹیکم (Causticum): دھوکہ دینے کی خواہش 'لڑائی بھگڑنے کے میلان کے ساتھ 'ہلا دوجہ شور مچانے والا۔

مغالطے یا وسوسے (Delusion)

(قریب نظر، اوراک، وہم اور اندیشہ)

(Hallucination, Perception, Illusion & Apprehension)

سٹرامونیم (Stramonium): جانوروں کے 'کالے کتوں وغیرہ کے خواب (ان علامات پر اس دوا سے نمونیہ کا علاج بھی کیا جاتا ہے) خود کو دو خیال کرے 'خیال کرے کہ وہ لمبا ہے اور ایک حصہ کہیں کھو گیا ہے۔ اپنے ارد گرد کی اشیاء کو چھوٹا خیال کرے۔ تھائی اور تاریکی کو برداشت نہ کر سکے۔ روشنی اور رفاقت لازم ہو 'بھوتوں کو دیکھے' آوازیں سنے اور روحوں سے بات کرے۔ مریض محسوس کرے کہ کھٹکوں کا ایک لمبا چوڑا قافلہ اس کے تعاقب میں ہے اور ان کے پیچھے بھونروں کا ایک جلوس ہے اور پھر کارڈچوں کا ایک لشکر کا لشکر اس کے اوپر رہنکتا چلا آ رہا ہے۔ مریض اپنے سامنے کی بجائے اپنی ایک طرف ہولناک شبیہیں دیکھے۔ عشقیہ گیت گائے اور فحش باتیں کرے۔ قریب نظر اور ہریان میں مبتلا ہو 'چھرا کھونپے اور کانٹے کی کوشش کرے' چیزوں کو غلط ناموں سے پکارے 'اپنے پوٹوں کو شہتیر اور اپنے کمرے کو اصطبل کہے۔ خدا سے باتیں کرے' وعظ بیان کرے اور پیشین گوئیاں کرے۔

لیکٹیکا وائروسا (Lactuca Virosa): محسوس کرے جیسے ہوا میں تیر رہا ہے یا زمین سے بلند ہو کر چل رہا ہے۔

کلورلیم (Chloralium): رات دہشت ناک ہو 'پادریوں کے خواب دیکھے' جب اندھیرے میں ہو یا جب آنکھیں بند کرے تو آوازیں سنے۔

لیک لینیٹم (Lac Can): سانپوں کے توہمت تصور کرے کہ اس کے ارد گرد سانپ ہی سانپ ہیں۔ اس ذرے کہ کہیں کوئی سانپ اسے کاٹ نہ لے آنکھیں بند کرنے سے بھی خوف زدہ ہو۔ محسوس کرے کہ ہوا میں چل رہا ہے۔ اذیت ناک سوچیں۔ محسوس کرے کہ چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے 'خیال کرے کہ وہ جو بات بھی کہتی ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو خیال کرے کہ یہ 'وہ خود نہیں ہے۔ اس کی جائیداد اس کی اپنی نہیں ہے' جو ناک اس کے چہرے پر ہے کسی اور کی ہے۔

سباڈیلا (Sabadilla): غلط فہمیاں (غلط اندازے لگائے) جیسے اپنے جسم کے متعلق غلط فہمی کا شکار ہو 'مثلاً اپنے آپ کو حاملہ خیال کرے حالانکہ پیٹ محض ہوا سے پھولا ہو۔

پلاٹینم (Platinum): غرور یا اپنے متعلق خوش فہمی۔ مریض خیال کرے کہ وہ دوسروں سے ارفع ہے 'خیال کرے کہ اس کا جسم دوسروں سے لمبا ہے' منگیروں پر ازخوت۔

کیمفر (Camphor): ہر متحرک چیز اسے بھوت محسوس ہو اور کمرے میں موجود بے جان

چیزیں زندہ ہو کر اسے ڈرائیں۔

کلیسریا کارب (Calcarea Carb): ایسے اشخاص کو دیکھئے اور ان سے گفتگو کرے جو موجود نہ ہوں۔ مریض تصور کرے جیسے کہ وہ کتوں میں گھری ہوئی ہے، ہر کام سے بے زاری۔ وہ اداس اور غم زدہ رہے، پر از خوف اور زندگی سے اکتائی ہوئی۔

ایل تنھس (Ailanthus): یوں محسوس کرے جیسے کوئی چوبایا ایسی ہی کوئی چھوٹی چیز اس کی ٹانگ پر اور بدن پر ریگ رہی ہے۔

اینا کارڈیم (Anacardium): مریض خود کو اچھی اور بری خواہش کے درمیان پاتا ہے۔ اس کی بیرونی خواہش اسے کسی برے کام کے لئے اکساتی ہے جبکہ اس کی اندرونی خواہش اسے ایسا کرنے سے روکتی ہے۔ مذہب، ایک لمحہ کو سوچے کہ یہ ایسا ہے لیکن اگلے ہی لمحہ کئی وجوہات اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیں کہ ایسا نہیں ہے۔ کم حوصلہ، تھڑدلا، خوف میں مبتلا ہو کہ کوئی اس کے تعاقب میں ہے، چوروں کے وہم میں ادھر ادھر دیکھے، خوف زدہ ہو کہ دشمن اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہر چیز اور ہر شخص سے خوف زدہ ہو۔ ظالمانہ اور پر تشدد اعمال کرنے کی اس کی بری خواہش اس کا پیچھا کرتی رہے جبکہ اچھائی کی خواہش اسے روکتی رہے اور قابو میں رکھے۔ (ہائپر سائیکس، ہیلڈونا اور سٹرامونیم بھی ملاحظہ فرمائیں) اپنی بہن اور والدہ کی آوازیں سننے حالانکہ وہ وہاں سے بہت دور ہوں۔

ہیلی بوریس ٹانگ (Helleborus Nig): جسم اور ذہن کی بدحواسی اور کاپلی، ایسی مدہوش جس سے مشکل ہی سے نکالا جاسکے اور جب وہ ہوش میں آجائے تو روحوں کے متعلق باتیں کرے یا کہے کہ وہ شیطانوں کو دیکھتا ہے جن کے سینک اور دس ہیں۔ قریب نظری۔

کاسٹیکم (Causticum): مریض کے ضمیر پر چونیں لگیں جیسے اس نے کوئی جرم کیا ہو۔

فیرم آیوڈ (Ferrum Iod): محسوس کرے جیسے اس کا بدن تیس فٹ تک لمبا ہو چکا ہے۔

بپٹیشیا ٹی (Baptisia T): محسوس کرے جیسے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ٹھہر چکا ہے۔

کیموملا (Chamomilla): مریض ایسے اشخاص کی آوازیں سنے جو وہاں موجود نہ ہوں، بس کے باعث اس کی نیند خراب ہو جائے۔

زینک میٹ (Zincum Met): اپنے اندر سے آوازیں سنے جو گلی گلوچ کریں اور گندی زبان بولیں۔

ہیلڈونا (Belladonna): خوفناک چہرے اور عفریت دیکھے۔ کاسٹے اور مارے۔ مریض خود کو یا دوسروں کو اس وقت تک زخمی نہیں کرے گا جب تک کہ وہ یہ نہ سوچے کہ یہ سب کچھ وہ اپنے دفاع میں کر رہا ہے۔ مریض اس آدمی پر حملہ کر دیتا ہے جو اس کی خواہش کے خلاف کام

کرتا ہے۔

سپاکی جیلیا (Spigelia): اندیشہ مند اور اعصابی مریضوں کے لئے۔ کبھی استرا استعمال نہ کریں کیونکہ کوئی چیز انہیں مستقل طور پر اندر سے اکساتی رہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اپنا گلا کاٹ ڈالیں۔ کھانے کی میز پر بھی اور آگے پیچھے بھی کھانے کے کائنات سے خود کشی کی خواہش ہو، تیز دھار اور نوکیلے آلات سے خوف زدہ رہے۔

تھوجا (Thuja): یہ احساس کہ جیسے زندہ بچہ اس کے پیٹ میں ہے۔ اپنے جسم کو دبلا پٹکا، نرم و نازک، کمزور محسوس کرے۔ محسوس کرے کہ اس کا جسم آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے، جیسے شیشے سے بنا ہو۔

کینابیس انڈیکا (Cannabis Ind): جگہ اور وقت کا غلط ادراک ہو۔ مریض محسوس کرے کہ جیسے اس نے گزشتہ چھ ماہ سے کھانا نہیں کھایا حالانکہ ابھی کھانا ختم کر کے بیٹھا ہو۔ ایک میل کے فاصلے کو ایک سو میل کا فاصلہ خیال کرے۔ اس کا ذہن کبھی نہ ختم ہونے والے خیالات سے بھرا رہے۔ گیندوں اور ہاتھیوں کے توہمات جو اس کا پیچھا کرتے محسوس ہوں۔ تصور ہی تصور میں دل خوش کن موسیقی سنے، آنکھیں بند کرے اور لذت انگیز سوچوں اور خوابوں میں کھو جائے۔ تصور کرے کہ کوئی اسے بلا رہا ہے۔ تصور کرے کہ وہ غیر جسمانی طور پر ایک وسیع و عریض جگہ میں پھیلا ہوا موجود ہے۔ اسے اپنا جسم پھیلتا محسوس ہو حتیٰ کہ اسے اپنے سر کا کلاہ آسمان کی محراب سے بھی بڑا معلوم ہو۔ سب کچھ غیر حقیقی دکھائی دے۔ اپنے آپ کو بھی غیر حقیقی محسوس کرے۔ تمام احساسات میں اعتماد رہے کا مقابلہ پایا جائے۔ آوازیں سننے اور انتہا درجے کی بہترین موسیقی سننے۔ حسین اور شاندار (پر شکوہ) مناظر (خواب) دیکھنے جن کا مقابلہ صرف جنت ہی سے کیا جاسکتا ہے۔

آرسنک البم (Arsenic Alb): تصور کرے کہ گھریلو روں سے بھرا پڑا ہے۔ سارے گھر میں بھاگتا پھرے، چوروں کی تلاش میں یا خوف کے باعث خود کو ان سے چھپاتا پھرے۔

سکیوٹا وائروسا (Scuta Virosa): محسوس کرے کہ وہ کسی عجیب و غریب جگہ پر ہے اور معمولی حالات میں نہیں رہ رہا۔ ہر چیز عجیب اور تقریباً خوف ناک دکھائی دے۔ نئی نوع انسان کی خفارت، اپنے دوستوں سے دور بھاگے کیونکہ ان کی حماقتوں سے اسے کراہت ہو۔

وسکم البم (Viscum Album): وہم ہو جائے کہ مریض کا اوپر والا دھڑ ہوا میں تر رہا ہے۔ کوکولس (Cocculus): وہم ہو کہ کوئی چیز دیواروں پر، کرسیوں پر، فرش پر اور ہر کہیں لڑھک رہی ہے اور وہ اس پر بھی لڑھکے گی۔

ہائوسائیمس (Hyoscyamus): تصوراتی لوگوں سے باتیں کرے جیسا کہ وہ اس کے ساتھ

بیٹھے ہوں۔ مردہ بیوی سے 'بہن سے یا شوہر سے گفتگو کرے جیسا کہ وہ دوبارہ دنیا میں آچکے ہوں۔ چیزوں کو حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، چوہے، بلیاں تصور کرے۔ محسوس کرے کہ جیسے اس کے ہاتھ اور انگلیاں بہت لمبی ہو گئی ہیں۔

کوکین (Cocaine): خیال کرے کہ وہ اپنے متعلق ناخوش گوار باتیں سنتا ہے۔ سننے کے قریب میں مبتلا ہو، بستر پر جانے کے گھنٹوں بعد تک نہ سو سکے، گھنٹوں اور کیڑے مکوڑوں کو اپنے کمرے اور بستر پر دیکھے اور محسوس کرے، اخلاقی حس کند ہو جائے۔

الیومنا (Alumina): جب مریض کوئی بات کہے تو یوں محسوس کرے جیسے یہ بات کسی اور نے کہی ہے۔ اسی طرح سے جب وہ کوئی چیز دیکھے تو محسوس کرے کہ یہ چیز کسی اور نے دیکھی ہے یا جیسے کہ وہ صرف اسی صورت میں دیکھ سکتا ہے کہ وہ خود کو کسی دوسرے شخص کے اندر محسوس کر دے۔ اپنی ذات کی شناخت سے متعلق پریشانی۔

گلوٹائن (Glutamine): مریض اپنی تھوڑی گھنٹوں تک لمبی محسوس کرے، بار بار اپنی تھوڑی کو چھو کر یقین کرے کہ ایسا نہیں ہے۔

کاربونیم سلف (Carbonium Sulph): آوازیں سننے اور یقین کر لے کہ وہ ڈاکے میں ملوث ہے۔

لیکسیس (Lachesis): جب مریض کسی کو سرگوشی کرتے دیکھے تو خیال کرے کہ وہ اسی کے متعلق بات کر رہے ہیں اور اسے نقصان پہنچانے کا پروگرام ترتیب دے رہے ہیں۔ مریض اپنے متعلق خیال کرے کہ وہ کسی مافوق الفطرت ہستی کے قابو (قبضے) میں ہے جس کا وہ ہر حکم (جزوی طور پر خواب میں) مانے۔ اس بات کا خوف کہ اس کے دشمن اس کے تعاقب میں ہیں۔ اس بات کا خوف کہ دوا اصل میں زہر ہے۔ اس بات کا خوف کہ گھر میں لٹیرے گھس آئے ہیں چنانچہ مریض کھڑکی میں سے باہر پھلانگ لگا دیتا ہے۔

میلی لوتس (Mellilotus): مغالطہ، مریض خیال کرے کہ ہر کوئی اسی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ بلند آواز سے بولنے سے ڈرے، بھاگ جاتا ہے۔

اگنوس بی (Agnus C): مغالطہ اس بات کا کہ ہیرنگ (مچھلی کی ایک قسم) کی یا مٹک کی بو آ رہی ہے۔

کوکا (Coca): جلد پر اور کپڑوں پر کیڑے ریگنے کا وہم۔

اسارم یورپ (Asarum Europ): محسوس کرے کہ وہ ہوا میں منڈلا رہا ہے۔ چکر آئیں جیسے شراب پی رکھی ہو۔

بیرٹا کارب (Baryta Carb): یوں محسوس کرے جیسے ہر چیز اس کے ساتھ ہلتی ہے جیسے کہ

وہ بھری جہاز میں ہے۔

کروکس (Crocus): محسوس کرے کہ جیسے کوئی زندہ چیز اس کے پیٹ میں ہے۔ تصوراتی حمل بدلتا ہوا مزاج۔

مارفینم (Morphinum): محسوس کرے کہ جیسے کمرہ بچوں سے بھرا پڑا ہے۔ بستر کے پائنتی آدمی محسوس ہو، بیماری کی علامات واضح نہ کر سکے، معمولی معمولی باتوں پر آہیں بھرے۔

میڈورنیم (Medorminum): محسوس کرے کہ جو کام آج کئے گئے ہیں وہ ایک ہفتہ پہلے کئے گئے تھے جیسے کوئی اس کے عقب سے سرگوشیاں کر رہا ہے۔ مریضہ محسوس کرے کہ فرنیچر کے پیچھے سے چہرے نمودار ہوتے ہیں اور اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں "آجاؤ۔" محسوس کرے کہ زندگی حقیقی نہیں ہے بلکہ ایک خواب ہے۔ خود کو ناقابل معافی گناہ میں ملوث پائے اور خیال کرے کہ وہ دوزخ میں دھکیلی جا رہی ہے۔ کوئی پرواہ نہ ہو کہ آیا وہ دوزخ میں جاتی ہے یا جنت میں، بے تاب، بہت خود غرض۔

مرکیورس (Mercurius): یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے کیڑے اس کے حلق میں اوپر کو چڑھ رہے ہیں، سب کا چھلکا جیسے گلے میں پھنسا ہو، جیسے کانوں میں برف بھری ہو، کانوں سے جیسے ٹھنڈا پانی بہہ رہا ہو۔

پالادیئم (Palladium): مریضہ محسوس کرتی ہے کہ اسے نظر انداز کیا گیا ہے، عزت نفس بھروسے ہونے کا احساس۔

پتھرولیم (Petroleum): مریضہ تصور کرے کہ اس کے ساتھ بستر میں کوئی دوسرا شخص یا کوئی بچہ بھی موجود ہے۔ خواب دیکھے کہ وہ دو ہے یا دو سے زیادہ ہے، بازو اور ٹانگیں دوگنا ہونے کا احساس۔

پلائینیم (Platinum): اسے یوں لگے کہ وہ اپنے خاندان میں سے نہیں ہے۔ تھوڑی سی غیر حاضری کے بعد ہر چیز سراسر بدلتی ہوئی محسوس ہو، بصری اور ذہنی، دونوں اعتبار سے چیزوں کا تناسب معلوم کرنے کی حس کا جائزہ رہتا۔

سورنیم (Psomium): محسوس کرے کہ دماغ باقی جسم سے الگ ہو چکا ہے، جیسے کہ اس کے ماتھے (سرا) میں جگہ ٹاکانی ہو، جیسے کہ اس نے جن کانوں سے سنا ہے وہ اس کے اپنے نہیں ہیں۔

سائی کلیمین (Cyclamen): مریضہ خود کو ناپاک خیال کیا کرے، کسی آدمی کو یا کسی چیز کو چھو لینے کے بعد ہر مرتبہ نہانا چاہے، ہر چیز دو چند دکھائی دے، محسوس کرے کہ کوئی شخص بستر میں اس کے ساتھ لیٹا ہوا ہے۔ فرائض کی ادائیگی نہ ہونے سے تکالیف یا برے کام میں ملوث ہونے سے تکالیف۔

سٹیفنی سیکریا (Staphisagria): مریض جب چلے تو محسوس کرے کہ کوئی شخص اس کا پیچھا کر رہا ہے، یہ احساس اسے پریشانی اور خوف میں مبتلا کر دے اور وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے قاصر ہو۔
سلفر (Sulphur): ہر چیز مسن میں تبدیل ہو جائے، پرانے جھیتڑے اور پرانی چھڑیاں حسین فن پارے دکھائی دیں، ہر چیز یاری لگے اور مریض اسے پر رہے، ہر چیز کو چھونے کی خواہش۔
کینابیس سیٹ (Cannabis Sat): خود کو قتل کر دینے کا حکم سن سناقتی ہوئی سرگوشیوں میں سنے اور خیال کرے کہ یہ اعلیٰ ترین ہستی کا حکم ہے۔

کیوپرم ایسی ٹیکم (Cuprum Aceticum): یہ وہم کہ کوئی پولیس والا اسے گرفتار کرنے آچکا ہے۔ فریب نظر، ہر قسم کے اجسام اور عمارات کے بارے میں، خاص طور سے شام کے وقت، جب آنکھیں بند کرے یا جب سونے لگے۔

اولینڈا (Oleander): مریض اگر کسی چیز یا کسی شخص کو چھو لے تو خود کو اور اپنے کپڑوں کو دھوئے، جیسے کہ اسے یقین ہو کہ اس نے کسی گندی چیز کو چھو لیا ہے جس کے بعد اسے خود کو اور کپڑوں کو دھونا ضروری ہے۔

پائیروجینیئم (Pyrogenium): اس بات کا فریب ہو کہ وہ بہت امیر آدمی ہے اور بینک میں اس کی بڑی بڑی رقم پڑی ہوئی ہے۔

نکس موسکاٹا (Nux Moschata): خود کو دو محسوس کرے اور اپنی دوسری ذات کو کھینچا ہوئے دیکھے، گھویا ہوا محسوس ہو اور جب اسے بلایا جائے تو اپنے آپ میں واپس آکر پریشان ہو جائے۔ مریض محسوس کرے کہ اس کے دو سر ہیں۔

ابتدائی دیوانگی

(Dementia Praecox)

(ذہانت، یادداشت اور سبب کا کھو جانا)

(Loss of intellect, Memory and Reason)

نکس دامیکا (Nux Vom): ہر چیز اور ہر شخص میں سے نقص نکالنے کا مزاج، دوسروں کے الفاظ اور توجہ کے متعلق انتہائی درجہ کی حساسیت، اپنے بہترین دوستوں کو قتل کرنے کی طرف مائل ہو، خود کشی کرنا چاہے لیکن بزدلی کے باعث نہ کر سکے، بہت ہی چڑچڑا، جھگڑالو اور کینہ پرور۔

میریوریس (Mercurius): شائستگی کی حس کا مکمل طور پر جاتے رہنا۔ جسمانی طور پر غلیظ اور اپنی عزت نفس کا جنازہ نکال دینے والی ذہنیت رکھنے والا، یادداشت انتہائی شدید کمزور، تصور

خراب 'سانس گندا' بھاری پالش کی ہوئی زبان۔
 اگنیشیا (Ignatia): غم کے باعث اتحاد رہنے کی ذہنی حساسیت 'معاملات محبت میں مایوسی۔
 کلسیریا کارب (Calcarea Carb): دیگر اعضاء کے علاوہ دماغی ترقی میں مکمل طور پر
 فقدان 'بھول جانے کے مرض کے ساتھ 'سستی اور اکتساب علم کی ناقابلیت۔
 لائیکوپوڈیم (Lycopodium): 'عظیم دباؤ' بے حوصلگی 'دل شکست و آزرده رہے' اپنی نجات
 کے متعلق فکر مند رہے' اپنے فرائض انجام دینے کے قابل ہونے کی فکر' یہ فکر کہ وہ اپنے
 امتحانات میں کامیاب ہو جائے' بد مزاج' غیر مطمئن' چڑچڑا' ٹھیکھا' بہت زیادہ ہوشیار اور غصیلہ
 قبض رہے اور کھنی غذا سے ڈکار آتے رہیں۔
 سٹیفیسیگریا (Staphisagria): بے خوابی' بزدلی' شرمیلے پن کے ساتھ۔ 'تغفر' غصہ'
 شرمساری' قنوطیت' ناامیدی' شرمیلہ پن' عزالت نشینی کی خواہش کے ساتھ۔
 کیومیلا (Chamomilla): حساسیت' چڑچڑا پن' زود رنجی' بہت جلد غصہ کر لے اور اس
 کے دور رس نتائج جھیل کرے۔
 ٹیرنٹولا ہیز (Tarentula His): کسی چیز پر طیش آجائے تو جو کچھ ہاتھ میں ہو اور جو کچھ ہاتھ
 میں آسکتا ہو' اٹھا کر پھینک مارے' معمولی سے اختلاف یا اعتراض پر دوسرے آدمی کو ہر اس چیز
 سے مارے جسے پکڑ سکتا ہو۔

افسردگی --- دباؤ (Depression)

کالی برومیتھم (Kali Br): مادہ منویہ کے اخراج کے بعد 'اڈیت ناک و سانس کے ساتھ بے
 خوابی اور اس بات کا اندیشہ کہ ہر چیز کی جو اس کے قریب ہے تباہی قریب آ چکی ہے' خوف اور
 اندیشوں کا دباؤ' ادھام اور اخلاقی فقدان کا احساس۔
 اورم میٹھ (Aurum Met): 'عظیم دباؤ' جس کے باعث مریض خود کشی کرنے کی طرف
 راغب ہو جائے۔
 نکس وامیکا (Nux Vom): مادہ منویہ کے اخراج کے بعد۔
 امبرا گریسیا (Ambra Grisea): بڑھاپے کے باعث مزاج کی شدت کی جگہ بے حوصلگی
 لے لے جس کے باعث افسردگی ہو۔
 آرٹنی میشیادوی (Artemisia V): مرگی کے حملے سے ایک روز پہلے افسردگی ادباؤ۔
 ہیلی بوریس (Helleborus): سرخ بخار کے بعد۔
 کروٹیلس (Crotalus): ضعف' غشی اور پائیس کو لمے میں درد کے ساتھ (افسردگی) ادباؤ۔

کینڈیم سلف (Cadmium Sulph): آزرہ کی، تاامیدی اور ہمت کے فقدان کے باعث
 افسردگی۔ خوراک 200 (Dilution)۔
 زنگم میٹ (Zincum Met): جلدی امراض کے ساتھ افسردگی (دباؤ)۔ روزانہ دو خوراکیں
 دی جانی چاہئیں۔
 نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid): شام کے وقت افسردگی (دباؤ)۔
 کینابیس سیٹوا (Cannabis Sat): قبل از دوپہر افسردگی (دباؤ)۔
 فاسفورس (Phosphorus): اس یقین کے ساتھ کہ وہ ایک ناقابل علاج دل رکھتا ہے۔
 جلیسی میم (Gelsemium): گرمی سے 'نامردی کے باعث افسردگی (دباؤ)۔
 نیٹرم میور (Natrium Mur): جوع الکلب (بے تحاشہ بھوک) کے باعث افسردگی۔
 کیلیڈیم (Caladium): نامردی کے باعث افسردگی۔
 ڈی جی ٹیلیس (Digitalis): دل کی دھڑکن کے ساتھ افسردگی۔
 کوکا (Coca): محنت و مشقت کی زیادتی کے باعث افسردگی۔
 فانیولا (Phytolacca): وجع المفاصل (جوڑوں کا درد) میں اور آٹھک میں۔
 آگنس کاسٹ (Agnus Cast): عمومی ناتوانی اور قوت حیات کی افسردگی۔ زبردست اداسی
 موت کی آمد کے غیر متزلزل خیال کے ساتھ۔
 میوریکس (Murex): جب لیکوریا سے اتفاق ہو۔
 ایسڈ فاس (Acid Phos): دباؤ (افسردگی) جو لائے اعتماد رستے کی لا تعلقی 'بے پرواہی' ہے
 رنجی وغیرہ۔
 امونیا کارب (Ammonia Carb): حوصلے کی افسردگی۔ مریض بہت زیادہ روتی ہے 'بے
 ہوشی کے دورے پڑتے ہیں 'پریشانی ہو' بے اطمینانی ہو اور حرکت سے لاغری ہو 'کمزوری کے
 باعث ضیق النفسی۔

خواہش (طلب)

(Desire "Craving")

(انگریزی میں "Eatstake")

سلفر (Sulphur): مریض ہر وقت شراب نوشی کا خواہاں ہو۔ صبح سے شام تک شراب پینا
 چاہے 'بچہ ناک سے بننے والا مواد کھاتا ہے' حاملہ عورتوں میں پرائمری کی طلب۔
 فاسفورس (Phosphorus): یہ دوا معدہ کی جلن کو دور کر کے شراب نوشی کی خواہش کا

سہباب کرتی ہے، قبل ازیں یہی معدہ کی جلن غیر معمولی اشتہا کا باعث بنتی ہے۔
پلمبم (Plumbum): اس میں ایک عجیب علامت یہ ہے کہ مریض شراب خریدنے کے لئے
 رقم چوری کرتا ہے لیکن جیسے ہی اس پر سے پابندی اٹھائی جائے تو یکایک شراب پینے کی خواہش
 جاتی رہتی ہے۔

ایسڈ سلفیورک (Acid Sulphuric): شراب نوشی کی طلب کو ختم کرنے کے لئے، ایک
 حصہ سلفیورک ایسڈ کا مکپھر اور تین حصے شراب ملا کر دس سے پندرہ قطرے کی خوراک دن
 میں تین مرتبہ، تین چار ہفتہ تک دی جائے۔

ٹیرینٹولا ہسپانیولا (Tarentula H): راکھ کھانے کی خواہش، خاص طور سے حمل کے دوران
 اور پرورد حیض میں، ریت کھانے کی خواہش۔

ایسڈ نائٹریک (Acid Nitric): چاک کھانے کی خواہش، چربی، نمک، چونا اور مٹی یا پلستر
 کھانے کی خواہش۔

الیومنا (Alumina): نشاستہ، کچے چاول، چاک، ٹکڑی کا کونکہ، چائے اور کافی کی تلچھٹ،
 تیزاب اور ناقابل ہضم اشیاء کھانے کی طلب۔ آلوہ گوشت اور بیڑ شراب سے نفرت۔

سائی کوٹاوائروسا (Cicuta Vir): بچہ کو کونکہ منہ میں رکھے اور بڑے شوق سے اسے چبائے
 اور نگلے، کچے آلو کھانا چاہے، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو کہ وہ حقیقت میں چیزوں کے درمیان
 امتیاز ہی نہ کر سکے کہ کوئی چیز کھانے کے لئے مناسب ہے اور کون سی چیز غیر مناسب ہے۔

قیورکس (Quercus): یہ دوا شراب، تمباکو اور چائے کے برے اثرات کو دور کرتی ہے۔
سٹروفین تھس (Strophanthus): شراب کی طلب کو یہ دوا زائل کرتی ہے۔ مدر ٹچھر کے
 پانچ سے دس قطروں کی خوراک دن میں دو بار دیجئے۔

پسی فلورا ان، ایویناسیٹ (Passiflora In, Avena Sat): مارفیا اور افیون کی طلب کو
 یہ دوا ختم کرتی ہے۔ مدر ٹچھر کی پانچ سے دس قطروں کی خوراک دیجئے۔

فالی ٹولا کا (Phytolacca): دانتوں اور مسوڑھوں کو کاٹنے کی نہ رکنے والی خواہش، خصوصاً
 دھوائے ہوئے گوشت کی اور عموماً عام گوشت کی طلب۔

منگانیئم (Manganum): ہر وقت بستر پر لیٹے رہنے کی خواہش، مریض آرام سے بہتری
 محسوس کرے جبکہ حرکت سے اس کی تکالیف میں اضافہ ہو جائے۔

ہیمپیر سلفر (Hepar Sulphur): سرکہ اور اچار کی زبردست خواہش۔

ہائیوسکیمس (Hyoscyamus): دیوانے لوگوں میں کام کرنے کی خواہش۔

کیلڈیم (Caladium): یہ دوا تمباکو کا تریاق ہے اور اس کی طلب کو زائل کرتی ہے۔ اس

کی علامات حسب ذیل ہیں: یادداشت کا جاتے رہنا، غیر حاضر دماغی اور بھلوترپن، ہر کام جلد بازی میں کرے، یہ دوا جوف بصر کو بھی اگر اوپر دی گئی علامات ہوں تو درست کرتی ہے۔

پالڈیم (Palladium): خوشامد کئے جانے کی خواہش۔

لیڈم پال (Ledum P): یہ دوا دہسکی کی طلب کو زائل کرتی ہے۔

کالی بانیکیرام (Kali Bi): پیڑ شراب اور تیزابی مشروبات کی خواہش۔

میڈورہیم (Medorrhinum): نمک، مٹھائیوں، سبز پھلوں، برف، کھٹی اشیاء اور سنگتوں کی طلب۔

مرکوریس (Mercurius): گائے کا گوبر اور جوہڑوں کا گارا (کچھن) کھانے کی خواہش۔

سینی کیولا (Sanicula): پیچھے دیکھنے کی نہ رکھنے والی خواہش۔

سپیا (Sepia): شراب، سرکہ اور مٹھائیوں کی خواہش۔

آئیوڈم (Iodum): گوشت اور نشہ آور مشروبات کی خواہش۔

تھلاپی بی (Thlaspi B): دودھ مکھن کی خواہش۔

سائی کلیمن (Cyclamen): سارڈین (ایک خاص قسم کی مچھلی) کھانے کی طلب۔

کروٹالس ایچ (Crotalus H): برف (آسمان سے گرنے والی ہلکی اور پارک برف) کھانے کی خواہش۔

سٹرامونیم (Stramonium): چیزوں کو اپنے دانتوں سے کاٹنے اور پھاڑنے کی شدید خواہش۔

تیزابوں (تیزابی مشروبات) کی زبردست خواہش، سرکہ سے بہتری ہو۔

مگنیشیا کارب (Magnesia Carb): تپ دق والے بچوں میں گوشت کھانے کی غیر معمولی خواہش۔

سس ٹس کین (Cistus Can): پتیر کی طلب جاڑا لگنے کے رجحان کے ساتھ جو لمبے عرصہ

تک قائم رہے، سردیوں میں شدت ہو، تیزابی غذا اور پھل کی چاہت جس کی وجہ سے درد اور اسہال میں مبتلا ہو۔

ایلیم سپیا (Allium Cepa): کچے پیاز کھانے کی خواہش۔

کونیوم (Conium): اپنا بہترین لباس پہننا پسند کرے۔ غیر ضروری خریداری کرے۔ چیزوں کی

بست ہی تھوڑی پرواہ کرے، انہیں ضائع اور برباد کرتا رہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): انڈوں کی خواہش، چوٹا کھائے، سلیٹ کی پتیلیں،

چاک، چٹنی مٹی، کچے آلو، مٹھائیاں، آئس کریم وغیرہ کھانے کی خواہش۔

اگریکس امیت (Agaricus Emet): پریشانی کے حملوں کے دوران، اچانک برف کے

ٹھنڈے پانی کی خواہش جس سے تکلیف میں کمی ہو۔
کلکیریا فاس (Calcarea Phos): سور کا خشک 'ٹمکین گوشت' سور کی ران کا گوشت 'ٹمکین اور دھونے گوشت کھانے کی خواہش' بہت زیادہ اچھارا ہو 'ابتدائی پیشہ۔
ار جیم ٹاٹریکیم (Argentum Nit): شکر (چینی) اور مٹھائیاں کھانے کی خواہش 'حالات' موافق نہ ہوں۔ نشاستہ اور اٹلے وغیرہ نہ کھا سکے حالانکہ بیمار نہ ہو۔

سلی سیم (Selenium): نشہ آور مشروبات کی خواہش 'گالیاں دینے کی (ہڈیاں) قریب قریب نہ رکھنے والی خواہش کے ساتھ۔

بیوفو (Bufo): جلق کی عادت پوری کرنے کے لئے تنہائی کی خواہش 'تنہائی کا شیدائی' حالانکہ تنہا ہونے پر دہشت زدہ ہو جائے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): میٹھی چیزوں اور گرم مشروبات کی طلب 'کافی اور گوشت سے نفرت کرے۔

برائی اونیا (Bryonia): کسی چیز کی خواہش لیکن مریض یہ نہ جانتا ہو کہ کس چیز کی اسے خواہش ہے۔ آپ بچے کو ایک کے بعد ایک کھلونا پیش کرتے رہیں لیکن وہ ہر ایک کو مسترد کرتا رہے گا۔

لیک فیل (Lac Fel): کانڈ کھانے کی زبردست خواہش۔

میزیریئم (Mezereum): چربی 'سور کا گوشت کھانے اور دودھ پینے کی خواہش۔

نٹرم سلف (Natrium Sulph): برف اور برف کے ٹھنڈے پانی کی طلب۔

انٹم ٹارٹ (Antum Tart): کھٹے اور تیزابی پھلوں کی خواہش جو اسے بیمار کر دیں۔

سر کے 'کھنی چیزوں' کھٹی شرابوں اور کھٹے پھلوں سے معدے کی تکالیف میں مبتلا ہو۔

وریرٹرم البم (Veratrum Alb): اپنے ہی پاخانے کو کھانے اور اپنے ہی پیشاب کو پینے کی زبردست خواہش۔

کوکا (Coca): شراب نوشی اور تمباکو نوشی کی خواہش 'عادی نشہ بازوں کے لئے۔

آرنیکا ایم (Arnica M): سرک کی طلب 'خصوصاً حاملہ خواتین میں۔

ٹکس دامیکا، ٹیکسیس، پلساٹیل (Nux Vom, Lachesis, Pulsatilla): براہی کی خواہش۔

کاسٹیکم (Causticum): نوجوان لڑکیاں شادی کی خواہش میں چلیں۔

ٹوباکم (Tobacum): سگریٹ نوشی کی طلب کو ختم کرتی ہے۔ ہر ہفتہ 200 یا 1000 کی خوراک دیں۔

کاربووتج (Carboveg): کافی 'تیزابی اشیاء'، مٹھائیوں اور نمکین چیزوں کی خواہش۔ قابل
ہضم اشیاء اور بہترین غذا سے بیزاری۔
انگس تراویرا (Angustura Vera): کافی کی عظیم ترین طلب۔

تباہ کن (Destructive)

بیلادونا (Belladonna): حامد، غصیلہ، کانے، مارے، بھاگ جانا چاہے، گھٹاؤنے چہرے اور
خوفناک مناظر دیکھے۔
کنٹھرس (Cantharis): تیز و تند ہڈیاں، شدید جنسی خواہش کے باعث چیخنے اور چلائے۔

نشوونما (Development)

برشا کارب (Baryta Carb): ذہنی نشوونما کا فقدان جبکہ جسمانی نشوونما ہوتی ہے، ایسے
مریضوں میں ہم خوف اور سادہ لوحی دیکھتے ہیں جیسی کہ بچوں میں پائی جاتی ہے، بچکانہ سادگی اور
معصومیت، 18 سال سے 52 سال کی لڑکیوں میں بچکانہ پن، گزریوں کے ساتھ کھیلنے اور بیوقوفانہ
باتیں کریں، بچکانہ طرز عمل۔ عورت اپنے میں دیر سے آتا عورتوں والے معمولات اور
ضروریات کو دیر سے اختیار کرتا۔

دہشت (Dread)

(تیز دیکھے "خوف")

کیڈمیم سلف (Cadmium Sulph): ذہنی یا جسمانی کوئی بھی کام کرنے سے دہشت زدہ
ہو۔

کونیم (Conium): اکیلا ہونے سے دہشت کھائے۔

چائنا آف (China Off): کتوں اور دیگر جانوروں سے دہشت زدہ۔

فاس فورس (Phosphorus): دہشت زدہ ہو کہ جیسے ہر کوئی کھدوے سے کوئی چیز دہشت
ہوئی یا ہر آری ہے۔

بوریکس (Borax): بچے کی طرف حرکت کرنے سے خوف کھائے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): مہوش، نمکین اور چڑچا، مردوں سے خوف زدہ، رفاقت
سے بے زار لیکن اکیلا رہنے سے بھی ڈرے۔

جلسیم (Gelsemium): حرکت سے خوف زدہ، اعصابی خوف، گلوکاروں اور مقررہوں

میں۔
انگیشیا (Ignatia): معمولی معمولی چیزوں سے دہشت کھائے۔

کھانا — (Eats)

وریمٹرم البم (Veratrum Alb): خود اپنا پانچا کھائے اور پیشاب پیئے۔
سلفر (Sulphur): بچے ناک سے بہتا ہوا مواد کھا جائیں 'نزلہ' زکام کا راجحان۔

فرار — (Escape)

بیلادونا (Belladonna): بھاگ جانے کی خواہش یا فرنیچر کے پیچھے بستر و فیروزہ میں پھپھ جانے کی خواہش۔

اوپیم (Opium): بخار، خصوصاً ٹائی فائیڈ میں کہیں بھاگ جانے کی خواہش۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): اپنے بچوں سے راہ فرار حاصل کرنے کی خواہش۔

وریمٹرم البم (Veratrum Alb): گردن توڑ نگار میں 'بھاگ جانے کی خواہش۔

مرکیورس (Mercurius): بستر یا میں فرار ہو جانے کی خواہش جیسے مریضہ خیال کرے کہ اس سے کوئی جرم سرزد ہو چکا ہے۔

ہائیوسکیمس (Hyoscyamus): بستر سے چھلانگ لگائے اور کہیں بھاگ جانا چاہے۔

امتحان (Examination)

ارجنٹم نائٹریکیم (Argentum Nit): یہ دوا امتحان میں ناکائی کے خوف و ہراس کے لئے مخصوص ہے۔ پیش از وقت دہشت جس کے باعث دست آنے لگیں۔ دروازے کے قریب بیٹھنا چاہے تاکہ فرار ہو سکے۔ سکول کے لڑکے جو سکول مدرسہ یا مسجد جانے سے خوف زدہ ہوں۔

ایناکارڈیم (Anacardium): امتحانات سے قبل خوف، بے تحاشہ مطالعہ سے کبھی نہ تھکیں 'مادہ منویہ کے اخراج سے اعصابی تھکاوٹ' یادداشت کی کمزوری۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): امتحانات میں پاس ہونے کا دباؤ، خوف کی فطری وجوہات کے باعث جھلاہٹ جس کی وجہ سے جسمانی اعضاء پر گہرا اثر مرتب ہو 'چڑچڑاہٹ'۔

ایٹھوزا سائپسیم (Aethusa Cynapium): سوچنے اور توجہ مرکوز کرنے کی نااہلیت، اس علامت کے ساتھ مریض پر امتحان کا خوف و ہراس طاری ہو۔

جلسی میم (Gelsemium): امتحان سے قبل خوف و ہراس۔

خوف — (Fear)

(نیز دیکھئے "موت" اور "دہشت")

اکونائٹ این (Aconite N): موت، اندھیرے، شور والی جگہوں اور موسیقی سے خوف۔ دوران حمل موت کا خوف، بھوتوں کا خوف، زالی، کار یا ریل گاڑی کے گھس آنے کا خوف۔ پریشانی کے ساتھ خوف۔ گلیوں کو پار کرنے کا خوف، انتہائی پریشانی اور بے چینی کے ساتھ شدید خوف۔

سٹرامونیم (Stramonium): ہڈیاں میں خوف، کتوں کا خوف، قریب نظر کے باعث خوف، پانی کا، روشنی کا، کام غلط کر دینے کا اور لعنت طاعت کئے جانے کا خوف، اندھیرے کا خوف، بیک چمک دار چیزوں کا خوف بھی ہو، رات کا اور زخمی ہو جانے کا خوف، شدید پیاس لیکن پانی سے ڈرے۔

اوپیم (Opium): کسی الم ناک تجربہ (حادثہ) پیش آنے کے بعد ڈر کا دل میں جاگزیں ہو جانا، جب خوف سے پیٹ چالو ہو جائے، مریض بہت جلد خوف زدہ ہو جائے، موت کا خوف، خصوصاً خوف سے بڑی ہنم لے۔

کیوپرم میٹلیکیم (Cuprum Metallicum): جب خوف کے باعث شیق النفس کے تغبی دورے پڑیں۔

مرکیورس (Mercurius): خوف، بھاگ جانے کی خواہش کے ساتھ جیسے مریضہ سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہے۔

آرسنک البم (Arsenic Alb): چاقو سے قتل ہو جانے کا خوف، تھائی سے خوف، رفاقت پسند کرے، شدید بے چینی۔

کیوپرم ایسیٹیکم (Cuprum Aceticum): بستر کے کپڑوں سے خوف یا گھر کو آگ لگ جانے کا خوف۔

سلیشیا (Silicea): ذہنی تھکان، مخمد خیالات، صرف پنوں کو سوچے، انہیں ذرا سے، انہیں تلاش کرے اور گئے۔

آرنیکا ایم (Arnica M): اچانک موت کی دہشت اور خوف، ڈرے کہ کوئی خوفناک بات ہونے والی ہے، رات کو اٹھ جائے اور دل کو پکڑ لے، راتوں کو خوف زدہ کر دینے والے دہشت ناک خواب دیکھے، اس بات کا خوف کہ سامنے سے آنے والوں سے ٹکرا جائے گا۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): پریشانی یا خوف اس بات کا کہ کوئی خطرناک یا غمناک بات ہو جائے گی، اس بات کا خوف کہ لوگ مریضہ کی ذہنی الجھن سے واقف ہو جائیں گے، سائے کا خوف، پاگل ہو جانے کا خوف۔

بیلادونا (Belladonna): تصوراتی چیزوں اور بدیوں کا خوف، قرار ہو جانا چاہے، جانوروں کا خوف، کتوں کا خوف۔

ہائوسکیمس (Hyoscyamus): زہر دیئے جانے کا خوف، زخمی ہو جانے کا خوف، لعنت، ملامت کا خوف، پانی کا، اور لوگوں کا خوف، جنگلی جانوروں کے کانٹے کا خوف۔

سیکسی نم (Succinum): ریل گاڑیوں اور بند کمروں کا خوف۔

اگنیشیا (Ignatia): ایسے ہسٹریائی مریضوں میں فضائی حملے کا خوف جو معمولی سی اشتعال انگیزی پر غش کھا جائیں، خوف کے باعث غمگینی۔

برائی اونیا (Bryonia): فقر و فاقہ کا خوف۔

جلمسی میم (Gelsemium): فضائی حملے اور بمباری وغیرہ کا خوف، شیخ کا خوف، متوقع ہوائی حملے یا بمباری کی خیر من کر دھچکا لگنے سے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، تھکاوٹ کا احساس اور کچپی۔ اس دوا میں بے چینی اور پریشانی کی علامات پائی جاتی ہیں۔ گرنے کا خوف۔

فاسفورس (Phosphorus): سر پر منڈلانے والے حادثے کے پیش آ جانے کا خوف، اندھیرے کا خوف، تنہا ہو جانے کا خوف، دم گھٹنے کا خوف، طوفان باد و باراں کا خوف، کسی بری بات کے واقع ہو جانے کا خوف۔

ارجنٹم نائٹریکیم (Argentum Nitricum): ضرورت سے زیادہ پریشان ہو جائے، خوف زدہ، جلد باز انسان، فضائی حملے اور بمباری وغیرہ کے باعث۔ بے چینی اور ادھر ادھر بھاگے پھرنا اس دوا کی مخصوص علامت ہے، اس بات کا خوف کہ موت قریب آ رہی ہے۔ مجمع میں گر جایا سینما یا کسی بھی پر جھوم جگہ جانے کا خوف، وہ سانس نہ لے سکے، اسی طرح لٹ یا سرنگ میں جانے کا خوف۔

الیومنا (Alumina): شام کا خوف۔

لائسیمین (Lyssin): پانی کا خوف، کیونکہ پانی کو دیکھنے سے مریض کو پیشاب کی تحریک ہوتی ہے۔ یہ علامت مخصوص ہے جب کہ پانی کا خوف پایا جائے۔

کینابیس انڈیکا (Cannabis Ind): ہمیشہ کے لئے کھو جانے کا خوف، اللہ تعالیٰ کے نام کا پکارا جانا برداشت نہ کر سکے کیونکہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ مر رہا ہے۔ روشن اشیاء کے دکھائی دینے پر خوف زدہ ہو جائے، ہوا کے معمولی جھونکے پر یا کسی کے آنچلنے پر خوف زدہ ہو جائے۔

اندھیرے کا خوف۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): تھارہ جانے کا خوف، بزدلی کا خوف، تاریکی کا، موت کا، بھوتوں کا اور لوگوں کا خوف۔

کوکولس (Cocculus): موت اور انجانے خطرے کا خوف۔

کالی کارب (Kali Carb): مستقبل کا خوف، موت کا خوف، اس امر کا خوف کہ کچھ ہونے والا ہے، بھوتوں کا خوف۔ ایسے مریض تھکے ہوئے، پزیرے اور حساس ہوتے ہیں، جنہیں کبھی سچا نہ ہو، جو کبھی اکیلے رہنا نہ چاہئیں۔

کلیمٹس (Clematis): اکیلا رہنے سے خوف کھائے لیکن دوسری طرف موافق لوگوں کی رفاقت کی طرف بھی عدم میلان ہو۔

ایناکارڈیم (Anacardium): خوف زدہ ہو کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ چوروں کی تلاش میں نظر دوڑاتا رہے، دشمنوں کا گمان کرے۔ ہر چیز اور ہر آدمی سے خوف کھائے، اندرونی پریشانی سے بھرا رہے، انتہا درجے کا بزدل۔ جسم پر زخم کھائے بغیر کسی احساس کے۔ ظالم، کینہ پرور، بد معاش۔

کلیڈیم (Caladium): انتہا درجے کی اعصابیت، اپنے ہی سائے سے خوف زدہ ہو، تمام رات شہوانی خیالات میں گم جاگا کرے، اندیشہ ناک، خاص طور سے سونے سے پہلے، مستقبل کے متعلق خوف زدہ ہو۔

کیمفر (Camphor): ذہنی پریشانی کے ساتھ انتہا درجے کا خوف، اشخاص کا، انہیوں کا خوف، اندھیرے کا خوف، تصوراتی روحوں (بھوتوں) کا خوف۔

منگانیئم (Manganum): ذہنی پریشانی اور خوف، عظیم اندیشہ ناک، خیال کرے کہ کوئی دہشت ناک واقعہ ہونے والا ہے، مریض اپنے ذہن پر قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، جوں جوں وہ اپنے ذہن پر قابو پانے کی کوشش کرے اور بھی زیادہ پریشان ہوتا چلا جائے۔ وہ سوچ نہیں سکتا اور غور نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تھکا ہوا اور بے آرام ہوتا ہے۔ لیٹ جانے پر یہ کیفیت جاتی رہتی ہے، لیٹنے سے بہتری ہو۔

سپونجیا (Spongia): موت کا خوف، مستقبل کا خوف، رات کو کسی خوف ناک بات کے وقوع پذیر ہونے کا خوف، ضیق النفسی اور ذہنی پریشانی بھی ساتھ ہو۔

پاولینیا فانیٹا (Paullinia Finata): مدقوق ہو جانے کا خوف۔

اونوسموڈیم (Onosmodium): سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے ہوئے نیچے گر جانے کا خوف۔

مینسکی نیلا (Mancinella): دیوانہ ہو جانے کا خوف، بد روحوں کا خوف۔

میڈورینم 200 (Medorrhinum 200): موت کا خوف، جب اکیلا ہو تو علامات میں تیزی آجائے، خوف کے احساس کے ساتھ جاگے، محسوس ہو کہ کوئی خوف ناک بات وقوع پذیر ہو چکی ہے۔

سینی کولا (Sanicula): اندھیرے کا خوف، مریض کو مسلسل پیچھے دیکھنے کی خواہش ہو۔

کینابیس اینڈیکا (Cannabis Ind): تاریکی کا خوف۔

ٹیرنٹولا ہسپانیولا (Tarentula His): مطلق خوف، یہ خوف کہ کچھ ہونے والا ہے، کسی ایسی

چیز کا خوف جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، ایسی خوف ناک چیزیں دیکھے جو وہاں موجود ہی نہ ہوں۔

سٹیفی سیگریا (Staphisagria): اپنے ہی سائے سے خوف زدہ ہو، غصے کے ساتھ پریشانی،

گہرے طور پر اندرونی جذبات مجروح ہونے سے ہاتھ میں موجود چیز کو دور پھینک دے۔

ہائیڈروسیانک ایسڈ (Hydrocyanic Acid): تصوراتی مشکلات کا خوف، ہر چیز ڈرائے

جیسے کھوڑے، دیگنیں، مگرتے ہوئے گھر وغیرہ۔

خوشامد — (Flattery)

پالادیئم (Palladium): خوشامد کرانے کی خواہش کرے۔

بھول جانا

(Forgetfulness)

(نیز دیکھئے ”غیر حاضر دماغی“ سوچنا“ اور ”غلطی کرنا“)

لیک کینینم (Lac Caninum): مریض غیر حاضر دماغ ہوتا ہے، وہ بہت بھٹکتا ہوتا ہے، بازار

سے چیزیں خریدے اور اشیاء لئے بغیر چل دے۔ لکھتے وقت الفاظ میں حروف چھوڑ جائے، بات

کرتے ہوئے غیر شعوری طور پر یا اپرواہی سے ذہن میں موجود چیزوں کی جگہ نظر آنے والی

چیزوں کو بول دے۔ لکھنے میں بہت زیادہ الفاظ استعمال کرے لیکن یہ مناسب الفاظ نہ ہوں۔

مطالعہ کی جانب توجہ مرکوز نہ کر سکے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): جنسی بے اعتمادیوں کے باعث یادداشت کا جائزہ دینا

ہوئی، کمزور یادداشت، اپنے خیالات کو مجتمع نہ کر سکے۔

ایناکارڈیم (Anacardium): دماغی مشقت کے باعث فراموش کاری۔ یہ علامت سب سے

زیادہ صبح کے وقت واضح ہو، عمومی فالج کے بعد، یادداشت کی کمزوری یا یادداشت کا کھو جانا، یا

دعا دینے کی، قسم اٹھانے کی نہ رکھنے والی خواہش۔

برٹا کارب (Baryta Carb): یوزمے لوگوں کے لئے مفید دوا ہے جبکہ ان کی عمر تمام ذہنی استعدادوں سے ہاتھ اٹھا لینے کی طرف راغب ہو چکی ہو۔

کینابیس انڈیکا (Cannabis Indica): مریض کامل طور پر فراموش کار (بھٹکا ہوا) ہو چکا ہو، اپنا جملہ پورا نہ کر سکے کیونکہ وہ بھول چکا ہو کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔

سیلیسیم (Selenium): جاگنے کے عرصہ کے دوران فراموش کار رہے اور سونے پر خواب میں وہ چیز دیکھے ہو بھول گیا تھا۔

سفی لینم (Syphilinum): بھٹکا، کمزور دماغ، بغیر کسی وجہ کے روئے اور ہٹے، صحت یاب ہونے سے مایوس، غم زدہ، کاروبار اور دیگر معاملات سے یکسو رہے۔

گلوٹائین (Glutamine): بھٹکا، مریض کو مضحکہ خیز بنا دے، وہ مشہور گلیوں (سڑکوں) کے نام بھول جائے، خود اپنے گھر کا نمبر اور محل وقوع بھول جائے، حالانکہ وہ وہاں سال ہا سال سے رہائش پذیر ہو، گھر کا راستہ بہت لمبا محسوس ہو، مشہور و معروف گلیاں (سڑکیں) اجنبی لگیں۔

سٹیفیسیا (Staphisagria): جلق یا مادہ منویہ کے اخراج کے بعد یادداشت کھو جائے یا مسلسل جنسی موضوعات پر بولنے یا لکھنے کے باعث یادداشت کا کھو جانا، جب کوئی چیز پڑھے اس کی موبوم سی یاد باقی رہے اور بہت دیر تک کو شش کرنے کے بعد ہی یاد آ سکے۔

لیک-ویک-ڈیفیل (Lac. Vacc. Dell): ذہنی تھکاوٹ اور ذہنی کام سے بے ذارقی کے ساتھ یادداشت کا جاتے رہنے، غمگینی اور آسان ترین ذرائع سے موت کی خواہش۔

کیلیڈیم (Caladium): جنسی بے اعتدالیوں یا تباہی کے ذہن کے باعث فراموش کاری (بھٹکا) پن ا غیر حاضر دماغی، اشتہار سے کا اشتعال، وہ سوچ نہیں سکتا، جتنا کسی مضمون کو سوچے اتنا ہی اس سے دور ہوتا چلا جائے، ایسا ذہنی یا جسمانی تھکاوٹ کے باعث ہو سکتا ہے۔ یہ دوا "شک" والے مریضوں کے لئے بھی مفید ہے جو کسی بھی چیز کے لئے پر یقین نہیں ہوتے، حتیٰ کہ ایک ایسی چیز کے متعلق بھی اس شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ ہے بھی یا نہیں ہے، ابھی دیکھ کر اور محسوس کر کے اس کے پاس سے ہٹے ہوتے ہیں۔

آئیوڈم (Iodum): بہت جلد بھول جاتا، کسی ایسی چیز کو بھول جائے جس کے متعلق یہ بھی یاد نہ ہو کہ وہ کیا چیز تھی۔ لیکن وہ اس کے سر پر سوار رہے اور اسے بے چہن اور پریشان کرتی رہے۔

اٹلنٹھس گینڈیو لوسا (Ailanthus Glandulosa): یہاں تک کہ ایک لمحہ پہلے کئی گنی بات بھول جائے۔ یادداشت کا مستقل کھو جانا۔

اولینڈر (Oleander): کمزور یادداشت اور بھٹکا، مریض کی قوت الکی سستی کے

ساتھ۔

امبر اگریسیا (Ambra Gisea): شدید اعصابی تھکاوٹ کے باعث عام سے عام الفاظ یا حقائق کو بھی نہ یاد رکھ سکے، وقت سے پہلے بوزھا ہو جانا، ایک موضوع سے دوسرے موضوع میں چلا جائے۔

کونیم (Conium): یادداشت کی کمزوری، فراموش کاری، ذہنی کاوش کی نااہلیت۔

کالی بروم (Kali Brom): یادداشت کا جاتے رہنا، ناموری، قلت دم (خون کی کمی)، 'لاٹری' (دہلیا) کے ساتھ، مفرد الفاظ بھول جائے، الفاظ کی 'Z' و (Syllable) چھوڑ جائے۔

زنگم فاس (Zincum Phos): دماغی کمزوری، محض فراموش کاری سے فائر عقلی کی طرف مبذول ہو جائے، کم تر درجے کی فائر عقلی، 'ریڑھ کے ساتھ ساتھ' جن 'ریڑھ کے آخری یا پہلے صربے میں ہلکا درد' بیٹھنے سے زیادہ ہو جائے۔ مطالعہ یا تھکاوٹ سے بھی زیادتی ہو۔ کمزوری، ہاتھوں، پاؤں وغیرہ کے ہست سے عضلات کا کانپنا اور بھڑکنا، ٹانگوں اور پاؤں میں استدار سے کی بے چینی، شدید استادگیوں اور اخراج مٹی کے ساتھ خیموں اور مٹی کی تالی میں درد۔

میڈرینیم (Medorrhinum): حقائق، اعداد اور ناموں کو بھول جائے، جو کچھ پڑھا ہو بھول جائے، لکھنے میں جھوٹ کی اور الفاظ کی غلطیاں کرتے۔ محسوس ہو کہ وقت بہت آہستگی سے گزر رہا ہے۔ ہر شخص بہت آہستہ آہستہ حرکت کرتا محسوس ہو۔

نیٹرم کارب (Natrium Carb): اعصابیت اور ہسانی کمزوری کے ساتھ فراموش کاری، اعداد کو بننے کرنے کی نااہلیت، جو کچھ پڑھتا ہے بھول جاتا ہے۔ ایک صفحہ پڑھتے ہوئے پچھلا صفحہ ذہن سے صاف ہو جائے ایک جملے کے آغاز سے اختتام تک یادداشت ساتھ نہ دے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): غلط الفاظ، کافظ اور حروف استعمال کرے، غلط جملوں کے ساتھ لکھے اور الفاظ کے اجزاء چھوڑ جائے، پریشان خیالی، کوئی نئی چیز دیکھنا برداشت نہ کر سکے۔ اپنا لکھا ہوا نہ پڑھ سکے۔

سلفر (Sulphur): بہت زیادہ بھلا، گزشتہ واقعات اور نام یاد نہ آسکیں۔ احمق اور گھبراہو، بات چیت سے پہلو تھم کرے۔ مناسب الفاظ نہ تلاش کر سکتے یا بولتے یا لکھتے ہوئے الفاظ بھول جائے، دن کے دوران غمگین رہے اور رات کے دوران خوش ہو، کڑھے اور انداز نگاہے، لیکن کام نہ کرے۔

روڈوڈنڈرون (Rododendron): یادداشت کا جاتے رہنا، لکھتے ہوئے الفاظ چھوٹ جائیں، سوچ کا اچانک غائب ہو جانا، بھول جائے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔

رسائکس (Rhus Tox): دماغ کی مسلسل سوچنے کی نااہلیت، مریض 12 گھنٹہ چاہے لیکن 1

لکھنے کے بعد سمجھ نہ سکے کہ اس کے بعد اسے کون سا ہندسہ لکھنا چاہئے۔
سٹرامونیم (Stramonium): غلط الفاظ استعمال کرے، درست الفاظ یاد نہ آسکیں۔

جوئے بازی

(Gambling)

مرکیورس وائیو (Mercurius Viv): بہت بڑے جوئے باز، بعض اوقات روپیہ پیسہ آزادانہ
 (کھلے ہاتھ سے) خرچ کریں اور بعض اوقات ہاتھ کھینچ کر (کنجوسی سے) خرچ کرے۔
سلفر (Suiphur): جوئے باز، چوری کی عادت بھی ساتھ ہو، تمباکو استعمال کرنے والے۔

محرم ضمیر

(Guilty Conscience)

(دیکھئے "مغالطے یا وسوسے" خوف" اور "مراقی حالت")

قریب نظر

(Hallucination)

(دیکھئے "مغالطے یا وسوسے" اور "مروشن ضمیری")

نفرت — (Hate)

(دیکھئے "بے زاری")

علاقت یا وطن

(Home Sickness)

کیپسیکیم (Capsicum): علاقت یا وطن کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ اس میں درج ذیل
 علامات ہوتی ہیں: رخسار سرخ، بے خوابی، بچے سکوں میں مطالعہ یا کام کرنے سے قاصر ہوں اور
 گھر پہنچنا چاہیں۔

آئرس ٹینکس (Iris Tenax): آواز میں افسردہ، گھر کی یاد ستائے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): علامت یاد وطن کے باعث نکالیں۔
 اگنیشیا (Ignatia): بدلتا ہوا مزاج، خاموش کزمن، اداسی، غمگینی، صدمات کے بعد غم،
 تاسیدی۔

مراقی حالت

(Hypochondriasis)

(نیز دیکھئے "اعصابی کمزوری")

نکسن وامیکا (Nux Vomica): واضح چڑچڑاہٹ، بد صورت (خطرناک)، اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو قتل کرنا چاہے۔ نیز خود اپنے آپ کو بھی 'شور'، 'بد روشنی گرمی اور ٹھنڈ سے حساس ہو' اپنی خوراک اور کپڑوں وغیرہ میں نقص نکالے۔ یہ سب کچھ ہاتھ پہ ہاتھ دھرتے بیٹھے رہنے کی عادت کھانے پینے میں بے اعتدالیوں اور خصوصاً منشیات کے باعث ہو۔

اکتیارسی موسا (Actea Racemosa): یہ مستورات کی دوا ہے، جب حیض سے پہلے یا دور مانگولیا کے حملے ہوں۔ کسی تصوراتی جلد کا خوف، ہو کوئی دایہ، ڈاکٹر، دوست، چوہا، چوہیا، غلی یا کتا بھی ہو سکتا ہے۔ زندگی کے لئے ناموزوں لیکن موت سے خوف زدہ۔

کلیکیریا کارب (Calcarea Carb): تشویش مند، موت کا، بد قسمتی کا، ذہنی توازن کھو دینے کا، جان لیوا امراض کا خوف۔ ذہنی اذیت کے دورے رونے اور سسکیاں بھرنے کے ساتھ۔
 غمزدوں اور دیگر ناخوشگوار چیزوں کے خواب۔

سٹیفیسگنیا (Staphisagria): اعصابی نظام کے لئے موزوں دوا ہے جو کہ دماغ اور جنسی آلات پر اثر انداز ہو، اپنے مرض کی علامات بتانے کے لئے تمنا کا خواہاں ہو۔ اترا ہوا چہرہ، بھیجھی آنکھیں، کپکپاتے ہاتھ، ٹھنڈا چیچپا پیوند، یہ سب کچھ جلتی اور جنسی بے اعتدالیوں کے باعث ہو، ذہنی و جسمانی اظہار کی حساسیت۔

فاسفورس (Phosphorus): بزدلی یا غیر مستقل مزاجی، جنسی بے اعتدالیوں یا جلتی کے باعث، تپ دق میں بار بار جلتا ہونے کا، رحمان، قشہ، باتونی، ہڈیانی، رونے والا، اداس، ہسٹریائی، دائمی طور پر کمزور، قاترا، عقل۔

اورم میت (Aurum Met): اعتماد ہے کامیوس، خود سے قنقرہ، خود کشی کرنا چاہتے لیکن مرنے سے ڈرتے، مرد مریض لعنت ملاست کرے اور بد دعائیں دے، عورت مریض سسکیاں بھرتے اور رونے، دونوں کی غینہ مکی ہو۔ عورتیں سوتے میں سسکیاں بھریں جتہ۔ مرد قسمیں کھائیں، خود کو لعنت ملاست کریں۔ خود کو شرم دلائیں۔ اپنے اوپر تنقید اس دوا کی اہم علامت

ہے۔ تصور کرے کہ وہ کسی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور وہ ہر کام غلط کرے، محسوس کرے کہ اس نے اپنے دوستوں کو اور اپنے فرائض کو نظر انداز کیا ہے اس لئے اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔

سیپیا (Sepia): مریضہ اپنی صحت اور اپنے گھریلو معاملات کے بارے میں مفہوم رہے، غیر ارادی طور پر ہنسنے اور رونے کے دورے۔ بہت زیادہ چڑچڑاہٹ جو بے دخی سے بدل جائے، اکیلا رہنے کا خوف، جبکہ رفاقت سے اشتعال پذیری ہو۔ حقیقی یا تصوراتی برائیوں سے پریشانی خوف کے ساتھ۔

نیٹرم میور (Natrium Mur): اس اور روتے ہوئے مریضوں کے لئے جو دل جوئی کو پسند نہ کریں، اور جو ان کی دلجوئی کرے اس سے شدید نفرت کریں۔ غمگین، کم خون، زندگی سے تھکا ہوا، کینہ پرور، منتظر، معمولی باتوں سے تحریک میں آجائے۔
کونیوم (conium): جماع سے اجتناب کے باعث مراثی حالت (یا بالٹولیا)۔

ہسٹیریا (Hysteria)

انگیشیا (Ingnotia): بھراؤ کا احساس، سینے میں واضح کھنچاؤ کے ساتھ، ناقابل بیان بو کے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں پانی کی طرح صاف پیشاب ہو۔ بے اختیار ہنسی کے دورے، چنوں میں ہنسنے لگیں اور پیچھے پھڑکیں۔ بادی بادی ہنسی کے اور رونے کے دورے، مرض کے حملے کے دوران مدد چکرا استعمال کریں اور بعد میں اونچی خوراکیں، ہسٹیریا کی لئے یہ دوا چوٹی کی ہے۔ انکی عورت ہو اپنے بچے یا شوہر کو کھو دے اور اس کے باعث درد سر، کپکپاہٹ، بے خوابی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے۔ وہ خود پر قابو پانے کے قابل نہ ہو، خیال کرے کہ اس نے اپنی کسی ذمہ داری کو نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ قوفانہ حرکتیں کرے جن پر اسے بڑا تازہ ہو اور اسی طرح سے نمائش کرے، جوش میں پاگل ہو رہی ہو، اگر یہ تکلیف انگیشیا دینے کے بعد پھر نمود کر آئے تو نیٹرم میور دی جائے جو کہ انگیشیا کی مزمن دوا ہے۔

اکتیارسی موسا (Actea Racemosa): اعصابی اور عضلاتی دونوں نظاموں سے متعلق ہسٹیریا کی انٹنشن، عظیم دباؤ، حیض سے قبل تمام علامات میں زیادتی ہو۔ اس دوا میں مرض کی وجوہات عموماً حیض میں بے قاعدگی یا دوسرے رحم سے متعلق امراض ہوتے ہیں۔

ایسا فوئیڈا (Asafoetida): جب پیٹ میں پاؤ گولہ اٹھنے کے باعث دورہ (ہسٹیریا کا) ہو، دورے کے دوران کھالی ہوئی غذا کی تہ ہو۔ پیشاب کی تکلیف، پاؤ گولہ کے ہسٹیریا کے ساتھ غذا کی ٹالی میں دباؤ اور گلے میں کھنچاؤ ہوتا ہے۔ مٹکی، مسلسل نکلنے رہنے کے ساتھ۔

سیکیوٹا وائروسا (Cicuta Virosa): بے ہوشی کے ساتھ۔ غیر ارادی طور پر پنوں میں خاص طور سے بازوؤں اور انگلیوں کے پنوں میں پھڑکن ہو اور جھٹکے لگیں۔

پوتھوس (Pothos): دھڑکنے کے دس قطرے دیئے جائیں، ہسٹیریا کے لئے مخصوص دوا ہے۔

کینامونیئم (Cannamonium): جب دردِ ذکاروں، متلی اور تھکے کے ساتھ ختم ہو، حیض کے دوران خون بہت زیادہ مقدار میں اور زیادہ عرصہ تک جاری رہے۔

مگنیشیا میور (Magnesia Mur): 'شیخ' غشی، 'باؤ گوالہ' رحم کے حصہ میں نیچے کی جانب دباؤ، رحم کا 'شیخ' کمر میں درد کے ساتھ سیاہ رنگ کے حیض، ہر پاخانہ کے بعد اور رحمی 'شیخ' کے بعد 'لیکچر' یا 'ہنجر' خراب ہو، رات کے کھانے کے وقت غشی، ذکاروں سے بہتری ہو، حرکت کرنے سے دل کی دھڑکن بہتر ہو۔

سینشیو اورینس (Senecio Aurens): حیض کے دہ جانے کے باعث ہسٹیریا۔

ایپیک (Ipec): متلی اور تھکے کے ساتھ ہسٹیریا۔

وینریانا (Valeriana): اعصابی 'بیجان' چھن سے نہ بیٹھ سکے، حرکت سے پھاڑنے والے درووں میں سکون ہو۔

نکس موسکاتا (Nux Moschata): یادداشت کا کھو جانا، ماضی کے واقعات کو بھول جائے، بھول جائے کہ وہ سارا دن اپنے بیٹے سے باتیں کرتی رہی ہے۔ جب تکلیف ہو تو بھول جائے کہ وہ ابھی کیا کام کر رہی تھی۔ غنودگی اور غشی، مریض کی حالت میں پریشانی کے باعث اضافہ ہو جائے، ارد گرد کا ماحول عجیب و غریب معلوم ہو۔ خواب ٹاک اور قرضی ماحول، مریض غیر حاضر و ماضی کی حالت کا شکار ہو، نیند کا غلبہ اور آخر کار گہری بے ہوشی، جذبات و احساسات کے جاتے رہنے کے ساتھ۔ بدلتا ہوا مزاج، ایک وقت میں ہنسے اور پھر ساتھ ہی رو دے۔ کچھنے میں غلطیاں کرے، چیزیں اپنی جسامت سے بڑی یا لمبی دکھائی دیں لیکن غور سے دیکھتے رہنے پر اپنی اصلی جسامت میں واپس آجائیں۔ جسمانی اذیت میں مبتلا ہو، سر اور ٹھوڑی سینہ پر گرے، سر بوجھ سے گھومے، منہ اور گلا خشک ہو، دل دھڑکے، بے تحاشہ اچھارہ ہو۔

ہائوسکیمس (Hyoscyamus): معمولی اینٹھن یا بغیر اینٹھن کے ہسٹیریا کے دورے، بے ہوشی کے ساتھ لمبے دورانیہ کے دورے جن کا اختتام دو یا تین روز میں ہو، مریض درووں کے دوران کبھی ہنسے اور کبھی روئے، جیت پر بھی انہی کا چھوٹا جانا برداشت نہ کر سکے۔

ماسکس (Moschus): اس وقت یہ دوا موزوں ہوتی ہے جب مریض جلد جلد بے ہوش ہو جائے، ایک دھسار سرخ اور ٹھنڈا ہو اور دوسرا دھسار پیلا اور گرم، نہ جوش، اعتدال ملامت

کرنے والا، ٹھنڈ سے غشی، خلق اور پھپھڑوں کا تشنج۔

پلائینا (Platina): شدید جنون اور ہست ہی زیادہ سنگبرانہ مزاج اس دوا کی علامت ہے (پن)

نخوت و حقارت آمیز مزاج۔

لیلیئم نگرینم (Lilium Tigrinum): ہسٹریائی مستورات کے لئے، مریض مشکل ہی سے منہ بان

کھول کر سکے۔ انتہا درجے کا چڑچڑاہٹ، خیالات و تصورات کی دنیا میں گم، پاگل پن، مذہبی

مانٹوایا، تصورات، دل کی تکالیف کے ساتھ۔ دہاو ہو نیچے کی جانب، یوں محسوس ہو کہ تمام

اندرونی اعضاء نیچے کی جانب کھینچ رہے ہیں۔

کیسٹوریم (Castoreum): نامکمل ہسٹریا کے آغاز میں اعصابی دورے، اعصابی قوت، اشتہائی

تھکاوٹ کے ساتھ پٹوں میں پھرنے، دہانے سے درد میں افادہ ہو، حیض کا قوت پیلے پن اور

ٹھنڈے پٹینوں کے ساتھ۔

تھائی رائیڈینم (Thyroidinum): ہسٹریا کے باعث جب چہرے اور بازوؤں پر سوجن ہو،

حیض کے وقت دورے ہوں، ہسٹریائی دوروں کے رجحان کا علاج درج ذیل ادویات سے کیا جا

سکتا ہے:

زکرم وال 30، سیپیا 30، ماسکس 6، کللی فاس 30 اور سکوٹیلریا (Scutellaria) ٹچریا

پہلی ڈائلوشن (1st Dilution)۔

امونیا کارب (Ammonia Carb): ضیق النفس کے ساتھ ہسٹریا، غشی کے دوروں کے

ساتھ، بے چینی اور تھکاوٹ حرکت سے۔ 200 یا اوپر کی پوٹینسی کی دوا دیجئے۔

نٹرم میور (Natrium Mure): یہ دوا انگیشیا کی مزمین ہے، جب انگیشیا غیر مؤثر ہو جائے تو

یہی دوا دی جانی چاہئے۔ باری باری ہنسے اور روئے۔ خود پر اور اپنے جذبات پر قابو پانے کے

قابل نہ ہو، مریض شادی شدہ مرد کی محبت میں مبتلا ہو جائے۔ یا پھر گھریلو ملازم کو چوان وغیرہ

سے محبت کرنے لگے، وہ جانتی ہے کہ یہ عقل مندی نہیں لیکن وہ خود پر قابو پانے سے قاصر ہو،

اس دوا کے استعمال سے اس کا دماغ صحیح سوچنے کے قابل ہو جائے گا۔

ٹیرنٹولا ایچ (Tarentula H): بے قابو ہو کر گائے اور ناپے، ناپچے کی دیوانگی، سر کو جھٹکے،

پال کھینچنے، کپڑے پھاڑے اور چیزیں برباد کرے، خود کو اور دوسروں کو مارے، بوڑھے لوگوں کو

ان کی عمر کے بارے میں مذاق کرے، دورے غیر طبعی تیند پر ختم ہوں۔

کونیئم (Conium): ہسٹریا، جماع سے اجتناب کے باعث۔

کاسٹیکم (Causticum): حیض کے دوران مرض میں اضافہ ہو، ٹھنڈی خشک ہوا لگنے سے

تکلیف پڑھے۔

ضعف عقل (فاتر العقلی)

(Idiocy)

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): علاج اس دوا سے شروع کرنا چاہئے۔ یہ دوا 1 ایم (M) One) ہر چھ روز میں ایک دفعہ دینی چاہئے دیکر دی کئی ادویات کے ساتھ۔
برشا کارب (Baryta Carb): فاطر العقلی کی چوٹی کی دوا ہے، بچے ذہنی اور جسمانی طور پر پست رہ جائیں اور ان کی ترقی و نشوونما نہ ہونے پائے، جیسے پھولا ہوا، جلد سردی لگ جائے، گلے کے غدود میں سوزش، اس کی جگہ ٹیوبرکولینم ایک ایم (1M) ڈائیکلوٹن بھی دی جاسکتی ہے۔
کلکیریا کارب (Calcarea Carb): تشویش مند، جوں جوں شام ہوتی ہے، تکلیف میں زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے۔ دلائل کے کھم جانے سے اور بد قسمتی سے خوف زدہ، بھلائی وداشت گم کردہ، پریشان اور پست حوصلہ۔ پریشانی دل کی دھڑکن کے ساتھ، ضد اور بیلا ہیں۔
برشامیور (Baryta Mur): بچے، جو منہ کھول کر چلتے ہیں اور ناک میں بولتے ہیں، بے وقوفی سے جھلکتی ہے۔

کلکیریا فاس (Calcarea Phos): کمزور، دبیلے پتلے اور فقر الدم (خون میں سرخ ذرات کی کمی) کے مریض، چہ چہ، ہمیشہ کہیں نہ کہیں جانے کے خواہش مند۔
سیفی لینم (Syphilitum): یہ متبادل دوا ہے، جب ٹیوبرکولینم (Tuberculinum) اور برشا کارب (Baryta Carb) مکمل طور پر فائدہ نہ دیں، یا جب یہ دونوں دوائیں غیر موثر ہو جائیں، یہ دوا مذکورہ بالا دیکر ادویات کے ساتھ بھی قیمتی طور پر تبدیل ہو سکتی ہے۔
ایٹھوزا (Aethusa): فاطر العقلی بچے جو ذہنی بھراؤ کے باعث مکمل مل نہ سکیں۔ اگرچہ ایک حد تک صحت کریں لیکن امتحان کے لئے زائد مطالعہ کو بے فائدہ خیال کریں۔ ذہنی اتھری، جو کچھ سیکھیں اسے یاد نہ رکھ سکیں۔

تحریکات (Impulses)

آئیوڈیم (Iodum): گرم مزاج مریضوں میں شدید تحریکات، جو پیشہ نمونہ ہو یا میں رہنا چاہیں اور نمونہ سے پانی سے غسل کرنا چاہیں۔ کسی بھی شخص کو بغیر کسی وجہ یا تک کے مارنے کی تحریک، بغیر کسی وجہ کے خود کو مار ڈالنے کی تحریک، لیکن مریض مزاحمت کرتا ہے، ناقابل ضبط اور اچانک تحریک، کسی بھی شخص کو قتل کرنے یا کسی بھی چیز کو برباد کر دینے کی فراہ ہو جانے کی تحریک۔

اورم میٹ (Aurum Met) کسی اونچی جگہ سے یا کھڑکی سے گر کر خود کشی کا ارتکاب کرنے کی تحریک 'خود کشی کرنے سے متعلق خیالات' چلائنگ لگانے کی تحریک۔
نکس وامیکا (Nux Vom) خود کشی کا ارتکاب کرنا چاہے لیکن ہمت نہ ہو 'مریض کے اندر اپنے بچے کو آگ میں جھونک دینے کی تحریک۔

آرسنک البم (Arsenic Alb) حجام میں تحریک 'ہو کہ سرد مزاج ہوں اور گرم گرمی میں رہنا چاہیں' شیو کرتے ہوئے اپنے گاہک کو استرے کے ساتھ قتل کر دیتا چاہیں۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit) دریا میں یا کھڑکی سے چلائنگ لگا دینے کی تحریک۔

لائسی سین (Lyssin) ہاتھ میں پکڑا ہوا چاقو اپنے جسم میں ٹھونپ دینے کی تحریک۔

اسٹیلگو ایم (Ustilago M) خود کشی کی تحریک 'خاص طور سے ڈوب کر۔

الیمینا (Alumina) تیز دھار والا اوزار یا خون دیکھ کر خود کو قتل کر دینے کی تحریک۔

پلائٹینم (Platinum) اپنے بچے کو قتل کر دینے کی تحریک 'اپنے خاوند کو جس کے ساتھ وہ (جذباتی) پر جوش محبت کرتی ہے اور جس کے ساتھ کامل طور پر خوش ہے' قتل کر دینے کی نہ رکھنے والی تحریک۔

سٹیفنی سگنیا (Staphisagna) کسی ایسے شخص پر چیزیں پھینکنے کی تحریک جو انتہائی معمولی اور تصوراتی طور پر برہمی کا باعث بنا ہو۔

ہیپیر سلف (Hepar Sulph) بغیر کسی جرم اور بغیر کسی وجہ کے قتل کا ارتکاب کرنے کی شدید تحریک 'اس دوا اور آرسنک البم (Ars Alb) کے طریق کار کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے ہر دو ادویات میں ٹھنڈ سے خشکی و ٹھنڈک اور حساسیت پائی جاتی ہے۔ ان کے مریض گرمی اور تپش کو پسند کرتے ہیں' جبکہ آئیوڈیم (Iodum) کے مریض گرم مزاج ہوتے ہیں اور سرد فضا کو پسند کرتے ہیں۔

مرکیورس سول (Mercurus Sol) 'مریض خود پر تنقید کرنے والوں کو قتل کر دیتا چاہے' قتل یا خود کشی یا پرتشدد کاموں کے ارتکاب کی تحریک۔ تحریکات کی تکمیل کرنے میں عقل کھو دینے کا خوف۔

بے رخی، بے اعتنائی، لاپرواہی

(Indifference)

امبرا گرےسا (Ambra Grisea) ہر چیز سے بے اعتنائی، خوشی، غم، لوگوں وغیرہ کی کوئی پروا نہ ہو 'ایسی بے اعتنائی کا پرتاؤ کرے کہ اچھے خاصے متوازن افراد کا بھی دل توڑ دے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): زندگی کے معاملات سے بے اعتنائی، جب جنسی بے اعتدالیوں کے باعث ناتوانی لاحق ہو، تمام چیزوں سے ذہنی طور پر بے اعتنائی کا رویہ، زندگی میں اور باہر کی دنیا میں کسی قسم کی دلچسپی ظاہر نہ کرے۔

آرنیکا، سیکیوٹا (Arnica, Cicut): دماغی چوٹ کے بعد۔

فاسفورس (Phosphorus): شراب نوشی کے برے اثرات کے باعث اپنے بہترین دوستوں سے بے اعتنائی، خود اپنے بچوں سے بے اعتنائی۔

سائی کلیمین (Cyclamen): سن یا س (جب چالیس سال کی عمر کے بعد عورتوں میں حیض آنا بند ہو جاتے ہیں) کے دوران دماغی خلل کے باعث بے رخی کا رویہ۔

فلورک ایسڈ (Fluoric Acid): ان اشخاص سے بے رخی جن سے مریض بہت زیادہ محبت کرتا ہے جبکہ اجنبیوں کو پسند کرے۔

سیپیا (Sepia): مریض اپنے خاندان اور جن سے وہ زیادہ محبت کرتی ہے ان سے بے رخی و بے اعتنائی برتے۔

دیوانگی (مالینخولیا)

(Insanity "Melancholia")

ہائیوسائیمس (Hyoscyamus): مریض جھڑوا، باتنی، بے چین (تھلا ت بٹھنے والا) ہو۔ کپڑے اتار دیتا ہے۔ وہ کینہ پرور اور مراقی ہوتا ہے۔ مضحکہ خیز اور بے ہودہ حرکتیں کرے، چاقو لے کر لوگوں پر چڑھ دوڑے، جن سے ملے انہیں مارے اور قتل کرنے کی کوشش کرے۔ آدمیوں کو سویر خیال کرے، جنگلی جانوروں سے کاٹے جانے کا مخصوص اور انوکھا خوف۔ مایوسی میں ڈوب کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ خیال کرے کہ وہ غلط جگہ پر ہے۔ بے وقوفانہ قہقہے لگائے، تقریباً ہر وقت خوش مزاج رہے۔ جلدی جلدی اور خوش مزاجی کے ساتھ باتیں کرے، تشدد، حاسد، جسم کو تنکا کرنے اور جنسی اعضاء دکھانے کی رغبت، عشقیہ اور قہش لگاتے گاتے۔

بیلادونا (Belladonna): جب کہ سر میں اختناق دم (وفور دم، خون کی زیادتی) ہو، آنکھوں میں خون اتر آئے اور مریض غضب ناک ہو۔ کپڑے پھاڑے، کانٹے مارے، تھوکریں مارے، چیخے اور چلائے۔

ایسڈ فلور (Acid Fluor): دیوانگی کے اس مرحلے میں مریض سارا دن خاموشی سے کمرے کے ایک گوشے میں بیٹھا رہتا ہے۔ وہ منہ سے ایک لفظ تک ادا نہیں کرتا اور جب اسے بلایا

جائے تو مشکل ہی سے جواب دیتا ہے (پلسانیلا)۔

سٹرامونیم (Stramonium): علاو جنون، سرکی علامات کے بغیر جیسا کہ دیا اوتا میں ہوتا ہے۔ تصویرائی اشخاص اور چیزوں کو دیکھنے اور ان کی آوازیں سننے، مایکولیائی، دہشت زدہ اور باتونی، روشنی کا خواہش مند، کھانے اور پینے سے پہلو تھی کرے، کہے کہ ان میں زہر ملا ہوا ہے۔ بے چہن ہو اور کچکپائے، بلا ارادہ پیشاب، پاخانہ ہو جائے، حمل کے دوران جنون۔

ایگریگس (Agaricus M): بے خوف، دھمکیاں دینے والا، تباہ کن دیوانگی۔ خود اپنے خلاف ہو جائے اور خود کو زخمی کر بیٹھے۔ چشبین کو بیاں کرے، اشعار کہے۔ خوشگوار اور لاپرواہی کا مزاج۔ ہر توانہ اور فضول باتیں کرے۔ بے موقع گائے اور سیٹیاں بھائے۔

اورم میٹ (Aurum Mel): ذہنی، کبروی، زندگی سے کوئی محبت نہ ہو، خود کشی کا ارتکاب کرنا چاہے۔ غم زدہ و افسردہ، اداس و دل شکستہ، نا اُمید، بے ہمت، خود کو اس دنیا کے لئے ناموزوں خیال کرے، ہر وقت کڑھتا ہے، گرم موسم میں بہتری ہو جبکہ سردی میں علامات میں زیادتی ہو۔

ار جینم نائٹ (Argentum Nit): دیوانگی کا ترقی پذیر فالج۔

سیلیشیا (Silicea): انفلوئنزا کے بعد دیوانگی۔

ٹیرنٹولا ہسپانیولا (Tarentula His): مزاج میں اچانک تبدیلی کے ساتھ جنون، مریضہ خود کو اور دوسروں کو مارے۔ چیزوں کو پھاڑے، توڑے اور تباہ کرے، اچانک شدید اور تباہ کن تحریک، مریضہ دورہ ختم ہو جانے کے بعد افسوس کرے اور معافی مانگے، ڈرے کہ کچھ ہونے والا ہے، ایسی چیز سے ڈرے جس کا وجود ہی نہ ہو، خوفناک اشیاء کو دیکھے حالانکہ وہاں کچھ بھی نہ ہو، بالکل بے قابو ہو کر لگائے اور ناچے، سر کو جھٹکے اور بال ہرائے، بے چینی، آنکھیں پھیلی ہوئیں اور گھورتی ہوئیں۔

لکیسیس (Lachesis): مذہنی جنون، خود پسندی، حسد و جلن، نفرت اور ظالمانہ مزاج اپنے آپ سے بے جا محبت، جلن (حسد) رکھنے والا، بدگمان۔ مریضہ جب بھی دو اشخاص کو سرگوشتیاں کرتے دیکھے خیال کرے کہ وہ اسی سے متعلق بات کر رہے ہیں۔

کینابیس انڈیکا (Cannabis Ind): مبالغہ آمیز خیالات کے ساتھ جنون، وقت بہت آہستگی سے گزرے، خلا (جگہ) لامحدود دکھائی دے۔

یوفوربیم (Euphorbium): گھوڑے کی دم پر عبادت کرنے پر اصرار کرے۔

آرسنک البم اور ورٹرم البم (Ars Alb and Veratrum Alb): یہ دوائیں ہر دو کھٹے کے بعد بدل بدل کر ایک ہفتہ تک دیجئے، جب دیوانگی دوہرے فوجی بخار کے ساتھ ہو، مریض

نم آلود ماحول میں سکونت پذیر رہا ہو۔

نیتروم سلف (Natrum Sulph): سر میں زخم کے باعث ہونے والی دیوانگی اور دماغی تکالیف۔

لائکی سین 200 (Lyssin 200): دیوانگی درج ذیل دماغی علامت کے ساتھ 'پانی یا نہانے کو ناپسند کرے' یہاں تک کہ پانی پینے کی خواہش بھی نہ ہو 'اپنے مکان کی چھت پر سے کود جانا چاہے۔

کالی بروم (Kali Brom): کسی خاص نام کو من کر یا مخصوص چیز کو دیکھ کر تشدد پر اتر آئے۔
کاسٹیکم (Causticam): شدید ہڈیان کے ساتھ بنون 'دماغی تھکاوٹ' نا امیدی 'پھوڑے پھنسی کے بیرونی علاج سے انسداد کے بعد ناامیدی (پاسیت)۔

برشا میور (Baryta Mur): بڑھی ہوئی اور طاقت ور جنسی خواہش کے ساتھ کسی بھی قسم کا بنون 'عضلات کی بڑھتی ہوئی کمزوری' بڑھتے ہوئے غدد کے ساتھ۔

سائی کلیمن (Cyclamen): جب حیض کے جاری ہونے سے مانگو لیا میں افادہ ہو۔

سلفر (Sulphur): منتشر خیالات 'اپنے خیالات' مجتمع کرنے کے قائل نہ ہو۔ جلد باز 'تیز تیز' اپنے کھانے پر تھوک دے 'زہنگی (وضع حمل) کا جنون یا دیوانگی' بچے کی پیدائش کے بعد تمام گھر کے افراد سے دلچسپی ختم ہو جائے۔ یہاں تک کہ بچے کو دودھ بھی نہ پائے۔ خاموش رہنا پسند کرے۔ 1000 کی پوٹینسی دیتے۔

کروکس (Crocus): شدید غصے سے بے قابو ہو کر پھٹ پڑے اور اپنے بہترین دوست یا رشتہ دار کو قتل کرنا چاہے لیکن اس کے فوراً ہی بعد پشیمانی ہو 'بدلتا ہوا مزاج' روئے اور رونے کے فوراً بعد تھکے لگاتے لگے۔

تھوجا (Thuja): مریض خود کو شیشے سے بنا ہوا خیال کرے اور اس لئے خود کو محفوظ کرنے کے لئے کانڈوں میں یا کسی دوسری ایسی ہی چیز میں لپٹے 'کسی بھی چیز کے چھوٹے سے نفرت کھائے کیونکہ وہ خوف زدہ ہو کہ وہ چیز ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔

میلی لوتس (Mellilotus): یہ دوا علامات کے درج ذیل امتزاج کی نشاندہی کرتی ہے:

1- مریض فرار ہو جانا چاہے 'خود کو قتل کرنا چاہے' کینہ پرور 'جو اس کے قریب آئیں انہیں قتل کی دھمکیاں دے' خیال کرے کہ اس کے پیٹ میں کوئی شیطان بیٹھا ہے جو اس کی ہر بات کی تردید کرتا ہے۔

2- مریض چھپ جانا چاہے۔ کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ دوسرے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔

1- صابی 'بزدل' بلند آواز سے نہ بولے جیسے کہ وہ خوف زدہ ہو 'بے خوابی۔

3- فرار اور خود کو قتل کر دینے کی دیوانگی۔

4- مذہبی مانگولیا۔

درہ شرم الیٹیم (Veratrum Alb): چیزوں کو برباد کر دینے کی خواہش 'اپنے کپڑے چھاڑ دینا چاہے' واضح علامت شدت اور بربادی ہے۔ گھٹنوں پر گھڑا ہو کر گھٹنوں عبادت کرے۔ اسے یقین ہو کہ وہ کوئی اوتار یا پیغمبر ہے۔ زچگی کا جنون اور لھٹ لگنے اور لھٹ سے پیٹنے آنے کے ساتھ اینٹھن۔ ایک تنائی مریضوں کے صحت یاب ہونے کا دعویٰ اسی دوا کے ذریعے موجود ہے۔ مذہبی جنون 'دلجوئی کئے جانے کے ناقابل کمرے میں ادھر ادھر بھاگے۔ زمین کو تھلا رہے یا پھر ایک کونے میں بیٹھ کر کڑھا کرے۔ گریہ و زاری کرے اور روئے۔

سیپیا (Sapia): انتہا درجے کو پہنچی ہوئی دیوانگی 'بد ہضمی اور قبض کے ساتھ' گرم مزاج مریض '200 پوٹینسی کی خوراک دیتے (200 Dilution)۔

سٹیفی سیکریا (Stephisagra): حلق کے باعث جنون 'جو بھی مریض کے قریب آئے اسے انتہا ملامت کرے اور گالی دے۔

فاسفورس (Phosphorus): حلق یا حد سے زیادہ جنسی عیاشیوں کے باعث جنون 'سل (پتھیزوں کا دق) کے باعث جنون' دماغی اور ریزھ کی ہڈی کے اور دیگر امراض کے باعث جنون۔

آئیوڈیم (Iodium): جنون کے آخری مراحل 'جب اندیشے استثنائی تیز رفتاری سے دماغ میں پہنچتے ہیں۔ وہ بھول جاتا ہے کہ ابھی وہ کیا سوچ رہا تھا اور پریشان (تشویش مند) ہو جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ دماغ آرام نہیں کرے گا۔ سوچوں کے دماغ میں آنے کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ اسے پاگل بنا دیتی ہے۔ کھانے کے دوران جب مریض کھا رہا ہو تو ذہن میں خیالات کا جھوم ہوتا ہے۔ باتونی پن 'خیالات دماغ میں اتنی تیز رفتاری سے آتے رہتے ہیں کہ مریض گھٹنوں 'جوش اور ضرورت سے زیادہ اعتماد کے ساتھ بول سکتا ہے۔ فیپ دانی۔

اینا کارڈیم (Anacardium): یادداشت کے بہت زیادہ کمزور ہو جانے کے ساتھ جنون 'ارٹھکاز توجہ میں مشکل 'سرد سری' مراق 'مانگولیا وغیرہ۔

اورم آرسنک (Aurum Arsi): تعصب کا جنون 'شرابیوں اور مذہبی لوگوں کا جنون' افسوس ناک باتونی پن اور قہقہے 'زندگی سے شدید نفرت' انتہا درجے کا چڑچڑاہٹ 'ٹپلا (اضدی) اور جلدی سے ناراض ہو جانے والا' غلط کام کرنے پر خود کو ملامت کرنے والا۔ تصور آئی زخم لگنے پر دوسروں کو ملامت کرے۔

یوفو (Bufo): کانٹے کا رتھان۔

حسد (جلایا) (Jealousy)

ہائیوسائیمس (Hyoscyamus): حسد کرنے، قتل کرنے کی کوشش کے ساتھ، غصے اور بد اعتمادی کے ساتھ حسد، شہوانی جنون کے ساتھ حسد، حسد کے بد اثرات۔

اپیس ایم (Apis M): مستورات میں، شکوک و شبہات اور حسد، تپش، گرم کمروں اور گرم پانی سے غسل سے علامات میں زیادتی ہو۔

لکسیس (Lachesis): ڈراؤنے تصورات کے ساتھ، منہ چرانے کے رجحان کے ساتھ۔ مضحکہ خیز اور بڑے خیالات کے ساتھ۔ بیماریوں کے باعث، بیوی اپنے خاوند پر اعتماد کرے یا خاوند اپنی بیوی پر اعتماد کرے، ہمیشہ اس کے افعال و حرکات پر کڑی نظر رکھے۔ پریشانیوں کا منتظر رہے۔ شکوک اور جلایا لڑکیوں میں، اپنی سہیلیوں پر شک کرے۔

پلساٹیلہ، نکس و امیکا، سٹرامونیم (Pulsatilla, Nux Vom, Stramonium): دی گئی ترتیب سے انہیں آزمائیں، اگر اوپر والی ادویات ناکام ہو جائیں۔

محبت میں مایوسی

(Love- Disappointment)

ایسڈ فاس (Acid Phos): محبت میں مایوسی کے باعث جب غنودگی ہو۔

ہیلےبوریس (Heileborus): محبت میں مایوسی کے باعث جب حیض میں کمی واقع ہو جائے۔

ہائیوسائیمس (Hyoscyamus): محبت میں مایوسی کے باعث، مرگی ہو، ہنسی کے دوروں کا رجحان ہو، مانگھو یا ہو، یہ دوا ذہن کو خود کشی کرنے کے رجحان میں بھی مفید ہے۔ حسد (جلایا) جلانے کے ساتھ ناخوش گوار محبت۔

اگنیشیا (Ignatia): جب محبت میں مایوسی کے نتیجہ میں خاموش غم کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ ایک حساس جوان لڑکی محسوس کرتی ہے کہ اس نے اپنی محبت کھو دی ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ جوان مرد نے اسے مایوس کیا ہے، اس دوا سے وہ مطمئن اور معقول ہو جائے گی۔

نیٹرم میور (Natrurn Mur): مایوس محبت، اس وجہ سے تعلق کو توڑ دینا چاہے لیکن توڑ نہ سکے، اس دوا کو اگنیشیا کے ناکام ہو جانے پر آزمائیں۔

محبت میں گرفتار ہونا

(Love- Falling in)

نیٹرم میور (Natrium Mur): جب محبت تم کر دینے کا احساس ہو تو یہ دوا دینی جائے ' جذبات پر قابو نہ پاسکے اور شادی شدہ مرد کی محبت میں گرفتار ہو جائے یا گھریلو ملازم کی محبت کا دم بھرنے لگے حالانکہ عام حالات میں وہ اسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ ایسا کرنا عقل مندی کی بات نہیں ہے لیکن وہ مجبور ہوتی ہے اس لئے کچھ نہیں کر سکتی ' اپنے اوپر قابو نہیں پاسکتی ' اس دوا کا استعمال اس کی دماغی حالت کو صحیح کر دے گا۔

دروغ گوئی — (Lying)

اوپیم (Opium): یہ دوا ایسے اشخاص کے لئے مفید ہے جن کی عادت ہی جھوٹ بولنا ہو۔
کلسیریا کارب (Calcarea Carb): چوری کرنے اور جھوٹ بولنے کا رجحان۔
مارفینم (Morphinum): دروغ گوئی سے کام لے ' پڑ پڑا اور غلطیوں کا متلاشی ' خواب کی سی کیفیت۔

پاگل (جنون) — (Mania)

(نیز دیکھئے "دیوانگی")

برٹا میور (Baryta Mur): پاگل پن کی کوئی بھی صورت ' بڑھی ہوئی جھنسی خواہش کے ساتھ۔

میلی لوتوا (Melilotua): بھاگ جانا چاہے یا خود کو قتل کر دینا چاہے ' کینہ پرور ' جو بھی اس کے قریب آئے اسے قتل کی دھمکیاں دے ' مذہبی مانگوں یا۔

سٹرامونیم (Stramonium): شدید پاگل پن قتل کے ارتکاب کے رجحان کے ساتھ۔ چھرا کھونچنے اور کانٹے کا رجحان پریشانی کے ساتھ ' کسی سوار کی طرح اپنے منہ سے زمین کریدے ' روشنی اور رفاقت کی خواہش ' ہاتھ ایک دوسرے میں ڈال کر بھیچے ' دوران صبح ' مذہبی پاگل پن ' ہر وقت عبادت کرنا چاہے ' بہت زیادہ باتنی پن ' بے سرو پا اور فضول خیالات کا اظہار کرے ' ہڈیاں کے ساتھ قریب نظر ' زچگی کا پاگل پن۔ باتنی بہت زیادہ باتیں کرے ' خود کو ادھر ادھر گراتا پھرتے ' روشنی میں علامات میں اضافہ ہو اور اندھیرے میں اتفاق ہو۔

کوکولس انڈیکا (Cocculus Ind): جب حیض کی بندش کے باعث جنون ہو جائے۔

ہائوس سائیس (Hyoscyamus): مسخکہ خیز، نگا رہتا چاہے، کپڑے اتار دے، حسد (جلاپا) کے ساتھ پاگل پن، احمق۔

ویرٹرم ایلیم (Veratrum Alb): ہر شے کو کاٹنا اور پھاڑنا چاہے، ہر آدمی کا بوسہ لینا چاہے، تشدد، مذہبی جوش و جنون کی کیفیت۔

لیکیسیس (Lachesis): گھر کی بربادی کے بعد پاگل پن، مرگی کے جھلے سے پسے جنون، مذہبی پاگل پن، بد معاشی و بد اطواری سے بڑے خود پسند و متکبر، دوسروں سے حسد کرنے اور نفرت کرنے اور ظلم کرنے، مریض اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو اپنی روحانی بربادی کی گمانی ستا سنا کر جھنجھلا دے۔ اس کی تمام دہشت زدہ کردیتے والی حرکتوں سے اس کے رشتہ دار و عزیز و اقارب جھنجھلا جائیں، مریض خیال کرے کہ اس سے ایسے ناقابل معافی گناہ سرزد ہو چکے ہیں جن کے نتیجہ میں اس کا جہنم میں جانا لازمی ہو چکا ہے جیسا کہ وہ مذہبی کتابوں میں پڑھ چکی ہے۔

اوپیم (Opium): دہشت ناک خوابوں کے ساتھ پاگل پن، غیر منسوب رویہ۔
سپیا (Sepia): خون حیض کے بہت زیادہ مقدار میں بہہ جانے کے باعث جنون یا من یاس کے زمانہ میں جب خون اچانک بند ہو جائے اور خاندان کے لوگوں سے الچسپی باقی نہ رہے۔
پلساٹیل (Pulsatilla): حیض کی بندش کے دوران جنون۔

بیلادونا (Belladonna): ایک وقت میں خوش ہو لیکن تھوڑی ہی دیر میں اپنے ارد گرد کے لوگوں پر تھوکنے اور انہیں کانٹے لگانے لگے، اس مرض کی علامات سٹرامونیم اور ہائوس سائیس کے بین بین ہوتی ہیں۔ جانگنے پر چوگے اور چھلانگ لگا کر گرے۔

مرکیوریس (Mercurius): پاگل پن، رات کو کپڑے اتار پھینکے، کپڑے پھاڑے اور جھنجھکیاں دے، خود سے بہت زیادہ باتیں کرے اور خود کو بھڑکیاں دے، مسلسل تھوکنے، جو تھوک اس کے پاؤں میں پھیلا ہوا ہو اس میں سے کچھ کو چات لے، گائے کا گوبر اور جو ہروں کا کیکڑ چات جائے، دوسروں کو نقصان نہ پہنچانے لیکن اگر اسے چھوا جائے تو مزاحمت کرے۔ چلتے ہوئے پاس سے گزرنے والے اجنبیوں کو اپنی ناک سے پھوٹنے کی رغبت ہو۔

تارنٹولا ہسپانیولا (Tarentula His): جنون، مریض پہلے جھنجھکا کرے اور پھر ہر کسی کو کانٹیاں بکے، جو چیز ہاتھ میں آئے اسے چاہ و برباد کر دے۔ اپنے کپڑے پھاڑے، بٹے اور گائے لگائے، بوڑھے لوگوں کو ان کی عمر سے متعلق جھنجھکے، مذاق کرے، دور سے کاغذ تمام بے ہوشی کی غیبت پر ہو، ہر چیز کا حرکت میں رہنا پسند کرے۔ کسی شخص کو دیکھنا گوارہ نہ کرے، اپنے رشتہ داروں کو بلا مقصد گھر کے گرد چکر لگاتے دیکھنا چاہے، وہ کسی آدمی کا بے کار شہنشاہ اور ست ہونا پسند نہ کرے۔

سلفر فلسفیانہ پاگل پن، کچھ نہ کرنا، بے کار بیٹھے، اس میں سوچتے رہنا کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے اور وہ کیسے ہے؟ اور آخر میں قدرت خداوندی پر چھوڑ دینا لیکن پھر پوچھنا کہ خدا کو کس نے بنایا اور اس کا باپ کون تھا وغیرہ وغیرہ (نعوذ باللہ من ذلک)

اکتیاریس موسا (Actea Racemosa): اعصابیت کے عذاب ہو جانے کے بعد جنون۔

کیوریم میٹ (Cuprum Met): جنون، جس کے اختتام پر پیسہ آئے۔

پلائینا (Platina): پریشانی کے بعد پاگل پن۔

آئیوڈیم (Iodium): خاموشی اور غور و فکر سے بہتری ہو۔

کلیسریا کارب (Calcarea Carb): مذہبی جنون، مذہبی ذہنیت، جنون کے باعث تناسب کی حس ختم ہو جائے۔

کیمفر (Camphor): آنکھیں چڑھ جانے کے ساتھ زچگی کا جنون، چمکتی اور گھورتی ہوئی

آنکھوں کے ساتھ، چہرہ پیلا اور ماتھا ٹھنڈا ہو جائے، گالیوں کی زبان میں جھاڑے، جھپاڑے، جلد خشک۔

نکس دامیکا (Nux Vom): بے خوابی، کراوت اور بوش کے باعث جنون۔

اسٹیلگوایم (Ustilago M): نمائے کا جنون، خود کشی کا ارتکاب کرنے کی تحریک، خصوصاً ڈوب کر۔

مالینچولیا — (Melancholia)

(دیکھئے ”دیوانگی“)

یادداشت — (Memory)

(دیکھئے ”غیر حاضر دماغی، بھول جانا“ اور ”سوچنا“)

کنجوسی۔ بخل — (Miserly)

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): حرص و لالچ اور کنجوسی کی عادت کے لئے یہ دوا چوٹی کی ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): کنجوس، لالچی و حرص، بے اعتبار، غیر حاضر دماغ اور پست حوصلہ۔

آرسنک الیم (Arsenic Alb): اوپر دی گئی ادویات جب ناکام ہو جائیں تو یہ دوا کنجوسی کی عادت کو دور کرتی ہے۔

غلطیاں (Mistakes)

لائیکو پوڈیم (Lycopodium): حساب کرنے میں غلطیاں کرے 'اچڑائے الفاظ میں' الفاظ کے استعمال میں 'بجوں میں اور لکھنے میں غلطیاں کرے۔

نکس و امیکا (Nux Vom): ماپنے اور وزن کرنے میں غلطیاں کرے۔

گلوناکن 'نکس موسکاٹا' پیٹرولیم (Glonaine, Nux Mos, Petroleum): محل وقوع

میں غلطیاں کرے (ان ادویات کو دی گئی ترکیب کے مطابق استعمال کریں۔)

شیرم میور (Natrium Mur): بولنے میں اور لکھنے میں غلطیاں کرنے کا رنجان۔

کیناٹس سیٹوا (Cannabis Sat): لکھنے اور بولنے میں غلطیاں کرے اور جو کچھ پڑھے یا

سنے اس کی صحیح تفہیم نہ ہو۔

چائنا (China): لفظوں کا غلط انتخاب کرے اور الفاظ کو غلط جگہ استعمال کرے۔

لیکسیس (Lachesis): الفاظ لکھنے میں غلطیاں کرے۔

تھوجا (Thuja): پڑھنے اور لکھنے میں غلطیاں کرے۔ اتنی آہستہ آہستہ بولے کہ جیسے الفاظ

کسیں کھو گئے ہوں۔

زیر وفالیم (Xerophyllum): بودا ذہن کو مطالعہ کی طرف متوجہ نہ کر سکے۔ ناموں کو بھول

جائے۔ الفاظ کے بعد والے حروف کو پہلے لکھ جائے۔ معمول کے الفاظ کے سچے چھوڑ جائے۔

الیومنا سیلیکیٹ (Alumina Silicate): بولنے میں اور لکھنے میں غلطیاں کرے۔ بھٹکا، یکہ

(بے اعتنائی برتنے والا) 'مذہب (غیر مستقل مزاج)' قلت خیال (خیالات کی کمی)۔

ہنسی اثرانا (منہ چڑانا)

(Mocking)

لیکسیس 'پلاٹینم' (Lachesis, Platinum): اپنے رشتہ داروں اور دوسروں کا مذاق اڑائے

دی ہوئی ترتیب کے مطابق آزمائیں۔

اعصابیت (گھبراہٹ)

(Nervousness)

کیلیڈیم (Caladium): اتنا درجے کی اعصابیت اپنے ہی سائے سے خوف زدہ ہو پر

شہوت خیالات کے ساتھ تمام رات جاگا کر سہ۔ تشویش، خاص طور سے سونے سے قبل، مستقبل سے متعلق خوف زدہ ہو، 'امتحان ہمارے' دروازہ بند ہونے کی آواز یا اخبار کی کھڑکڑاہٹ سے چونک جائے۔

آئیوڈیم (Iodium): اعتماد ہے کی اعصابیت، چیزوں کو دور پھینکے اور انہیں توڑے، لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے مارنا پسند چاہے۔ بھگت پین، کمزوری اور چڑچڑاپن۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): مسلسل غم کے باعث اعصابی کمزوری، دماغی مشقت، جنسی بے اعتمادیاں یا ہسمانی یا ذہنی کھنچاؤ۔

کیسٹوریم (Castoreum): ثانی فائیز بخار کے بعد اعصابیت اور چڑچڑاپن، نامکمل ہستیا سے پہلے اعصابی حملے، اعتماد ہے کی تھکاوٹ کے ساتھ پنوں کی پھڑکن۔

ایپس ایم (Apis M): اعصابیت لڑکیوں میں، بے چینی اور ہوانگی، جنگلی کے ساتھ، غلط موقع پر انہیں کام کرنے میں تھکون مزاجی، بھونڈا پن، چیزیں گرائیں اور پھر نہیں۔

کالی فاس (Kali Phos): اعصابیت کے لئے عمدہ اور چوٹی کی دوا ہے۔

لیک کینم (Lac Can): غیر معمولی حساس، مثال کے طور پر ایک مریض کئی روز تک اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو علیحدہ علیحدہ کے پڑا رہتا ہے اگر وہ ایک دوسروں سے مس ہو جائیں تو غصہ ناک ہو جائے۔

نیٹرم کارب (Natrium Carb): ذرا سے شور سے گھبرا جائے، دروازہ بند ہونے کی آواز سے گھبرا جائے، اعصابی اشتعال اور بہت زیادہ تھکاوٹ کے ساتھ دل کا دھڑکنا، کانڈ کی کھڑکڑاہٹ سے بھی دل دھڑکنے لگے اور چڑچڑاہٹ ہو، موسیقی سے خود کشی کا ارتقان پیدا ہو۔

کافیا (Collea): اعصابی اشتعال، انگیزی، بے خوابی، ہڈیانی روٹا، اعصابی درد ہوں، عضلات کا پھڑکنا، دانتوں کا درد، چہرے کا درد، چہرہ سرخ ہو اور سرگرم ہو، خوشی یا خوشگوار حیرت سے یا کسی عقلمند مقصد کی خاطر محنت کرتے ہوئے سرگرم ہو جائے اور چہرہ سرخ ہو۔

کولو سینتھس (Colocynthis): اعصابی تھکاوٹ اور چڑچڑاپن، خصوصاً کاروباری معاملات میں خرابی کے باعث یا کسی عورت کے اپنے خاوند کی دن رات نگرانی کے باعث جو اسے دوسری عورتوں سے بچانے کے لئے اس کی نگرانی کرتی ہو۔

کونیم (Conium): رانڈ عورتوں اور رنڈوے مردوں میں اعصابیت جو اچانک جنسی مشاغل سے محروم ہو جائیں، ذہنی اور ہسمانی کمزوری، توجہ مرکوز نہ کر سکیں، پنوں میں لرزش، جھٹکے اور پھڑکن، اعصابی مریض، حالت خراب ہو جائے، زندگی سے تھکاوٹ۔

کالی آئیوڈ (Kali Iod): اعصابیت اور ذہنی تھکاوٹ، آرام کرنے سے، مستقل حرکت سے

اور تیز تیز چلنے سے حالت زیادہ خراب ہو جائے ' مریض میں ظالماتہ مزاج اور چڑچڑاہٹ پن پاتا جائے۔

کروٹیلس ہور (Crotalus Hor): اعصابیت، کیکاپاہٹ اور کمزوری، قوت حیات کی اچانک اور شدید کمزوری، باتونی پن۔

اورم میٹ (Aurum Met): فم زدہ ہو اور خود کو ناقابل قبول شخصیت خیال کرے۔ کسی بھی چیز سے مطمئن نہ ہو، مانگولیا کا مریض ' خود کو اس دنیا کے لئے ناموزوں خیال کرے، موت کا شائق ہو کیونکہ اس کے خیال میں وہ اس کے لئے خوشی کا باعث ہو گی۔ جھگڑالو، چڑچڑاہٹ، بھلا یا ہوا، معمولی سے اختلاف کو بھی برداشت نہ کر سکے۔

کیمفر (Camphor): یہ دوا انتہا درجے کی اعصابیت کے لئے ہے۔ شروع میں تشدد، اشتعال اور جنون ہو اور بعد میں چڑچڑاہٹ تو ختم ہو جائے لیکن بے ہوشی اور ٹھنڈک کے ساتھ جو اس گم ہو جائیں، سخت تھکاوٹ اور نقابت۔

نکس وامیکا (Nux Vomica): جھگڑالو، لعنت ملامت حتیٰ کہ تشدد کی بھی پرواہ نہ کرے، تیز خوشبو، تیز روشنی، شور اور باتوں کی آوازیں برداشت نہ ہوں۔ مذبذب، غیر مستقل مزاج۔

کوکولس (Cocculus): دیکھنے میں خوش باش لگے، اپنی صحت کی پرواہ کم ہی ہو، سو سروں کی علامات کے متعلق زیادہ فکر مندی ہو۔ اعصابی نظام کی انتہا درجے کی چڑچڑاہٹ، ہلکا سا شور یا ناگوار آواز بھی برداشت نہ ہو۔ پاؤں اور ٹانگیں اکڑ جائیں اور تھوڑی دیر اسی حالت میں رہیں پھر ڈھیلی ہونے پر درد کریں۔ ذہنی اور جسمانی افعال سست ہوں، فالجی کمزوری میں اضافہ ہو۔

تھیرائیڈین (Theridion): اعصابی حساسیت کی بہت ہی بری حالت جس میں کمزوری، کیکاپاہٹ، ٹھنڈ، پریشانی، غشی، جلد جلد جوش میں آ جاتا اور ٹھنڈے پینے بھی ہوں۔ انتہا درجے کی اعصابیت اور چڑچڑاہٹ، آنکھیں بند کرنے سے حالت مزید بری ہو جائے۔

جلسی میم (Gelsomium): خوف، صدمہ اور چھپہ گی کے باعث حکالیف، ایک فوجی کے میدان جنگ میں جاتے ہوئے بے اختیار ان دست لگ جائیں، دہشت یا دہشت کے ساتھ حیرت کے باعث بے اختیار پیشاب خطا ہو جائے۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): اسہال کا اچانک حملہ، اس وقت جب مریض کسی دوست کو ملنے کی تیاری کر رہا ہو یا کسی اجنبی سے ملاقات کرنے کے لئے تیار ہو رہا ہو یا اوپیرا (سٹیج وغیرہ) کے لئے تیار ہو رہا ہو، یہ سب اعصابی جوش کے باعث ہوتا ہے۔

کریو زوٹ (Kreosote): دماغی طور پر بہت زیادہ بیجا، طرح طرح کی چیزیں مانگے لیکن پیش کی جانے پر انکار کر دے۔ کوئی چیز اس کے لئے موزوں نہ ہو اور کوئی چیز اسے مطمئن نہ کر

ضعف اعصاب (اعصابی تھکاوٹ، ذہنی تھکاوٹ یا تھکاوٹ)

Neurasthenia (Nervous Prostration, Brain Fagor exhaustion)

(نیز دیکھئے ”ذہنی تھکان“ اور ”اداسی“)

کالی فاس: (Kali Phos)۔ ضعف اعصاب کے لئے عمدہ دوا ہے۔ یہ دوا خاص طور سے ایسے نوجوانوں کے لئے مفید ہے جو کمزور پیدا ہوئے ہوں یا جن میں اعصابی قوت کا فقدان ہو، شرمیلا پن اور احتکام، مجامعت کے بعد شدید تھکاوٹ اور جنسی طاقت میں کمزوری اس دوا کی اہم علامات ہیں۔

سٹرائیکنیا فاس (Strychnia Phos)۔ یہ دوا کالی فاس کے بعد اہم خیال کی جاتی ہے۔ اعصابی طاقت میں بے قاعدگی اس دوا کی علامت ہے۔ بعض اوقات بہت زیادہ اور بعض اوقات بہت کم اعصابی طاقت میں بے قاعدگی ظاہر ہوتی ہے۔ ذہن اور پنوں دونوں پر قابو نہیں ہو سکتا۔ یہ عام قلت خون میں بھی دی جاتی ہے۔

پیکریک ایسڈ: (Picric Acid)۔ سٹرائیکنیا فاس کے بعد اس دوا کا نمبر آتا ہے۔ دماغی اور جسمانی کمزوری اس کی بنیادی علامت ہے۔ اور مشقت کے باعث تکلیف میں زیادتی اس دوا کا رہنما کن طریق کار ہے، تھوڑی سی مشقت سے تھکاوٹ محسوس ہو، یوں لگے یا کچھ کرنے کی خواہش نہ رہے، لیٹے رہنا چاہیے، بھوک بہت کم، عمومی طور پر دلچسپی کا فقدان۔

امبرا گریسیا: (Ambra Grisea)۔ مریض انتہائی ناخوشگوار چیزوں کے درمیان رہنے پر مجبور ہو، یہ چیزیں اس پر مسلط ہوں اور وہ ان سے بچنا چھڑانے سے قاصر ہو، شدید تجسس، انتہائی ناخوشگوار چیزوں کے درمیان رہے جو اس پر مسلط ہوں اور وہ ان سے بچنا نہ چھڑا سکے۔ اعصابی شکستگی اور ذہنی تھکاوٹ، خاندان میں کسی کی موت یا کاروبار میں نقصان وغیرہ کے صدمے کے باعث۔

نیٹرم میور: (Natrium Mur)۔ ماضی کی ناخوشگوار یادوں میں گھرا رہتا پسند کرے اور راتیں بستر پر جاگتے ہوئے ان پر گزرتے ہیں گزارے، یہ دوا انگیشیا کی مزمیں ہے، اسی لئے اس کی تکمیل کرتی ہے۔

ار جینٹم نائٹریکیم: (Argentum Nit)۔ جب کالی فاس ناکام ہو جائے تو اسے آزمائیں، خصوصاً جب ارجٹاٹ جاتا رہے، جب اعصاب و عضلات پر قابو نہ رہے، اور اس کے ساتھ ٹانگوں اور بازوؤں میں کپکپاہٹ ہو، جب کسی سے ملاقات کے لئے مریض کی ہمت بندھ جاتی ہے تو پریشان

ہو جائے 'اندیشوں کے باعث پیت پھوٹ جائے' جب شادی پر جانا ہو یا اوپر یا چرچ میں جانا ہو تو اندیشے 'خوف کے ہمراہ ہوں' حتیٰ کہ اس سال لاحق ہو جائیں 'مضائق کی طلب ہو جو کہ مریض کے لئے موافق نہ ہو' اعصابی بالنگولیا 'ٹھنڈ لگنے کے ساتھ درد سر ہو اور کیکپاہٹ ہو ذہنی تھکان ہو اور چکر آئیں۔ معمولی طور پر سر باندھنے اور دبائے سے درد سر میں افادہ ہو 'حلق میں پھانسی کا احساس ہو' ڈکار آئیں اور گاڑھی رطوبت والی تے ہو 'گیس ہو جائے جو کہ گرمی سے اور رات کے وقت زیادہ ہو۔

زنگم فاس: (Zincum Phos): دماغی و اعصابی تھکاوٹ جس کی وجہ مرگی یا اس کا غلط علاج ہو 'یہ دوا کاروبار میں ناکامی کے بد نتائج اور طلب کے زیادہ دماغی محنت کرنے کے بد اثرات میں بھی مفید ہے۔ یادداشت کمزور ہو 'سوچنے کی ناقابلیت' چکروں کے مسلسل حملے جو لینے سے بہتر ہوں 'مریض تھکا ماندہ ہو اور بے حس ہو' جنسی بے اعتدالیوں کے باعث نامردی۔ دوا لمبے عرصہ تک پویشی بدل بدل کر جاری رکھنی چاہئے۔

ہائپرکیم: (Hypericum): کسی بھی قسم کی اعصابیت کے لئے 'خواہ جگہ کی تبدیلی کے صدور کے باعث ہو یا کسی کار وغیرہ کے حادثے کے باعث ہو' بولنے میں جھٹکے لگیں اور اچکپاہٹ ہو' مریض خاموش رہے اور زندگی میں دلچسپی نہ رہے۔

ایناکارڈیم: (Anacardium): اعصابی تھکاوٹ 'بے تحاشہ مطالعہ یا مادہ منویہ کے اخراج کے باعث' یادداشت کمزور ہو 'محسوس کرے جیسے وہ ایک نہیں بلکہ دو ہے' محسوس کرے کہ اس کے ہر طرف اجنبی لوگ ہیں 'اپنے خاوند کو اپنا خاوند اور اپنے بچے کو اپنا بچہ خیال نہ کرے۔ ذہن اور جسم میں جدائی ہو جائے۔ ایک ہی وقت میں مریض پر دو مختلف طرح کے اثرات مرتب ہوں۔ ایک نقصان پہنچانے کا دوسرا اچھائی کرنے کا' سب کچھ خواب لگے اور دنیا میں کچھ بھی حقیقی معلوم نہ ہو۔

ارجنٹم میٹ: (Argentum Met): یادداشت میں خلل واقع ہو جائے اور آدمی کی ذہانت والے حصہ میں بھی خلل ہو 'فہم کی ناقابلیت' سوچنے سمجھنے کی ناقابلیت 'تاجروں' طلبہ' قارئین و مفکرین میں ذہنی شعبوں میں محنت (اس مرض کا سبب بنتی ہے)۔

اورم میٹ: (Aurum Met): غم 'مایوس کن محبت' دہشت 'غمصے' تنقید 'نقص لگ جانے یا سخت شرم کے باعث ہونے والی تکالیف' مریض خاموشی سے اپنی حالت پر اور دنیا سے شدید نفرت پر کڑھتا رہتا ہے وہ کسی شخص کو اپنی ذہنی حالت کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا اور اس طرح آخر کار خود کشی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔

کونیئم: (Conium): ذہنی مشقت نہ کر سکے 'ارٹھراز توجہ کا فقدان' کسی چیز پر توجہ مرکوز کرنے

سے قاصر ہو، تقسیم آہستہ آہستہ۔

ڈی جی ٹیلیس: (Digitalis) خوفناک پریشانی یا تشویش یا اندیشہ ناکی، اکیلا رہنا پسند کرے،
اواسی، مانگو لیا، دل شکستگی، نا اُمیدی اور بے چینی ہو، مریض مذہب ہو، نبض بے قاعدہ، کمزور
اور سست ہو، خود کو کسی کام میں مشغول نہ کر سکے۔

سائی پری پیڈیم (Cypripedium): طویل علالت کے باعث اعصاب شل ہو جائیں، چائے
اور کافی کے بے تحاشہ استعمال سے اعصاب پر برا اثر، ذہنی اشتعال سے، جس کے بعد انفلوئنزا
ہو۔

گنیشیا کارب (Magnesia Carb): حوادث کا شکار ہونے والے لوگوں میں بے تحاشہ
پریشانیوں اور تفکرات کے باعث اعصابی تحکات، خوراک 200 ڈائی لیوٹن۔

زنگم میٹ (Zincum Met): حساسیت، شور، اخبار کی کھڑکھڑاہٹ، باتوں کی آوازوں سے
خواہ یہ باتیں اس کے عزیز ترین دوست ہی کیوں نہ کریں نیز بولنے سے بھی حساسیت ہو۔

میفاٹینس (Mephitis): چھوٹی طاقت کی خوراکیں دیکھنے، یہ دوا اعصابی نظام کو درست کرتی
ہے اور تحکات کو دور کرتی ہے۔

ایپس ایم (Apis M): اعصابی لڑکیوں کے لئے جن میں بے چینی اور ہرانگیبختگی پائی
جائے، بے موقع ہنسی اور اس کے ساتھ کام کے موقع پر سکون ملائی ہو، بودا پن، چیزیں گرائے
اور پھر بنے۔

کاربووےج (Carboveg): اس بات کی اناہیت کہ مریض چیزوں کی مابہیت کو سمجھ سکے، وہ
نہیں سمجھ پاتا کہ آیا یہ چیزیں خوشگوار ہیں یا نا خوشگوار، خوفناک باتیں سن کر اس پر خوف کا کوئی
اثر ظاہر نہیں ہوتا اور نہ خوش کن باتیں سن کر وہ خوش ہوتا ہے، سکول کے لڑکے لڑکیاں جو یاد
کرنے میں اور سیکھنے میں بہت سست ہوں اور جو رات کو ڈریں، وہ اکیلے نہیں سو سکتے، اور نہ وہ
کسی اندھیرے کمرے میں کسی اور کو ساتھ لئے بغیر جاتے ہیں۔

سینٹورا ٹیگاتا (Centaura Tagaana): ذہنی صاقت و پریشانی، مریض اوھر اوھر ہر جگہ
جھپٹتا پھرتا ہے، ایک کام شروع کرتا ہے اور اسے بیچ میں چھوڑ کر پورا کئے بغیر دوسرا شروع کر
دیتا ہے اور اسی ذکر پر چلتا رہتا ہے اور کوئی بھی کام مکمل نہیں کر پاتا، سست اور ناقابل ارتکاز
توجہ ہوتا ہے۔

اگنیشیا (Ignatia): سر درد کے ساتھ اعصاب شل ہو جانا، بچے یا خاوند کی وفات کے بعد جسم
میں کپکپاہٹ اور بے خوابی، مریض ہر وقت روتی رہتی ہے اور اسے نیند نہیں آتی، خود پر قابو
پانے کے قابل نہیں ہوتی، اپنے آپ سے شرمندہ ہو۔

ٹیوبریکولینم بوو (Tuberculinum Bov): جذبہ محبت کا جالتے رہتا، مریض اپنے خاوند یا بچے سے محبت نہ کرے، ذہنی معذوری، یہ تمام علامات تپ مق کی ہسٹری کے ساتھ ہوں۔

کھلیمر یا کارب (Calcarea Carb): تذبذب میں مبتلا رہے، متکون مزاج، بے چین اور اعصابی، اس بات کا خوف کہ مریض غیر ضروری شخصیت ہے۔ ناکام ہو جانے کا خوف۔ پریشانی و تشویش اور سوچے سمجھے کی نا اہلیت، اندرونی تناؤ اور دباؤ، متفکر ہو، عورتوں کی رفاقت میں مریض ہسٹری محسوس کرے، ٹھنڈے اور مرطوب موسم میں ابتری ہو۔

ناجا: (Naja): بھٹکنے، غیر حاضر دماغ، خودکشی کا رجحان، تصوراتی چیزوں پر کڑھتا رہے، اپنی جنسی نا اہلیت پر تشویش میں مبتلا رہے جب کہ جنسی خواہش موجود ہو۔ محسوس کرے کہ ہر کام غلط ہو چکا ہے اور اس کی اصلاح کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جو کام ضروری ہیں انہیں کرنے کا بہت زیادہ احساس لیکن انہیں نہ کرنے کا ناقابل ضبط رجحان، احمق اور الجھا ہوا، گھبرایا ہوا۔

سنی کولا: (Sanicula): دماغی آوارگی، کسی ایک چیز پر نہ ٹھہر سکے۔ ایک کام شروع کرے اور پھر اسے چھوڑ کر دوسرے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ بھوک نہ رہے، طبع کی ہوئی زبان، منہ خشک، گرم اور خشک کرے میں ابتری ہو، ایک ایم طاقت دیتے۔

کوکولس (Cocculus): کسی ایک نا موافق چیز پر ہی خیالات مرکز رہیں۔ خیالات میں گم رہے اور اپنی کوئی پرواہ نہ ہو۔ دماغی کمزوری کا اظہار ہو، ذہن خالی خالی (کور) محسوس ہو۔ خلا میں گھورتا رہے اور سوال کرنے والے کی طرف آہستہ آہستہ مڑ کر دیکھے اور جواب دینے میں دقت محسوس کرے۔ اس بات کا اطلاق پیشہ ور نرسوں پر نہیں ہو سکتا۔ مریض کا ذہن بہت سستی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ بھول جائے کہ ابھی اس نے کیا چیز مانتا تھا۔ ذہنی الجھاؤ۔

لیک کین: (Lac Can): دل شکستہ، نا اُمید، یہ خیال کے زندہ رہنے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔ خیال کرے کہ اس کا مرض رفع ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ خیال کرے کہ دنیا میں اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ رونے کا مزاج بنا رہے، غم زدہ اور چڑچڑاہو، بچے ہر وقت روتے اور چیختے چلاتے رہیں۔

سٹیفی سیکریا: (Staphisagria): جب کوئی شخص اپنے بڑوں کے رویہ سے غیر مطمئن ہو، حالانکہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں اس نے ہر ممکن طور پر اپنی تمام صلاحیتیں صرف کی ہوں اور خود کو تھکایا ہو۔ اس سب کچھ کے بعد وہ بیمار ہو گیا ہو تو یہ دوا فوری طور پر اسے بحال کر دے گی۔

نائٹرک ایسڈ: (Nitric Acid): معمولی معمولی باتوں پر بخ یا ہو جائے، کام پر اختیار نہ ہو، کسی سنجیدہ کاروباری کارکردگی پر اختیار نہ ہو، ذہن کمزور اور آوارہ ہو، یادداشت کمزور ہو، اپنے عزیز

ترین دوست کے کھو جانے پر بہت بڑی روحانی اذیت میں مبتلا ہو۔ بیمار کی بیمار داری کرنے کے باعث بے تحاشہ ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ ہو۔

ڈروسیرا (Drosera): مریض پر اعتمادی سے پڑ ہو جیسے اسے غلط لوگوں کے ساتھ معاملہ طے کرنا پڑ رہا ہے۔ بے چین، اداسی و غم کے رجحان والا تصور کرے کہ وہ حامد قسم کے لوگوں سے دھوکہ کھا جائے گا۔ کوئی ناموافق بات سننے کا خوف۔

سپیڈیا (Sepia): اعصابی اور اچھل کود کرنے والی مریض چاہتی ہے کہ ہر آدمی اور ہر چیز سے دور بھاگ جائے اور کہیں اکیلی اندھیرے میں آنکھیں بند کر کے پڑی رہے۔ اگر وہ دس منٹ کی نیند لے سکے تو ایک بدلی ہوئی عورت بن جائے۔ کند ذہن، یک سو، ٹھکی ماندی، چڑچڑی، وہ دیکھنے میں اسحق اور کند ذہن معلوم ہو، ذہنی طور پر کند ہو، آہستہ آہستہ سوچے اور بھٹکنا بھی ہو۔

پلاٹینم (Platinum): جب ذہنی علامات ظاہر ہوں تو جسمانی علامات غائب ہو جائیں اور اسی طرح سے اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے، جسم میں تکلیف ہو لیکن ذہن ہشاش بشاش ہو اور جب جسم پر سکون ہو تو ذہن متاثر ہو جائے۔

سیلیشیا (Silicea): جب صبح کو جاگے تو چلائے کہ اس کے ہاتھ سو گئے ہیں۔ صرف پنوں (Pins) کے متعلق سوچے، ان کے متعلق خوف زدہ ہو، انہیں تلاش کرے اور انہیں بڑی احتیاط سے گئے، ہر جگہ پر پنوں کو دیکھا کرے۔

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): تبدیلی کی مسلسل خواہش، سفر کرنے کی، کہیں جانے کی اور کوئی مختلف قسم کا کام کرنے کی مستقل خواہش، یہ اشخاص جنوں کی سرحد پر ہوتے ہیں۔

تھیریڈین (Theridion): ہر آواز پورے جسم میں گھسکتی ہوئی محسوس ہو، اس کے باعث مٹی اور چتر آئیں، ہر چیز چمکتی ہوئی آواز دانتوں میں گھسکتی ہوئی محسوس ہو۔

سٹرکیولیا (Sterculia): یہ دوا دوران خون کو باقاعدہ بناتی ہے، یہ ایک مقوی دوا ہے، اس سال کو روکتی ہے، نظام دوران خون کو باقاعدہ بناتی ہے۔ اور بطور پیشاب آور کام کرتی ہے۔ ضعف قلب کے لئے مفید ہے۔

الیومینا فاس (Alumina Phos): سوالات کے جوابات دینے اور رفاقت سے بے زاری، بہت زیادہ پرجوش اور بھٹکنا، اس دوا میں غم کے مزمن اثرات پائے جاتے ہیں اس طرح یہ انگلیش کے بعد آتی ہے، دماغی پشیمانی، جنسی بے اعتمادیوں کے بعد اور طویل ذہنی مشقت کے بعد مفید دوا ہے، کلچ کے زمانے کے بعد ذہنی ناکارہ پن، ہر وقت لینے رہتا چاہے یہاں تک کہ معمولی تھکاوٹ یا پیدل چلنا تمام علامات کے ظاہر ہونے کا باعث بن جاتا ہے، غیر حاضر دماغ، اعصابی ضعف، دوسروں سے الگ تھلگ رہنے کا رجحان، غیر مستقل مزاجی اور خیالات کا

فقدان 'ذہنی تھکان ہو' طویل دماغی مشقت کے بعد۔
 کینابیس سیٹروا: (Cannabis Sat): اپنے آپ کو قتل کرنے کے بارے میں سرگوشیاں
 سننے 'خیال کرے کہ یہ اعلیٰ ترین ہستی کی طرف سے حکم ہے۔

ضدی — (Bostinate)

(نیز دیکھئے "ماراضی")

کیموملا: (Chamomilla): ضدی بچے جیسے کہا جائے کام دیے نہ کریں 'چیزوں کے لئے
 روکیں گے لیکن جب دی جائیں تو لینے سے انکار کر دیں گے۔
 کلکیریا کارب: (Calcarea Carb): ضدی مزاج رکھنے والے بچوں کے لئے دوا جو
 موٹاپے کی طرف مائل ہوں۔
 سٹیفنی سیکریا: (Staphisagria): بد مزاج بچوں کے لئے جو مختلف چیزوں کے لئے ضد کریں
 لیکن پیش کی جانے پر انکار کریں۔
 نکس وامیکا: (Nux Vomica): دوسروں کی خواہشات کے سامنے رکاوٹ پیدا کریں۔ جنون
 اور زیادتی جیس میں۔
 ارجنٹم ناکٹرکیم: (Argentum Nit): بہت ہی ضدی اور جس چیز کی بھی توجہ دی جائے اس
 پر عجیب عجیب اعتراضات کریں۔ عجیب و غریب سوچوں سے بھرے ہوئے۔ مریض ہر چیز ٹھنڈی
 پسند کرتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈی خوراک 'گرم کمرے میں دم گھٹتا ہوا
 ٹھوس کرے۔

تنگ مزاج (چڑچڑا)

(Peevish)

اورم میٹ: (Aurum Met): تنگ مزاجی جو خوش مزاجی سے بدل جائے۔
 لائیکوپوڈیم: (Lycopodium): اسال میں یا بیدار ہونے کے وقت چڑچڑا ہوا۔
 کیموملا: (Chamomilla): دانت نکالنے کے دوران بچوں میں چڑچڑا پن، نکس کی جھگی کے
 ہمراہ۔
 فیرم میٹ: (Ferrum Met): تنگ مزاجی، تنقید یا اختلاف رائے کو برداشت نہ کر سکے
 جھگڑالو۔
 پتھرولیم: (Petroleum): بہت ہی تنگ مزاج 'بغیر کسی جرم کے ہر کسی کو مارنا چاہے۔

ادارک (شعور، سمجھ وغیرہ)

(Perception)

کالچیم: (Colchicum): ثانی فائیز بخار میں قوت مدرکہ میں کمی واقع ہو جائے۔
 پلمبم: (Plumbum): ادارک میں سستی، محسوسات میں سستی، فالجی جنون، دماغ ست رفتاری سے کام کرے، یہ سب کچھ مریض کو فالج کی جانب لے جا سکتا ہے۔
 اگریکس میور: (Agaricus Mur): مدرکہ نکھو جائے، پھولی پھولی چیزوں کو پھلانگنے کے لئے لمبی لمبی پھلانگیں لگائے اور ڈگ بھرے جیسے کہ وہ درختوں کے تنے ہوں۔ معمولی سا سوراخ بہت بڑا خوفناک شکاف یا رخسہ دکھائی دے۔ مچھ بھرپائی بڑی سی بھیل محسوس ہو۔

زہر خورانی (کا خوف)

(Poisoned)

الیئم سیٹ: (Allium Sat): زہر دینے جانے کا خوف۔
 ہائیوسکیمس: (Hyoscyamus): شک کرے کہ اسے زہر دیا جا رہا ہے۔ آبی ایم ڈا کیلوشن کی ایک خوراک دیجئے۔
 لیکسیس: (Lachesis): مریض تصور کرے کہ اس کے عزیز رشتہ دار اسے زہر دیتے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے وہ غذا ان کے ہاتھوں سے لینے سے انکار کر دے۔

غرور — (Pride)

پالادیئم: (Palladium): عزت نفس کا مجروح ہو جانا، محسوس کرے کہ اسے عملاً یا قولاً بے عزت کیا گیا ہے۔
 پلاٹینم: (Platinum): ذہنی طور پر سخت صدمہ پہنچنا، معمولی سی تنقید سے ذہنی صدمہ محسوس کرے، گہرا زخم محسوس کرے، دل کٹ جائے، دل ٹوٹ جائے۔
 لائیکو پوڈیم: (Lycopodium): اکڑا ہوا، نمود و نمائش کا دل دادہ، اپنی بات منوانے والا۔
 لیکسیس: (Lachesis): غرور کا جنون، خود پسند، حاسد، متنفذ، انتقام اور ظلم مریض کے اوصاف (علامات) ہوتے ہیں۔
 فیرم میٹ: (Ferrum Met): غرور، خود سے مطمئن دکھائی دے۔

سلفر: (Sulphur): غرور، سب تمام قحط شدہ دوائیں غیر مفید ثابت ہو جائیں تو یہ دوا انہیں کارآمد بنانے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔

جھگڑالو — (Quarrelsome)

(دیکھئے ”غصہ“)

اُداسی (غمگینی)

(Sadness)

(نیز دیکھئے ”ضعف اعصاب“)

گھریٹاٹس: (Graphites): اداسی میں موسیقی سے اتھری ہو، موت کے خیالات۔

پلائینا: (Platina): اداسی گھر کے اندر، کھلی ہوا میں جانے سے بہتری ہو۔

سٹانم: (Stannum): آدمیوں سے بیزاری کے ساتھ اداسی۔

پلمبم میٹ: (Plumbum Met): اداسی ’مالٹولیا‘ یوں محسوس ہو کہ کوئی خطرناک بات ہونے

والی ہے، مریض محسوس کرے کہ وہ رحمت سے محروم کئے جانے والا گناہ کر چکی ہے، محسوس

کرتے کہ اس سے ناقابل معافی گناہ سرزد ہو چکا ہے، سوچنے سے اتھری ہو، بے خوابی میں مبتلا

ہو۔

اگنیٹیا: (Ignatia): غم کے بعد اداسی۔

اورم میٹ: (Aurum Met): اداسی ہو اور مریض محسوس کرے کہ وہ اپنے دوستوں کی

عنایات سے محروم ہو چکی ہے۔

اکونائٹ نیپ: (Aconite Nap): مستقبل سے متعلق اداسی۔

ایسڈ فاس: (Acid Phos): اداسی کے باعث کمزوری ہو جائے۔

اورم فولی ایٹم: (Aurum Foliatum): ’مالٹولیا‘ مریض محسوس کرے کہ وہ دنیا کے لئے

موزوں شخصیت نہیں ہے اس لئے انتہائی خوشی کے ساتھ مرنے کی تمنا کرے۔

کوکولس: (Cocculus): ’مالٹولیا‘ اور اداس ’تدلیل سے بہت حساس‘ جلدی سے ناراض

ہو جائے۔ معمولی معمولی باتیں اسے ناراض کر دیں۔

شرمیلہ — (Shy)

جلمی میم: (Gelsemium): عام لوگوں کے سامنے جانے سے شرمائے، بہت شرمیلہ، بزدل

ذہن خالی خالی محسوس کرے۔

برشا کارب 'کالی فاس': (Baryta carb, Kali Phos): خود اعتمادی کے فقدان کے باعث شرمیلا پن، خوف و بزدلی۔

سلفر: (Sulphur): شرمیلا پن، خوف کے رجحان کے ساتھ۔

الیومینا: (Alumina): (بزدلی) شرمیلا پن، جو خود اعتمادی سے بدل جائے (یعنی یہ تبدیلی ہوتی رہے) بھی شرمیلا پن ہو اور کبھی خود اعتمادی۔

کوکا: (Coca): شدید ذہنی بے چارگی کے ساتھ شرمیلا پن۔

پلساٹیل: (Pulsatilla): شرمیلا پن، بزدلی کے ساتھ۔

نیند — (Sleep)

میڈوررینم: (Medorrhinum): گھٹنوں کو سینے کے ساتھ جوڑ کر سوئے، یہاں تک کہ بڑی عمر کے مریض بھی اسی حالت میں سوتے ہیں۔

کوکولس: (Cocculus): مریض سونے کے دوران سب کچھ سن سکتا ہے یہاں تک کہ خزانے بھی۔

میویری ایٹک ایسڈ: (Muriatic Acid): بستر سے پائنتی کی جانب سے نیچے گر جانے کا رجحان۔

انگیشیا: (Ignatia): اتنی کچی نیند سوئے کہ ہر بات سن سکتا ہے، ایک ہی موضوع پر تمام رات خواب دیکھتا رہے۔

کیڈنیم سلف: الی کاک، لائیو پوڈیم: (Sulphur, Ipecac, Lycopodium): کھلی آنکھوں کے ساتھ سوئے۔

غنودگی، خواب آلودگی (خوابی دورے، غشی)

(Sleepiness, Narcolepsy)

سائی مکس: (Cimex): نہ رکنے والی غنودگی۔

سائی کلیمین: (Cyclamen): غنودگی، ترش مزاجی، سستی (آکسی) بے ہوشی، کام سے بے رغبتی، عظیم آزر دگی اور مایوسگی۔

انڈول: (Indol): آکسی کے ساتھ غنودگی، ہر وقت لیٹے رہنا پسند کرے، کام کرنے کی کوئی خواہش نہ ہو۔

نیرم سلف: (Natrium Sulph): پڑھتے وقت غنودگی۔
 آرٹیکا ایم' میٹیشیا: (Arnica M. Baptisia): جب کسی سوال کا جواب دے رہا ہوں تو
 غنودگی ہو جائے (یہ حالت عام طور سے تائی فائیڈ بخار، فوٹی بخاروں اور انفلوئنزا میں ہوتی

ہے)۔
 میگنیشیا کارب: (Magnesia carb): کھانے کے بعد غنودگی ہو، جبکہ کھڑا ہو۔

سلفر: (Sulphur): پاخانے کے بعد غنودگی۔

ایٹھوزا: (Aethusa): پاخانے کے بعد یا قے کرنے کے بعد غنودگی۔

ہائیوسکیمس: (Hyoscyamus): ذہنی تھکاوٹ کے بعد غنودگی۔

ناجا: (Naja): کسی شہتیر کی مانند پڑا سویا کرے، سانس میں خراہٹ کے ساتھ، سونے میں
 کسی حشرات کیڑے کی سی حالت۔

نیرم میور: (Natrium Mur): غنودگی اور اونگھ کھانا کھانے کی بعد۔

کاسٹیکم: (Causticum): شدید غنودگی، دن کے دوران، مزاحمت کرنا مشکل ہو، لیٹ جانا

پڑے۔

چیلیدونیم: (Chelidonium): واضح غنودگی، حتیٰ کہ کھلی ہوا میں بھی ہو، مریض چلتے چلتے
 اونگھ جائے اور گرنے کے قریب ہو جائے۔

کالی بروم: (Kali Brom): کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو جائے۔

بے خوابی

(Sleeplessness)

کافیا: (Coffea): یہ دوا بہت زیادہ جاگتے رہنے کی حالت کی نشاندہی کرتی ہے، آنکھیں بند کرنا
 ممکن نہ ہو، غایت (انجسٹ) ذہنی کے باعث جسمانی جہان، خوشی کی خبر سن کر، بے تحاشہ محنت کے
 بعد جو خوشی کا باعث ہو اور حیران کن مسرت کے بعد بے خوابی لاحق ہو جائے، لیکن بے سکونی
 یا درد وغیرہ نہ ہوں۔ طویل پوکیدارہ کرنے کے باعث یا منشیات کے بے جا استعمال کے باعث
 بے خوابی لاحق ہو جائے۔

سینی شیو: (Senecio): رحم اپنی جگہ سے نکل جانے کے باعث بے خوابی، سن یاس کے
 دوران رحم میں سوزش یا جلن۔

سائپری پیڈیم: (Gypripedium): جب دماغ میں ہر قسم کے خوش کن خیالات کا اثر دہام ہو
 جائے تو اس کے باعث بے خوابی لاحق ہو، چھوٹے بچے تمام رات جاگتے ہیں اور کھیلتے ہیں اور

اپنے والدین کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔

مگیشیا کارب: (Mag Carb): جنت میں شدید دہاؤ کے باعث بے خوابی یا تشویش ناک 'بے چینی اور اندرونی گرمی کے باعث بے خوابی' کپڑا اتر جانے کے عمومی خوف کے ساتھ 'اچھارے کے باعث بے خوابی۔

کالی فاس: (Kali Phos): یہ دوا بے خوابی کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ خصوصاً جب نیند رات کے آخری حصہ میں نہ آئے 'مریض کاروباری پریشانیوں کے باعث اعصابیت کا شکار ہوتا ہے اور ذہنی طور پر تھکا ہوا ہوتا ہے۔

میوری ایک ایسڈ: (Muriatic Acid): نیند آتی ہو لیکن سونے کے قابل نہ ہو 'نیند سے سر ہرائے' ساری رات خیالات میں محو اور بے چین رہے 'چڑچڑاہٹ۔

کاسٹیکم: (Causticum): خشک گرمی کے باعث رات کو بے خوابی 'کسی کروت چین نہ ہو' مریض حالت سکون میں نہ رہ سکے۔

فیرم میٹ: (Ferrum Met): صرف چارپائی (بید وغیرہ) کا سرہانہ جنوب کی طرف کر کے ہی سو سکے۔

اگنیشیا: (Ignatia): اتنی کچی نیند سوائے کہ ہر بات دوران نیند سنائی دے۔ ایک ہی موضوع پر تمام رات خواب دیکھے۔ پر جوش یا پر تشویش سوچوں کے باعث رات بھر سو نہ سکے۔ غم 'اداسی اور دیگر افسردہ کردینے والے جذبات کے باعث بے خوابی 'جسم میں تھر تھراہٹ دوڑ جانے کے ساتھ بے چینی۔

آرنیکا مونٹ: (Arnica Mont): بے تحاشہ جسمانی و ذہنی تھکاوٹ کے باعث بے خوابی۔
اکونائٹ این: (Aconite N): جوش 'پریشانی' بے چینی 'ناراضی اور خوف کے باعث بے خوابی 'بچے بے قراری سے ادھر ادھر جھٹکے کھائے۔

آرسنک ایلیم: (Arsenic Alb): ہوائی حملے وغیرہ کے خوف کے باعث بے خوابی۔

اوپیم: (Opium): جب کافی (دوا) تکام ہو جائے تو یہ دوا بے خوابی کے لئے مفید ہے۔

سلفر: (Sulphur): بہت ہی مختصر نیند 'مریض دن بھر سوائے اور رات بھر جاگے۔

کلیمٹس: (Clematis): صبح کے وقت اس بات کا احساس کہ وہ کافی نیند نہیں لے سکا۔

پسی فلورا انک: (Passiflora Inc): بے خوابی کے لئے یہ ایک بہت مفید دوا ہے۔ لیکن اس کی مدد پتھر کی بڑی خوراکیں دی جانی چاہئیں۔ 10 سے 30 قطرے فی خوراک۔

امبرا گرےسیا: (Ambra Grisea): کاروباری الجھنوں کے باعث پریشانی کے لاحق ہونے سے بے خوابی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ مریض اچھی خاصی تھکاوٹ کے ساتھ بستر پہ جاتا ہے لیکن

جیسے ہی سر تکیے کو پھوٹتا ہے مریض مکمل طور پر بیدار ہو جاتا ہے۔

ٹباکوم: (Tabacum): اعصابی کشمکش کے باعث بے خوابی۔

بلیس پی: (Ballis P): صبح بہت جلد آنکھ کھل جائے اور پھر دوبارہ سو نہ سکے۔ مدد کچھ استعمال کریں۔

کوکولس انڈیکا: (Cocculus indica): راتوں کو تیار داری کرنے کے باعث بے خوابی۔ پیشہ ور نرسوں کا راتوں کو جاگ کر تیار داری کرنا اس مرض کی علامات میں شامل نہیں بلکہ یہ علامت ایسے تیار داروں کے لئے ہے جو فکر مندی اور پریشانی کے ساتھ اپنے رشتہ دار مریض کی تیار داری کرتے ہیں۔ جب دن کے کاروبار سے متعلق سوچ و فکر نیند اڑا دے۔

سکوتلریا لیٹ: (Scutellaria): ایسے اعصابی مریضوں میں جو بہت ذہین، عالی حوصلہ اور فعال (جست) ہوتے ہیں۔ یہ لوگ معاشرے یا کسی بڑے کاروباری ادارے کے سربراہ اور وہ افراد ہوتے ہیں۔ انہیں اچھی طرح نیند نہیں آتی اور یہ مسلسل معاشرتی یا کاروباری معاملات پر کڑھتے رہتے ہیں۔ اعصابی صفراوی سرور کے باعث بے خوابی۔ یہ دردِ دماغ کی جز میں ہوتا ہے۔

نکس وامیکا: (Nux Vom): شریبوں میں بے خوابی یا جب کافی یا چائے کے مضر اثرات مرتب ہو جائیں یا جب معدہ پر آگندہ ہو (معدہ میں گڑبڑ ہو)۔

بیلادونا: (Belladonna): سر میں خون کے انجماد (یا انجماع) کے باعث انتہا درجے کی بے سکون نیند۔ آنکھوں کو بند کر سکے کیونکہ آنکھیں بند کرنے پر مریض کو دہشت ناک تصوراتی چیزیں نظر آتی ہیں۔ بچے نیند سے جاگ جاتے ہیں اور دہشت زدہ ہوتے ہیں۔

ہائوسکیمس: (Hyoscyamus): اعصابی جوش کے باعث بے خوابی، دماغ پریشان کن خیالات و تصورات سے بھرا رہے بچوں میں بے خوابی، ایسے بچے خوف سے پھڑکتے، چیختے چلاتے اور کپکپاتے ہیں۔ ایسے افراد جو بہت جلد پر جوش ہو جائیں برا کھینچتے ہو جائیں، ایسے افراد چڑھے ہوتے ہیں۔

کیموملا: (Chamomilla): درد کے باعث بے خوابی۔

جلسیم: (Gelsemium): دماغی کام کرنے والوں میں بے خوابی کے لئے، ایسے کاروباری اشخاص کے لئے مفید ہے جو بے چینی سے راتیں گزارتے ہیں، بہت صبح سویرے جاگ جاتے ہیں اور اپنے کاروباری معاملات سے متعلق پریشان و فکر مند رہتے ہیں۔

کینابیس انڈیکا: (Cannabis Ind): بے خوابی کی ضدی قسم کی صورت، بے قاعدہ نیند کے ساتھ، مدد کچھ کے 10 قطرہوں کی خوراک دی جائے۔

چرانہ — (Stealing)

کلیریا کارب: (Calcarea Carb): چوری کرنے اور جھوٹ بولنے کا رجحان، یہ دوا پیسے چرانے کی عادت کو رفع کرتی ہے۔ مریض بعض اشخاص کو بغیر کسی وجہ کے ناپسند کرے۔
آرٹنی میزیا ول: (Artemisia Vul): مرگی میں چوری کرنے کی عادت۔
سٹرامونیم: (Stramonium): جنون میں چرانے کی عادت۔
سٹیفیسیا: (Staphisagria): چرانے کا عمومی رجحان۔
سلفر: (Sulphur): تمباکو استعمال کرنے والوں یا جواریوں میں چوری کرنے کی عادت۔
اوپیم: (Opium): چوری کرنے اور جھوٹ بولنے کی عادت۔

پاخانہ — (Stool)

ورٹرم ایلبم: (Veratrum Alb): مریض کے اندر اپنا ہی پاخانہ کھانے یا پیشاب پینے کی طلب ہوتی ہے۔

خودکشی کا رجحان

(Suicidal Tendency)

(تیز دیکھئے "تحریکات")

ایناکارڈیم: (Anacardium): بندوق وغیرہ کی گولی کے ذریعے خودکشی کا رجحان اور کسی ذریعے نہیں خودکشی کا ارتکاب کرنا چاہے لیکن بزدلی کے باعث ایسا نہ کر سکے۔ ایک ایم ڈائی لیوٹن دیتے۔

رشاکس: (Rhus Tox): خود کو کھڑکی میں سے گرا دینا چاہے لیکن مرنے سے خوف زدہ ہو۔ جب اگر پانی کے نزدیک ہو تو خود کو پانی میں ڈبو دینا چاہے۔ باورچی خانہ میں داخل ہو تو آگ سے بھرے چولہے میں کھنکھنے کی کوشش کرے تاکہ جل کر مر جائے۔ مریض مسلسل حرکت میں رہے اور آہ و فغاں کرتا رہے۔

کلیریا کارب: (Calcarea Carb): چہرہ گھونپ کر خودکشی کرنے کی خواہش۔
کپسیکیم: (Capsicum): خودکشی کے ارتکاب سے متعلق مسلسل سوچیں لیکن مریض خود کو قتل کرنا نہ چاہے اس لئے ان سوچوں کے آگے بند باندھتا رہے۔ مریض کے اندر خودکشی کی خواہش نہیں ہوتی، اگر خودکشی کی خواہش ہو تو دوسری دوائیں منتخب کریں۔ (کپسیکیم یہاں کام

نہیں دے گی۔)

الیومینا: (Alumina): کم حوصلہ مریض اسے یہ بھی شک ہوتا ہے کہ یہ وہ خود ہی ہے یا کوئی اور برے خیالات اس کے ذہن میں آتے رہتے ہیں اور وہ اپنا گلا کٹ کر اپنی ناقابل برداشت زندگی کا قصہ تمام کر دینا چاہتا ہے۔ چاقو یا خون کو دیکھ کر خود کشی کا رجحان پیدا ہو۔

اگنس کاسٹس: (Agnus Castus): مریضہ میں اپنے خاوند بچے اور جنسی عمل سے بے زاری کے ساتھ خود کشی کا رجحان۔

اورم میٹ: (Aurum Met): جنون اور خود کشی کے خیالات کے لئے یہ ایک تیرمرف دوا ہے۔ مریض خود کو گولی مار دینا یا خود کو اونچی جگہ سے گرا دینا چاہتا ہے۔ وہ خود کشی کرنے کے لئے ڈوب جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی مصروف نہیں ہے۔ یہ سب اس لئے ہوتا ہے کہ وہ خاموشی سے کڑھتا رہتا ہے اور کسی شخص کو اپنی پریشانیوں کی ہوا نہیں نکلنے دیتا۔

انٹیم کروڈ: (Antum Crud): جذباتی اور حساسیت کا حامل جنون پوری نہ ہو سکتے دلی خواہشات مریض کو غم اور کڑھن میں مبتلا کر دیتی ہیں اور وہ اپنی نامرادیوں و بے چارگیوں کا خاتمہ کرنے کے لئے خود کو گولی مار دینا یا پانی میں ڈبو دینا چاہتا ہے۔

نٹرم سلف: (Natrium Sulph): خود کشی کے جنون کے لئے ایک اور عظیم دوا ہے۔ مریض کو مستقل طور پر اپنے آپ کو خود کو جسمانی طور پر نقصان پہنچانے سے روکنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ موسیقی سے خوف زدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ اسے مانگو لیا میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ خود کشی کا رجحان عموماً سر میں چوٹ لگ جانے کے باعث ہوتا ہے۔ خود کو تباہ و برباد کر دینے کی تحریک حالانکہ وہ ایسا کرنے سے ڈرتا ہے۔ کیونکہ وہ مرنا نہیں چاہتا رفاقت سے بے زار خود بولنا یا بلایا جانا پسند نہیں کرتا۔

اسٹیلگو: (Ustilago): پانی میں ڈوب کر خود کشی کرنے کا رجحان۔

اگنیٹیا: (Ignatia): کاروباری اتھری کے بعد مریض ماچس کا قاسمورس کھا کر اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔

زینک میٹ: (Zincum Met): دباؤ اور مانگو لیا کے باعث خود کشی کے خیالات پیدا ہوں اتنا بڑول ہو کہ خود کشی نہ کر سکے کسی اور کو اذیت دینے کی خواہش ایک ایم ڈائی لیوشن دیجئے۔
کینابیس سیٹیوا: (Cannabis Sat): سنسناتی ہوئی سرگوشیاں سننے خود کو قتل کر دینے سے متعلق اسے اعلیٰ ترین حاکم کا حکم خیال کرے۔

ارجینٹم نائٹ: (Argentum Nit): جب بلندی پر ہو تو عجیب و غریب خیالات آئیں۔ جب

کوئی پل عبور کر رہا ہو تو خیال کرے کہ وہ پانی میں چھلانگ لگا کر خود کو قتل کر سکتا ہے۔ یا جب کسی بلند عمارت پر موجود ہو تو کھڑکی سے باہر کا نظارہ کرتے ہوئے سوچے کہ کتنا برا ہو گا اگر اس نے باہر چھلانگ لگا دی۔ بعض اوقات یہ تحریکات حقیقت میں اسے باہر چھلانگ لگانے پر آمادہ کر لیتی ہیں۔

جلیسی میم: (Gelsemium): خود کو کسی بلند مقام سے کھڑکی میں سے گرا کر خود کشی کا ارٹھاب کرنا چاہے۔

ہیلی بوریس نائنگ: (Helleborus Nig): بعض لوگوں کے چوری وغیرہ کی قصت لگا دینے کے نتیجے میں خود کشی کرنے کا رجحان۔ وہ اس قصت یا الزام کو دل پر لگا لیتا ہے اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے۔

آئیوڈیم: (Iodine): مریض خود کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دینا چاہتا ہے لیکن وہ اس رجحان کے مقابلے میں مزاحمت کرتا ہے۔

لیک ویک ڈیفیل: (Lac Vacc Delli): یادداشت کا کھو جانا، سستی اور ذہنی کام سے بے زاری، اداسی، مریض مرنے کا خواہش مند ہو اور اپنی چاہی کے لئے آسان ترین طریقوں کے متعلق غور و فکر کرے۔

میڈورینم: (Medorrhinum): خود کشی کا رجحان، اٹھے اپنا ہسپتال اٹھائے لیکن اس کی اندرونی ارادے کی طاقت اسے خود کشی سے روک لیتی ہے۔

توہمات (Superstitions)

(دیکھئے ”مغالطے یا وسوسے“)

بدگمانی (شک و شبہ)

(Suspicion)

لیکیسی: (Lachesis): مریض یا مریضہ خیال کرے کہ لوگ اسی کے متعلق سمجھ کر رہے ہیں۔ اس بدگمانی میں جتنا ہو کہ لوگ اسے پاگل خانے بھیج دینا چاہتے ہیں یا زہر دے رہے ہیں۔ کسی مافوق الفطرت ہستی کے قابو میں خود کو محسوس کرے اور محسوس کرے کہ وہ مافوق الفطرت ہستی اسے چوری یا قتل کا حکم دے رہی ہے جسے ہر حال میں پورا کرنا ہو گا، حسد یا جلایا بھی اس دوا کی ایک علامت ہے۔

ہائیوسامیس: (Hyoscyamus): زہر دینے جانے کا شک، مریض محسوس کرے کہ اس کا

تھاقب کیا جا رہا ہے اور تمام لوگ اس کے خلاف ہو چکے ہیں۔ محسوس کرے کہ گھر کے وہ افراد جن کے متعلق اسے غلط فہمی ہو چکی ہے، اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ روزانہ کپڑے تبدیل کرے تاکہ لوگ اسے پہچان نہ پائیں۔ گھر سے نکلنا نہ چاہے یہ بدگمانی کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ظلم نہیں ہے۔

ہمدردی (Sympathy)

کاسٹیکم: (Cousticum): دو سروں کی تکالیف پر اعتماد ہے کی ہمدردی محسوس ہو۔
نوفر: (Nuphur): جب کاسٹیکم ناکام ہو جائے تو اسے استعمال کریں۔

باتونی پن

(Talkativeness)

اگیریکس ایم: (Agaricus M): گائے اور باتیں کرے لیکن جواب نہ دے۔ بے تعلقی اور بے خوفی، گائے، چیخنے چلانے، بڑبڑانے، شعر کہنے یا منگنا نے اور پیشین گوئیاں کرنے کی امتیازی خصوصیات والا ہڈیان۔

اکٹیا آر: (Actea R): مسلسل اور لگاتار باتیں کرے۔ ایک موضوع سے دوسرے موضوع کو تبدیل کرے جیسا کہ ہڈیان کے دوروں میں ہوتا ہے۔

سٹیکٹا پی: (Sticta P): کسی نہ کسی چیز کے متعلق بولتے رہنے کی شدید خواہش، مریض بردار نہیں کرتی کہ کوئی اس کی بات سن بھی رہا ہے یا نہیں۔ وہ اپنی زبان کو ساکت نہیں رکھ سکتی (یعنی خاموش نہیں رہ سکتی)۔

ہائوسامس: (Hyoscyamus): انتہائی غلی مزاج اور باتونی، بے حیائی اور شہوت پرستی کا جنون، جسم نکا کرے۔ ہر چیز پر ہنسنے کی طرف مائل، آہستہ آہستہ بڑبڑائے، سوتے میں باتیں کرے اور چٹخیں مارے، خود سے باتیں کرے، وہی، ایک ہی فعل کو بار بار دہرائے۔

کیٹاٹس انڈیکا: (Cannabis Ind): بے رہا گفتگو کرے۔ بے تحاشہ بولنے کے ساتھ غایت درجہ کا انبساط کے ساتھ، بے تحاشا ہنسا، ہر مرتبہ چند لمحات کے بعد خود کو بھلا دے، مریض جانتا ہے کہ وہ بے وقوفانہ باتیں کر رہا ہے لیکن وہ ایسا کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ چیخنے چلائے اور فی البدیہہ اشعار کہے۔ نہیں جانتا کہ وہ کس مقصد کے لئے زندہ ہے۔ بدلتے ہوئے خیالات کے ساتھ اعتماد ہے کی باتونی پن۔

لکس: (Lachesis): باتونی پن کے لئے ہونی کی دوا ہے۔ وحشیانہ جوش، اداس، دنیا کے

ساتھ تھکنے ملنے کی خواہش نہ ہو۔ بے چین و بے آرام ہر وقت کسی الگ تھلک جگہ رہنا چاہے۔ بہت تیزی سے باتیں کرے، جیسے ہی کوئی شخص بولنا شروع کرے، یہ اس کے منہ سے بات چھین لے اور جلدی جلدی کہانی سنا کر ختم بھی کر دے حالانکہ اس سے پہلے وہ بات (کہانی) کبھی بھی نہیں سنی ہوتی۔ منتخب الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو سجائے لیکن بات کرتے کرتے ایک موضوع سے دوسرے انتہائی مختلف موضوع میں کود پڑے۔ تسلسل کا فقدان، بعض اوقات آدھے آدھے جملے بولے اور خیال کرے کہ آپ اس کا پورا مطلب سمجھتے ہیں۔

کروٹیلس: (Crotalus): باتونی پن اس طرح سے کہ الفاظ بڑبڑائے، بے ترتیب الفاظ ادا کرے اور بولنے میں بار بار ٹھوکر کھائے۔ ست حالت جیسا کہ نقشے میں ہو، ٹیکسیس کے مریض صاف بولتے ہیں، بڑبڑائے یا بے ترتیب الفاظ ادا نہیں کرتے۔

سٹرامونیم: (Stramonium): نہ تھمنے والا باتونی پن، ہنستا، گھٹا، قسمیں کھاتا، دعائیں کرتا، اشعار پڑھتا، خوشی تیزی کے ساتھ غم میں بدل جائے، وسوس یا مغالطے اس مرض کی پہچان ہیں، خود کو لہبا محسوس کرے یوں محسوس ہو کہ وہ ایک نہیں دو ہے۔ اپنا ایک حصہ گرم شدہ محسوس کرے، تھمائی اور اندھیرا برداشت نہ کر سکے، خود کو لہبا محسوس کرے، یوں محسوس ہو کہ وہ ایک نہیں دو ہے۔ اپنا ایک حصہ گرم شدہ محسوس کرے، تھمائی اور اندھیرا برداشت نہ کر سکے، روشنی اور قراقت لازم ہو۔

چوری کرنا — (Thieving)

(دیکھئے ”چرائی“ Stealing)

سوچنا — (Thinking)

(نیز دیکھئے ”غیر حاضر دماغی“ اور ”بھول جانا“)

ایٹھوزا: (Aethusa): سوچنے اور توجہ مرکوز کرنے کی ناقابلیت، ایسے طلبہ کے لئے اعلیٰ دوا ہے جن کا ذہن پڑھائی کی طرف نہ ہو۔

کاجوپٹام: (Cajuputam): ایک منٹ میں ہزاروں چیزوں کو سوچا کرے۔

کینابیس انڈیکا: (Cannabis Ind): آنکھیں بند کر کے سوچ میں ڈوبا رہے۔

کافیا: (Coffea): خیالات سے پر، جاگ کر لیٹے ہوئے ہزاروں چیزوں کو سوچا کرے، گھنٹہ گھر کے گھر وال کی آواز دور سے سن لے، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنے، یادداشت بہت فعال ہو، خیالات سے بھرا رہے، سوچنے اور بحث مباحثہ کرنے کی بڑھتی ہوئی قوت۔

اونوسموڈیم: (Onosmodium): اور نگار توجہ اور ذہنی ارتہاط کی کمی۔
 ار جہنم نائٹرکیم: (Argentum Nit): جب سوچ بچار کے باعث اسماں لاحق ہو جائیں،
 بھارت میں ضعف۔
 اوسیم: (Osmium): دوسروں کو درپیش ہونے والے حادثات کے متعلق سوچا کرے، یہ
 سوچیں آخر کار اس احساس پر منتج ہوں کہ اسے بھی وہی چو نہیں آئی ہیں جو دوسروں کو آئی ہیں۔
 بپتسیا: (Baptisia): نالی قانیہ بخار میں سوچنے کی ناقابلیت۔
 ایسڈ فاس: (Acid Phos): جملہ کے بعد سوچنے کی ناقابلیت۔
 تیربینٹینا: (Terebinthina): اعصابی درد سر میں سوچنے کی ناقابلیت۔
 الومینا: (Alumina): قبض کے ساتھ درد سر میں سوچنے کی ناقابلیت۔
 ار جہنم میٹ: (Argentum Met): سوچنے کی ناقابلیت، یادداشت اور آدمی کی ذہنی
 صلاحیت میں خلل واقع ہو جائے، سر میں اور کمر میں درد۔
 نائٹرک ایسڈ: (Nitric Acid): ماضی کی تکالیف پر سوچ بچار۔
 برائی اونیا: (Bryonia): یہ سوچ کہ وہ گھر سے دور ہے اور گھر پہنچنا چاہے۔
 کروٹن ٹیگ: (Croton Tig): خود سے باہر نکل کر نہ سوچ سکے۔
 سٹرامونیم: (Stramonium): وحشیانہ خیالات۔

رونا — (Weeping)

پلساتیللا: (Pulsatilla): خوشی کے ہوں یا غم کے واقعات پر روئے، جب اپنے مرض کی
 علامات بتائے تو روئے، تردید یا اختلاف رائے پر روئے۔
 موسکس: (Moschus): جتنے اور روئے کا تالول۔
 نیٹرم میور: (Natrium Mur): رونے کا واضح رجحان، ہمدردی سے بہتری ہو۔
 کافیا: (Coffea): اچانک خوش خبری سننے پر رونا، درد سے، قلبی محسوسات اور نظر انداز کئے
 جانے پر روئے۔
 کیمفر: (Camphor): خشک آنکھوں کے ساتھ رونے کی خواہش۔
 سٹرامونیم: (Stramonium): بلند آواز کے ساتھ رونا، ذہنی کمزوری کے ساتھ رنج پہنچانے
 اور رنجیدہ ہونے کا رجحان۔
 کالی فاس: (Kali Phos): غم آئی جنون میں رونا۔
 پلائینا: (Platina): خاموشی (سکوت) میں رونا۔

سپیا: (Sepia): جب اس کے مرض کی علامات پوچھی جائیں تو روئے۔
 اٹیم سیٹو: (Allium Sat): نیند کے دوران روئے۔
 میڈورنیم: (Medorrhinum): روئے بغیر بات نہ کر سکے۔
 کاربو انیلس: (Carbo Ani): مریض جب کھاتی ہے اس وقت روتی ہے۔
 لائیوپوڈیم: (Lycopodium): جب کسی دوست یا سہیلی کا استقبال کرے اس وقت رو
 دے یا کسی شناسا سے ملاقات کرنے پر روئے جب شکریہ ادا کرے تو رو دے۔

قوت ارادی — (Will)

ایناکارڈیم: (Anacardium): جیسا کہ دوہرے ارادے کا حامل ہو، ایک مثبت ارادہ اور
 ایک منفی ارادہ، ایک ارادہ قتل کے ارتکاب کا ہو اور دوسرا اس کے برخلاف کرنے کا۔

طریف (پر مزاح) — (Witty)

سٹرامونیم: (Stramonium): جب کوئی شخص طریف تو ہو لیکن بد اخلاق بھی ہو۔

مخروج عزت نفس

(Wounded Pride)

(دیکھئے "غور")

قلم کاروں (ادیبوں وغیرہ) میں اینٹھن


(Writers Cramps)

مگنیشیا فاس: (Magnesia Phos): کھساریوں میں اینٹھن کے لئے یہ بہت اعلیٰ دوا ہے جب
 کہ ہاتھوں اور اور انگلیوں کے طویل استعمال کے باعث اینٹھن ہو اور جب اس اینٹھن میں
 حرارت سے اتفاق ہو، ایک ایم ذاتی لیوشن کی خوراک دیجئے۔

جلی میم: (Gelsimium): اینٹھن، ہاتھوں کی کپکپاہٹ کے لئے یہ ایک چوٹی کی دوا ہے،
 عضلات پر قابو پانے کی قوت کا فقدان، بازو کے اگلے حصہ میں پنوں کی اینٹھن۔

رہس ٹاکس: (Rhus Tox): انگلیاں سخت ہوں۔ پنوں کی نسبت نسوں میں زیادہ درد ہو،
 آرام سے بہتری ہو (سوائے انگلیوں کی سختی کے) نیز خشک سینکے سے بھی بہتری ہو جیسے بجلی کے

پڈ (Pad) سے۔
 اکونائٹ این: (Aconite N): بازو اور ہاتھ کی فائی کمزوری خصوصاً جب لکھ رہا ہو۔ انگلیوں میں لکھتے وقت جھنجھٹا ہٹ ہو۔
 کیوپرم میٹ: (Cuprum Met): کھنچاوت اور پھڑکن ہو پنوں میں 'ہاتھوں کا سرد ہو جانا' ہتھیلیوں میں اینٹھن ہو اور بازوؤں میں شدید تھکاوٹ ہو۔
 سٹرامونیم: (Stramonium): انگلیوں کی کمزوری ہلکی اینٹھن کے ساتھ۔
 اکتیا آر: (Actea R): لکھتے وقت انگلیوں میں کپکپاہٹ۔
 زینک فاس: (Zincum Phos): یہ دوا اس وقت آزما کی جائے جب تمام دوائیں ناکام ثابت ہو چکی ہوں۔ پیریسس (Peresis) (فالج کی ایک قسم جس میں اعصابی حرکت زائل ہو جاتی ہے مگر حس باقی رہتی ہے) میں مبتلا ہو جانے والے مریضوں میں انگلیوں کی اینٹھن 'دماغی انحطاط یا اجتری کے شروع ہو جانے کے ہمراہ۔
 میوری اشک الیڈ: (Muratic Acid): اینٹھن کی طرح کا تشنجی درد 'دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے گولے (Ball) میں لکھنے کے دوران درد ہو 'انگوٹھے کو حرکت دینے سے یہ درد رفع ہو جاتا ہے۔
 سلفیورک الیڈ: (Sulphuric Acid): انہوں کی مخصوص اینٹھن 'زخموں کے بعد متکثرین ہو جانے کا رجحان 'سپے (رائگا) کا زہر چھ جائے۔
 فیریم آیوڈائیٹم: (Ferrum Iodatum): کھساروں کی مخصوص اینٹھن کے لئے اعلیٰ دوا ہے۔



اعصابی نظام کے امراض (Diseases of Nervous System)

صرع (مرگی)

(Apoplexy)

اکونائٹ این: (Aconite N): شدید ذہنی و جسمانی اضطراب کے ساتھ تیز (بھرپور) نبض، بے چینی، لرزہ یا اچانک خوف کے باعث، چہرہ سرخ ہو، 'ix' ڈائی لوشن کی خود اک ہر چند رو منٹ کے بعد حملے کے دوران دی جائے۔

بیلادونا: (Belladonna): سر میں خون کی اثر دہام کے ساتھ چہرے پر بے اندازہ سرخی کا آ جانا۔ نبض بہت بھرپور اور تند و تیز ہو۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیل جائیں، چھٹی (6TH) ڈائی لوشن دیکھنے اور ہر چند رو منٹ کے بعد دھراتے جائیں یہاں تک کہ حملہ ختم ہو جائے۔

اوپیم: (Opium): دماغی مرگی، جڑے لگے ہوئے، آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئیں، گرم پسینے آئیں، ایک جانب کا قلع، سیاہی مائل، سرخ چہرے کے ساتھ سکتے ہو اور خراٹے دار، تنفس ہو، جب کہ اچانک بے تحاشہ مسرت حاصل ہو جانے کے باعث مرگی ہو، ست اور صلی ہوئی نبض ہو۔ ایسی حالت میں یہ چوٹی کی دوا بن جاتی ہے اور ایک ایم (TM) ڈائی لوشن ہر پچھتے دیا جانا

چاہئے۔
گلوٹائٹم: (Glonoinum): شدید گرمی، جلد چمکیلی ہو جائے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوں، سانس خراٹے دار، سکتے ہو، یہ تمام رہنما کن علامات ہیں۔

نکس و امیکا: (Nux Vomica): یہ اوپیم کی امدادی دوا ہے جو علاج کی تکمیل کرتی ہے۔ لیکن انفرادی طور پر صفراوی مزاج، کثیر الدم (جو شیلے مزاج والے) یا اعصابی اور چڑچڑے مزاج والے مریضوں کے لئے مفید ہے، یہ دوا عادی شرابیوں کے لئے بھی مفید ہے۔

اگنیشیا: (Ignatia): جب بہت زیادہ مغموم رہنے کے باعث مرگی لاحق ہو یا جب اشتعال انگیزی کے باعث جذبات دب جائیں اور مریض اعصابی مزاج اختیار کر لے۔

لکے سس (Lachesis): مسلسل دماغی استفراق، غنودگی، خون کے اژدہام کے ساتھ دماغ کے اندر گہرائی میں دردیں خصوصاً بائیں جانب، جوڑوں میں سختی، چہرہ زرد اور پھولا ہوا۔

پلساٹیل: (Pulsatilla): خواب، آنودگی (ادنگہ)، اس گرم ہو جانا، داغ دار، ٹیلاہٹ مائل سرخ، زرد اور پھولا ہوا چہرہ، پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد جسے جلدی جلدی اگلا گیا ہو حملے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ دل کی دھڑکن تقریباً مکمل طور پر دبی ہوئی نبض کے ساتھ۔

فیرم فاس: (Ferrum Phos): خون کی قلت والے اور پیلے پڑے ہوئے افراد میں مرگی، نبض تند و تیز، آہستہ اور تار کی طرح سے ہو۔

ہیلونیاس: (Halonias): دل کی شدید دھڑکن جو سینہ اور پیٹ کو ہلا کر رکھ دے، بے ہوشی اور پنوں کی پھڑکن۔

جلی میم: (Gelsamium): مریض اونگتا رہے، حرکت سست ہو، زبان مفلوج، نبض آہستہ، بھرپور لیکن نرم نبض، آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئی۔

سٹرائی کنیا فاس: (Strychnia Phos 3x): عضلات کے ریشوں میں چربی کا انحطاط (اتھری) جب یوں محسوس ہو کہ دل سے ذرہ آیا ہے اور دل چکناکی کی اتھری کا شکار ہو۔

آرنیکا مونٹ: (Arnica Mont): چوٹ کے باعث مرگی، سرگرم اور جسم ٹھنڈا ہو، یہ دوا اس وقت دینی چاہئے جب حساسیت کو شفا ہو چکی ہو، سارے جسم میں جلن اور درد ہو۔

فارمیکا: (Formica): اگر مرگی دماغی کمزوری کے باعث ہو، یہ دوا دماغ کو تقویت دیتی ہے اور بیماری کے اعادہ کو روکتی ہے۔

لاروسی راسس: (Laurocerasus): بغیر کسی پیشگی علامت کے اچانک مرگی کا دورہ ہوتا ہے۔ ساتھ میں دل کی دھڑکن بھی ہوتی ہے، ٹھنڈی نم دار جلد اور چہرے کے پنوں میں اینٹھن۔

حرام مغز کی جھلیوں کا ورم

(Cecrebro Spinal Meningitis)

(دیہیے "مگردن توڑ بخار")

کوریا (Chorea)

(اعصابی مرض جس میں عضلات بے اختیارات پھڑکتے ہیں)

(Disease of the Nerves Attended with Involuntary Twitchings)

(نیز دیکھئے "ہسٹریا")

اگنیشیا: (Ignatia): خوف، دہشت، سزایا بری خبر کے باعث "کوریا" لاحق ہو۔ غم کے بعد یا جوش و جذباتیت کے بعد، بازوؤں میں بھیجنہاٹ، جوڑوں میں درد، خفگی اور جھڑا۔

کیوپرم میٹ: (Cuprum Met): تشنج میں مبتلا بچے کو رینگ کر میز کے نیچے گھستے دیکھنے کے بعد کوریا لاحق ہو، کوریا کی حرکات انگلیوں میں اور پاؤں کے انگوٹھوں سے شروع ہو اور پھر بازوؤں اور ٹانگوں میں پھیل جائیں، سونے کے دوران بہتری ہو، لیکن جوں ہی جاگے بدترین تشنج اور عجیب و غریب بے ہنگم قسم کی حرکات دوبارہ شروع ہو جائیں۔

سٹرامونیم: (Stramonium): کوریا جس کا آغاز رونے کے رجحان کے ساتھ ہو، یا پھر ہنسنے اور چلنے والی خوش مزاجی کے رجحان کے ساتھ، بازو گھمائے اور ہاتھوں سے سر کو پکڑے اور آنکڑا سا بنائے۔

نکس وامیکا: (Nux Vom): ریڑھ کی ہڈی کا کوریا، غیر متوازن چال اور پاؤں گھسیٹنے کے ساتھ۔ قبض لاحق ہو۔

کاسٹیکم: (Causticum): جب دائیں جانب، بائیں جانب کی نسبت زیادہ متاثر ہو۔ چہرے کے عضلات، زبان، بازو، ٹانگیں سب ہی متاثر ہو جائیں۔ بات کرتے وقت الفاظ جھکنوں کے ساتھ ادا ہوں، مریض مسلسل اپنی حالت کو تبدیل کرتا رہے یہاں تک کہ تھک کر سو جائے جو بچے چلنا سکھ رہے ہوں بہت جلد گر جائیں اور ان کی چال میں لڑکھڑاہٹ ہو۔

مالیگیل: (Mygale): کوریا کے واضح کیسوں کے لئے، ٹانگیں حرکت میں رہیں جبکہ مریض بیٹھا ہوا ہو یا کھینتی ہو ملیں جبکہ مریض چلنے کی کوشش کرے۔

اگریکس مس: (Agericus Mus): دماغی کوریا، آنکھ کے ذہیلوں اور پلوں میں اینٹھن اور پھڑکن کے ساتھ، ہاتھوں اور پاؤں میں وتری تشنجی حرکات ہوں یعنی ایک طرف کا اوپر والا حصہ اور دوسری جانب کو نیچے والا حصہ متاثر ہو۔

ٹیرنٹولا ہسپانیولا: (Tarentula His): کوریائی حرکات جو دائیں بازو اور دائیں ٹانگ میں ہو اور مسلسل جاری رہیں یہاں تک کہ رات کو بھی یہ خوف اور غم کے باعث ہو، بے چینی ہو ریڑھ کی حساسیت اور کیکاپاہٹ کے ساتھ، مریض چلنے کی نسبت دوڑنے میں بہتر ہو، دماغی انتشار

ہو جو خاص طور سے موسیقی سے بہتر ہو۔

زنگم میٹ: (Zincum Met): مسلسل حرکت 'پاؤں میں' جو رات کے دوران بھی جاری رہے۔ خصوصاً جب اس کا باعث پھٹیوں کا دب جانا یا خوف ہو۔

اکٹیارسی موسا: (Actea Racemosa): ریڑھ کی سوزش کے لئے جس کے ساتھ وجع المفاصل (گٹھیا) بھی لاحق ہو خصوصاً عورتوں میں سن بلوغ اور حیض کی بندش کے وقت 'جنونی' اور باتونی ہو جائیں' مسلسل ایک موضوع سے دوسرے موضوع کو بدلتی رہیں۔ پنھوں میں جھٹکن ہو جب کہ جوش کی حالت میں ہوں یا جاڑا (لرزہ) ہو رہا ہو۔ جس کردت لینا ہو اس جانب جھٹکے لگیں یا جسم کا جو حصہ دبا ہوا ہو اس میں جھٹکن ہو 'پنھوں کا سن ہو جانا یا جھٹکے کھانے'۔

تھیس پیچ: (Thasplum): 'کوریہ' 'ہشیریا' 'مرگی' 'خود کشی کا رجحان ہو' 'طبیعت میں دباؤ ہو' 'پسنے اور رونے بدلتا ہوا موڈ۔

فیرم آرس: (Ferrum Ars): قلت دم (خون کے ضائع ہو جانے کے باعث) کے باعث کوریہ لاحق ہو۔

رہوڈوڈینڈرون: (Rhododendron): 'بائیں ٹانگ' 'بازو اور چہرے کا کوریہ' 'طوفان کی آمد پر ابتری ہو۔

اویٹا سیٹ: (Avena Sat): اعصابی رعشہ عمر رسیدہ لوگوں میں بازو اور ٹانگیں سن ہو جائیں جیسا کہ قارچ ہو۔

وسکم البم: (Viscum Alb): چکر آنے کے ساتھ کوریہ میں یہ دوا بہت عمدہ ہے۔
ہائوسکیمس: (Hyoscyamus): بازو اور ٹانگیں ٹھنڈی ہوں 'کپکپائیں اور سن ہوں' 'تھپی حرکت ہوں اور لرزہ ہو' آنکھیں بست نمایاں ہوں 'مریض چیخنے چلائے اور دانت پیسے کھانے یا پینے کے بعد علامات ظاہر ہوں۔

لاروسیرا سس: (Laurocerasus): مستقل جھٹکے لگیں 'پھڑکن میں سکون نہ ہو سکے' 'عجیب علامات یہ ہیں: مریض ہانپے' ماتھا ٹھنڈا ہو' سر کی چوٹی پر وزن محسوس ہو' مریض انتہا درجے کا اعصابی ہو۔

آرسینیکم البم: (Arsenicum Alb): ٹانگوں اور بازوؤں میں کپکپاہٹ خصوصاً بازوؤں میں 'عادی شریبوں میں بازوؤں اور ٹانگوں کی کپکپاہٹ' بے حسی کا احساس بازوؤں اور ٹانگوں میں جیسا کہ مردہ ہو' دبا ہوا۔

کوما (بے ہوشی) — (Coma)

- برٹیا کارب: (Baryta): مرگی میں کوما ہو۔
- آنتیم تارتارکیم: (Antim Tartaricum): دم گھٹنے کے ساتھ کوما، حلق اور پیچھڑوں کے نزلہ کے دوران، مریض کمانسی سے بیدار ہو جائے۔
- اوپیم: (Opium): خراہٹ والے شخص کے ساتھ کوما ہو، بے اختیارانہ پیشاب، پانچا، خطا ہو جائے، پیشاب میں خون یا پیپ کی سمیت، نبض بھرپور اور سست۔
- ایسڈ ہائیڈروسیانکیم: (Acid Hydrocyanicum): کوما ہو، دماغ میں اثر دہام خون کے ساتھ، جس میں اچانک تشنجی حرکات کے باعث خلل پیدا ہو جائے۔ مرگی کے دوروں میں گرفتار ہونے کے بعد۔
- زئکم مٹلیکم: (Zincum Metallicum): دماغی تھکاوٹ کے باعث کوما ہو، خارش کے دب جانے کے باعث۔
- جلسی میم: (Gelsimium): حرام مغز کی مصلیوں کے ورم (گردن توڑ بخار) میں۔
- لیکسیس: (Lachesis): دوران مشقت کوما ہو جائے۔
- گلوٹائن: (Glonoine): دھوپ کے باعث۔
- ہیلی بوریس: (Helleborus): دماغی چوٹ کے باعث۔
- ہینیشیائی فاس فورس، آرنیکا: (Baptisia T. Phosphorus, Arnica): ٹائی فائیڈ بخار میں۔
- کروٹالس ایچ: (Crotalus H): فساد خون والے بخار میں کوما لاحق ہو، مرگی میں کوما ہو۔
- بیوفو: (Bufo): مرگی میں گرفتار ہونے کے بعد ایسے افراد میں کوما کا لاحق ہو جانا جنہوں نے جلق وغیرہ کے ذریعے جنسی غلہ کاریوں کا ارتکاب کیا ہو۔
- ٹیریہ: (Terebinth): کوما کی وہ قسم جس میں صرف ہلانے سے مریض کوما سے باہر آ سکے لیکن فوراً ہی دوبارہ کوما میں چلا جائے۔ چال میں لڑکھڑاہٹ، یوں محسوس ہو کہ مریض نشہ میں ہے، ہاتھوں اور پاؤں کی بے حساسیت۔
- ایلمینیم مٹلیکم: (Aluminium Metallicum): ذیابیطس میں کوما کا لاحق ہو، 200 ڈاکی لیوٹن کی خوراک دیجئے۔
- سلفر: (Sulphur): مرگی کے بعد یا مرگی کے دوران۔
- پلائینا: (Platina): زچگی کی اینٹھن (تشنج) میں۔

رینن کیولس بلبوسس: (Ranunculus Bulbosus) مرگی کے دورے میں 'جو شراب پینے سے لاحق ہو۔

اختناق الدم — (Congestion)

(دیکھئے "سوزش" جلد ")

اینٹنسن (تشنج)

(Convulsions)

بیلادونا: (Belladonna) اینٹنسن کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ سرگرم ہو جس کے ساتھ ٹیکن (پھڑکن) والا درد بھی ہو، آنکھیں گھورتی ہوئی ہوں (یعنی غلٹی بندھی ہوئی ہوں اور آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئی ہوں۔ نبض بھرپور اور اچھلتی ہوئی۔ دانت نکالنے کے دوران تشنج (اینٹنسن) بچہ یک دم اکڑ جاتا ہے۔ بچوں میں تشنج جو اچانک ظاہر ہوتا ہے۔ سرگرم ہو اور پاؤں ٹھنڈے 200 ڈائی لیوشن کی خوراک دیجئے اور ہر چار روز کے بعد دہراتے جائیے یہاں تک کہ صحت پالی ہو جائے۔

کوکیولس: (Cocculus) تشنج (اینٹنسن) بے خوابی کے بعد۔

جلسیمیم: (Gelsimium) بخار کے ساتھ اینٹنسن ہو، پہلے کندھوں میں درد ہو اور پھر کمر اور گردن میں اکڑن ہو، آنکھیں ایک جانب سے دوسری جانب گھومتی ہیں، مریض بے چین اور شدید گرم ہوتا ہے لیکن اس ساتھ ہی جلد پر نمی بھی ہوتی ہے۔

سنا: (Sina) بد ہضمی یا گرمی کے باعث ہونے والی بڑی آنت کی سوزش کی وجہ سے اینٹنسن کا ہونا، بچہ ناراض ہو اور اس کی بھوک گھٹتی بڑھتی رہے، بڑی آنت کی سوزش کے باعث جلد بھی غیر صحت مند ہو، چہرے کے عضلات میں پھڑکن۔

کلکیریا کارب: (Calcarea Carb) سوکھے (Rickets) کے مرض کے باعث جھٹکے (تشنج) لگیں یا دانت نکالنے کے دور میں یا نمونہ میں تشنج ہو۔

ہائیوسکیمس: (Hyoscyamus) چیخوں کے ساتھ اچانک زمین پر گر جائے اور جھٹکے کھانے لگے۔ بچوں میں تشنج خاص طور سے خوف کے باعث کھانے کے بعد اینٹنسن۔

ایٹھوزا: (Aethusa) خصوصاً بچوں میں تشنج زبردست کمزوری اور خوابیدگی والی لاغری کے ساتھ تشنج کے ساتھ غنودگی اٹیوں اور پانخانوں کے بعد، آنکھیں الٹ جائیں اور یا اطراف کی بجائے نیچے کی جانب، اوپری ہونٹ پر موتیوں جیسی سفیدی کے ساتھ چہرے پر جھٹکن ظاہر ہو

جائے جس کی حد بندی 'ٹاک کے بیرونی سوراخ سے منہ کے زاویوں تک پھیلی ہوئی ایک نمایاں لکیر سے ہوتی ہے۔

ہیلی بوریس: (Helleborus): پیچک کے مانند 'پھوڑے' پھنسیوں کے دب جانے کے باعث تشنج ہو 'متواتر چبانے والی حرکت ہو' ایک ہاتھ اور پاؤں میں خود بخود حرکت ہو 'سر پیچھے کی جانب کندھوں کی طرف مڑ جائے' سر نگلیہ میں گھستا چلا جائے' بے ہوشی ہو 'پیشاب کی بندش ہو۔

سیکیوٹا وائروسا: (Cicuta Virosa): شدید جھٹکے 'سر' بازوؤں اور ٹانگوں میں ہوں 'بازوؤں اور پاؤں میں بدترین تحریک کے ساتھ تشنج ہو' سر کندھوں کی جانب پیچھے کو مڑ جائے 'پٹھوں میں جھٹکے' چہرہ گہرا سرخ ہو 'ہونٹ نیلے اور خون آلود ہوں۔ منہ سے جھاک اڑے' تشنج اوپر سے نیچے کی جانب اور وسط سے گردا گرد پھیلے 'معمولی سے چھوٹے یا ہلکے سے ارتعاش سے بھی تشنج لاحق ہو جائے' ہوش میں آنے کے بعد اسے کچھ یاد نہ ہو کہ کیا واقع ہو چکا ہے۔

زئعم فاس 'اورم میور': (Zincum Phos. Aurum Mur): تاجروں 'طلب' عیاشوں یا مرگی کا شکار ہونے والوں اور مرگی کے غلط علاج کے لئے تحت مشق بننے والوں میں 'دماغ اور حرام مغز کے افعال میں ابتری واقع ہو جانے کے باعث تشنج ہو' علاج دی گئی ترتیب کے مطابق کیا جائے۔

کیوپرم میٹ: (Cuprum Met): نیلے چہرے اور بھینچے ہوئے انگوٹھوں کے ہمراہ تشنج ہو 'تشنج کے دوران تے ہو' زچگی والا تشنج 'بعضہ میں تشنج' حملہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ پہلے ہاتھوں اور پاؤں میں جھٹکے لگتے ہیں اس کے بعد آنکھوں کے ذیلیے گھومنے لگتے ہیں۔ جو آخر کار اوپر کی جانب پلٹ کر ساکت ہو جاتے ہیں۔ ایسا تشنج جو پیشاب کی بندش یا پھنسیوں کے دب جانے کے باعث لاحق ہو۔ تشنج جو بازوؤں اور ٹانگوں سے شروع ہو کر جسم کے وسط تک پھیل جائے 'ٹھنڈے مشروبات سے مرض کو افاقہ ہو جبکہ مشروبات علامات کے آغاز میں دیئے جائیں۔

سلفر: (Sulphur): جب اچھی منتخب دوائیں ناکام ثابت ہو جائیں۔ اس کی 200 ڈائی لیوشن کی خوراک معان دوا کی حیثیت سے دی جائے۔

نکس وامیکا: (Nux Vom): تشنج ہوش کے ساتھ ہو جس کی وجہ بد ہضمی ہو 'جیزوں کی چبانے والی حرکت' شراب کے بد اثرات کے بعد۔

کیموملا: (Chamomila): والدہ میں غصے کا دورہ ہونے کے بعد دودھ پلانے پر بچوں کو تشنج لاحق ہو۔ دانت نکالنے کے عرصہ کے دوران اگر بیلاڈونا قبل ہو جائے تو یہ دوا دیں۔

اوپیم: (Opium): والدہ کے اچانک خوف زدہ ہو جانے کے بعد دودھ پلانے پر بچوں میں تشنج

کا ہونا، بچہ دہشت کے ساتھ جاگ جاتا ہے، چٹخا ہے اور روتا چلاتا ہے یہاں تک کہ جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حرارت یا گرم کپڑوں وغیرہ سے اتھری ہو۔

گلوٹائین: (Glonoine): بچوں کا تشنج گرمی (حرارت) یا سر میں خون کے اژدہام کے باعث جو دانت نکالنے کے عرصہ کے دوران ہو۔ اگر پلازڈونا ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جائے، جھٹکوں کے دوران ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں پھیل جائیں اور اکڑ جائیں، تحس میں دقت ہو اور دل کی دھڑکن سنائی دے۔

وریرٹرم ویرائیڈ: (Veratrum Viride): گردوں اور مثانے کا فعل خراب ہو جانے کے باعث خون کی سمیت کا تشنج جس کے ساتھ نظر بھی کمزور ہو، تشنج کے دورے ہوں، آنکھوں کی پتلیاں پھیل جائیں، ٹھنڈا چھپچھپاہندہ آئے۔

گریٹیولہ: (Gratiola): بے ہوشی کے بغیر تشنجی حالت۔

آرنیکا ہائپرکیم: (Arnica, Hypericum): پتلیوں کے ذریعے پیدائش ہونے یا دیر تک سر جھکے رہنے پر فوری تشنج ہو۔ ہر دو گھنٹے میں 1000 پونٹسی کی خوراک دی جائے یہاں تک کہ صحت یابی ہو جائے، آرنیکا میں سرگرم ہوتا ہے جبکہ جسم کا باقی حصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔

سیکیل کور: (Secale Cor): عضلات کی پھڑکن اور اینٹھن جسم کے بہت سے حصوں میں ہو، جس کے ہمراہ انگلیاں سخت، اکڑی اور پھیل ہوئی ہوں، جسم میں اکڑن ہو جو بعض اوقات ڈھیلے پن سے بدل جاتی ہے۔

سٹرامونیم: (Stramonium): شدید تشنج جو جسم کے ہر حصے میں ہو۔ اکڑن ہو، شدید توڑ مروڑ ہو، بازوؤں اور ٹانگوں میں سکڑن ہو، زبان دانٹوں سے کٹے، تشنج کی وجہ دہشت یا ڈراؤنے خواب ہوں، ہوش قائم ہوتے ہوئے، تشنج تیز روشنی میں آنے سے دوبارہ عود کر آئے، پانی کا منظر، روشنی یا آئینہ یا ہر وہ چیز جو چمکی ہو تشنج کے دورے کا باعث بن جائے، خفائی اور اندھیرا برداشت نہ ہو سکے۔ پھینچوں کے دب جانے کے باعث تشنج لاحق ہو۔

سرسام (حالت غشی یا دیوانگی)

(Delirium)

بیلادونا: (Belladonna): شدید سرسام، سرخ خون آلود آنکھوں کے ساتھ، مریض کپڑے پھاڑتا ہے، دانت کالتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، ٹھوکرین مارتا ہے، درد ناک آواز میں دادیلا کرتا اور چٹخا چلاتا ہے، اور بعض قصص راتی اشخاص سے دور کہیں بھاگ جانا چاہتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں سرد ہوتے ہیں جبکہ سرگرم ہوتا ہے۔ حدت اور جلن تمام جسم میں ہوتی ہے، کہیں بھاگ جانا چاہے،

شدت کے باعث کمزری میں سے چھلانگ لگا دینا چاہیے 'ایٹشن کے ساتھ کانٹے کی رغبت ہو ' سر میں خون کے اثر وہاں میں ' بخار میں ' سرسام ہو ' بلاؤں یا عفرتوں کو دیکھے ' دانت نکالنے کے دوران ' چہرے میں تروڑ مروڑ ہونے کے ساتھ سرسام ہو ' دانت پیسنا مارنے کو ٹٹنے کی رغبت ' نگلنے میں دقت ہو ' ذہل یا رسولی وغیرہ کے غائب ہو جانے پر سرسام کا ہو جانا ' چوہوں اور چوہیوں وغیرہ کے خواب دیکھے یا قریب نظر ہو۔

ہائوس سائیکس: (Hyoscyamus): سفالانہ انداز کے ساتھ چوری کا الزام لگنے کے بعد سرسام کا لاحق ہو جانا۔ آنکھیں غم آلود ہوں اور چمک دار ہوں۔ عظیم جسمانی فعالیت کے ساتھ۔ حسد و جلن کے ساتھ گفتگو کرنے سے سرسام کا لاحق ہو جاتا۔ ہشیریا کے باعث سرسام ہو جائے ' تصوراتی غلطیوں کا دیوانہ پن ' خود کو بنگا کرنا چاہیے ' مرض کی شدت کے اعتبار سے ہائوس سائیکس ' ہلاؤڈنا اور سٹرامونیم کے بیچ کی دوا ہے۔ مریض قہقہہ اور گندے گانے گاتا ہے۔ یہ سرسام بے ہوشی کے دوروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مریض خود ہی سے باتیں کرتا رہتا ہے۔

سٹرامونیم: (Stramonium): ہڈیاں و سرسام کی تین اہم دواؤں میں سے یہ تیسری دوا ہے۔ پہلی دو ادویات ہلاؤڈنا اور ہائوس سائیکس ہیں۔ مریض کسی شخص کو غم خواری کے لئے بلائے۔ خوف سے بھرا ہو اور خیال کرے کہ پیسے کتنے اس پر حملہ کیا ہی چاہتے ہیں۔ شدید سرسام لیکن اتنا شدید نہیں جتنا ہلاؤڈنا یا ہائوس سائیکس میں ہوتا ہے۔ فوٹ شدہ بے تکلف دوستوں کی روحوں کے ساتھ باتیں کرے حالانکہ وہ موجود نہ ہوں۔ بھوتوں کو دیکھے اور ان کی آوازیں سنے ' جنسی جوش کے ساتھ مخبوط الحواس ' شرمیلا ایسا کہ خود کو چھپا لینا چاہیے ' متواتر ہنستا چلا جائے ' اعتقادہ انداز میں تالیاں پیٹے اور آنکھیں پھاڑے ' قریب نظر کے ساتھ شور و غوغا کرے۔ بے ربط ہیرا ہٹ ' تمام قریب ہائے نظر مریض کے اندر دہشت اور خوف کی پیداوار کا باعث بنتے ہیں ' سرخ کی بجائے چیزوں کو سیاہ رنگ میں دیکھتا ہے ' پیشاب کی بندش ہو جاتی ہے۔

اکیبریکس ایچ: (Agaricus): عظیم ذہنی بے چارہ (ہرلنگ بختگی) خوش مزاجی ' ہمت ' باتنی پن ' بے ترتیب ' بے ربط گفتگو ' لٹخولیا ' سرسام ایسا جس میں شعر کہنے اور پیشین گوئیاں کرنے اور اپنے ساتھیوں کو چوسنے کا رجحان موجود ہو۔

لکس: (Lachesis): ہیرا ہٹ والا سرسام ' کمپوزی کا سرخ پاؤ ' آنکھیں بند کرنے پر ' سر پر کے وقت یا سونے کے بعد سرسام کے دورے ہوں ' چیچک ' خسرہ وغیرہ کے دب جانے کے باعث غشی ' پیلا پن ' خناق میں چہرے پر خون کی کمی اداسی کے اظہار کے ساتھ ہو ' سانپوں اور دیگر خوفناک چیزوں کے خواب ' نگلے میں دم گھٹنے کا احساس ہو اور اچانک سوتے میں اچھل پڑے اور یوں محسوس ہو جیسے ابھی خواب میں ہے۔

ہو فو: (Bufu): اسل کے ساتھ سرسام۔
 چلمیم: (Plumbum): سرسام جو قویخ کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ اس احساس کے باعث سرسام کا ہونا کہ مریض کی زندگی خطرے میں ہے اور اسے قتل کیا جانے والا ہے یا زہر دیا جانے والا ہے اور یہ احساس کہ اس کے ارد گرد جتنے بھی افراد ہیں سب قاتل ہیں۔

کیوپرم میٹھ: (Cuprum Met): ہیضہ میں سرسام ہو، مریض قرار ہو جاتا چاہے، پیشاب کی بندش یا خارش وغیرہ کے دب جانے کے باعث سرسام ہو جائے۔

وریرٹرم ویرائیڈ: (Veratrum Vinde): سنبے کی پیدائش کے دوران سرسام ہو جانا، بخار یا زچگی کا سرسام، گردوں اور مثانے کا فعل خراب ہو جانے کے باعث خون کی سمیت والا سرسام، بیت کا پھول جانا، آنکھوں کی ٹھنکی بندھ اور وحشت ناک ہو جانا، دونوں ہاتھوں کو مسلسل حرکت ہو، نبض کمزور ہو، دل کی دھڑکن میں شدت ہو۔

آرینیکم ایلیم: (Arsenicum Alb): افسردگی (طبیعت میں دباؤ) بے چینی، موت کا خوف، اکیلے ہو جانے کا خوف، خود کشی کا رجحان، دماغ اور تمام جسم میں قلت دم واقع ہو جائے۔

اکتیارسی موسا: (Actea Racemosa): سرسام کے دورے ہوں، تمام قسم کی چیزوں کو کئی رنگوں اور شکلوں میں دیکھتا ہے۔ چوہے، سانپ، شیر، کھٹل، چھوٹے کیزے، کھیاں وغیرہ مریض کو نظر آتی ہیں، باتنی ہو اور ایک مضمون سے دوسرے مضمون کو بدل رہا ہے، چڑچڑاہٹ، بے چینی اور بے خوابی اس کی علامت ہیں۔

نکس دامیکا: (Nux Vom): سرسام کے دورے اس وقت ہوں جب کہ مریض روٹھا ہوا ناراض، چڑچڑا، بد وضع ہو اور یہ سب شراب کے استعمال کے باعث ہو۔

وسپ ٹیشیا: (Eptasia): ذہنی یا (خلاق) میں سرسام کا ہو جانا، سرسام ہو ہرے پن کے ساتھ۔

لوپیم: (Opium): ایسے پرانے گناہ گاروں میں سرسام جنہوں نے بے اعتدالیوں کے باعث اپنی صحت تباہ کر لی ہو، کمرے کے متعدد حصوں سے مختلف قسم جانوروں کو تیزی سے باہر نکلتے دیکھیں۔ مریض بھوتوں اور شیطانوں کو ملاحظہ کریں اور ان کے ساتھ باتیں کریں۔

کینابیس انڈیکا: (Cannabis Ind): جاہ و جلال اور شان و شوکت کے خیالات، خلا اور وقت کے بارے میں غلط اندازے قائم کرے۔

کینتھرس: (Cantharis): شدید سرسام جس میں جنسی خیالات اور گفتگو کی ملی جلی کیفیت ہو۔ شہوت انگیز اور گندے گلے گائے اور انسانی اعضائے تناسل اور پیشاب پانخانہ کے متعلق باتیں کرے۔

کلکیریا کارب: (Calcarea Carb) مریض جیسے ہی ایک لمحہ کے لئے آنکھیں بند کرے اسے خوفناک مناظر نظر آئیں جو اسے دوبارہ آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیں 'جانوروں کو دیکھنے اور ان کے ساتھ کھیلے (یہ حالت اعصابیت کے باعث ہوتی ہے)۔

چائنا: (China) مختلف چیزوں کو اور لوگوں کو دیکھے جیسے ہی آنکھیں بند کرے اور آنکھیں کھول دینے پر یہ سب کچھ غائب ہو جائے 'شدید کمزوری' بھوک جاتی رہے اور کھانا کھا کر سونے کی نہ رکھنے والی خواہش ہو 'یا پھر یہ حالت بے خوابی کے ساتھ بدل جائے' قلب اہم۔

زینک میٹ: (Zincum Met) اونچے درجے کی حرارت 'بے ہوشی اور بازوؤں اور ٹانگوں کے جھٹکے کھانے کے ساتھ سرسام کا ہو جاتا۔

کوکولس: (Cocculus) اچانک حیض کے جاری ہو جانے پر سرسام کا ہونا حسب ذیل دسائوس کی دماغی علامات کے ساتھ: یوں محسوس ہو جیسے کوئی زندہ چیز دیواروں 'فرش' کرسیوں وغیرہ پر لڑھک رہی ہے اور یہ کہ خود اس کے ساتھ بھی لپٹ رہی ہے۔

سوزش (ورم دماغ)

Encephalitis (Inflammation of the Brain)

جلسی میم: (Gelsemium) کمر میں نیچے کی جانب تنگی ہو جو مریض کو ہلا کر رکھ دے۔ طویل اور تھکا دینے والی حدت 'گردن اور کندھوں کے پٹھوں کی دھکن کے ساتھ سر درد ہو۔ ا بے حسی 'سستی' چکر 'غفلت' دوران سر (اضطراب) 'پانی کی طرح کی رطوبت ناک سے بکسے 'چہرہ گرم بھاری اور سرخ ہو 'پلکیں بھاری ہوں' نظر میں کمزوری ہو 'مضغلات پر قابو پاتی نہ رہے۔

آرسینکیم ایلبم: (Arsenicum Alb) جب ذہنی اتھری کی تبدیلیاں دماغ یا کسی دوسرے عضو میں ہونا شروع ہو جائیں۔

ہائوسکائیئس: (Hyoscyamus) دماغی سوزش 'سر اور چہرے میں خون کا اثر وہاں 'شدید لیکن (پھڑکن) ہو 'غنودگی' سرسائی شدت۔

سٹرامونیم: (Stramonium) دماغ کی سوزش 'حدت اور سر کے چوٹی والے حصہ میں ارتعاش کے ساتھ دماغی سوزش کا ہونا 'سرسائی دورے' اپنی پہچان کے حلق مغالطہ ہو 'روشنی اور رفاقت ضروری ہو۔

ہیلی بوریس: (Helleborus) بے ہوشی کے ساتھ دماغ کی سوزش کا ہونا 'یادداشت کمزور ہو' مانگولیا ہو 'اوٹھ آتی رہے۔

ارجنٹم نائٹ: (Argentum Nit) یہ دوا ہلکی بھلیوں پر عمل کرتی ہے۔ خصوصاً عقدہ کی ہلی

پر 'اس کا عمل دماغ پر گہرا ہوتا ہے۔ اعصابی خلیوں کے عصبی مسم کی نسبت زیادہ تر بگاڑ اور زیادہ تر تحریک پر اثر انداز ہوتی ہے لیکن اس کا اثر عضلات پر نسبتاً کم ہوتا ہے۔
 ہینڈشیا: (Baptisia) گھومتے پھرتے رہتا، بڑبڑاتے رہتا، سر سام ہو، بے ہوشی یا بے حسی ہو،
 پائیں کرتے کرتے گر کر سو جائے، دماغی پریشانی کا ہونا، سر میں دھن دھن محسوس ہو، سر بہت لمبا
 محسوس ہو، سانس متعفن ہو، رویہ جارحانہ ہوتا ہے۔

مرگی — (Epilepsy)

کاسٹیکم: (Causticum) سن بلوغ میں قدم رکھنے کے ساتھ مرگی لاحق ہو جائے جس کا باعث
 حیض میں بے قاعدگی ہو یا خارش، پھوڑے، پھنسی وغیرہ کا کا دھب جانا ہو یا کسی قسم کا خوف ہو،
 نئے چاند پر اتھری ہو، بے اختیار اند پھٹاب خطا ہو جائے، ٹھنڈا پانی پینے سے بہتری ہو۔
 پسی فلور انک: (Passiflora Inc) عرصہ حیض کے موقع پر اس مرض کا حملہ ہو، چھاتی
 میں لٹک کی لہر اور سختی (جکڑن) کا احساس ہو۔

اوٹنٹی کروکاٹ: (Oenanthe Crocata) اچانک اور مکمل بے ہوشی، خطرناک قسم کے
 تشنج کے ساتھ، نوجوان لڑکیوں میں حیض کا نہ ظاہر ہونا جو مرگی اور تشنج کی طرف لے جائے،
 اس عرصہ میں اتھری ہو جس عرصہ میں حیض ہونے چاہئیں، مخصوص علامات حسب ذیل ہیں:
 قے، اچھارہ اور حملے کے دوران نیم التادی، سو جا ہوا سرخ چہرہ جس کے ساتھ منہ سے بھاگ
 آئے۔

پلمبم: (Plumbum) جب دماغ کے پردوں میں ورم یا دھبوں (Tumors) کے باعث مرگی
 لاحق ہو، حملے سے قبل بھاری پن اور قافیہ کیفیات ظاہر ہوں اور بعد میں طویل خراٹے ہوں،
 شدید قبض ہو۔

بیلادونا: (Belladonna) صرف تازہ کیسوں میں یہ دوا استعمال کی جائے۔ جب تک (تشنج) ہاتھوں
 اور بازوؤں سے شروع ہو کر چہرہ آنکھوں اور منہ کی طرف پھیل جائے۔ مختصر دورانیہ کے
 دور بے دن میں کئی مرتبہ پڑیں اور جلد ہی ختم بھی ہو جائیں۔

ارجنٹم نائٹریکیم: (Argentum Nitricum) خوف کے باعث یا حیض آنے کے موقع پر مرگی
 ہو، حملہ سے پہلے دنوں یا گھنٹوں کے لئے پائیاں پھیل جائیں، حملہ کے بعد بے چینی ہو اور
 ہاتھوں میں کپکپاہٹ ہو، تیز چیخے، شدید عضلاتی پھڑکن ہو خصوصاً گلے میں، مکمل بے ہوشی، منہ
 پر بھاگ کے ساتھ، اکثر اپنی زبان کو کات لے، پھر تقریباً تین گھنٹوں کے لئے گہری نیند سو جائے،
 پیٹھے پھل کھانے سے دورہ پڑ جائے۔

کیپریم متلیکم: (Cuprum Metallicum) ٹھنڈک کی لہریاؤں کی جانب سے اٹھنا شروع ہو اور پیٹ کے زیریں حصہ تک چڑھ آئے، جب کہ بے ہوشی ہو اور 'خفج' ہو، نیز منہ میں جھاگ آجائے، حملے کے دوران سر میں مسلسل اپنی زبان منہ سے باہر نکالے اور اندر کرے، گرم کمرے میں اتھری ہو، حملے سے قبل گرائی والا شدید درد سر ہو۔

نٹرم میور: (Natrium Mur) حملے سے قبل اور دوران بازوؤں اور ٹانگوں میں پھڑکن ہو، روٹی سے بے زاری ہو، کند ذہنی، سوچنے میں دقت ہو، افسردگی اور چڑچڑاہٹ ہو، ٹھنڈک کی لہریاؤں سے شروع ہو یا یوں محسوس ہو کہ چوہا ٹانگ سے اوپر کی جانب پیٹ کے دائیں طرف کو دوڑ رہا ہے۔ حملوں سے پہلے پتھر آئیں خند ہو اور دانت مل جائیں (جس دن دندان پڑ جائے) نیز حلی اور تے ہو، منہ پر جھاگ آجائے، کیکپاہٹ ہو، جسم کو ہینکلے لگیں اور ٹانگیں سختی کے ساتھ اوپر کو اٹھ جائیں، ہاتھ بھیج جائیں لیکن انگوٹھے اندر کی جانب نہ مڑیں، ہاتھوں اور پاؤں میں ٹھنڈک ہو، بعض کے دوران اتھری ہو، سوزاکی بے ہوشی کے مزمین کیس، دہلی ہوئی خارش۔

نکس وامیکا: (Nux Vom) ہوش کے ساتھ 'خفج' غصے، چھوٹے جانے، 'جوش' حرکت اور بد چھٹی سے اتھری ہو، تشنگی سختی والے جھکے، اکڑن ہو، چہرہ سرخ ہو جائے اور آنکھیں بند ہو جائیں، دورے کے دوران بے اختیارانہ پانخانہ و پیشاب نکل جائے، پیٹ کے اوپری حصہ میں ٹھنڈک کے لہروڑے، حملے کے بد کمری خند ہو، کھلی ہو اس میں اتھری ہو۔

کالی بروم: (Kali Brom) جب دورے نئے چاند کے ساتھ آئے اور دورے کے بعد درد سر ہو، کند ذہنی، احساسات کے اعتماد میں سستی ہو، پتھر آئیں، چال میں لاکھڑاہٹ ہو، بد مزاج اور اونگٹا رہنے والا۔

لونا: (Luna) مری پورے چاند کے ساتھ ہو۔

بیونو: (Bulo) جب کہ جلتی اور جنسی بے اعتدالیوں کے باعث مرض لاحق ہو، دوران مباحثرت دورہ پڑ جائے، پیٹ میں بے چینی کا ایک عجیب احساس، اور پھر اچانک ہوش جاتے رہیں، حملہ سے قبل آنکھوں کی پتلیاں بے تحاشہ کھلی ہوئی ہوں اور ان پر روشنی کا کوئی اثر نہ ہو، ٹھنڈک کی لہریاں آلات یا پیٹ سے شروع ہو، حملہ سے قبل منہ بہت زیادہ کھلا ہوا ہو، اور حملہ کے بعد جڑے لگ جائیں، حملہ کے بعد پیشاب بے اختیارانہ خفا ہو جائے۔

برٹامیوری ایٹی کم: (Baryta Muraticum) خون کی ٹالیوں کے ڈھیلا پڑ جانے کے ساتھ، دہلاپے اور کمزوری کے ساتھ، نیز غشی کے دوروں کے ساتھ، موسم بہار میں شکایات میں اتھری آجائے، تمام بدن میں سرسراہٹ ہو۔

آرٹی میزادی: (Artimisia V) شدید جذبات کے باعث دورے پڑیں، جھکے جلدی جلدی

گلیں اور بعد میں لباؤ قند ہو۔

اٹالینا (Alumina): زیادہ تر دورے اس وقت پڑیں جب پاخانہ کر رہا ہو۔
ابسینتھیم (Absinthium): جب دورے سے قبل کیکاپاٹ ہو، چکر آئیں اور غنودگی ہو،
 حملہ کے بعد یادداشت کھو جائے اور ٹھنڈی اور ٹھلی پوٹنسی کی ذاتی لیوشن دیجئے۔
اگنیشیا (Ignatia): مرگی کے دورے جو کہ جذبات کو نہیں لگ جانے یا بہت بڑے خوف کے
 بعد لاحق ہوں، خاموشی سے غم برداشت کرنے کے ساتھ یا غصے سے دورے پڑیں، جوش سے
 اور نا آسودہ محبت کے باعث دورے ہوں۔

تھوچا (Thuja): حفاظتی ٹیکے لگنے کے بعد مرگی کے دورے پڑنے لگیں، جب وہ آبلہ عاتب
 ہو جائے جو حفاظتی ٹیکہ لگوانے کے بعد پیدا ہو، کانوں میں سرہ پن محسوس ہو حملے کے بعد، ایک
 انیم ذاتی لیوشن دیجئے۔

سٹارنم (Starum): دانت نکالنے کے عرصہ کے دوران مرگی کے دورے جھٹ میں کیڑوں کی
 علامت کے ساتھ، چہرہ زرد ہو اور اس کے ساتھ ہاتھوں اور آنکھوں میں پھڑکن ہو، نیز ساتھ
 میں بازو اور پاؤں لہرائے۔

لائکی کو پوڈیم (Lycopodium): بہت ہی منتقلی ذہن رکھنے والے ضدی اشخاص میں مرگی،
 ملاست انگیز رویہ، ایسے لوگوں کے ساتھ اختیار کریں جنہیں بے وقوف خیال کرتے ہوں لیکن
 اپنا یہ حل ہو کہ خود احمکی کے فقدان میں مبتلا ہوں، سر کے وقت ابتری ہو۔

سلیشیا (Silicea): دہلے، لہجے، گہرے رنگ والے، سرد مزاج، مغرور اور پیاس نہ محسوس
 کرنے والے اشخاص میں مرگی، پاخانہ لیس دار اور قبض کے ساتھ ہو، ہتھیلیوں میں پسینہ آتا
 رہے اور غیر صحت مند جلد ہو، نئے اور پورے چاند کے موقع پر راتوں کو مرگی کے حملے ہوں۔
وسکم البم (Vescum Alb): ایسی مرگی کے لئے جس میں حملے کے بعد چکر آتے رہیں۔

ککلیریا کاربید (Calcarea Carb): بچوں میں مرگی، کھلے ہوئے تالو اور دیر سے دانت
 نکالنے کے ساتھ، سر اور گردن پر پسینہ ہو، حملے سے خوف ہو اور اس کی اذیت پر کڑھے جس
 کے باعث لہجہ میں مبتلا ہو جائے، پھنیوں کے دب جانے، جلق یا جنسی بے اعتدالیوں کے
 باعث مرگی کا ہونا، بازوؤں میں یا خوفِ معده سے نیچے کی جانب کسی چیز کے چلنے کا احساس ہو،
 اچانک چکر کا حملہ ہو جائے، تشجج کے بغیر حواس کا کھو جانا، حملے سے قبل منہ میں چبانے والی
 حرکت ہو، گزیراٹ اور یادداشت کا کھو جانا، درد سر، غنودگی، پیاس اور بھوک حملے کے بعد ہو۔
سیکیوٹاوائی روسا (Cicuta Virosa): اچانک سختی ہو جس کے بعد جھٹکے لگنے لگیں اور
 شدید توڑ پھوڑ ہو، جنس میں دباؤ پیدا ہو جائے، جڑے بند ہو جائیں، چہرہ گہرا سرخ ہو جائے، منہ

پر جھاگ آجائے۔ حملے کے بعد بہت زیادہ غصہ ہو، معدے کی سوزش کے ساتھ مرگی کے دورے، دورے کے دوران انگوٹھے اندر کو مڑ جائیں، حملے کے بعد کچھ بھی یاد نہ رہے، مریض ایک ہی چیز کو گھورتی رہتی ہے اور اگر وہ نظر کو ہٹالے تو فوراً گر کر پے ہوش ہو جائے، معمول سے بچھو جانے یا بٹنے سے دورے میں اتھری ہو جاتی ہے۔

تھاسپیم: (Thaspium): ہسٹیریا، مرگی اور کوریا خود کشی کی رجحان کے ساتھ ہو، رونے اور ہنسنے کا بدلتا ہوا رجحان، خصوصاً سونے کے دوران کوریا لاحق ہو، ہونٹوں میں سرسراہٹ ہو، بازوؤں میں نامحسوس اور تشنجی پھڑکن، مردوں میں مباشرت کے بعد لاغری، عورتوں میں بائیں بیض دان میں درد، حیض میں رکاوٹ کے ساتھ۔

ہائوسکامس: (Hyoscyamus): پھڑکن اور جھٹکن، منہ پر جھاگ اور زبان کاٹنے کے ساتھ، حملے سے قبل بھوک ہو، خوف کے باعث مرگی کا دورہ، دورے سے پہلے چکر آئیں، کانوں میں گھنٹیاں بھیں، آنکھوں کے آگے چنگاریاں اڑیں، نیچیں مارے، دانت پیسے اور پویشاب خطا ہو جائے، جس کے بعد سو جائے اور خرائے لے۔

ایگریکس ایم: (Agaricus M): ایسی مرگی میں یہ دوا دی جاتی ہے جس میں حملے کے بعد خیالات کا ہماؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور مریض بہت زیادہ باتیں کرتا ہے۔ ہر سات دن کے بعد مرگی کا دورہ پڑتا ہے، ہمائوں کے غلبہ کے ساتھ دورہ شروع ہوتا ہے۔

فیرم فاس: (Ferrum Phos): پیلاژونا کے برعکس مریضوں کے لئے یہ دوا ہے، یعنی قلت دم والے، کمزور، اعصابی، زرد چہرے والے، ہلکی جھلی زرد والے مریض۔

گلوٹائین: (Glonoine): بہت زیادہ شدت، حملے سے پہلے یا بعد میں چھتیس یا اڑتالیس گھنٹہ تک دھڑکن اور دباؤ والا درد ہو، گرم کمرے یا گرم اشیاء کے استعمال سے مرض میں اتھری ہو، دل کی دھڑکن تمام جسم میں محسوس کرے۔

سلفر: (Sulphur): یہ معاون دوا کے طور پر استعمال کی جاتی چاہئے، خصوصاً جب کہ مرگی کا سبب موروثی ہو، یہ ایک ایم ڈائی لیوشن دی جاتی چاہئے، یہ ٹی بی کے رجحان کی نشان دہی کرتی ہے اور خارش یا پھوڑے پھینچوں کے دب جانے کی نشان دہی کرتی ہے۔

زنک فاس: (Zincum Phos): دماغی انحطاط کی دوا ہے جو کہ کسی بھی قسم کی مرگی کے باعث پیدا ہوا ہو، جس کی اصلاح کے لئے کثرت کے ساتھ برومائیڈ استعمال کئے گئے ہوں۔

غش کھانا — (Fainting)

ماس کس: (Moschus) معمولی سے جوش کے باعث غش کھا جائے، اگر ہسٹریا کی طرف رغبت ہو۔

اوپیم، اکونائٹ: (Opium, Aconite) جب خوف زدہ ہو جائے۔

سلفر، فاسفورس: (Sulphur, Phosphorus) بھوک سے غش کھا جائے۔

سلفر، کوئیم، پوڈوفیلیم: (Sulphur, Conium, Podophyllum) پائانہ کے بعد غش ہو۔

کمیشیا کارب: (Magnesia Carb) مریض جب رات کا کھانا کھانے بیٹھے تو غش کھا جائے۔

الیومینا: (Alumina) جب کھڑا ہونے کے لئے مجبور ہو جائے۔

کاربو ویج: (Carbo Veg) جب بیٹھنے کے لئے مجبور ہو جائے۔

لائکوپوڈیم، تھوچا، میوریکس: (Lycopodium, Thuja, Murex) حیض سے پہلے اور نیچے لیٹنے پر غش ہو۔

ایسٹک ایسڈ: (Acetic Acid) کمزوری میں غشی کے دورے ہوں، وقت دم والے اعضاء

درد سر، چہرہ زرد اور موم کی طرح کا نکسیر اور نہ بچنے والی پیاس، اس دوا کی علامتیں ہیں۔

امونیا کارب: (Ammonia Carb) کونکے کے بخارات کے زہر کے باعث غشی ہو۔

اوپیم: (Opium) کونکے کی گیس سانس کے ذریعے اندر داخل ہو جانے کے باعث غشی، مریض کو اونگھ بے ہوشی ہو اور درد کا احساس نہ ہو۔

ایسافوئیڈا: (Asafoetida) انزال کے بعد غشی ہو۔

ایگریکس: (Agarcus) مباشرت کے بعد غشی ہو۔

سپیا: (Sepia) خشکی اور تھکاوٹ کے دوران غشی۔

نکس موسکاٹا: (Nux Mochata) جب دیر تک کھڑا رہے یا بظاہر کسی بھی وجہ کے بغیر غشی ہو،

غشی ہو، حیض اور بواسیر کا رجحان ہو، جب مریض خون دیکھ لے تو غش کھا جائے یا کسی شدید درد کے باعث غشی ہو۔

پٹرولیم: (Petroleum) دل کی دھڑکن کے بعد غشی۔

بربرس ولگرس: (Berberis Vul) اگر گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے غشی ہو تو یہ دوا دیتے۔

سپلیا: (Spigelia) دل کی تکلیف کے باعث غشی ہو تو یہ دوا دی جائے۔

آرنیکا ایم: (Arnica M): اگر کمینیکل زخم کے باعث فشی ہو۔
 کروکس: (Crocus): اگر ناک سے خون بہا کرے۔
 چائنا: (China): اگر اتنا کھون غصے کہ نقابت ہو جائے اور اس کے باعث فشی ہو تو یہ دوا دی جائے۔

درد سر۔۔۔ (Headach)

(یہ دیکھئے "اعصابی درد" اور "آدھے سر کا درد")

بیلادونا: (Belladonna): کنپٹیوں میں ٹھوکریں لگنے اور پھن والا درد سر ہو جس کے ساتھ چہرہ آگ کی طرح سرخ اور گرم ہو، آنکھوں میں خون بھرا ہو اور سرخ ہوں، چہرہ سرخ اور پھولا ہوا ہو، جیسے اچانک درد ظاہر ہو ایسے ہی اچانک غائب ہو جائے، سورج کی گرمی یا دھوپ کے باعث درد سر ہو جس کے ساتھ بھرپور نبض ہو، بے ہوشی ہو جائے۔
 جلیسی سم: (Gelsimium): گردن کے قریب گدی سے دردیں شروع ہوں اور سارے سر میں پھیل جائیں، ان دردوں کے باعث ماتھے اور آنکھوں کے ذیلیوں میں پھن کا سا احساس ہو، یوں محسوس ہو کہ سر بھرا ہوا ہے اور بڑا ہے، بے ہوشی ہو، یوں محسوس ہو کہ سر کے گرد ایک ٹی بندھی ہوئی ہے۔

گلوٹائن: (Glonoine): میس کی روشنی کے نیچے کام کرنے یا دھوپ میں جہاں گرمی بڑا راست سر پر اثر انداز ہو، کام کرنے کے باعث درد سر ہو، سر بہت زیادہ بڑا محسوس ہو، نوٹنگے یا سورج کی دھوپ کے باعث درد سر ہو جس میں بے ہوشی نہ ہو، قصیدی چیزوں کے استعمال یا سر کو بلند رکھنے یا طویل نیند لینے سے بہتری ہو لیکن تھوڑی نیند بعض اوقات مرض میں اضافہ کر دیتی ہے۔ شدید درد سر ہو، مریض جس کے باعث کھڑکی سے چھلانگ لگا دیتا ہے۔

نایٹرم میور: (Natrium Mur): جب درد سر سورج طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھے اور غروب ہونے کے ساتھ ساتھ کم ہو۔ درد سر پیٹے کے ساتھ، جتنا شدید درد ہو اتنا ہی زیادہ لمبی دے، سکول کے ٹکے، لڑکیوں میں درد سر، آنکھیں ایک جگہ مرکز کرنے سے اجڑی ہو، نل کھاتے ہوئے شرارے سے نظر آئیں درد سر سے پہلے، ہتھوڑے لگنے کا سا درد سر جیسا کہ سر میں ہتھوڑے مارے جا رہے ہوں، درد سر سے سر پھٹے، یوں محسوس ہو کہ سر کسی قلعہ میں کسا جا رہا ہے۔ جیسے کھوپڑی کھلی جائے گی، نظر میں خلل آجائے کے باعث درد سر۔

سپیلیا: (Spigelia): اعصابی درد جو دماغ کی جڑ میں صبح کے وقت شروع ہو پھر سارے سر میں پھیل جائے آنکھوں کے کڑھوں تک جائے اور بائیں کنپٹی تک جائے، آنکھوں کے

ذہیلوں میں دباؤ کے ساتھ ناقابل برداشت درد ہو، بائیں جانب کے عضلات میں اضطرابی حرکت ہو۔ شدید اعصابی درد کے ساتھ۔ درد شام کے وقت غائب ہو جائے یوں احساس ہو کہ جیسے سر کی چوٹی کو باندھ دیا گیا ہو۔

تیسرے فاس: (Natrium Phos): غصے خیم کے دوران درد سر۔ خیم گاڑھا، لو تھوڑے دار، گرمے رنگ والا خارج ہو اور صرف ایک دن تک ہی جاری رہے، پتے کی پتھری کا قویج، پاؤں ٹھنڈے ہوں، خود کشی کرنے کی تحریک ہو۔

سینگولی نیریا سی: (Sanguinaria C): اس کی علامات بھی سپائی جیلیا ہی کی طرح کی ہیں سوائے اس کے کہ یہ دائیں جانب کی دوا ہے۔ کھانا نہ کھانے کے باعث صفراوی درد ہو، شریانیں اور کپٹیاں پھولی ہوئی ہوں، درد سر ہفتہ میں ایک بار ہوتا ہے۔ درد صبح جاگنے پر شروع ہوتا ہے جو چاند سے شروع ہو کر دائیں آنکھ اور کپٹیاں کی طرف سفر کرتا چلا جاتا ہے۔ مریض کو یہ درد اندھیرے کمرے میں لے جا کر لٹا دیتا ہے، قے ہوتا شروع ہو جاتی ہے جس سے کچھ سکون ملتا ہے، ہتھیلیوں اور پاؤں کے ٹکڑوں سے گرمی خارج ہوتی ہے، پھاڑنے والا درد جو سورج طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ اترتا چلا جائے، جھوٹی بھوک ہو جس کے ساتھ سوچنے اور خوراک کی بو سے بے زاری ہو۔

پلاٹینا: (Platina): ایک قسم کا شدید اعصابی درد جس سے چہرے کے عضلات میں اضطرابی حرکت ہوتی ہے۔ دائیں آنکھ سے درد پیچھے کی جانب پھیل جاتا ہے۔ یہ درد تیزی سے بڑھتا ہے اور آنکھوں سے بہت زیادہ پانی بہنے کا سبب بنتا ہے۔ 1000 ڈائی لیوشن کی خوراک دیجئے۔

سیڈرن: (Cedron): شدید ناقابل برداشت درد جو روزانہ 6 بجے شام کو ہوتا ہے، چہرے کے عضلات میں پھڑکن والا اعصابی درد۔

برائی اونیا: (Bryonia): ٹھنڈے پر درد سر کا ہونا، یوں محسوس ہو کہ جیسے دماغ ماتھے کے راستے پھٹ کر باہر آ جائے گا۔ حرکت کرنے سے اتھری ہو، کھینٹے، کھیل دیکھنے پر ہونے والا درد سر۔

میلی لوفس: (Mellilotus): شدید اجتماع خون کے ساتھ اعصابی درد سر جس کو نکسیراناک سے خون بہنے سے) سے اتفاق ہو۔ سر میں خون کے اٹوہام کے باعث ہونے والا درد سر جس میں یوں محسوس ہو کہ بیہوش ماتھے کے راستے پھٹ کر نکل جائے گا۔

کولن سونیا: (Collinsonia): ایسا درد سر جس کے ساتھ بوا سیر اور قبض کا عارضہ بھی ہو۔

چائنا آف: (China Off): درد سر جس میں، سر میں اٹوہام خون، ٹپکن ہو اور ہتھوڑے لگنے کا احساس جو کپٹیوں پر لگیں، معمولی پھوٹے یا دبانے سے اتھری ہو جبکہ زور سے دبانے پر بہتری ہو۔

کالی بانیکرام: (Kali Bi): اگر سر میں درد نظر کے دھندلا جانے کے ساتھ ہو تو یہ دوا دیں۔
یوں ہوں درد سر تیز ہوتا چلا جائے نظر درست ہوتی چلی جائے۔
کالی سائن: (Kali Gyan): پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد۔

کالی کارب: (Kali Carb): جب نزلہ کے باعث اخراج (پیشاب) پیٹ وغیرہ کا بند ہو جائے
تو سر میں درد ہو لیکن جیسے ہی اخراج درست ہونا شروع ہو 'سر کا درد بھی درست ہوتا چلا
جائے۔

لیک ویک: (Lac Vac): متلی اور قبض کے ساتھ درد سر کا ہونا یا پھر حیض آنے کے موقع
پر درد سر ہو 'فلکٹر پیشاب آنے سے بہتری ہو۔

لیتھیم کارب: (Lithium Carb): جب درد سر کو کھانے سے افادہ ہو۔
روتا: (Ruta): پڑھنے اور آنکھوں پر دباؤ ڈالنے سے درد سر کا ہونا۔ آنکھوں کے دباؤ کے لئے
یہ چوٹی کی دوا ہے۔

اولی اینڈر: (Oleander): یوں محسوس ہو کہ کھوپڑی پر بہت بھاری وزن رکھا ہوا ہے جو سر
کو کھل رہا ہے 'اطراف میں دیکھنے سے یا بھینگے پن کے ساتھ دیکھنے سے بہتری ہو۔

آرنیکا ایم: (Arnica M): جب کسی چوٹ کے باعث درد سر ہو 'جو بعض مواقع پر بہت تیز
ہو جائے 'یوں محسوس ہو کہ دماغ میں کیل ٹھوکنے جا رہے ہیں 'دماغی پریشانی اور گڑبڑا ہٹ ہو 'سر
کو ہاتھوں سے ملنے سے درد زیادہ سنگین ہو جائے جبکہ سر کو بلند کرنے سے درد میں افادہ ہو۔

ہائی پری کم: (Hypericum): ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگ جانے کے باعث درد سر کا لاحق ہو
جانا 'یہ دوا آرنیکا کے بو استعمال کی جانے والی دوا ہے۔ یہ دوا بے اندازہ حساسیت کو رفع کرتی
ہے جبکہ آرنیکا سر میں خون کے اژدہام اور چوٹ کی حالت کو درست کر چکی ہوتی ہے۔

نکس وامیکا: (Nux Vomica): الکوحل اور دوسری فشی اشیاء کے استعمال کے باعث درد
سر کا ہونا۔ یہ دھکن والا درد سر ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ پیٹا جا رہا ہے۔ کھنچاؤ ہوتا
ہے 'بھاری پن ہوتا ہے 'کند ذہنی ہوتی ہے 'جھنڈا ہٹ ہوتی ہے 'غٹوگی ہوتی ہے 'ڈوبنے اور
کچلے جانے کی کیفیت ہوتی ہے جس کے ساتھ متلی اور کھٹے اور بدبودار مواد والی تے کی علامات
ہوتی ہیں۔ سرد و شام کو بہتر ہو جاتا ہے۔

کیموملا: (Chamomilla): چڑچڑے پن کے ساتھ درد سر کا ہونا 'مریض ناراض اور غصیلا
ہوتا ہے 'یہ درد سر عمومی طور پر ایسے مریضوں میں ہوتا ہے جو الکوحل بے تحاشہ استعمال کرتے
ہیں۔ انہوں کھاتے ہیں اور بہت زیادہ کافی پیتے ہیں اپنے اعصاب کو سکون دینے کے لئے۔

چائینی خم سلف: (Chininum Sul): کوئین کے غلط استعمال کے باعث درد سر لاحق ہو جائے

جس میں دونوں کانوں میں گھنٹیاں بجتے، بھنسناسٹ اور گرہنے کا احساس موجود ہو، شدید لہروں والے درد ہوں ماتھے اور آنکھوں میں 1000 ڈائی یوشن دیجئے۔

کالی میور: (Kiai Mur): جب چاکلی تم سلف ٹاکام ہو جائے تو یہ دوا استعمال کی جائے، یہ دوا بھی کونین کے لفظ استعمال سے ہونے والے درد سر کے لئے مفید ہے۔ اس میں سر کے اندر کیزے مکڑوں کے ریگنے کا سا احساس ہوتا ہے اور آوازیں آتی ہیں 100 ڈائی یوشن دی جائے۔

آئیوڈیم: (Iodum): درد سر ہو جس میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ سر کو کسی پٹی سے باندھا گیا ہے، گرم کمرے میں جانے یا آگ کے قریب جانے پر بہتری ہو۔ ٹھنڈے کمرے میں جانے سے اور ٹھنڈی ہوا میں رہنے سے بہتری ہوتی ہے اور جب کہ مریض کھا رہا ہو تو اس وقت بھی بہتری ہو۔

پیرس قویڈری فولیا: (Paris Quadrifolia): سر کے پھیلنے کے احساس کے ساتھ درد سر لاحق ہو جو ریڑھ کے آغاز سے شروع ہوتا ہے۔

فائی ٹولاکا: (Phytolacca): قوت سماعت میں زیادتی ہو جانے کے ساتھ درد سر۔

کلکیریا فاس: (Calcarea Phos): سکول پڑھنے والے لڑکے لڑکیوں میں درد سر جو اپنی کتابوں کے ساتھ بہت زیادہ منہمک ہوتے ہیں خصوصاً ایسے بچوں میں جو بہت تیزی سے پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی ذہنی ترقی، جسمانی قوت کی نسبت کم ہو رہی ہوتی ہے۔

ٹھوچا: (Thuja): درد سر لاحق ہو اور یوں محسوس ہو جیسے ایک کیل اس کی گدی میں ٹھونکا جا رہا ہے یا پیشانی میں ٹھونکا جا رہا ہے۔

کافیا: (Coffea): درد سر یوں محسوس ہو جیسے کیل گدی میں ٹھنک رہا ہے۔

پیکرک ایسڈ: (Picric Acid): معمولی سی ذہنی مشقت سے دماغی نرمی کے باعث درد سر کا لاحق ہو جانا۔ سکول میں پڑھنے والے بچوں میں درد سر جو پڑھنے یا امتحان دینے کے بعد لاحق ہوتا ہے۔ طلبہ کا درد سر۔

روبینیا: (Robinia): گیس کی علامات کے ساتھ صغروی درد سر۔ درد شکم، کھنی اٹیوں اور تیزابیت کے ساتھ یوں محسوس ہو جیسے سر اٹھتے ہوئے پانی کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔

کلورے لم: (Chloralum): ہولناک درد سر، کند ذہنی، سر بھاری ہو، کئی روز کے دورے کے ساتھ اگلے حصے کا درد سر۔

ٹیرنٹولا ہسپانیہ: (Tarentula Hispania): یوں محسوس ہو جیسے ہزاروں سوئیاں سر میں چبھ رہی ہوں، شر سے، پھوٹنے سے اور تیز روشنی سے بہتری ہو، سہلانے سے بہتری ہو۔

لیک ڈیفیل: (Lac Defil): سنے والا درد سر جو ہاتھ سے شروع ہو کر گردی تک پھیل جائے، نیز جس کے ساتھ چکن ہو، متلی ہو، سنے ہو، اندھا پن ہو اور شدید (چیزی قسم کی) قبض ہو۔ حیض آنے کے وقت درد سر۔ زیادہ پیشاب آنے سے افادہ ہو۔

وریرٹرم البم: (Veratrum Alb): اعصابی درد سر جس کے ساتھ بیٹائی معدوم ہو جائے، نیز برقی ٹھنڈک کا احساس چاند میں ہوتا ہے جس کو افادہ ٹھنڈی چیزوں کے لگانے سے ہو (200) طاقت کی خوراک دیجئے، درد سر ایسا جو چہرہ بگاڑ دے اور دیوانگی کی حد تک لے جائے۔

وائی اولادوڈوراٹا: (Viola Odorata): اچانک درد سر لاحق ہو جائے جس کی وجہ بظاہر معلوم نہ ہو اور جس کے ساتھ بیٹائی بھی متاثر ہو۔

چیونٹھس: (Chionanthus): سنے والے درد سر کے لئے مخصوص دوا، غافل اور بے پرواہی سر کے اگلے حصہ میں کند قسم کا درد جو ناک کی جڑ کے اوپر، آنکھوں کے اوپر ہوتا ہے اور کپٹیوں میں ہوتا ہے، جھکنے اور حرکت کرنے سے ابتری ہو، درد فحش استعمال کیجئے۔
پوتھوس: (Pothos): ہسٹریائی درد سر کے لئے۔

الیئم سیٹ: (Allium Sat): درد سر جو آغاز حیض میں بہتر ہو، جب بعد میں ابتر ہو جائے۔
کلیکیریا ایسٹ: (Calcareia Acet): بے ہوشی میں جٹا کر دینے والا دپانے والا درد سر جو بیٹائی میں ہوتا ہے کام پھوڑ دینا پڑے اور یہ نہ جان سکے کہ وہ کہاں ہے۔

ایپی فیکس: (Apiphegus): اعصابی درد سر جس کے ساتھ بنیادی اور نمائیاں علامت مسلسل تھوکتے رہنے کی ہو۔ تھوک لیس دار ہو، درد سر جس سے پہلے بھوک ہو۔
اگنیٹیا: (Ignatia): غم کے بعد اعصابی درد سر، تیز بھاؤ کے ساتھ پیشاب آنے پر درد سر جانا رہے، ہسٹریا میں درد سر کا لاحق ہو جانا، درد سر جس کے ساتھ یوں محسوس ہو کہ ایک سوئی یا کیل سر میں ٹھونکا جا رہا ہے۔

لوبیلیا انفلیٹا: (Lobelia Infl): گردن توڑ بخار والا درد سر، ہر دو گھنٹے کے بعد دن میں چھ مرتبہ ۱۰ ڈالٹی لیوشن کے دو یا تین قطرے دیجئے۔

لائکوپوڈیم: (Lycopodium): کپڑے اتار دینے سے درد سر میں افادہ ہو۔
اورم میٹ: (Aurum Met): پاگل بنا دینے والا درد سر، یوں محسوس ہو کہ اس کے سر کے اوپر ہوا چل رہی ہے حالانکہ اسے ایک جھوٹا بھی نہ لگے، ٹھنڈک سے اتنا درجے کی حساسیت ہو، سر کو لپیٹنا چاہے۔

سلیٹا: (Silicea): درد سر جس میں سر ڈھانپنے اور لپیٹنے سے افادہ ہو، اندھیرے میں ابتری ہو اور روشنی میں بہتری ہو، اعصابی درد سر جو سکول میں بے تحاشہ مطالعہ سے لاحق ہو۔

اونوس موڈیم: (Onosmodium): تناؤ یا آنکھوں کے کھنچاؤ کے باعث درد سر 'چکر آئیں' اعصابی درد سر 'ضعف اعصاب لاحق ہو۔

اکتیا آر: (Actea R): سامنے کے حصہ میں درد سر ہونا 'عمودی سر کا درد' یا گدی میں درد ہو 'جن کے ساتھ آنکھوں کے ذیلوں میں بھی درد ہو' دبانے سے بہتری ہو 'جبکہ معمولی حرکت سے درد میں اضافہ ہو جائے۔

نکس موسکاٹا: (Nux Moschata): تھوڑا سا کھانے سے درد سر لاحق ہو جائے۔
پلساٹیل: (Pulsatilla): آنکس کریم کھانے سے درد سر کا لاحق ہو جانا 'گیسوں کے باعث درد سر ہو' گرمی سے بہتری ہو۔

سپیا: (Sepia): درد سر 'بر بھی گلنے کا سادرد' سر اور چہرے کی دائیں جانب سامنے والی ہڈی کی جانب گھومے 'بائیں کنٹھی میں بر بھی گلنے اور پھاڑنے والے درد' بائیں آنکھ کے اوپر درد ہو جو گدی کی طرف پھیلے 'چاند پر تنکین والا درد' یوں محسوس ہو جیسے سر اوپر سے کھل جائے گا۔ شور سے بہتری ہو 'معدہ خالی ہونے کے احساس کے ساتھ ہر قسم کی خوراک سے بے ذاری ہو۔ کھانے سے بہتری ہو اور مکمل آرام سونے سے ہو۔

ٹیوبرکولینم: (Tuberculinum): ایسے اشخاص میں درد سر جن کے خاندان میں تپ دق کے اثرات پائے جائیں 'خصوصی علامت اس درد میں یہ ہوتی ہے کہ مریض کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ لوہے کی ایک پٹی سے اس کا سر جکڑ دیا گیا ہے۔ ریزہ پر مریض کو کیلے کپڑوں کا تکلیف دہ احساس ہوتا ہے۔

اورم آرس: (Aurum Ars): درد سر جس کے ساتھ ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈے ہوں 'نیز ٹانگیں اور پاؤں بھی ٹھنڈے ہوں۔

سٹیفی سیکریا: (Staphisagria): گائے کا گوشت کھانے کے بعد درد سر لاحق ہو 'کانوں میں گر جن کے ساتھ درد سر 'سر میں بے ہوش کر دینے والا درد' خاص طور سے ماتھے میں 'ایسے درد جو اندر اور باہر کی طرف دبائیں' یہ درد معمولی سے چھو جانے سے بڑھ جاتے ہیں۔

کلکیریا آئیوڈ: (Calcarea Iod): سر میں درد 'بالوں کا پاندھنے سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

کروٹیلس ہور: (Crotalus Hor): تپے والا درد سر 'بہت بڑی مقدار میں تپے ہوتی ہے' دائیں کوٹ نہیں لینا جا سکتا نیز کمر کے بل سیدھے بھی نہیں لیٹ سکتا کیونکہ ایسا کرنے سے سیاہ صفراوی تپے ہوتی ہے۔

اینا کارڈیم: (Anacardium): درد سر جو کھانے سے رفع ہوتا ہے۔ حرکت کرنے اور کام

کرنے کے دوران درد تیز ہو جاتا ہے، گیس کے ساتھ درد سر ہو اور اعصابی درد سر۔
چیلڈونیم (Chelidonium): بے قابو کر دینے والا شدید درد سر جو مریض کو ہاتھ کانٹے اور
 بھٹکتے پر مجبور کر دے۔

کو کولس (Cocculus): سر کے پچھلے حصہ میں درد، یوں محسوس ہو جیسے سر کے حصے باری
 باری کھل اور بند ہو رہے ہیں۔ درد سر ایک سائے کی طرح ظاہر ہوتا ہے، سونے کے دوران
 بھی مریض ہر بات سن سکتا ہے۔ حالانکہ سونے کے دوران وہ خراٹے لے رہا ہوتا ہے۔
 غنودگی، متلی اور پکڑوں کے ساتھ اعصابی درد سر، درد کی شدت کے باعث مریض اپنے سر کی
 گدی کو دونوں ہاتھوں سے خوب دبا کر پکڑ لیتا ہے۔

پشیلیمائی (Petelia T): جلد اور چہرے کی جلن کے ساتھ صفراوی درد سر حتیٰ کہ سانس بھی
 نھنوں کو جلاتی ہے۔

آئرس ور (Iris Ver): جلن اور تیزابیت کے ساتھ صفراوی درد سر۔ ٹپکن اور شدید درد
 پیشانی میں غلغلہ پیدا کر دے، کڑوی تے سے درد میں افادہ ہوتا ہے۔

سورنیم (Psorinum): بھوک کے باعث درد سر لاحق ہو، کھانا چاہے لیکن کافی کھانا نہ کھا
 سکے۔

ایلیو منا سلیکیٹ (Alumina Silicate): درد سر جو بالوں کا باندھنے سے بدتر ہو جائے، اس
 کے ساتھ دانت کاٹے، حیض سے پہلے اور دوران حیض درد سر ہو، بھاری قدموں سے چلنے کے
 باعث درد سر ہو، ٹھنڈی ہوا سے اور ٹھنڈی چیزیں لگانے سے بہتری ہو، سر کو اوپر کی جانب
 اٹھانے سے، سر کو حرکت دینے سے اور چلنے سے بھی افادہ ہو۔

فیلین ڈریم (Phellandrium): درد سر جس میں یہ احساس ہو کہ سر کی چوٹی پر وزن رکھا ہوا
 ہے۔

کینبائس انڈیکا (Cannabis Indica): اسی احساس کے ساتھ درد سر ہو کہ چاند سے سر
 کھل رہا ہے اور بند ہو رہا ہے۔

بیڈی آگا (Radiaga): شام کے 2 سے 7 بجے تک سر میں شدید درد ہو، چکر آئیں، سر میں
 بھراؤ کی کیفیت۔ ٹھنڈک سے اتھری اور گرمی سے بہتری ہو۔

کالمیا لٹیفولیا (Kalmia Latifolia): گدی میں درد سر ہو، سورج طلوع ہونے سے سورج
 غروب ہونے تک سر میں درد رہتا ہے۔ سر جھکانے سے اتھری ہوتی ہے، چکر آئیں اور ذہنی
 پریشانی ہو۔

جیبوراندی (Jaborandi): روزانہ سہ پہر کے وقت سر میں درد ہو، متلی ہوتی ہے، گرمی

کے ساتھ ہتھماہٹ ہوتی ہے۔ اور پیسے آتے ہیں۔
نیٹرم سلفیورکیم (Natrium Sulphuricum): سرکی جڑ میں درد ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سر کچلا جا رہا ہے 'سر میں چوٹ لگ جانے کے باعث دماغی عارضہ ہو۔ چکر آتے ہیں 'کانوں میں جھین ہو 'کتنبیوں میں سوراخ ہوتے محسوس ہوں 'موسیقی اور مرطوب موسم کے باعث اتھری ہو۔

سلی نیئم (Selenium): شراب پینے کی بد عادت یا چائے کے زیادہ استعمال کے باعث درد سر لاحق ہو 'گرم موسم کے باعث بھی یہ درد سر لاحق ہو جاتا ہے۔ بے تحاشہ مطالعہ کے باعث درد سر 'تیز خوشبوؤں کے سونگھنے سے درد میں اضافہ ہو 'درد سر کے دوران پیشاب کے بھاؤ میں زیادتی ہو جاتی ہے۔

پودوفیلیم (Podophyllum): جب درد اور اسہال بدل بدل کر آئیں۔
پلمبم (Plumbum): سامنے کے حصہ میں یا گدی میں درد سر لاحق ہو 'عموماً قہقہ اور صفراوی تے کے امراء ہوتا ہے خصوصاً جب درد سر کے ساتھ یہ احساس بھی ہو کہ ایک گولا حلق سے سر کی طرف اٹھ رہا ہے۔

فاس فورس (Phosphorus): درد سر جو ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے کم ہو جائے اور گرم گرمے میں جانے سے اور گرم اشیاء کے استعمال سے درد میں اضافہ ہو 'دماغ کی بنیاد میں لٹھک کا احساس ہوتا ہے۔

پتھرولیم (Petroleum): گدی میں درد سر جس کے ساتھ مٹلی اور تے کی سخت (خندی) عادت۔

لیکیسیس (Lachesis): عرصہ حیض کے دوران شدید درد سر 'خصوصاً اس وقت بھاؤ بہت سست پڑ جائے 'حیض کے درد کی مانند سر میں بھی درد ہو 'بھاؤ سے اس درد میں اتفاق ہوتا ہے 'بچن والا اور ہتھوڑے پر سے والا درد سر 'خون کے تیزی کے ساتھ سر کی طرف چڑھنے کے ساتھ۔

کونیم (Conium): شراب نوشی کے باعث چکر آئیں اور درد سر لاحق ہو 'تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہوئی اشیاء کو دیکھنے سے تے والا درد سر۔

الیمینا (Alumina): درد سر 'مٹلی اور تے کے ساتھ۔ نزلہ لگ جانے کے باعث درد سر 'ناک ٹنک اور بند ہو 'ناک میں لمبے اور ہنر پٹکے پھنسے ہوں 'ماٹھے میں آنکھوں کے اوپر درد ہونے کے ساتھ پانی کا اخراج ہو۔

سلس کین (Oleum Cani): پیشانی پر ٹھنڈے پیسے آنے پر درد سر میں اضافہ ہو 'بھتا

زیادہ پیسہ آئے نزلہ اتنا ہی زیادہ بڑے اور اسی کے ساتھ درد سر میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔
کھانے سے اتفاق ہو۔

کلکیریا آرسنک (Calcareo Ars): اس دوا کی عجیب علامت یہ ہے کہ جس کروٹ
مریض لیتا ہے اس جانب سے درد دوسری جانب چلا جاتا ہے جس کروٹ دو لیٹا نہیں ہوتا چنانچہ
مریض ہر وقت کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔

امبرا گریسا (Ambra Grisea): درد سر جو نیچے کی طرف دبانے اور پھاڑنے والا درد جو
کپٹیوں سے شروع ہوتا ہے 'درد سر جب ٹاک بہہ رہی ہو' دائیں آنکھ اور پلوں میں جلن
کھانے کے بعد اضافہ ہو جائے۔

فلورک ایسڈ (Fluoric Acid): پیشاب آنے کی خواہش کے پورا نہ ہو سکتے کے بعد درد سر
کالا حق ہو جاتا۔

ایگریکس مس (Agaricus Mus): پیشاب میں قلت اور قبض کے باعث درد سر پاخانہ
کرنے سے اتفاق ہو 'دقوں کے ساتھ کھینچا درد پھاڑنے والا درد جو پیشانی میں ہو۔

الیومن (Alumen): سر پی چوٹی میں درد جیسا کہ آگ جل رہی ہو اور اتنا زیادہ دباؤ ہو کہ
پوں محسوس ہو کہ کھوپڑی پگلی جائے گی 'تخت دباؤ اور برقی ٹھنڈی اشیاء لگانے سے اتفاق ہوتا
ہے۔

ایمونیا کارب (Ammonia Carb): ضعف اعصاب اور گھٹیا کا درد سر 'کپٹیوں میں پھن
ہوئی ہے۔

بویشا (Bovista): دماغ میں گہرائی میں درد ہو اس احساس کے ساتھ کہ سر پھولا ہوا اور بہت
بڑا ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی جیش میں بے قاعدگی ہو اور دل کی دھڑکن بھی درہم برہم ہو اور دل
بھی بڑھا ہوا محسوس ہو۔

کلکیریا کارب (Calcareo Carb): قریب اشخاص میں مزمن درد سر 'چہرے پر ہیبت آئے
کے رتھان کے ساتھ 'سرف کی طرح ٹھنڈا محسوس ہو اور ہاتھ پاؤں نم آلود لگیں۔

لائکوپرسی کم (Leopersicum): سارے سر میں ہی انتہائی شدید درد ہو لیکن آنکھوں کے
پچھے اور کپٹیوں میں تو جم کر بیٹھ جائے اور بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہو 'گرم کرے میں یا
انتہائی گرمی میں 'تباکو کے دھوئیں سے مکمل آرام ہو۔

سر میں پانی (رطوبت) کا بھر جانا، سر میں رطوبت کا اکٹھا ہو جانا

(Hydrocephalus)

(Accumulation of fluid in Head)

ہیڈرا ہیکس (Hedra Helix): ایک قطرہ دیجئے۔ صرف ایک خوراک۔ اگلی صبح ناک میں رطوبت ظاہر ہوگی اسے صاف کر لیجئے اور بس اسی ایک خوراک سے ہی شفا ہو جائے گی۔ اگر دوبارہ عارضہ ہو جانے کا خطرہ ہو تو دوسری خوراک بھی دے دیجئے۔

ایپس ایم (Apis M): تالو میں ابھار ہو، چہرہ سو جا ہوا اور پیلا ہو، مریض لاپرواہ، اونگھنے والا، خاموش ہو، کسی موقع پر ایک تیز چیخ کے ساتھ چونک جائے، چونکنے کے بعد بخار ہو جائے۔
زینک میٹ (Zincum Met): مریض اپنے سر کو گھماتا ہے اور غیند سے بیدار ہو جاتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خوف زدہ ہو، گدی گرم ہوتی ہے، ماتھا ٹھنڈا ہوتا ہے، دانت پڑتا ہے، آنکھیں روشنی سے حساس ہوتی ہیں ایک سی پگ، جیو، ہوئی اور گھورتی ہوئی، ناک خشک ہوتا ہے، سونے کے دوران عضلات میں جھٹکے لگتے ہیں۔

ہیلی بوریس (Helleborus): ذہنی دباؤ اس دوا کی مخصوص اور اہم علامت ہے اس دوا کے مریضوں کی آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ ان کے کان تو ہوتے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ بازو اور ایک ٹانگ خود بخود ہی حرکت کرتے رہتے ہیں۔ سر کو گھماتا اور نکلنے میں سوراخ کرنے کے سے انداز میں گھسٹا اس دوا کی اہم علامت ہے۔ درد سر کی چیخ بھی موجود ہوتی ہے۔ جھٹکے (تھچ) متواتر اور شدید ہوتے ہیں۔ گردن تو بخار ایک ابھرنے والی ہوتی ہے، ہچکچاہٹ کی سوزش کی تکلیف، پیشاب کی بندش ہو جاتی ہے اور آنکھیں روشنی سے متاثر نہیں ہوتیں۔

کلکیریا کارب، کلکیریا فاس (Calcarea Carb, Calcarea Phos): پہلی دوا چلیے مریضوں کی نشاندہی کرتی ہے جن کے تالو کھلے ہوتے ہیں۔ ان کا سر غیر معمولی حد تک بڑا ہوتا ہے، ان کی جلد ڈھیلی اور لٹکی ہوئی ہوتی ہے، سر پر پلینہ ہوتا ہے۔ دوسری دوا کے متعلق سوچتے ہوئے چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا چاہئے جو کمزور اور چھوٹے قد کے ہوتے ہیں۔ یہ بچے چڑچڑے ہوتے ہیں۔ انہیں تمکین چیزوں کی طلب ہوتی ہے، پیٹ کے عضلات اندر کو دھنسنے ہوئے ہوتے ہیں۔

کالی آیوڈ (Kali Iod): سینفی لس کی ہسٹری والے خاندان کے کیسوں میں یہ دوا مفید ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں ہونے والی خود بخود حرکت کے ساتھ بھیجنگا پن، نخس میں دشواری اور

تشیخ (جھٹکے) قلع اور آنکھوں کی پتلیوں کا پھیلا ہوتا ہوتا ہے۔
 • مرک سول (Merc Sol): خسرو اور چوٹکے والے بخار کے بعد سر میں رطوبت کے بھر جانے کا عارضہ ہو، بچہ سر گھماتا ہے اور آہیں بھرتا ہے کراہتا ہے جس کے ساتھ سر پر بھی پھیند ہوتا ہے۔
بیلادونا (Belladonna): بخار کے ساتھ حاد کیسوں میں یہ چوٹی کی دوا ہے، بے ہوشی یا ہڈیان، شدید درد سر، نوز میریخ و آتشیں آنکھیں۔
ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): معاون دوا کی حیثیت سے دی جاسکتی ہے۔
سلفر (Sulphur): خنازیر میں جھٹکا بچوں کے لئے مناسب دوا ہے، ٹھنڈا پھیند آتا ہے، بازوؤں اور ٹانگوں میں جھٹکے لگتے ہیں، پیدائشی مرض والے کیسوں کے لئے۔
اپوسائٹیم کین (Apocynum Can): سر میں پانی کا بھر جانا، ماتھا آگے کو نکلا ہوا ہو، چوٹانی کی سیون کھلی اور پھیند آنے کی حالت میں بے ہوشی ہو، ایک بازو اور ٹانگ کی بلا ارادہ حرکت، ایک آنکھ کی پٹائی جاتی رہے، جسم کے فاضل مادوں کے اخراج میں کمی خصوصاً پیشاب اور پھیند بہت کم آئے۔

پانی سے خوف

(Hydrophobia)

لائے سین (Lyssin): علاج اسی دوا سے شروع کرنا چاہئے۔ ایک خوراک 200 ڈائی لیٹرن کی دی جائے اور اسے 4، 4 گھنٹوں کے بعد دہرایا جائے۔ علامات کے مطابق ادویات حسب ذیل درج کی جارہی ہیں۔

بیلادونا (Belladonna): انتہائی شدید ہڈیان ہو، مریض انتہائی فحش ہوا، مریض مارتا پھینکتا ہے، کانٹا ہے، فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اگر اسے روکا جائے تو کسی بھوت پریت کی طرح سے لڑائی کرتا ہے، گلا خشک، سرخ، صیقل کیا ہوا درد سے بھرا ہو، کھانسی، روشنی اور ٹپنے سے ابھری ہوتی ہے، یہ دوا پہلے درجے کے مرض کے لئے ہے۔

سٹرامونیم (Stramonium): بیلادونا ہی کی طرح کی علامات، البتہ اس میں علامات قدرے ہلکی ہوتی ہیں، سٹرامونیم میں علامات کے اندر اضافہ نہ صرف پانی پینے کی کوشش سے ہوتا ہے بلکہ صرف پانی کو دیکھ لینے سے بھی علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس دوا کی بنیادی اور اہم علامت ہے۔ ہلکی بڑبڑاہٹ والا ہڈیان، یہ دوا مرض کے دوسرے درجے کے لئے ہے، پاگل جانوروں کے کانٹے کے باعث پانی کے خوف کا مرض۔

ہائوسکیمس (Hyoscyamus): جب غیہ میں بہت زیادہ کمی واقع ہو جائے اور گلے کے عضلات میں مسلسل حرکت ہوتی رہے۔

کینٹھرس (Cantharis): شدید غصے والا ہڈیان، دیوانہ پن اور جوش، شدید غصے کے دورے ہوں، اور غصے کے باعث بھونکے، جوشیلا ہو اور پریشان ہو، بے چینی آخر کار غصے پر منتج ہو، حاد جنون، حجرہ کو چھونے اور ٹھنڈا پانی پینے سے تمام علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے، انگلیں میں، وقت ہو، درد کے ساتھ کھنچاؤ اور سکڑاؤ ہو جلن اور خشکی ہو، اونچے درجے کا بخار ہو۔

دماغ میں خون کا غیر معمولی اثر وہام

(Hyperaemia of the Brain)

(Rush of Abnormal Blood to the Brain)

بیلادونا (Belladonna): سرخ چہرے کے ساتھ سر میں ٹپکن والا شدید درد ہو، ٹھنڈی چیزیں لگانے سے یا سر کو اوپر کی جانب اٹھائے رکھنے سے بہتری ہو۔

اکونائٹ این (Aconite N): سر گرم ہو، جلد خشک ہو، نبض تیز، چھوٹی باریک تار کی طرح کی ہو، بے اندازہ بے چینی اور پریشانی ہو، مرض کے آغاز کے متعلق سوچنا چاہئے۔

گلوٹائن (Glonoine): سر میں بھراؤ کی کیفیت کے ساتھ ٹپکن والا درد، سورج کی گرمی اور ہلکے سے درد میں اضافہ ہو۔

جیلسمیم (Gelsemium): دماغ میں خون کا اثر وہام سست ہو، اس کیفیت کے ساتھ کہ سر اندر سے پھولا ہوا اور بھرا ہوا ہو، مریض کند، بے پرواہ ہو اور اس کے چہرے سے بھی لاپرواہی کے آثار ظاہر ہوں۔

ورمیرم ویرائیڈ (Veratrum Viride): دماغ کے بنیاد والے حصہ میں اثر وہام خون، سر گرم ہو، آنکھوں میں خون بھرا ہو، ایک کے دو دو دکھائی دیں، نبض نرم اور سست ہو۔

دورم، سوزش، جلن (اعصابی)

(Inflammation "Neuritis")

اکونائٹ این (Aconite N): سورج کی گرمی یا اچانک جذباتی جوش کے باعث دماغ میں خون کا اثر وہام ہو جاتا، یہ دوا دماغ کی سوزش کے ابتدائی درجے کے مرض کے لئے ہے، شور اور روشنی سے بہتری ہوتی ہے۔

ہیلاڈونا (Belladonna): دماغ میں خون کا اژدہام اور چڑچڑاہٹ جس کے ہمراہ سرگرم ہو اور پاؤں گرم ہوں، گردن کی شریانوں اور سر میں چپکن وار درد۔

گلونائین (Glonoine): یہ احساس کہ جیسے سر بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہے اور خون سے بھرا ہوا ہے، سر کو پیچھے کی جانب جھکانے سے ابتری ہو اور حرکت سے اور سر کو ننگا کرنے سے بہتری ہو۔ ہیلاڈونا میں اور اس دوا میں یہی امتیاز اور فرق ہے کہ ہیلاڈونا میں سر کو پیچھے کی جانب جھکانے سے بہتری ہوتی ہے اور سر کو ڈھانپنے اور حرکت دینے سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔

ہائوسکیمس (Hyoscyamus): سوزش دماغ کے ساتھ ارتعاشی لرز سر میں ہوں جو سر کو ہلانے سے اور سر کو آگے کی جانب جھکا کر پیشے سے بہتر ہوں۔ یہ ہیلاڈونا سے متضاد ہے۔

الیومینا سلیکیٹ (Alumina Silicate): اعصابی درم جس کے ہمراہ درد والے حصوں کا سن ہو جاتا ہوتا ہے۔

مگنیشیا فاس (Magnesia Phos): دماغ میں خون کا اژدہام ہو جائے جب کہ اس سال یک دم بند ہو جائیں، اعصابی درد اور گھٹیا والا درد سر۔

چلنے کی یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی نااہلیت

(Locomotor Ataxia)

(دیکھئے ”فلج“)

گردن توڑ بخار (دماغ کی جھلیوں کا درم)

(Meningitis)

(Cerebro- Spinal Meningitis)

ہیلاڈونا (Belladonna): شدید ہڈیان، بعض تصوراتی اشیاء سے فرار حاصل کرنے کے لئے لڑائی کرے۔ آنکھوں میں خون بھرا ہو۔ گردن کی شریانوں میں تھر تھراہٹ، غنودگی ہو جو اس وقت ختم ہو جب مریض پیچ اٹھے جیسا کہ وہ خوف زدہ ہو گیا ہو۔ شور اور روشنی سے حساسیت ہو۔ نبض تیز اور اچھلتی ہوئی ہو، حرارت اونچے درجے کی ہو، ڈھکے ہوئے جسم کے حصوں پر پیمت ہو، دانت پیسے۔

برائی اونیا (Bryonia): یہ ہیلاڈونا کے بعد بہت اچھا کام کرتی ہے۔ لیکن اسے اس کے بدلے

میں استعمال نہیں کرنا چاہئے۔ یہ اسی صورت میں دی جانی چاہئے جب ہیلاڈونا بخار کو کم کر چکی ہو اور نبض کو نیچے لا چکی ہو، کھانسی ہلکی ہو جائے، یہ گھٹیاوی مریضوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ سن ہو جانے کا احساس ہوتا ہے مریض بودا اور احسق دکھائی دیتا ہے۔ گردن میں اکڑن ہوتی ہے، بیٹ پھولا ہوتا ہے۔

ایپس ایم (Apis M): تپ دق والا گردن توڑ بخار یا حاد دماغی ریزش جس کا باعث خارش و پھوڑے پھینچوں کا دب جانا یا پوری طرح باہر نہ آنا ہو۔ مریض تیز چیخوں کے ساتھ دوران نیند روتا چلاتا ہے۔

ہیلی بوریس (Helleborus): جب پیشانی شکن آلود ہو، آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئی ہوں اور نچلے جڑے میں نیچے گرنے کا رجحان ہو تو یہ دوا دی جائے۔ ایک بازو اور ایک پاؤں میں خود بخود حرکت ہوتی رہے۔ پیشانی پر ٹھنڈا پھیندے آئے۔ مریض پانی پینے کے لئے بہت زیادہ لالچ کا مظاہرہ کرے اور جیسے ہی اس کے منہ میں پانی والا چمچ ڈالا جائے وہ دانتوں سے چمچ کو پکڑ لے۔ آنکھیں روشنی سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتیں۔ مکمل بے ہوشی ہوتی ہے۔ تپ دق والا گردن توڑ بخار، مکمل یا نیم بے ہوشی۔ سستی۔

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): اس دوا کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہئے اور اسے مرض کے آغاز میں ہی دینا شروع کر دینا چاہئے۔ یہ بنیادی دوا ہے اور تپ دق والے گردن توڑ بخار کا جس طرح سے علاج کرتی ہے اسی طرح یہ اسے روکتی بھی ہے۔ صرف ایک خوراک 200 ڈائی لیٹن کی دیکھئے اور 6 سے 12 گھنٹوں تک کوئی دوا نہ دیجئے یہاں تک کہ مریض کی حالت تبدیل ہو کر کسی دوسری دوا کی طلب ظاہر کرے۔

کیوپریم میٹ (Cuprum Met): جب مریض اونچی آواز میں چیخیں مارے جس کے بعد شدید قسم کے تشنجی جھٹکے شروع ہو جائیں۔ انگوٹھے پہنچ جائیں، چہرہ زرد پڑ جائے جبکہ ہونٹ نیلے ہوں، آنکھوں کے ذیلے مسلسل کھومتے رہیں۔

ہائیوسکیمس (Hyoscyamus): اس دوا کی علامت یہ ہے کہ تشنجی جھٹکے ختم ہو جانے کے بعد مریض بوسے پن کے ساتھ لیٹا ہوتا ہے اور حواس باختہ ہوتا ہے اور ذہنی ہدیان میں مبتلا ہوتا ہے۔

گلوٹائین (Glonoine): دماغی سوزش کے باعث چیخ (جیسا کہ ایپس میں ہوتا ہے) اس احساس کے ساتھ کہ سر بے انتہا بھیل چکا ہے۔ تشنجی تپے سر میں اڑدہام خون اور تھر تھرہٹ کے ساتھ دھوپ یا لو لگ جانے کے باعث گردن توڑ بخار کا لاحق ہو جاتا۔

زنکم میٹ (Zincum Met): دماغی سوزش (ورم) میں یہ دوا کارآمد ہے۔ بچہ خوف سے

جاگ جاتا ہے۔ اپنے سر کو گھماتا ہے، پھینک مارتا ہے اور نیند میں چونک جاتا ہے۔ یہ دوا ایسے بچوں کی نشاندہی کرتی ہے جو قلت دم کے عارضہ میں مبتلا ہوں اور جن میں پھوڑے پھینکوں کا رجحان ہو۔

سیکیرٹا وائروسا (Cicuta Virosa): گردن توڑ بخار کے ہمراہ تشنجی جھٹکے ہوں اور بازوؤں اور ٹانگوں اور تمام جسم میں خوفناک توڑ پھوڑ ہوتی ہو۔ ساتھ ہی حواس بھی غائب ہو جائیں، پیچھے کی جانب مڑنے کے رجحان کے ساتھ تشنجی جھٹکے، معمولی سے چھو جانے سے جھٹکے دوبارہ شروع ہو جائیں۔ شور اور جھٹکے سے ہلانے پر بھی دورہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔

مرکیورس سول (Mercurius Soli): دماغ کی پھلیوں کی سوزش، زخم والے حصہ کی ریزش کے ساتھ۔ حرام مغز کی پھلیوں کی سوزش، کان سے مواد کے اخراج میں بندش کے باعث لاحق ہو، اس دوا کے استعمال سے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر کان سے دوبارہ مواد کا اخراج شروع ہو جاتا ہے جبکہ دماغ کی پھلیوں کی سوزش کی تمام علامات غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔

اکونائٹ (Aconite): سوزش دماغ جو غصے یا دھوپ کے اثر سے دماغ میں اثر دہم خون کے باعث لاحق ہو۔ خوف کے ساتھ بخار ہو، بے چینی ہو، جلد خشک ہو اور بے انتہا پیاس ہو۔

جلسیم (Gelsemium): عضلاتی قوت کا مکمل طور پر یا نیم مکمل طور پر جاتے رہتا، اسی طرح سے پٹائی اور قوت گویائی کا مکمل یا نیم مکمل طور پر جاتے رہتا، قے ہو، عظیم غصہ ہو، اشتعال ہو، سر میں تھر تھراہٹ والا درد ہو، ٹھکی ہو، نبض ست ہو، تنفس میں اتھری ہو۔

ورمٹرم ورائیڈ (Veratrum Verde): جسم میں خشکی ہو، بے ہوشی لاحق ہو جائے، آنکھوں کی پتلیاں پھیل جائیں، خشکی ہوئی بے قاعدہ اور ست نبض ہو، تشنجی جھٹکے ہوں اور سر میں خون کا اجتماع ہو۔

گروتالیس ہور (Grotalus Hor): چونکنے والا بخار، بازوؤں اور ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، درد سر شدید ہوتا ہے، ہڈیاں ہوتا ہے، آنکھیں کھلی اور چہرہ سرخ ہوتا ہے۔

اوپیم (Opium): تشنجی جھٹکے، غم، دہشت، خوف کے باعث بے ہوشی، جسم کروٹوں میں گھومتا رہتا ہے۔

سلفر (Sulphur): تپ دق والا گردن توڑ بخار، ماتھے پر ٹھنڈا بیٹہ ہو، بازوؤں اور ٹانگوں میں جھٹکے لگیں، تشنجی جھٹکے ہوں، پیشاب بند ہو جائے۔

آئیوڈین (Iodine): تپ دق والے گردن توڑ بخار میں یہ دوا مفید ثابت ہوتی ہے۔

کلیکریا کارب (Calcarea Carb): ہلکی مزاج کے مریضوں کے لئے مناسب دوا ہے، سر بڑا ہو، ناکو کھلا ہوا ہو، چہرہ زرد ہو، بیٹہ بڑا ہو۔

درد شقیقہ (آدھے سر کا درد)

(Migraine)

(نیز دیکھئے "درد سر")

سکیو ٹیلریا (Scutellaria): جوش اور بے انتہا تھکاوٹ کے باعث سر کا اعصابی درد "متواتر" لیکن کم مقدار میں پیشاب آئے 'ہر ٹھنجر کے پانچ قطرے دیجئے۔
ٹونگو (Tongo): درد شقیقہ اور اعصابی درد کا عارضہ۔

چرو تھس (Chionanthus): تیزابیت اور جگر کی سستی کے باعث درد شقیقہ لاحق ہو۔
ڈامیانہ (Damiana): درد شقیقہ کے لئے ایک عمدہ دوا ہے 'ہر دو گھنٹوں کے بعد ہر ٹھنجر کے 15 سے 20 قطرے دیئے جائے چائیں 'تخت قسم کے کیسوں میں ہر آدھے کے بعد دوا دی جائے اور دونوں خوراکیوں کے بعد مریض سو جائے گا۔

گلکیریا لیک (Calcarea Lac): ٹی بی اور ذاتی ایستے سس میں یہ دوا مفید ہے۔ 3x ذاتی لیوشن کی خوراک دیجئے۔

آئرس وی (Iris V): معیادی اعصابی درد سر 'مریض جب ذہنی تھکاوٹ کے بعد سکون حاصل کرتا ہے تو اس کے بعد یہ درد لاحق ہوتا ہے۔ سکول کے ساتھ میں یہ درد ہفتہ یا اوار کو لاحق ہوتا ہے۔ مہلین میں یہ درد پیر کو لاحق ہوتا ہے۔ مریض کو کھٹے صفراوی مواد کی تہ ہوتی ہے اور تہ کے بعد درد میں افادہ ہوتا ہے 'آنکھ کا درد شقیقہ 'قبض کے ساتھ ہو 'چیزیں آدمی آدمی دکھائی دیتی ہیں۔

سائیکلے من (Cyclamen): اگر آئرس وی ناکام ہو جائے تو یہ دوا آزمائی جائے 'اس میں درد شقیقہ کے ساتھ آنکھوں کے سامنے چنگاریاں چھوٹی ہیں۔

کانیا (Coffea): غیند عاتب ہو جانے کے باعث جو درد سر ہوتا ہے اور جس میں بے خوابی کے بعد طبیعت میں جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ اس مرض کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔

اگنیشیا (Ignatia): جب ہسٹریائی مریضوں میں غم کے باعث درد شقیقہ لاحق ہو 'جب پیشاب تواتر کے ساتھ آئے 'تیز ہماؤ کے ساتھ ہو یا قلت کے ساتھ ہو۔

بیلادونا (Belladonna): دموی یا صحت مند اشخاص میں درد سر 'دوران خون کے نظام میں خلل واقع ہو جانے کے باعث یہ درد سر لاحق ہوتا ہے۔ درد سر شدید و ممکن اور چکن والا ہوتا ہے۔

آئرس ٹینکس (Iris Tanax): درد سر ہر ہفتہ کے روز طلوع آفتاب سے قبل شروع ہو '

بائیں آنکھ سے شروع ہو کر سر کے سارے بائیں طرف والے حصے میں پھیل جاتا ہے۔

مانی لی ٹیز (ریڑھ کی ہڈی کا ورم یا سوزش)

(Myelitis)

(Inflammation of the Spinal Cord)

(نیز دیکھئے "قلج")

بیلادونا (Belladonna): جب کہ ریڑھ کا اوپر والا حصہ متاثر ہو۔ گولی گلنے اور چھرا گھونپنے کے سے درد ریڑھ کی ہڈی میں ہوتے ہیں۔ عضلات میں پھڑکن ہو جیسے کہ بجلی کے شرارے پھو گئے ہوں، اونچے درجے کا بخار ہو۔

برائی اونیا (Bryonia): ریڑھ کی سیون میں درد ہو۔ ریڑھ کی ہڈی میں پھاڑنے والے درد ہوتے ہیں، حرکت سے دردوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عضلات میں سختی ہو اور سن ہو جائیں۔
آرنیکا ایم' ہائپیری کم (Arnica M, Hypricum): ریڑھ کی ہڈی پر کسی چوٹ کے لگ جانے یا زخم کے باعث ریڑھ کی ہڈی میں درد اور سوزش ہو جائے، معمولی حرکت سے درد ہو، چھونے سے اتھا اور سبے کی حساسیت ہو، کھڑے ہونے یا چلنے کی کوشش سے بھی خوف کھائے۔
پلمبم (Plumbum): ریڑھ کی ہڈی میں بہت زیادہ درد ہو، بخار بھی ہو اور تشہی جھٹکے بھی ہوں۔

آکسلیک ایسڈ (Oxalic Acid): ٹانگوں میں کھنچاوت اور درد۔
سیکوتھائو وروسا (Cicuta Virosa): جب مریض چھین مارے تو سخت تشہی جھٹکے لگیں۔
کیوپریم آرس (Cuprum Ars): اینٹھن (کزل) ہو جسے پاؤں دہلنے سے افادہ ہو، ٹانگ میں سن ہو جانے اور قلج کا سا احساس ہو، پیشاب کرنے کی متواتر خواہش ہو۔
سٹرکینیا فاس (Strychnia Phos): ریڑھ کی ہڈی کی سوزش جس کے ساتھ چکنائی کے عارضہ میں تلانی کے دوران رکاوٹ آجانے کے باعث دل میں چکنائی کا بگاڑ شروع ہو جائے۔
ایلیومنا سلیکیٹ (Alumina Silicate): دماغ اور ریڑھ کی ہڈی میں خون کا اثر دہام ہو اور ریڑھ کے اعصاب میں نمایاں جلن ہو اور ڈنک گئے جیسے درد ہوں۔

اعصاب — (Nerves)

سن ہو جانا

Numbness (Anesthesia)

(نیز دیکھئے "انگیوں کا سن ہو جانا" "متفرق" کے ذیل میں)

اکونائٹ (Aconite): سن ہو جانا اور جھنجھناہٹ 'یہ دوا مرض کے آغاز میں دی جاتی ہے۔
پلائٹینا (Platina): سن ہو جانے کا احساس چھوٹی جگہوں کے لئے 'سر میں چھوٹی جگہوں کے سن ہو جانے کا احساس 'خصوصاً صبح سویرے بستر میں 'دانتوں کا سن ہو جانا 'زبان میں ریگن ہو 'ہٹھنے کے دوران ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے کے سن ہو جانے کا احساس 'پکپکاہٹ 'سن ہو جانے 'ریگن اور اینٹھن کے دوروں کی شکایات۔

ہائیڈروسیانک ایسڈ (Hydrocyanic Acid): اچانک اور مکمل طور پر حساسیت کا گم ہو جانا۔

کوکا (Coca): اندرونی ٹھنڈک کے ساتھ ہاتھوں اور پاؤں کا سن ہو جانا 'ہاتھوں اور پاؤں کی کمزوری۔

آرسینک (Arsenicum): سن ہو جانے کے ساتھ ہاتھوں اور پاؤں میں ریگن کا احساس۔
مارفین (Morphinum): ٹانگیں اور پاؤں سن ہو جائیں جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ جوں ہی مریض کھڑا ہونے کی کوشش کرے گر جائے 'پائیں پاؤں کے تلوے میں ہر فلی ٹھنڈک ہو 'بھڑکن بھی ہو۔

میڈیسیم (Mezereum): فالجی کمزوری بازوؤں میں ہو 'ٹانگیں اور پاؤں سو جائیں۔
جلیسیم (Gelsimium): بازوؤں کا سن ہو جانا اور بازوؤں کی کمزوری 'فالجی عارضہ 'عضلات کمزور ہوں اور مریض کے ارادے کو پورا نہ کر سکیں 'مکمل فالجی کیفیت کے ساتھ جو چلنے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے سے مریض کو عاجز کر دے 'پورے عضلاتی نظام کا دھڑن تختہ ہو جائے۔

ایگریکس ایم (Agaricus M): جسم کے حصے ٹھنڈے اور ٹپے پڑ جائیں 'اور یوں محسوس ہو جیسے مردہ ہو چکے ہیں بلکہ جم چکے ہیں 'چیونٹیوں کے ریگننے کا احساس۔

سکیل کور (Secale Cor): انگیوں کا سن ہو جانا اور انگیوں کے پوٹوں میں سونپیاں چبھنے کا

احساس 'من ہو جانا' غیر حساسیت اور ٹھنڈے پن کا احساس، کیڑوں کے ریگنے کا احساس، گرمی سے اتھری ہو۔

لیکچے سس (Lachesis): ہاتھوں اور انگلیوں کا من ہو جانا، صبح سویرے جاگنے پر نسون میں سکڑنا ہو ایسے مریضوں میں جو باتنی ہوتے ہیں۔ دوران شب اتھری ہوتی ہے یا صبح سویرے اتھری ہوتی ہے، جوں جوں دن گزرتا ہے بہتری ہوتی رہتی ہے، گرمی سے اور سونے کے بعد اتھری ہوتی ہے۔

آکسلیک ایسڈ (Oxalic Acid): کمر اور بازوؤں اور ٹانگوں کا من ہو جانا، انگوٹھے کے گولے میں من ہو جانے اور سوزش کا احساس، کندھے سے انگلیوں تک من ہو جانا۔
پلمبم (Plumbum): مردگی اور بے حسیت خصوصاً دائیں جانب میں، اعضاء کی فعالیت میں کمی آجائے، اعصاب اپنا پیغام بجلی کے کوندے کی سی تیزی سے نہ پہنچا سکیں، جلد کا من ہو جانا۔

سیکیو ٹائوڑوسا (Cicuta Virosa): قلع کے ساتھ بازو اور ٹانگیں من ہو جائیں، تمام جسم کا من ہو جانا، ہاتھوں کا ٹھنڈا ہو جانا۔

اگنیشیا (Ignatia): چلنے کے دوران ایڑھیاں من ہو جائیں اور ٹھنڈی پڑ جائیں۔
کونیم (Conium): سارے جسم میں من ہو جانے کا احساس، عظیم نقاہت، کیکپاہٹ، عضلات میں جھٹکن اور پھڑکن ہو۔

رافانوس (Raphanus): ہاتھوں اور پاؤں کے ٹکڑوں کا من ہو جانا۔
بوٹو (Bufo): جلد پر بے حس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں۔

کیڈمیم سلف (Cadmium Sulph): بازوؤں اور ٹانگوں کے پٹھوں میں اور جلد میں گھرائی میں چوٹیوں کے ریگنے کا احساس، جسم کے حصوں میں چھوٹی چھوٹی جگہوں کا من ہو جانا۔
امبرا گریسیا (Ambra Grisea): جسم کے تمام حصوں کی حساسیت کم ہو جائے، دوران خون سست ہو جائے، موسیقی برداشت نہ ہو، دکھن ہو، ٹھنڈ لگے، کیکپاہٹ ہو اور بازوؤں اور ٹانگوں میں خنکی ہو۔

الیومینا (Alumina): اعصاب کی پیغام رسانی کی صلاحیت میں خلل واقع ہو جائے چنانچہ ہاتھوں اور پاؤں میں ایک سوئی چھوئی جائے تو کچھ احساس نہ ہو پھر دوسری سوئی چھوئی جائے تب بھی کوئی احساس نہ ہو اسی طرح مزید سوئیاں چھوئے سے بھی احساس نہیں ہو تا، پاؤں کے ٹکڑوں کا من ہو جانا، دیگر اعضاء کے ساتھ بازوؤں اور ٹانگوں کے اعصاب کے تعلق نہ رہے۔
فاسفورس (Phosphorus): جب مرض کی وجہ جلتی ہو، یا چٹک وغیرہ کا مرض ہو، سوئیاں

چھیننے کے احساس کے ساتھ جسم کا سن ہو جانا، بازوؤں اور ٹانگوں کا سن ہو جانا اور بے حس ہو جانا، اور انگلیوں کے سروں کا سن ہو جانا یا بے حس ہو جانا۔

ضرورت سے زیادہ حساسیت

(Oversensitiveness)

(Hyperaesthesia)

کافیا (Coffea): بچوں میں غیر ضروری حساسیت، زچگی کے بخار میں جس کے ساتھ بازو اور ٹانگیں ٹھنڈی ہوں، معمولی سی حرکت کا احساس بھی بہت زیادہ ہو، چھوئے جانے اور شور سے زود حس ہو، بیٹائی کی حساسیت، سنے کی حساسیت، سوتگھنے، چھوئے جانے کی حساسیت ہو، شور سے دردوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، زنانہ اعضائے تناسل کی بہت زیادہ بڑھی ہوئی حساسیت، اکثر یہ حساسیت جماع میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے، جس کی وجہ اندام نسائی کا گرم ہونا اور حساس ہونا ہوتی ہے۔

چیموملا (Chamomilla): جب کافیا ناکام ہو جائے تو اس کی نشاندہی کی جاتی ہے، درد کی زود حس، جسم چھوئے سے درد کرنے کے ساتھ حساس ہو، چھوئے سے جسم کے سارے ڈھانچے میں کپکپی دوڑ جائے، پھڑکن اور اینٹھن ہو۔

اسارم یور (Asarum Eur): انگلی یا ناخن سے لینن یا ریشم کے کپڑے کو کھچتا، کانٹہ کی کھڑکھڑاہٹ، یا اسی قسم کی آوازیں یا افعال بہت ہی ناگوار احساس کو جنم دیتے ہیں۔ کوئی بھی جذبہ پیدا ہو جو مریض کو ٹھنڈک کے ساتھ کپکپاہٹ میں مبتلا کر دے، تصور کرے کہ وہ ایک روح کی مانند فضا میں معلق ہے۔ زمین پر چلتے زمین پر کھٹکتے کا احساس۔

نکس وامیکا: (Nux Vom): بیرونی اثرات مثلاً روشنی شور اور خوشبو سے زود حس۔ بیلاڈونا: (Belladonna): معمولی ہلنے یا شور سے زود حس ہو۔ معمولی ہلنا یا شور برداشت نہ کر سکے۔ کھوپڑی حساس ہوتی ہے، مریض بالوں میں، برش یا کٹھنسی نہیں کرنا چاہتا۔

سلفر: (Sulphur): بدبوؤں سے زود حس ہو البتہ گندی چیزیں کھائے اور نگل جائے۔ تھیرائیڈین: (Theridion): حساسیت ایسی ہو کہ درد کرنے والی تھر تھراہٹ جسم میں لہروں کی طرح گزرے جس کے بعد متلی ہو۔ شور سے متلی اس مرض میں بہت عجیب علامت ہے۔

ہیمپر سلف: (Hepar Sulph): نقوش (تاثرات) سے، ماحول سے اور درد سے زود حس، سڑی سے زود حس جیسے برداشت نہ کر سکے، غیر معمولی گرم کمرہ پسند کرے، نازک مزاج مریض۔

لیک کینٹنم: (Lac Can) زود حسی 'روشنی اور شور کی حساسیت' پر جسے وقت صفحہ ساف معلوم نہ ہو، مریضہ اندھیرے میں اپنے سامنے چہرے دیکھے۔

نکس وامیکا: (Nux Vom) بیرونی اثرات سے زود حسی ہو، 'روشنی' 'شور' 'ٹوشیو' ہوا سے زود حسی ہو۔ کم سے کم جھونکے نیز مریض کو اپنے ماحول سے بھی زود حسی ہو۔ اپنی خوراک کے متعلق بہت زیادہ ذکی الحس ہو۔ کئی قسم کی خوراک اس کے لئے غلط انداز ہو۔ تحریک وغیرہ پیدا کرنے والی اشیاء کی طلب رہے۔ یہ محرک اشیاء اسے چست رکھتی ہیں۔ مریض چہ چڑا اور زود درج ہوتا ہے۔ گوشت سے بے زاری ہو کیونکہ گوشت اس کی تکلیفات میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر اس کے راستے میں کوئی کرسی آجائے تو وہ اسے ٹھوکر مار کر راستے سے ہٹائے یا کپڑے اتارتے ہوئے اگر لباس کا کوئی ٹن کھلنے میں دقت پیدا کرے تو وہ بغیر ٹن کھولے لباس کھینچ کر اتارے، ایسا کرتے ہوئے بعض اوقات اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ ناقابل مزاحمت چہ چڑا بن۔ اپنے مزاج کے مطابق دوسروں پر بھی چیزیں مسلط کرے۔ اگر کسی چیز کے متعلق یا کسی بات کے متعلق کوئی تفصیل بیان کرے تو غصے میں آجائے اور اس کو ترک کرنا چاہے۔ چیزوں کو پھاڑ ڈالے۔ لعنت ملامت کرے۔ اپنے گھر جائے تو ان چیزوں کے متعلق اپنے گھر والوں سے بھی باتیں کرے اور انہیں سب کچھ بتائے، مریض جھگڑا کرے، سرزنش کرے، لعنت ملامت کرے، حسد کی باعث توہین کرے اور یہ سب کچھ کرنے کے فوراً بعد چلائے اور بلند آواز کے ساتھ روئے۔

آرسنک الیم: (Arsenic Alb) سو ٹکھنے سے اور چھونے سے حساسیت ہو، کمرے کے ماحول سے زود حسی ہو، اشتادہ جے کا نازک مزاج، چاہے کہ کمرے میں ہر چیز ترتیب کے ساتھ رکھی ہو۔

کوکولس: (Cocculus) سن ہو جانے کا اور فالجی کیفیت کا احساس ہو بازوؤں میں، ایک وقت میں ایک ہاتھ سن ہو جیسا کہ سو گیا ہو اور دوسرے وقت میں دوسرے ہاتھ کی یہی کیفیت ہو۔

سیلیشا: (Silicea) کام کرنے کے دوران ہاتھ اور پاؤں سو جائیں۔ شور سے حساسیت ہوتی ہے۔

الیومینا سلیکیٹ: (Alumina Silicate) انفرادی حصص کا سن ہو جانا اور درد کرنے والے حصص کا سن ہو جانا۔ گرمی کی لہروں کا یکایک سر کی طرف جانا اور گرمی کا تیزی کے ساتھ سر کی طرف جانا پایا جاتا ہے۔

ہائیوسکیمس: (Hyoscyamus) جلد کے اعصاب کی زود حسی جس کے نتیجہ میں مریض

کے اندر بٹکا ہونے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔
اوپیم: (Opium): شور سے زود حسی، مریض دیوار پر چلنے والی مکھی کی آواز سن لے اور دور سے گھڑی کی ٹک ٹک بھی سن لے۔
بیوفو: (Bulo): جلد پر مخصوص گھڑوں کی بڑھی ہوئی حساسیت، جبکہ دیگر حصے میں سہل ہو جانے کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔
پلمبرم: (Plumbum): حد اعتدال سے بڑھی ہوئی جلد کی حساسیت جس کے ساتھ قارچ اور طاقت میں کمی بھی پائی جاتی ہے۔ وہ چھوئے جانے کو برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ چھوئے جانے سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ حاد امراض میں بڑھی ہوئی حساسیت ہوتی ہے اور مزمن امراض میں جلد کی بے حسی ہوتی ہے۔
تھیرائیڈین: (Theridion): اعصابی زود حسی، لینن اور ریشم کے کپڑوں کی دگر سے بھی خراشیں پڑ جائیں۔ کالہ کی کمر کھڑا ہٹ ناقابل برداشت ہو۔ آنکھیں بند کرنے پر علامتوں میں اتاری واقع ہو۔
گرافٹس: (Graphites): سردیوں میں سردی سے اور گرمیوں میں گرمی سے حساسیت ہو۔

درد اعصاب (درد جو اعصاب پر اثر انداز ہو)

(Nevralgia)

(Pain Affecting Nerves)

آرسینکیم ایلبم: (Arsenicum Alb): جب اس کی وجہ ملیریا ہو اور دورے باقاعدہ وقفوں کے ساتھ آئیں۔ جلن اس مرض کی مخصوص علامت ہے۔ بائیں آنکھ کے حلقہ چشم کے اعصاب اور بائیں جانب کے عرق النساء کے اعصاب تواتر کے ساتھ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔
مگنیشیا فاس: (Magnesia Phos): یہ دوا دائیں جانب کی ترجیحی دوا ہے۔ یہ دوا اعصابی فراہمی کے کسی بھی حصہ کو متاثر کر سکتی ہے۔ مثلاً آنکھ کی کلن کی 'رحم' (بیضہ دان) کی یا ٹانگ کی۔ یہ دوروں کی دافع دوا ہے۔ عضلات کی سکڑن کے ساتھ بے تحاشہ درد ہو، گرم اشیاء لگانے، دبانے اور اندھیری جگہ چلے جانے سے بہتری ہوتی ہے۔
اگیریکس ایم: (Agaricus M): یہ دوا چہرے کے عضلات میں اضطرابی حرکت والے اعصابی درد کے لئے مفید ہے یا چہرے کے اعصابی درد کی کوئی بھی صورت ہے یہ ایک مفید دوا ہے، درد پھاڑنے والے، بھلا لگنے جیسے تیز اور بیشہ شدید ہوتے ہیں۔ معمولی چھوٹے سے درد

میں شدت آ جاتی ہے۔ ان دردوں کے ساتھ ہمیشہ عضلات کی پھڑکن ہوتی ہے۔ جن عضلات میں پھڑکن ہوتی ہے ان کے ریشوں میں سختی ہوتی ہے اور وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔
بیلادونا: (Belladonna): جب حملے اچانک ہوں اور اچانک ہی رفع ہو جائیں 'شور سے' روشنی سے اور چوٹ سے اور ہوا کے جھونکے سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے۔ چہرے کا سر 'عصبی' درد اعصاب 'جڑے' کے دائیں جانب کے اوپر والے اور نیچے والے حصہ میں تیز کانٹے والے درد۔

کیموملا: (Chamomila): اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے اس وقت جب مریض کا ہر عصب مارفین 'کوکین' یا حتیٰ کہ کافی کی طلب میں پھنسا رہا ہو جس سے کہ وہ محروم ہو چکا ہو۔ ناقابل برداشت درد کے لئے یہ دوا مفید ہے۔ دانت کے درد اور رحم کے درد کے لئے۔

ارجنٹم میٹ: (Argentum Met): جوڑوں میں پھاڑنے اور چیرنے والے درد ہوں جن کے ساتھ اعصاب میں اور کمری ہڈی میں بھی درد ہو۔ ٹھنڈے 'مرطوب' اور طوفانی موسم کے دوران مرض میں زیادتی ہو۔ حرکت سے بہتری ہوتی ہے۔ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ باوجود تھکاوٹ کے مریض کو چلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔

ارجنٹم نائٹ: (Argentum Nit): چلتے وقت یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے ٹانگوں کے نچلے حصہ میں پھاڑنے والے 'پر جھکی گئے' اور گولی گئے جیسے درد ہوں۔ مریض ٹھنڈی ہوا 'ٹھنڈے کمرے' اور ٹھنڈے مشروبات جیسے آئس کریم وغیرہ کی خواہش کرے۔ گرمی سے ابتری ہو۔

سٹانم میٹ: (Stannum Met): اعصابی درد جو آہستہ آہستہ بڑھیں اور آہستہ آہستہ کم ہو کر ختم ہو جائیں۔ کسی بھی کام کے کرنے سے نفرت ہو۔ اگر درد دب جائیں تو اس کے نتیجے میں سل ہو جائے۔ یہ عورتوں کی دوا ہے۔ جہاں شدید قسم کا اعصابی درد رک جائے اور پھر زیادہ مقدار میں پیلا 'سبز لیکوریا' شروع ہو جاتا ہے اس طرح سے وہ انہیں سل سے محفوظ کر لیتا ہے۔

کالو سنٹھس: (Colocynthis): پیٹ کے اعضاء کے اعصاب پر بہترین عمل کرتا ہے۔ کانٹے والے 'مروڑنے والے اور پیٹنے والے درد ہوتے ہیں۔ دبائے سے 'تیز تیز چلنے سے اور چمچل قدی سے بہتری ہوتی ہے۔ یہ اعصابی درد کچے پھلوں کے کھانے سے 'مخلوط مشروبات خصوصاً ٹھنڈے مشروبات پینے سے پیدا ہوتے ہیں۔ سر کا اعصابی درد آنکھوں کا 'پشت کے نچلے حصہ کا اور آنکھوں کا اعصابی درد 'غصے اور بد مزاجی کے بعد ہو۔ بعض کیسوں میں 'متاثرہ حصوں کا سن ہو جانا' ان میں سونپوں کا چھنا اور جھنجھٹا ہٹ جیسے چیزیں چل رہی ہوں پانی پانی ہے۔ بائیں

جانب کا عرق انشاءً جس کے لئے 200 ذائقہ لیوٹن استعمال کیا جاتا ہے۔

چائنا آف: (China Off): اعصابی درد ہو جس کی وجہ بار بار کا اخراج خون، طویل عرصہ تک مسلسل دودھ پلانا یا میعادہ بخار کے بار بار کے حملوں کا ہونا ہو۔ اس دوا کی نشاندہی اس وقت کی جاتی ہے جب درد حلقہ چشم کے زیریں حصہ میں ہو اور جڑے کی ہڈی کے بالائی حصہ کی شاخوں کے پانچویں عصب میں ہو۔ درد میں زیادتی معمولی سے چھو جانے یا ہوا کے جھوکے سے ہوتی ہے۔ یہ درد دورہ والا ہوتا ہے یہی اس کا مخصوص نشان ہے۔

تھوچا: (Thuja): سوئیاں چھوئے جانے کا ساشدید درد جس کے ساتھ اعضاء میں اور دانتوں میں بھی درد ہوتا ہے نیز اس کے ساتھ منہ میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے اور بالائی ہونٹ میں پھڑکن ہوتی ہے۔ چہرے کے بائیں جانب کا اعصابی درد۔

زینتھو آگزاٹلم: (Xanthoxylum): بازوؤں اور ٹانگوں میں ہر کہیں گولی لگنے کا ساعصابی درد ہوتا ہے جیسے بجلی کے جھٹکے لگ رہے ہوں۔ رحم کا اعصابی درد۔

میزیریئم: (Mezereum): آنکھوں کی پلکوں کے اعصابی درد کے لئے مفید دوا ہے۔ جس کے بعد ہونٹوں اور حلقہ ہائے چشم میں کھجلی ہو۔ اس کی وجہ دانت کا سڑنا ہو، درد والے حصہ میں سن ہو جانے کا عارضہ بھی ہوتا ہے۔ رخساروں کے عضلات کی پھڑکن بھی اس کی ایک مخصوص علامت ہے۔ گرمی اور پھونے سے مرض میں اتھری ہوتی ہے۔

فاسفورس: (Phosphorus): یہ دوا چہرے کے ہتھکانی درد کے لئے ہے، جب اس درد کی زب نسبت زیادہ ذائقہ سخن یا جوش ہو، درد جلنے والے، پھاڑنے والے اور کھینچنے والے ہوتے ہیں، چہرے کے عضلات کی ہر حرکت درد میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اس درد کے ہمراہ غشی اور ہر قسم کا شور ہوتا ہے۔

برائی اونیا: (Bryonia): اس کا تعلق دائیں بازو کی کلاکی کی سب سے نیچے والی ہڈی کے عصب کے ساتھ ہے۔ ضرورت سے زیادہ تھکاوٹ اور حرکت درد میں اضافہ کر دیتی ہے۔ بازو میں کہنی سے اوپر دھکن والا درد ہو، غیر معمولی سردی لگنے کے ساتھ اعصابی درد ہو، غصہ اور بد مزاجی کے بعد۔

نیرم میون: (Natrurn Mur): جب دورہ رات 9 بجے سے 11 بجے کے دوران لوٹے، خدی قسم کی قبض اور جلد کی خشکی موجود ہو، سائل سمندر پر اور ٹمک زیادہ استعمال کرنے سے درد میں اتھری ہو۔

کیپسکیم، پلساٹیل، ورباسکم: (Capsicum, Pulsatilla, Verbascum): کان کے درد کے لئے۔

آرنیکا ایم، شیئی سیکریا، پلانٹاگو: (Arnica M. Staphisagria, Plantago) دانت درد کے لئے۔

سکوتیلریا: (Scutellaria) سر کے اعصابی دردوں کے لئے۔

کالی سائی نیٹم: (Kali Cyanatum) ٹینشن والے حصہ میں 'پلکوں کی خرابی میں اور جڑے میں اذیت ناک درد' اوپر والے جڑے کی دائیں جانب کے درد کا بھی اس دوا سے علاج کیا جاتا ہے، دماغ کی رسوبی کے باعث پیدا شدہ بے لگام سر کا درد ہو تو 1000 یا اس سے اوپر والی طاقتوں کی خوراکیں دی جائیں۔

کالی آیوڈ: (Kali Iod) سرد کھٹے کے ساتھ بائیں آنکھ کے اوپر اعصابی درد ہو۔

مگنیشیا کارب: (Magnesia Carb) منگی کے ساتھ دانت کا درد، حاملہ عورتوں میں ہوتا ہے۔

سپائی جیلیا (Spigelia) بائیں جانب کا اعصابی درد، بائیں آنکھ میں، بائیں حلقہ چشم میں اور بائیں بازو کے اعصاب میں درد ہو۔ درد گولی گلتے جیسے جلن دار، پھاڑنے والے ہوتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ چہرے اور گردن میں سے گرم کی ہوئی سوئیاں گزاری جا رہی ہیں۔ گردن اور کندھے کے دردوں میں گرمی سے بہتری ہوتی ہے۔ آنکھوں کے درد ٹھنڈک سے آرام پاتے ہیں۔

رٹھاکس (Rhus Tox) جسم کو ٹکا کرنے اور پیوند آنے کے بعد پانی میں بھیگ جانے کے باعث پیدا شدہ اعصابی درد، درد میں بہتری جسم کی پہلی حرکت پر ہوتی ہے لیکن مسلسل حرکت سے بہتری ہوتی چلی جاتی ہے یا پھر چلتے رہنے سے بہتری ہوتی ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vom) شراب نوشی یا شراب کے بد اثرات سے پیدا شدہ اعصابی درد۔ درد شدید، غضب ناک، بدترین، کانٹے والے، جکڑنے والے اور کھرپنے والے ہوتے ہیں۔ بد ہضمی، قے، ڈکار، اسہال یا قبض اس مرض کی علامات ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے اور صبح کے وقت تکلیف میں اضافہ ہو۔ گھٹیا دوی مریضوں میں چہرے کا اعصابی درد ہوتا ہے۔ جس کے ہمراہ ٹھنڈک کا احساس بھی ہو۔

کالی بائی (Kali Bi) روزانہ ایک ہی وقت پر آنے والا اعصابی درد۔

پلمبرم (Plumbum) شدید کھینچنے والے اور اینٹھن والے طے طے اعصابی درد جن کا آغاز پیٹ سے ہوتا ہے اور پھر وہ سارے جسم میں پھیل جاتے ہیں۔ قبض ہوتی ہے اور پاخانہ سخت ہوتا ہے۔ پاخانے کی صورت ایسی ہوتی ہے جیسے کبری کی میٹنیاں ہوں۔

سینگونی نیریا سی (Sanguinaria C) دائیں جانب کا اعصابی درد جس کی علامات سپائی جیلیا

کی طرح ہوتی ہیں۔

روٹا (Ruta): ڈنگ لگنے جیسے پھاڑنے والے اور جلن دار درد 'ٹھنڈ اور نیچے لینے سے ابتری ہوتی ہے۔ عمومی طور پر مزمن دردوں کو اس دوا سے افادہ ہوتا ہے۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): عرق النساء کا درد 200 کی خوراک دیں یا سی۔ ایم (C.M) کی خوراک دیجئے۔

نے فالیم (Gnaphalium): عرق النساء کے لئے مخصوص دوا ہے۔ اس میں دردوں کے اندر 'آرام اور جسم کی پہلی حرکت سے ابتری ہوتی ہے۔

انیشیا، سٹیفنی سگریا (Ignatia, Staphisagria): بد مزاجی کے بعد پیدا ہونے والے اعصابی درد۔

نیفرم سلف (Nat Sulph): سائیکوٹک اعصابی درد 'چلتے وقت کو لہے کے جوز میں اچانک درد ہو۔

ویلیرینا (Valeriana): اعصابی درد 'جن میں زیادتی آرام کرنے سے ہوتی ہے۔

سٹرانٹیم کارب (Strantium Carb): چیر پھاڑ (سرجری) کے صدمہ کے باعث پیدا شدہ دردوں کے لئے یہ دوا خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔

ہورا براگیلس (Hura Bragilensis): مریض جتنا زیادہ ہنستا ہے۔ درد اتنا ہی شدید ہوتا جاتا ہے۔ یہ اس مرض کی عجیب علامت ہے۔ اسے ہنسی والا اعصابی درد کہا جاسکتا ہے۔

کیمی سی فیوگا (Cimicifuga): یہ شدید درد ہے۔ جو سورج غروب ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اور جیسے ہی دن کا آغاز ہوتا ہے۔ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ 200 ڈائی لیوشن کی ایک خوراک دیجئے۔ مریض دباؤ کا شکار ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی باتونی بھی ہوتا ہے۔ شراب نوشی سے ابتری ہوتی ہے۔

من ہو جانا — (Numbness)

(دیکھئے "اعصاب میں من ہو جانا")

(Paralysis, Paraplegia, Locomotor Ataxia & Spinal Affections)

(فالج، چلنے کی نااہلیت اور ریڑھ کی ٹکلیفات)

جلسیم (Gelsimium): جھٹکے لگیں، پھڑکن ہو، بجلی لگنے کے سے درد ہو، سر درد ہوں، دکھن ہو، ننگڑاہٹ ہو نیز ایک کے درد کھائی دیں۔ آنکھ کے پلائی پچھیر کا فالج ہو نیز فالج کی اور بہت سی اقسام۔ بازو اور ٹانگیں جلد جلد ٹھکیں، گردن میں اکڑاؤ ہو، دماغ سست ہو اور نظام

عضلات میں ڈھیلا پن ہو، فالج ذہنی و جسمانی کی وہ قسم جس میں اعصابی حرکت زائل ہو جاتی ہے لیکن حس باقی رہتی ہے۔

اولینڈر (Oleander): فالج جس میں درد نہ ہو۔

امبرا گرےسیا (Ambra Grisea): جسم کے تمام حصوں میں حساسیت کی کمی واقع ہو جائے۔ دوران خون بھی سست ہو اور غیر متوازن ہو۔

الیومینا (Alumina): جب اعصاب کی پیغام رسانی کی استعداد میں انتہائی کمزوری واقع ہو جائے چنانچہ ایک سوئی چھونے سے بھی کچھ پتہ نہ چلے اور دوسری سوئی چھونے سے بھی کچھ محسوس نہ ہو اور اسی طرح مزید سوئیاں چھونے سے بھی کوئی احساس نہ ہو۔ ریزہ کی ہڈی میں درد اس طرح سے ہوتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آخری مہرہ میں گرم و سرخ لوہا ٹھسٹرا جا رہا ہے۔ جیت کے پیچھے کی جانب سے بھلی ٹکٹے کے سے اور گولی ٹکٹے کے سے درد ہوں۔ ٹانگوں کے نیچے والے حصے بہت بھاری ہوں چنانچہ انہیں مشکل ہی سے ہلایا جاسکے۔ چلنے کی ناقابلیت سوائے دن کے وقت جبکہ ہر قدم بہت دیکھ بھال کے رکھے۔ چہرے کی جلد میں اتنا زیادہ کھینچاؤ ہوتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ انڈے کی سفیدی کو چہرے پہ ڈال کر خشک کر دیا گیا ہے۔ بڑھی ہوئی جنسی خواہش ہوتی ہے۔ منی بلارودہ خارج ہو جاتی ہے۔ قبض ہوتی ہے۔ ایڑیاں یا تو سن محسوس ہوتی ہیں یا پھر جلتی ہوئی گرم محسوس ہوں۔ بچوں کا فالج، ٹانگوں کا۔

پلمبم (Plumbum): عام اور جزوی فالج کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں قبض ہوتی ہے۔ ذہنی ابتری کے بعد والا فالج، کیکاپاہٹ کے دورے، گولی ٹکٹے کے سے اور تیر ٹکٹے کے سے درد اعصاب میں ہوں۔ جلد غیر معمولی حساس ہو ذرا سا چھونا بھی برداشت نہ ہو کیونکہ چھونا اسے تکلیف دیتا ہے۔ بازو کے آگے والے حصے کے اعصاب کے فالج کے باعث کلاٹیاں گر جائیں۔ پاؤں کے گر جانے کا علاج بھی اس دوا سے کیا جاتا ہے۔

سلفر (Sulphur): اس دوا کی نشاندہی اسی وقت کی جاتی ہے جب فالج، اکونائٹ کے زیادہ استعمال کے باعث لاحق ہو۔ مخصوص پہچان جو حیض کی بندش سے لاحق ہو۔

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): پیدائش کے وقت کا فالج، چھوٹے بچوں میں یہ مرض پیدائش کے وقت کسی ضرب کے لگ جانے کے باعث ہو سکتا ہے۔ جس کے نتیجے میں فالج ہو جاتا ہے۔ پٹیوں کے ذریعے پیدائش کے نتیجے میں دماغ یا ریزہ کی ہڈی کے دب جانے کے باعث یہ مرض ہو سکتا ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): متاثرہ حصص کا سن ہو جانا، یہ مرض گیلارہنے کے باعث یا تھکاوٹ کے بعد گیلی زمین پہ لیٹنے کے باعث لاحق ہوتا ہے۔ وضع حمل سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا

ہے۔ جنسی بے اعتدالیوں، تب لرزہ یا تب محرقہ (ٹائیفائڈ) سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں کا اور حرکت کا آنکھوں کے پچھروں کا گر جانا (یا فالج) سردی (یا بے حسی) من ہو جانا اور جھنجھناہٹ کا ہونا لاحق ہو۔ کھنچاؤ کے باعث اعصاب کو نقصان پہنچنے سے فالج لاحق ہو۔ آرنیکا کے ناکام ہو جانے کے بعد اسے آزمایا جاسکتا ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): ریزہ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ جلیں ہو۔ جس کے ساتھ چھوٹیوں کے ریگنے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ یہ اس دوا کی مخصوص علامت ہے۔ مرض کے آغاز کے مراحل میں جنسی اشتعال پایا جاتا ہے۔ جو نہ صرف ختم ہو جاتا ہے بلکہ اس کے بعد نامردی کا مرض بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ دماغ کے ریشوں میں پکنائی کی ابتدی ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ کام سے بے رغبتی پائی جاتی ہے۔ نیز مطالعہ اور ارتکاز توجہ کی بھی رغبت نہیں رہتی۔

کالی ہائیڈ (Kali Hyd): یہ دوا اس جگہ کی نشاندہی کرتی ہے جہاں آنکھ (سفلس) کی ہسٹری ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ اعصاب اور غدود بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اس میں دماغ کی رسولی پائی جاتی ہے نیز جگر اور دوسرے غدودوں اور غدودی اعضاء میں بھی رسولی پائی جاتی ہے۔ اس مرض میں کھلی گٹنے کے سے درد بنیادی علامت ہیں جو کہ ٹانگوں کی نسبت سر میں زیادہ قوت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ گرمی اور متاثرہ جانب لیٹنے سے دردوں میں ابتدی واقع ہوتی ہے۔

پیکریک ایسڈ (Picric Acid): یہ مرض ذہنی اور جنسی بے اعتدالیوں اور خون کی کمی کے باعث لاحق ہوتا ہے۔ جب جنسی خواہش کا موقع گزر جاتا ہے تو بے انتہا تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ ذہنی تھکاوٹ سے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹانگوں میں کمزوری، تھکاوٹ اور بھاری پن کا احساس پایا جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے چلنے میں دقت ہوتی ہے۔ بے حسی کی نشاندہی ہوتی ہے۔

پیکریٹ آف آئرن (Picrate of Iron): یہ دوا پیکریک ایسڈ کی جگہ استعمال کی جاسکتی ہے جبکہ مرض بے حسی کے ساتھ قلت دم کا مرض بھی پایا جائے۔

اوپیم (Opium): خلق کی بے عملی یا گلے کا فالج، جس کے نتیجے میں مائع غلط راستے سے نیچے جاتے ہیں یا ٹانگ کے راستے باہر آ جاتے ہیں۔

کیورارے (Curare): چلنے کے نظام کا فالج، اضطراری عمل میں رکاوٹ یا اس عمل کا ختم ہو جانا، عمومی فالج، اعصابی کمزوری، غنودگی، ضیق الشقی، چکر، آنکھوں کی پلکوں کا گر جانا، عضلات کا فالج، پتھوں یا عصب کے مادے کو متاثر کئے بغیر۔

ہائپرکیم (Hypericum): اعصابی صدمے کا برا اثر، سر میں چوٹ کے باعث تشنج یا جھٹکے، چٹنیوں کے ذریعے وضع عمل کے نتیجے میں چہرے کے فالج کو بھی یہ دوا خصوصی طور پر ٹھیک کرتی ہے۔ نیز آرنیکا کے ناکام ہونے پر بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔

لا تھیرس سائیوا (Lathyrus Sat): بازوؤں اور ٹانگوں کا فالج، خصوصاً ٹانگوں کا فالج، تشنجی فالج، ٹانگیں سوکھ جاتی ہیں۔ ٹانگیں نیلی اور سوجی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب انہیں لٹکایا جائے۔ گھٹنے اور گھٹنے اٹک جاتے ہیں اور ان میں ٹنگڑا ہٹ آ جاتی ہے۔ انگوٹھوں کو فرش سے نہیں اٹھایا جاسکتا جبکہ ایڑیاں فرش کے ساتھ نہیں گھٹکتیں۔ مریض آگے کو جھک کر بیٹھتا ہے۔ سیدھے بیٹھنے میں دقت ہوتی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ بازو اور ٹانگیں بہت بھاری ہیں اور فرش اونچا نیچا ہے چنانچہ مریض چلتے ہوئے دیکھ دیکھ کر پاؤں رکھتا ہے۔ پھوٹے سے اور مرطوب موسم میں اتھری ہوتی ہے۔

جیسی لینم (Bacillinum): جب بہترین منتخب دوائیں ناکام ہو جائیں تو یہ دوا استعمال کی جاتی ہے جو کہ درمیانی عمل انگیز ہے۔ 200 ڈالی لیوٹن کی صرف ایک خوراک دیتے۔ صبح سویرے نہارت۔

کاسٹیکم (Causticum): انفرادی حصوں کا فالج، آواز پیدا کرتے والے اعضاء، حلق اور گلا، زبان، چمکیں، چہرہ، بازو اور ٹانگیں، مثلاً عمومی طور پر دائیں جانب، ٹھنڈی ہوا یا ٹھنڈے پانی کے ٹنگے بدن پر لگنے سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ ٹائیفائیڈ، ٹائفس یا تھائک کے بعد بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ زہر کے باعث فالج کا ہو جائے۔ ٹائپنگ کرنے والے افراد کی زبان کا فالج جبکہ وہ ٹائپ کے حروف کو ہونٹوں سے پکڑتے ہیں۔ ایم ڈالی لیوٹن خوراک دیتے اور پھر اگر بہتری نہ ہو رہی ہو تو خوراک بڑھاتے جائے البتہ جب بہتری ہونے لگے تو خوراک بڑھانا بند کریں۔

آر جیٹم ٹائٹرکیم (Argentum Nit): جلدی میم والی علامات ہی اس دوا کی علامات ہیں لیکن جلدی میم والے کیسوں میں اسے عمومی دوا کے طور پر دیا جاتا ہے جبکہ جلدی میم عمل کرنا چھوڑ دے۔ پاگل پن کے فالج میں۔ مریض بے وقوف ہوتا ہے اور جلد پر جوش ہو جاتا ہے۔ ایک منٹ میں خوش ہو جاتا ہے جبکہ اگلے ہی لمحے غصے سے بھر جاتا ہے اور مشتعل ہو جاتا ہے۔ ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک جملہ بھی نہیں لکھ سکتا۔ چٹوں کی پھڑکن کے ساتھ چیخ مری۔

اکٹیاریس موسا (Actea Racemosa): رحم کی تکالیف کے باعث جب ریزہ کی ہڈی متاثر ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے اضطرابی نظام میں خرابی آتی ہے تو یہ دوا خاص طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں پچھلے دھڑکا سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔

اگریکس مس (Agaricus Mus): ریزہ کی ہڈی میں جھنجھٹ اور جلدی ہوتی ہے۔ جیسا کہ برف کے کانٹے سے جلن ہوتی ہے۔ جسم کے کئی حصوں میں عضلات کی پھڑکن ہوتی ہے۔ خصوصاً آنکھوں کی پلکوں میں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے برف کی سونیاں جلد میں چبھ رہی

ہول۔

زئکم میٹ (Zincum Met): ریڑھ کی ہڈی میں اینٹھن ہو۔ جس کے ساتھ کمر میں دکھن والا درد ہو۔ جس میں چلنے سے بہتری ہو۔ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ جلن ہوتی ہے۔
فائیسو سٹگما (Physostigma): جب ہر عصب میں بیجان ہو اور اس کے ساتھ ریڑھ کی ہڈی میں جلن اور پھڑکن کا احساس ہو۔ پاؤں اور ہاتھوں میں سن ہو جانے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اینٹھن والے درد ہوتے ہی کمر کے عضلات سخت ہو جاتے ہیں۔ ٹانگوں میں گولی لگنے جیسے درد کے ساتھ دائیں جانب کا فالج۔

کوکولس انڈ (Cocculus Ind): کمر میں فالجی دکھن، پیٹ میں چٹکیاں لینے کا احساس، ایزویوں میں سختی ہو۔

تھوجا (Thuja): بازو کا فالج اور دکھن جو کہ چھپک کے خلاف حفاظتی ٹینک لگوانے کے بعد لاحق ہو۔ الیم ڈائی لیوشن دن میں 2 بار صبح شام دیجئے۔ یہ دوا ایک ہفتہ تک دی جائے۔
سفلیئم (Syphilinum): یہ دوا لاکھڑا ہٹ والی چال کے لئے درمیانی عمل انگیز کے لئے استعمال کی جاتی ہے جبکہ اس مرض کی بنیاد میں آتشک کا مرض ہوتا ہے۔

اورم میٹ (Aurum Met): خود کشی کے رجحان کے ساتھ ادھرنگ یا جزوی فالج۔ اپنے آپ سے اور ہر کسی سے اور ہر چیز سے مریض بے زار ہوتا ہے۔ مریض کی خواہشات اور بے زاریاں انتہا درجے کی ہوتی ہیں۔

آر سینیٹک ایلم (Arsenic Alb): ریڑھ کی ہڈی کا دق، جلن دار اور گولی لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جسم کے تمام حصوں میں گرم سرخ سوئی چبھ رہی ہے۔ گرم چیزیں لگانے سے بہتری ہوتی ہے۔

کونیم (Conium): فالج کا آغاز پاؤں کی طرف سے ہوتا ہے جو اوپر کو جاتا ہے۔ پھوٹنے سے اعضاء ٹھنڈے محسوس ہوتے ہیں۔ تھوک کو نگل سکے اور نہ باہر نکال سکے۔

کوکولس (Cocculus): ریڑھ کی ہڈی کا نرم ہو جانا، چلنے کی ناقابلیت، ریڑھ کی ہڈی کا ٹپلے دھڑولنا علاقہ متاثر ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ کمزوری ہوتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ پیسے کمر صغیر میں فالج ہو چکا ہو۔ یہ جگہ باہر کو نکل آتی ہے۔ چلتے وقت گھٹنے باہر کو نکلتے ہیں۔ رانوں میں درد ہوتا ہے۔ پاؤں کے تلوے سوئے ہوئے محسوس ہوتے ہیں ہاتھ اور بازو سو جاتے ہیں۔ ٹانگیں اکڑ جاتی ہیں اور وہیں کی وہیں ٹھہر جاتی ہیں البتہ تھوڑی دیر کے لئے، لیکن ان کو ہلانے اور تھکانے کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ آنکھوں کی پٹلوں کا فالج اور گلے کا جزوی فالج جس میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ جب مریض بیٹھا ہوتا ہے تو پاؤں کے تلوے سو جاتے ہیں۔

ڈروسیرا (Drosera): ریزہ کی ہڈی کا نامور جس کے پیچھے انگلیوں کا اور / یا گھٹنوں کا پ
 وق لاحق ہو جاتا ہے۔ ہر چند وہ دن کے بعد 200 طاقت کی خوراک دیجئے۔
الیومنا سیلیکیٹ (Alumina Silicate): نچلے دھڑ کا بغیر درد والا فالج نیز متاثرہ حصوں میں
 درد ہو۔ بازوؤں میں کھنچاوت ہوتی ہے۔ بازوؤں، ٹانگوں اور ہاتھوں اور پاؤں میں جھنجھناہٹ
 ہوتی ہے۔

زئکم فاس (Zincum Phos): چلنے کی قابلیت کے مرض کے آغاز میں یہ دوا دی جاتی ہے
 جبکہ بھالے لگنے کے سے تیز درد ہوتے ہیں۔ ٹانگوں اور بازوؤں میں بہت زیادہ کمزوری ہوتی
 ہے۔ خصوصاً ٹانگوں میں کمزوری ہوتی ہے۔ ریزہ کی ہڈی میں گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ سونے
 کے دوران بے چینی ہوتی ہے۔ بازوؤں، ٹانگوں اور پاؤں کو ہلاتا رہتا ہے۔

رعشہ — (Paralysis Agitans "Tremor")

جلسی میم (Gelsemium): اس دوا کی مخصوص علامت کپکپاہٹ ہے۔ کمزوری اور فالج
 خصوصاً سر کے عضلات کا، چلنے میں لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، لرزہ کے لئے یہ دوا سرفہرست ہوتی
 ہے۔ دماغ ست اور عضلاتی نظام ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔

ارجنٹم نائٹریکیم (Argentum Nit): یہ جلسی میم کی عکسلی دوا ہے۔ اس میں یادداشت کمزور
 ہو جاتی ہے، مریض جلدی جلدی پر جوش ہو جاتا ہے اور غصہ میں بھر جاتا ہے، اچھارہ والے اور
 سبزی مائل اسال لاحق ہو جاتے ہیں۔

اگیریکس مس (Agaricus Mus): اس مرض میں کپکپاہٹ، خارش اور جھٹکے پائے جاتے
 ہیں۔ عضلات میں سختی ہوتی ہے، متاثرہ حصوں والی جلد میں خارش ہوتی ہے اور ریزہ کی ہڈی
 میں اتنا درجہ کی حساسیت ہوتی ہے۔ چھوئے جانے کو مریض برداشت نہیں کر سکتا۔

اصحیم (Absinthium): زبان میں لرزہ ہوتا ہے نیز دل کا بھی لرزہ پایا جاتا ہے۔
کوکولس (Cocculus): کھاتے وقت ہاتھ کپکپاتے ہیں اور جب ہاتھوں کو اوپر اٹھایا جاتا ہے
 اس وقت بھی ان میں کپکپاہٹ ہوتی ہے۔ گھٹنے کمزوری کے باعث نیچے ڈوب جاتے ہیں۔ ایک
 جانب کو گرنے کے رجحان کے ساتھ چلنے میں لڑکھڑاہٹ پائی جاتی ہے۔ گھٹنے جب حرکت کرتے
 ہیں تو کڑکڑ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔

گنیشیا فاس (Magnesia Phos): کپکپاہٹ، ہاتھوں کا ہلنا، ہر پفٹے 1000 طاقت کی خوراک
 دیجئے۔

لتھیرس (Lathyrus): بازوؤں کا رعشہ، نچلے دھڑ کی کمزوری کے ساتھ، یوں محسوس ہوتا

ہے کہ بازو اور ٹانگیں سخت اور سکڑی ہوئی ہیں نیز بازو اور ٹانگیں بھاری محسوس ہوتی ہیں،
فرش غیر ہموار محسوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے مریض کو دیکھ کر قدم بڑھانا پڑتا ہے۔
رشاکس: (Rhus Tox): جب رعشہ درد کے ساتھ شروع ہو جس میں حرکت سے بہتری
ہو، متاثرہ حصوں میں ختی پائی جاتی ہو۔

فائیسوگمما: (Physostigma): عضلات کا رعشہ اور تشنج جو کہ خوب واضح ہو، حرکت
سے ٹھنڈے پانی کے لگنے سے بہتری ہوتی ہے، دل کی دھڑکن اور پھڑکن سارے جسم میں
محسوس ہوتی ہے۔

امبرا گریسیا: (Ambra Grisea): رعشہ، سن ہو جانے کے ساتھ بازو اور ٹانگیں معمولی
حرکت سے سو جاتے ہیں، بازو اور ٹانگیں ٹھنڈی اور سخت ہوتی ہیں، ناخن ٹوٹتے ہیں اور چرم
ہو جاتے ہیں۔

ہیلوڈرما: (Heloderma): بازو اور ٹانگوں کے اعصاب کے ساتھ ساتھ کیکپاہٹ، تھکاوٹ کا
احساس ہو، مریض بہت کمزور اور مشوش ہوتا ہے۔ غشی ہو نیز سن ہو جانے کا احساس ہو۔
زنکم: (Zincum): پورے جسم میں شدید کیکپاہٹ (پھڑکن) خصوصاً ذہنی برانگیختگی کے
بعد، بچوں میں پھڑکن، گوریا، ہاتھوں اور پاؤں کا فلج، لگتے وقت ہاتھوں میں کیکپاہٹ ہو۔

پارکنسن کے امراض

(Parkinson's Disease)

(دیکھئے ”لرزد“ رعشہ“)

عضلات کی سختی (Sclerosis)

(نیز دیکھئے ”فلج“ اور ”پنوں کی بڑھتی ہوئی کمزوری“)

میڈورنیم: (Medorrhinum): سوزاک کے دب جانے کے باعث یا ٹھنڈے سوزاک کے باعث
یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ ایم ڈائی لیوشن دیجئے۔

پلمبم: (Plumbum): عضلات کے ریشوں کی ختی کے لئے یہ ایک بہترین دوا ہے۔ متعدد
ریشوں کی ختی کی دوا۔ 200 ڈائی لیوشن کی خوراک ہر ہفتہ دی جائے۔

ٹیرنٹولا ہسپانیولا: (Tarentula His): متعدد ریشوں کی ختی کیکپاہٹ کے ساتھ، پھڑکن ہو
اور جھٹکے لگیں، ٹانگیں سن ہو جائیں۔

اوگزین ملک الیڈ: (Oxalic Acid): دماغی اور ریڑھ کی ہڈی کے پچھلے حصوں کی ملی جلی ختی۔

بھالے لگنے جیسے ہگولی لگنے جیسے اور جھٹکے دار درد ہو 'جسم کے کئی حصوں میں 'ریڑھ کی سوزش' عضلات کی بے انتہا کمزوری۔

حساسیت (Sensitiveness)

(دیکھئے اعصاب — زود حس)

تشنجی دورے (Spasms)

(دیکھئے "جھٹکے")

کزاز (تشنج) (Tetanus)

ہائیڈروسیانک ایسڈ: (Hydrocyanic Acid) یہ دوا پھوں کے مستقل تشنج میں استعمال کی جاتی ہے خصوصاً چہرے کے عضلات کا تشنج، جڑے کا اور کمر کا تشنج، نظام تنفس میں الجھن ہو، منہ پر ٹیلے ٹیلے داغوں اور منہ سے بھاگ پھونکنے کے ساتھ، بازو اور ٹانگوں میں بہت زیادہ تشنج ہو نیز باقی جسم میں بھی تشنج ہو اور مریض پیچھے کی جانب جھک جائے۔
لیکیسیس: (Lachesis) جڑے آہیں میں مل جائیں اور حلق میں تشنج ہو جس کے ساتھ تنگی تنفس کے باعث مریض نیلا چڑھتا ہے اور بے ہوشی کی نیند سو جاتا ہے۔

ورینٹرم البم (Veratrum Album) جڑے مل جائیں جس کے ساتھ سانس کی مٹی کا تشنج ہو۔ سینے میں دباؤ ہوتا ہے جو قریب قریب سانس کو دبا دیتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں اندر کی جانب کھینچ جاتے ہیں اور آنکھوں کی پتلیاں سکڑ جاتی ہیں۔ تھکا دینے والے امراض کی نسبت اس میں تشنج دوسرے درجے کا ہوتا ہے۔ جبکہ سر نکلیا میں پسے درجے کا تشنج ہوتا ہے۔

بیلادونا: (Belladonna) پھونکے بچوں کا تشنج، پھر کن ہو، بچے اچانک چوتھ جاتے ہیں، آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں۔ آنکھیں کھورتی ہوئی ہوتی ہیں۔ شدید جھٹکے ہوتے ہیں۔ گلے کے عضلات اکڑ جاتے ہیں اکڑن والا تشنج ہوتا ہے۔

سٹرامونیم: (Stramonium) کزاز می جھٹکے جن میں پھونکے سے اور روشنی سے اتھری ہوتی ہے، داغ میں گڑبڑا ہوتی ہے، جنون کے ساتھ۔

کیمفر: (Camphor) یہ دوا کزاز می جھٹکوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ جس کے ساتھ منہ کے کنارے اوپر کو مڑ جاتے ہیں اور دانت نظر آتے ہیں۔ مروکی والا ٹھنڈا پن ہوتا ہے۔

کیوپرم میٹ: (Cuprum Met) ہوش جاتے رہنے کے ساتھ تشنجی دورے ہوتے ہیں جو

چوٹ لگنے یا تیز آلات کے ساتھ زخم لگنے کے باعث ہوں۔ چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ جڑے مل جاتے ہیں منہ سے جھاگ چھوٹ جاتے ہیں بازوؤں اور ٹانگوں میں جھٹکے لگتے ہیں اور شدید اکڑن والا تشنج ہوتا ہے۔

سٹرائکی جینم: (Strychnin) چھاتی میں گھٹن کے ساتھ تشنج، اس دوا کو نکس دامیکا کے ناکام ہو جانے کے بعد آزمایا جاسکتا ہے۔

انگس چورا ویرا: (Angustura Vera) تشنج میں چوٹ لگنے میں یا جب پھڑکن والے تشنجی دورے ہوں یا پنوں میں جھٹکے لگیں یا سکتے ہو جائے جس کے ساتھ جسم پیچھے کی طرف مڑ جائے۔ ان تمام امراض میں یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ تشنج، پھڑکن اور جھٹکوں کا لگنا، کمر میں یوں جیسے بجلی کے جھٹکے لگ رہے ہوں۔

فائیسو سٹگما: (Physostigma) تشنجی جھٹکے، چلنے کی نااہلیت، فالجی حصوں میں من ہو جانے کی کیفیت (بازوؤں) اور ٹانگوں میں اینٹھن والے درد ہوتے ہیں۔ ریشوں میں ریشہ ہو۔

پسی فلورا انک: (Passiflora Inc) یہ دوا تشنج کے لئے مخصوص ہے اس دوا کی مدد سے 10 قطروں کی خوراک دینی چاہئے اس میں گردن اور کندھوں کے عضلات کی انتہا درجہ والی خنقی پائی جاتی ہے۔ جس کے ساتھ لگنے میں دقت بھی ہوتی ہے جھوٹی مسکراہٹ اور پیچ اس مرض کی عجیب علامت ہے۔

سیکوناٹا ویروسا: (Cicuta Virosa) جھٹکے لگنے کے ساتھ اچانک خنقی ہو تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ شدید تخریب جس کے بعد بے انتہا تھابت ہو جائے۔ چھوٹے سے عضلات میں تشنجی دورے دوبارہ سے شروع ہوں تنفس میں بہت زیادہ دباؤ واقع ہو جائے، جڑے مل جائیں، چہرہ بے انتہا سرخ ہو جائے، منہ سے جھاگ چھوٹ جائیں، اکڑن والا تشنج ہو، اس جاتے رہیں، پیپ والے زخموں میں یا جب زخموں سے پیپ بہنا رک جائے۔

آرسینک البم: (Arsenic Alb) پھانسی کے ذریعے خود کشی کرنے کی کوشش کے ساتھ تشنج، خوف زدہ کر دینے والی بازوؤں اور ٹانگوں کی تخریب کے ساتھ تشنجی دورے، زہریلے مادوں کا اظہار ہو۔

ایکونائٹ این: (Aconite N) خوف، پریشانی، عضلات کی اکڑن، مجنوناہٹ اور من ہو جانا۔

ہائپرکیم: (Hypericum) زخموں میں شدید درد کے ساتھ تشنج، یہ دوا نوزائیدہ بچوں کو حفظ بالقدم کے طور پر دینی چاہئے جن کی ناف تندرست نہ ہو۔

سلیسیا: (Silicea) پیپ بہنے والے زخموں کے لئے یا جب زخموں میں سے پیپ بہنا رک

جائے۔
نمکس وامیکا: (Nux Vom): اکثر ان والے تغبغی ہنکے، آنکھوں میں تخریب، چہرے میں تخریب، غلی غلیٹھس کے ساتھ، معمولی چھو جانے سے، روشنی سے یا شور سے دور سے پھر سے شروع ہو جائیں خاص طور سے اس وقت اس دوا کے متعلق سوچنا چاہیے جب خواہ اس پر قرار ہوں۔

لرزہ (کیکیپاہٹ)

(Tremors "Trenbling")

(دیکھئے "رعشہ")

دماغی رسولیاں (Tumors "Brain")

ٹیوبرکولینم: (Tuberculinum): علاج کے شروع میں اس دوا کی 200 طاقت کی ایک خوراک دی جانی چاہئے۔ یہ مرض کو روک دے گی اور درد سر کو آرام ہو گا جو کہ دماغ کی رسولی میں عموماً ہوتا ہے۔

کلکیریا کارب: (Calcarea Carb): پکروں کے ساتھ اور سر گھومنے کے ساتھ درد سر، بھاری پن اور درد کے ساتھ ناک کی جانب دباؤ بڑھتا رہتا ہے۔ یہ پریشانی کہ سر بہت زیادہ بھرا ہوا ہے۔ کھوپڑی میں ٹانگے لگنے کے سے درد۔ سردی اور مرطوب موسم میں ابتری ہو، سر کے اور اور اندر پر ہلی ٹھنڈک ہوتی ہو۔

کلکیریا فلور، کلکیریا فاس: (Calcarea Fluor, Calcarea Phos): جب کلکیریا کارب ناکام ہو جائے تو یہ دوائیں آزمائی جاسکتی ہیں۔

مرک آئیوڈائیڈ: (Merc Iod): یہ دوا کھوپڑی کی ہڈی والی دماغی رسولی کو روکتی ہے اور تحلیل کرتی ہے۔

کالی آئیوڈائیڈ: (Kali Iod): آنکھوں اور ناک کے اور سر کے دونوں جانب بجلی لگنے کے سے درد ہوتے ہیں۔ نیکے کی گرمی سے ابتری ہوتی ہے۔ آنکھی ہسٹری۔

ہائپرکیم: (Hypericum): چوٹ لگنے کے باعث آہستہ آہستہ بڑھنے والی رسولیاں۔

تھوجا: (Thuja): شدید درد حقیقتہ اور درد سر کے ساتھ دماغ کی رسولیاں، مریض بے جوش حساس اور چنچڑا ہوتا ہے۔ روزانہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ تیزابی اور نمکین خوراک پسند کرتا ہے۔ بیت میں گیس کے ساتھ اچھا رہتا ہے، قبض ہوتی

ہے۔ پیشانی پر اور بازوؤں پر پھینک ہوتا ہے۔

بے ہوشی

(Unconsciousness)

(نزدیکھے "ہسٹریا" مرگی)

لیکیس: (Lachesis) دماغ میں خون جاری ہونے کے باعث جب بے ہوشی ہو۔ بے چین اور پریشان ہوتا ہے۔ گو بے ہوشی ہوتی ہو۔

ہیلی بوریس: (Helleborus) کھل بے ہوشی ہونٹوں کو اور کپڑوں کو نوچتا ہے۔ گھورتا ہے۔ غیر ارادی طور پر آہیں بھرتا ہے۔

اوپیم: (Opium) حواس کا مکمل طور پر کھ جانا، قبض، خراٹے دار تنفس۔

ہائیڈروسیانک ایسڈ: (Hydrocyanic Acid) ہر چیز کے خوف کے ساتھ بے ہوشی۔

فاسفورس: (Phosphorus) بے ہوشی جب ہڈیاں کے ساتھ ادلتی بدلتی رہے۔

آرنیکا مونت: (Arnica Mont) گو بے ہوشی ہو لیکن جب پوئے تو جواب درست دے۔ زخم کے صدمے کے باعث بے ہوشی ہو۔

سکوتا وائروسا: (Cicuta Virusa) جھکوں کے دوران بے ہوشی ہو جائے۔

سنا: (Cina) کھانسی کے حملے سے پہلے بے ہوشی ہو جاتا۔

گلوٹائین: (Glonoine) درد سر کے دوران بے ہوشی ہو، لو لگنے میں۔

نکس موسکاٹا: (Nux Moschi) بامیں ٹانگ کے ہلانے کی نااہلیت کے ساتھ بے ہوشی کا ہوتا۔

ایٹھوزا: (Aethusa) بے ہوشی میں ٹانگیں لمبی ہو کر پھیل جاتی ہیں۔

کینابیس انڈیکا: (Cannabis Ind) ہر چند لحاظ کے بعد خود کو کھودے۔

بیلادونا: (Belladonna) اکڑن والے تشنج کے ساتھ بے ہوشی۔

کاسٹیکس: (Causticum) میٹھے میٹھے بے ہوشی کا حملہ ہو (خون کی کمی کے باعث)۔

ہائیوسکیمس: (Hyoscyamus) جب ہڈیاں کے دوران پوئے تو بے ہوشی ہو جائے۔

خون کی نالیوں کا پھیل جانا (Vasodilatation)

(غددی اعضاء کے فعل میں تبدیلی واقع ہو جانے کے باعث اعصابی دوران میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے 'خون کی نالیوں کی پھیلاؤت)

فیرم فاس (Ferrum Phos): دل کی نس تیز اور ضربات والی ہو۔ جس کے ساتھ چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز اور کمزور ہوتی ہے لیکن بے قاعدہ 'قلت دم' ضیق النفس اور سانس چھوٹا ہو جائے۔ چہرہ خون سے بھرا ہوا چمک دار سرخ ہوتا ہے۔

گلوٹائین (Glonoine): دل کی دھڑکن اس مرض کی مخصوص علامت ہے۔ دل کی دھڑکن نہ صرف سینہ میں ہوتی ہے بلکہ جسم کے تمام اعضاء میں محسوس ہوتی ہے۔ چہرہ روشن خون سے بھرا ہوا لیکن اتنا تھیں جتنا فیرم فاس میں ہوتا ہے۔

بیلادونا (Belladonna): یہ دوا نظام دوران خون پر تیزی سے اور شدت کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہے۔ چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ خون کی نالیوں میں پھڑکن ہوتی ہے اور تیزی سے ایک حالت دوسری حالت میں تبدیل ہوتی ہے۔ حیض میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ جلدی جلدی آتے ہیں اور بست بدیودار ہوتے ہیں۔

چکر (Vertigo)

(Minier,s Disease)

چائیم سلف (Chinium Sulph): کان کے عصب کی تکلیف کے باعث چکر آتے ہیں۔ جس کے ساتھ پیشانی میں درد ہوتا ہے۔ کانوں میں بھرہ پن کے ہمراہ کانوں کا جھٹا اور گرج ہوتی ہو۔
کوکولس (Cocculus): چکروں کی چوٹی کی دوا ہے۔ اس میں ٹپھنے پر اور سواری کرنے سے ابتری ہوتی ہے نیز اس میں تے بھی ہو سکتی ہے۔

چینوپوڈیم (Chenopodium): عصب سمعی کے من ہو جانے کے باعث اچانک چکر 'نامکمل بھرہ پن جو بچی آواز کی نسبت بلند آواز سے بہتر ہو لیکن انسانی آواز سے ابتری ہوتی ہے۔ کانوں میں گھنٹیاں بھیں۔

گریفائٹس (Graphites): صبح کے وقت چلنے سے چکر آئیں۔ شام کے وقت چکر آئیں۔ اوپر کو دیکھنے سے 'انھنے سے' نیڑھا کھڑے ہونے سے چکر آتے ہوں۔ ضرور ہی لیٹ جانا پڑے ' آگے کی طرف گرنے کا رجحان۔

نایٹرم سلف (Natrurn Sul): کانوں میں گھنٹیاں بھنے کے ساتھ چکروں کا آنا۔

گنیشیا کارب (Magnesia Carb): یہ دوا اس وقت دی جاتی ہے۔ جب نیرم سلف ناکام ہو جائے۔

بیلادونا (Belladonna): کیروٹڈ شریانوں میں چپکن کے ساتھ چکر، پر خون مریضوں میں بستر میں گھومنے یا مڑنے یا سر کو حرکت دینے سے مریض کو غنودگی ہو۔ چیزیں گھومتی ہوئی محسوس ہوں۔ بستر پر لیٹ جائے اور سر نہ اٹھائے۔

گلوٹائن (Glutamine): کھوپڑی میں درد کے ساتھ چکر آئیں۔ سر ہلانے سے چکر آتے ہوں۔ جب جھکے تو نشے میں محسوس ہو۔

جلی میم (Gelsemium): آنکھوں کے عمل میں نامناسب کے باعث چکر آئیں۔ ایک کا دو دینا مخصوص ہے۔ لڑکھڑاہٹ کا رجحان۔

نکس دامیکا (Nux Vom): گیس کے ساتھ چکر آئیں جو کہ کھانا کھانے کے بعد آتے ہیں یا رات کی عیاشی کے بعد صبح سویرے۔

فیرم فاس (Ferrum Phos): قلت دم یا خون کے ضیاع کے بعد چکر۔ چہرہ پیلا ہو جاتا ہے۔ عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ چہرہ چمکیلا چمک دار سرخ ہوتا ہے۔ حملے کے دوران دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے۔

تھوجا (Thuja): چکر آئیں جبکہ آنکھیں بند کرے۔
لیکیسس (Lachesis): جب چکروں کے دوران پائیں جانب گرنے کا رجحان ہو۔ آنکھیں بند کرنے پر چکر آئیں۔ ڈوبنے کا احساس۔

سکولوپنڈرا (Scolopendra): چکر جب ان کے ساتھ بصارت بھی جاتی رہے۔
گرینی اولہ (Gratiola): کھانا کھانے کے دوران اور کھانا کھانے کے بعد چکروں کا آنا پڑھتے وقت آنکھیں بند کرنے پر چکر آئیں، نشست سے اٹھنے پر چکر آئیں۔

تھیرائیڈین (Theridion): آنکھیں بند کرنے پر حرکت سے جھکنے سے جہاز پر سوار ہونے پر چکر آتے ہیں۔ ایسے چکر جن کے باعث متلی ہو اور تھوے ہو۔ جس کے ہمراہ بصارت جاتی رہے اور آنکھوں میں درد ہو۔

سلینیم (Selenium): بستر سے یا نشست سے اٹھنے پر حرکت کرنے سے متلی کے ساتھ اور تھوے کے ساتھ چکر آتے ہیں نیز کھانے کے بعد بے ہوشی ہوتی ہے۔

نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): صبح سویرے اٹھنے پر چکر آئیں۔ ضرور ہی لیٹ جانا پڑے۔
لیک ویک ڈیف (Lac. Vacc. Def): مریض جب سوئی میں دھماکہ ڈالنے کے لئے ہاتھ اوپر اٹھائے تو چکر آ جائے۔ جب بستر میں مڑے یا تھکے پر سر کو حرکت دے تو چکر آتے ہیں۔

کو نیم (Conium): شراب نوشی سے چکر آئیں۔ ایسے چکر جن میں گول دائرے کے اندر گھومتا ہوا محسوس کئے۔ خواہ کھڑا ہو بیٹھا ہو یا بستر میں ہو۔ بستر یا کرسی گھومتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اطراف کی جانب سر کو گھمانے سے یا بستر میں سر کو موڑنے سے چکروں میں اتھری ہوتی ہے۔ اس طرح سے چکر آتے ہیں جیسے سر کو اطراف میں دائرے کی صورت گھمایا جا رہا ہو۔

کیڈمیم سلف (Cadmium Sulph): جب کمرے میں ہو تو بستر گھومتا ہوا محسوس ہو۔ امبرا گریسیا (Ambra Grisea): چاند پر وزن محسوس ہونے کے ساتھ چکر آئیں۔ سونے کے بعد اتھری ہو۔ خصوصاً صبح کے وقت کھانے کے بعد اتھری ہو۔ چکروں کے باعث نیچے لیٹ جانا پڑے اور معدے میں کمزوری محسوس ہو۔ عمر رسیدگی کے باعث چکروں کا آنا۔ سکیوٹا وائروسا (Cicuta Virosa): جب انھنے کی کوشش کرے تو چکر آجائیں۔ آنکھوں کے سامنے چیزیں گھومتی ہوئی محسوس ہوں۔ پھر آنکھوں کے سامنے اندھیرا آجائے۔ جب اسے دوبارہ نیچے لیٹ جانا پڑے۔ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی، رخسار پیسے، قلت سماعت کمزور، سانس میں دقت، پیشاب نکل جائے اور بستر گھل کر دے۔

کیلڈیم (Caladium): آنکھیں بند کرنے پر چکر آئیں۔ آنکھیں بند کر کے کھڑا نہ ہو سکے یا چل نہ سکے۔

لیک کینٹیم (Lac. Can): ہوا میں تیرنے کے احساس کے ساتھ چکر یا مریض جب بستر پر لیٹی ہو محسوس کرے کہ وہ بستر پر نہیں ہے۔

لاروسیراسس (Laurocerasus): کھلی ہوا میں چکر آئیں۔ اسے ضرور ہی لیٹ جانا پڑے۔

الیومنا (Alumina): چکر آئیں جن کے ہمراہ پاؤں کے تلوؤں کا سن ہو جانا، چلنے میں لاکڑاہٹ اور ٹانگوں اور بازوؤں میں بے ربطی ہوتی ہے۔

مارفینم (Morphinum): سر کی معمولی حرکت سے چکر آتے ہیں۔

اسارم یورپ (Asarum Europ): چکر آتے ہوں جیسا کہ اس نے شراب پی رکھی ہو۔ ہوا میں معلق محسوس کرے، خود کو۔

مرکیوری ایلیس پیرینس (Mercurialis Perennis): میڑھیاں اترتے ہوئے چکر آئیں۔

کلیکریا سلف (Calcarea Sul): صبح جاگتے وقت یا شام کو دوبارہ چکر آتے ہیں۔ کھلی ہوا میں بھری ہو۔ چکر آئیں مٹی کے ساتھ۔

اگیرونیکس ایم (Agaricus M): صبح کے وقت چکر آئیں پھر سارا دن وقفے وقفے سے آتے رہیں۔ تیز دھوپ کے باعث چکروں میں اشتعال ہوتا ہے۔ لاکڑاہٹ والی چال کے ساتھ

چکروں کا حملہ۔ کھلی ہوا میں چکر آئیں۔

فسفورس (Phosphorus): جب اوپر کی جانب دیکھے یا نیچے کی جانب دیکھے تو چکر آئیں۔ کھلی ہوا میں کھانے کے بعد 'شام' کے وقت چکر آئیں۔

سینو تھس (Ceonathus): دائیں جانب مڑنے پر بہت شدید چکر آتے ہیں۔ بائیں جانب لیٹنے پر چکر نہیں آتے۔

پٹیلیائی (Petelia T): مسلسل متلی اور تے کے ساتھ سر پکرائے۔ چکروں کے ساتھ ٹانگیں غیر متوازن ہوں۔

ایلن تھس (Allanthus): متلی، ابکاٹی اور کچھ تے کے ساتھ سر کا پکراتا، لڑکھڑاہٹ والی چال، بجلی کی سی تھر تھراہٹ سر سے شروع ہو اور ہاتھوں اور پاؤں طرف جائے۔

ارجنٹم نائٹریکیم (Argentum Nit): کھلی میں بلند و بالا کھروں کو دیکھنے سے چکر آئیں۔ یہ مریض کو لڑکھڑادیں۔ وہ اوپر اور نیچے نہیں دیکھ سکتا۔ آنکھوں کے بند کرنے پر چکر آئیں۔

کلکیریا کارب (Calcareia Carb): جب اونچی جگہوں پر چڑھ رہا ہو تو چکر آئیں۔ میزبیاں چڑھتے ہوئے یا پھاڑی پر چڑھتے ہوئے، اچانک اوپر کو اٹھتے ہوئے یا سر کو گھماتے ہوئے جبکہ وہ آرام کر رہا ہو یا چلتے ہوئے چکر آتے ہیں۔ پیچھے کی جانب یا اطراف میں گرنے کا

رد تھان ہو۔

موریٹک ایسڈ (Muriatic Acid): کھلی ہوا میں گھوم جانے والے چکر اور چلنے میں توازن کا نہ ہونا۔ جب چلے تو لڑکھڑا جائے۔ رانوں کی کمزوری کے باعث۔

سٹیفنی سیکریا (Staphisagria): جب بیضا ہوا ہو تو چکر آجائے۔ دائرے میں چلنے سے بہتری ہو۔

اکونائٹ این (Aconite N): چکر جو خوف کے باعث آتے ہوں، اچانک خوف سے چکر آجائے، خوف زدہ کر دینے والی باقیات کے ڈر سے چکر آئیں۔ مریض کو یہ خوف ہو کہ کتا یا کوئی

چور اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں چکر آجائے۔ دائیں جانب لڑکھڑاہٹ ہو۔ متلی کے ساتھ چکر آئیں۔ خاص طور سے اٹھتے وقت سر ہلانے سے چکروں میں بہتری ہوتی ہے جبکہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے۔

آئیوڈیم (Iodium): صرف بائیں جانب کا چکر آگے کو جھکنے سے بہتری ہو، دل پر لرزہ طاری ہونے اور بے ہوشی ہونے کے ساتھ چکر آئیں۔

پلساٹیل (Pulsatilla): ایسے چکر جن میں چلنے سے بہتری ہو۔ ایسے چکر جن میں مریض نشے کی حالت میں غموس ہوتا ہے۔ خصوصاً جب وہ بیضا ہو۔ سر بھاری ہوتا ہے۔

رہوڈوڈینڈرون (Rhododendron): جب بستر میں لیٹا ہو تو چکر آئیں۔ حرکت کرنے سے بہتری ہو۔

الیومنا سیلیکیٹ (Alumina Silicate): صبح اور شام چکر آئیں جبکہ مریض بیٹھا ہو، چلتا ہو، اچانک سر کو گھمائے۔ آنکھوں کے بند کرنے پر بھی چکر آتے ہوں۔ لیٹنے سے بہتری ہوتی ہے۔

برومیئم (Bromium): پیچھے کی جانب گرنے کے رجحان کے ساتھ چکروں کا آنا، جب کسی پل کو عبور کر رہا ہو اور چلتے ہوئے پانی کو دیکھے یا جب اس کے سامنے بہت تیزی سے حرکت ہو رہی ہو۔

بیرٹا کارب (Baryta Carb): ہر چیز اس کے ساتھ ملے جیسا کہ وہ بھری جہاز میں بیٹھا ہو۔



آنکھیں اور بصارت

(Eyes and Vision)

پھوڑا (آنکھ کے پردے کا) — (Abscess)

کلیریا میور (Calcarea Mur): آنکھوں کے پردے کا پھوڑا۔

بصارت میں دھندلاہٹ

(Amblyopia) (Dimness of Vision)

(دیکھنے "بصارت")

کمزوری (آنکھ کے عضلات میں)

(Asthenopia)

(Weakness of Ocular Muscles of the eyes)

سنا آرنی میزاول (Cina Artemesia Vul): آنکھوں کی موافقت میں خرابی آ جانے سے
پڑھتے وقت آنکھوں میں درد ہو "حروف دھندلے ہو جائیں اور حیطہ بصارت میں پائل آ
جائیں۔ آنکھیں ملنے سے تسکین ہوتی ہو۔

سکڑاؤ (آنکھ کے پردہ شبکی کا) — (Atrophy)

(نیز دیکھئے "آنکھ کا پردہ شبکی" اور "عصب بینائی")

نکس وامیکا (Nux Vomica): آنکھوں کے استعمال کی کوشش کے وقت شدید درد کے
ساتھ پردہ شبکی کا سکڑنا، روشنی برداشت نہ ہو سکے۔ صبح کے وقت ابتری ہو۔

فاسفورس (Phosphorus): عصب بصارت کا موتیا بند کے ساتھ ناکارہ ہو جاتا۔

آرسینک ایلیم (Arsenic Alb) تمباکو کھانے یا تمباکو نوشی کے باعث عصب بصارت کا
تاکارہ ہو جاتا۔

پلکوں کی سوزش — Blepharitis

(Inflammation of the Eyelids)

پٹرولیم (Petroleum): پلکوں کی سوزش یا پلکوں کے کناروں کی سوزش، پلکیں گر جائیں۔
کراسوفارکیم ایسڈ (Chrysopharicum Acid): پلکوں کی سوزش، پردہ قرص کا ورم،
روشنی سے خوف زدہ رہنے کا مرض وغیرہ۔ 30 طاقت کا استعمال اندرونی طور پر کیجئے۔ بیرونی
طور پر 4 گرین ایک اونس دیرلین میں ملا کر مرہم بنا کر لگائیں۔
ماربیلینم (Morbillinum): چچک کے بعد یا چچک کے بد اثرات کی وجہ سے پلکوں کی سوزش
ہو جائے۔

گرافٹائٹس (Graphites): پلکوں پر پھنسیاں جو کہ چھلکوں سے ڈھکی ہوں اور سرخ ہو
جائیں۔ آنکھوں کی پلکیں سرخ اور سوجی ہوئی ہوتی ہیں۔ پلکیں موٹی ہو جاتی ہیں۔ پلکوں میں
چرنے اور خون بننے کا رجحان۔

مرکیوریس کار (Mercurius Cor): خصوصاً آنکھ کے باعث جب پلکوں کا ورم ہو، پلکیں
موٹی سرخ، سوجی ہوئی اور پھنسیوں والی ہوتی ہیں۔ گرمی، سردی اور چھونے سے حساسیت ہوتی
ہے۔ مکمل ہوا اور ٹھنڈی چیزوں کے لگانے سے بہتری ہوتی ہے۔ آنکھ کے ڈھیلوں میں درد اور
خارش ہوتی ہے۔

ہیپیر سلف (Hepar Sulph): حاد کیسوں میں جبکہ مرض کا پہلا مرحلہ گزر چکا ہو اور پیپ
بننے کے قریب ہو یا پہلے ہی بن چکی ہو۔ پلکیں چکین والے درد کے ساتھ جلتی ہیں اور چھونے
سے حساس ہوتی ہیں۔ ٹھنڈک سے بہتری ہوتی ہے جبکہ گرمی سے بہتری ہوتی ہے۔
الیومنا (Alumina): مزمن والے دار پلکیں، پلنی مواد اور جھلیاں گاڑھی اور موٹی ہوتی
ہیں۔ پلکوں کا گر جانا، پلکوں کے حصے مکمل طور پر بالوں سے نکلے ہو جائیں۔

پلساٹیل (Pulsatilla): اونچے طبقے کا طرز زندگی اور مرغن غذاؤں کا استعمال، آنکھوں کی
سوزش کا ذریعہ بنتا ہے۔ چہرے پر دانے بھی ہو سکتے ہیں۔ گوبانہیاں نکلنے کا رجحان، آنکھوں سے
رطوبت بہت زیادہ خارج ہو۔

سٹیفی سیکریا (Staphisagria): پلکوں کے حاشے خشک ہوتے ہیں۔ جن کے ساتھ سخت
گوبانہیاں یا رسولیاں ہوں۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): برتن کے پیٹ والے غیر صحت مند بچوں کی آنکھوں کی سوزش 'یہ بچے خنازیر میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کے سر پر بہت زیادہ پیسہ آتا ہے۔ پلکیں سرخ اور سوتی ہوئی ہوتی ہیں۔

کلکیریا آئیوڈ (Calcarea Iod): غدد کے بڑھ جانے خصوصاً ٹائلسز کے بڑھ جانے کے ساتھ پلکوں کی سوزش۔

رٹاٹکس (Rhus Tox): آنکھوں کے میل اگیدا کے بننے کے ساتھ پلکوں کی سوزش۔

میزیریئم (Mezereum): پلکوں کا اور سر کا انگریزا۔

کونیئم (Conium): پلکیں سخت ہوں ' موٹی ہوں اور بھاری ہوں ' پلکوں کا اور ناف اور رخساروں کا کینسر۔

نابینائی (اندھا پن) — (Blindness)

(نیز دیکھئے "بصارت")

ہیلی بوریس (Helleborus): جب کہ وجہ معلوم نہ ہو۔

سیلیشیا (Silicea): اچانک آنکھوں کے ظاہر ہونے کے ساتھ بینائی کا جاتے رہنا۔

فیرم میٹ (Ferrum Met): ہسٹیریا میں بینائی کا جاتے رہنا۔

فاسفورس (Phosphorus): بجلی لگنے سے بینائی کا جاتے رہنا۔

جلیسی میم (Gelsemium): آنکھوں کے چھپر اور ریا پلکوں کے پھیل جانے کے ساتھ ہسٹیریا

میں زخم کے باعث ' آنکھ سے خون بننے کے باعث نابینائی۔

بوویٹا (Bovista): عصب بصارت کے قانع کے باعث بصارت کا جاتے رہنا۔

کالی میور (Kali Mur): جب برف کے باعث بینائی جاتے رہے ہر طرف دھواں اور دھند دھائی دے۔

گلوٹائن (Glonoine): گردن توڑ بخار یا دماغ کی مھلیوں کے ورم کے بعد یا دوران بصارت کا جاتے رہنا۔

سلفر (Sulphur): یہ دوا 200 ڈائی لیوٹن کی دینی چاہئے۔ بطور عمل انگیز دوا کے استعمال ہوتی ہے۔

لائیکو پوڈیم (Lycopodium): رات کے اندھے پن کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ سب سے پہلے یہی دوا استعمال کرنی چاہئے۔ کانٹے والے دردوں کے ساتھ اچانک بصارت کا جاتے رہنا۔

چائنا آف (China Off): اگر لائیکو پوڈیم ناکام ہو جائے تو یہ دوا استعمال کرنی چاہئے۔ یوں

محسوس ہوتا ہے جیسے آنکھوں میں ریت پڑی ہو۔
 پیٹروسلینیم (Petroselinum): آنکھوں کی سوزش کے ساتھ بصارت کا جاتے رہتا۔
 فائیسوگلما (Physostigma): رات کا اندھا پن جو ہنرموتیا کے ساتھ یا اس کے بغیر یا دور
 کی نظر کمزور ہونے کے ساتھ ہوتا ہے۔
 ریفین کولس بلبوس (Ranunculus Bulboses): عورتوں میں دوران حمل دن کا اور
 رات کا اندھا پن۔
 ہائیوسکیم (Hyoscyamus): کچکا پھٹ اور جھٹکن کے ساتھ رات کا اندھا پن۔
 گلوٹائن بل (Glutamine Bul): گردن توڑ بخار میں اندھا پن۔
 کالی بائیکرو (Kali Bich): درد سر سے پہلے اندھا پن جیسے جیسے درد میں زیادتی ہوتی
 رہتی ہے بصارت درست ہوتی جاتی ہے۔
 مانسی نیلا (Mancinella): شدید سوزش کے باعث اندھا پن۔

آنکھوں کا جھپکنا (Blinking of the Eyes)

لائکو پوڈیم (Lycopodium): اعصابی کمزوری کے ساتھ آنکھوں کی پلکوں کا جھپکنا۔ مریض
 زود رنج ہوتا ہے۔ اندھیرے سے خوف کھاتا ہے۔ اکیلے پن سے ڈرتا ہے۔ چہرے کے اعصاب
 میں پھڑکن ہوتی ہے۔
 بیلا ڈونا (Belladonna): پر خون مریضوں میں آنکھوں کی پلکوں کا جھپکنا۔
 یوفریزیا (Euphrasia): مستقل طور پر پلکوں کا جھپکنا۔
 کالی بائیک (Kali Bich): مستقل طور پر پلکوں کا جھپکنا، مرگی کے حملے کے دوران۔
 کروکس، کلکیریا کارب (Crocus, Calcareia Carb): پڑھنے کے دوران اور بعد میں
 پلکوں کا جھپکنا۔

چمک (آنکھوں کی) (Brightness)

بووٹا (Bovista): چمک کے بغیر آنکھیں۔
 یوفریزیا (Euphrasia): آنسوؤں اور آنکھوں کے میل (کیدا) کے پسنے جیسے ساتھ جلن اور
 کٹن ہو۔ آنکھیں ضرور ہی جھپکیں۔
 ایلیم سیپا (Allium Cepa): جلن ہو جیسے کہ دھریں سے ہوتی ہے۔ مریض آنکھیں ملتا
 چاہے۔ آنکھوں سے پانی نکلے۔

روٹا (Ruta): رات کے دوران یوں محسوس ہو جیسے آگ کے گولے آنکھوں میں ہوں۔
 کریوزوٹ (Kreozote): آنکھوں کے میل کے ساتھ جلن، تیز روشنی میں لہتری ہو۔
 آنکس ٹینکس (Ins Tenax): آنسوؤں کے بغیر آنکھوں میں جلن۔
 اگریکس ایم (Agaricus M): آنکھوں کے پونے آپس میں مل جانے کے ساتھ آنکھوں میں جلن۔
 کاسٹیکم (Causticum): آنکھوں میں جلن ہو جیسا کہ چھوٹے پھوٹے نقطوں کی صورت میں آنکھوں کے اندر چمکتا ہوا گولہ رکھا گیا ہو۔

موتیا بند — (Cataract)

کاسٹیکم (Causticum): دور کی نظر کمزور ہو جانے کے بلند درجے کے ساتھ ابتدائی مرحلہ میں یہ دوا ایم ہر مین کے بعد دی جاتی ہے۔ آنکھوں کا شیبہ والا پردہ خراب ہو جاتا ہے اور قریب کی نظر میں خرابی ہوتی ہے نیز سر کے دو چھوٹے پنوں کی کمزوری لاحق ہوتی ہے۔
 گلکیریا فلور، سلفر (Calcarea Flour Sulphur): بعد کے مراحل میں سلفر 200 طاقت کا ہر پندرہ دن کے بعد دیا جانا چاہئے۔ اس دوا سے ایک روز پہلے اور ایک روز بعد کوئی دوسری دوا نہ دی جائے۔ دوسرے دنوں میں گلکیریا فلور دی جائے۔ 30 طاقت کی خوراک دن میں تین مرتبہ پانچ پانچ گھنٹوں کے وقفوں کے ساتھ۔

فاسفورس (Phosphorus): یہ بھی موتیا بند کی بہت اچھی دوا ہے۔ آنکھوں کے سامنے کالے نقطے تیرتے ہیں۔ بصارت کے سامنے رنگ نظر آتے ہیں۔ آنکھیں گرمی اور آگ سے جلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ آنکھوں کے سامنے دھند آ جاتی ہے۔ ایم طاقت کی ایک دوا ہر ماہ دی جائے۔

سلفر (Sulphur): معدہ کے گڑھے میں ڈوبنے کے احساس کے ساتھ موتیا بند، گرمی چہرے کی طرف جڑھتی ہے۔ غسل کرتے وقت بے ہوشی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ دوا گلکیریا فلور کے ہمراہ عمل انگیز کا کام کرتی ہے۔ ہر پندرہ روز کے بعد دی جائے۔

سوزش (آنکھ کے سیاہ حلقے کی)

Choroiditis (Inflammation of the Choroid)

سلفر آیوڈ، آیوڈیم (Sulphur Iod, Iodium): زبان سخت اکڑی ہوئی ہونے کے ساتھ موتیا بند جیسا کہ کارڈیورڈ ہوتا ہے۔

اورم میٹ (Aurum Met): آنکھوں میں دہانے والے درد کے ساتھ جو کہ اوپر سے نیچے کی طرف دہاتے ہیں یا اندر کی جانب دہنے کے بغیر یا آنکھوں کے گرد والی ہڈیوں میں درد کے ساتھ چھوٹے سے بہتری ہوتی ہے اور روشنی سے حساسیت۔

کالی آئیڈ (Kali lod): آنکھوں کے سیاہ حلقے کی آنتھک کے لئے جو کسی بھی صورت میں ہو۔ یہ عمومی طور پر بہترین دوا ہوتی ہے۔ خصوصاً آنکھ کے اس سفید گاڑھے مادے کا دھندلا پن جو آنکھ کے عدسہ کے پیچھے والے خلا کو پر کرتا ہے۔

مرکوریس کارب (Mercurius Carb): آنکھ کے گرد اور آنکھ کے اندر شدید درد آنکھ کے سیاہ پردہ کا ورم جبکہ پردہ عینہ یا انگوری پردہ بھی متاثر ہو۔

فاسفورس (Phosphorus): موتیا بند جب کہ اس کے ہمراہ چند یا پن یا روشنی سے ڈرنے کا مرض لاحق ہو اور چیزیں بہت سی شکلوں اور رنگوں میں نظر آئیں۔ (جن میں سرخ رنگ نمایاں ہوتا ہے) آنکھوں کے سامنے سے کالے دھبے گزرتے ہیں۔

پرونس سپن (Prunus Spin): شدید درد جیسا کہ آنکھوں کے ذیلی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دب رہے ہوں۔ تیز گولی لگنے جیسے کپلے جانے جیسے اور کانٹے جیسے درد آنکھ میں سے گزر کر سر کی طرف جاتے ہوں۔

ہیمپر سلف (Hepar Sulph): آنکھ کی سیاہ پتلی میں پیپ بننے کے عمل کے شروع ہونے کے بعد۔ آنکھیں چھوٹنے سے حساس ہوتی ہیں اور شدید درد ہوتا ہے اور جھکن ہوتی ہے۔ گرم چیزیں لگانے سے بہتری ہوتی ہے۔

فائیٹولاکا (Phytolacca): ٹیکلیں بے حد سخت ہوتی ہیں نیز سرخ اور سوخی ہوئی ہوتی ہیں۔ آنکھ کے اندرونی حصہ میں پیپ ہوتی ہے۔

ڈوبوئیا (Duboisia): آپٹک ڈسک اور پردہ شبکی رگیں بڑھی ہوئی تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ آپٹک ڈسک میں اجتماع خون ہوتا ہے۔

توبریکولینم (Tuberculinum): جب تمام اچھی منتخب دوائیں ناکام ہو جائیں تو یہ دوا عمل انگیز دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ 200 طاقت کی یا اونچی طاقت کی صرف ایک خوراک دیجئے۔

پلکوں کے امراض

(Siliary Body- Diseases of the)

جبوراندی (Jaborandi): پلکوں کی ہم آہنگی کے دوروں میں یا پلکوں کے عضلات کے

بجلیان میں یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔ کچھ فاصلے سے دیکھنے پر ہر چیز ٹینک (مفر شیشے) کے بغیر دھندلی نظر آتی ہے البتہ قریب کی چیزیں صاف نظر آتی ہیں۔ بصارت مسلسل بدلتی ہو سکتی ہے۔ آنکھوں کے استعمال پر مٹتی ہوتی ہے اور چکر آتے ہیں۔

فائیسوسگما (Physostigma): آنکھوں کے گرد اور پلکوں میں پھرن کن 'پلکوں کے عضلات میں تشنج یا اینشن۔

اگریکس ایم (Agaricus M): پلکوں کے تشنج یا عمومی رعشہ کے ساتھ اگر ہو تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ پلکوں میں پھرن کن ہوتی ہے۔

قریب نظر (رنگوں کا) — (Coloured Vision)

(نیز دیکھئے "بصارت" قریب نظر)

فاسفورس (Phosphorus): رنگوں کے اندھے پن کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے اور عام استعمال ہونے والی دوا ہے۔

سٹرانسیم (Strantium): چیزیں ایسی دکھائی دیتی ہیں جیسے خون میں لتھڑی ہوئی ہوں۔

آرسینک البم (Ars. Alb): چیزیں ہز نظر آتی ہیں۔

کیپسکیم (Capsicum): چیزیں کالی نظر آتی ہیں۔

اکٹیا سپائی (Actea Spi): چیزیں نیلی نظر آتی ہیں۔

کیمفرا (Camphara): چیزیں روشن اور چمک دار نظر آتی ہیں۔

ایناہولی نم (Anaholinum): بصارت میں بے انتہا چمک اور رنگ بھرے ہوتے ہیں۔

سٹرامونیم (Stramonium): چیزیں سرخ کی جگہ سیاہ نظر آتی ہیں جبکہ سیاہ چیزیں بھوری نظر آتی ہیں۔

سنا (Cina): چیزیں پیلی نظر آئیں۔

اگریکس ایم (Agaricus M): آنکھوں کے سامنے رنگوں اور شکلوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔

ڈی جی نیلس (Digitalis): پیلی چیزیں سفید نظر آتی ہیں۔

کاربونیم سلف (Carbonium): سرخ اور ہز چیزیں سفید نظر آتی ہیں۔

ہائوسامس (Hyoscyamus): چیزیں سنہری نظر آتی ہیں۔

بیلادونا (Belladonna): سرخ چیزیں پیلی نظر آتی ہیں۔

کونیم (Conium): چیزیں سرخ نظر آتی ہیں نیز قوس قزح کے رنگوں والی نظر آتی ہیں۔

بلیوں والی نظر آئیں۔ ہر چیز دو دو نظر آئے۔ روشنی سے نفرت ہو، نظر کمزور ہو جائے۔

گرودشیولا (Grotiola): سبز چیزیں سفید ظاہر ہوتی ہیں۔

آشوب چشم — (Conjunctivitis)
(دیکھئے "سوزش")

تھیلی (آنکھ میں ہو) — (Cyst)

کلیریا فلور (Calcarea Fluor): پلوں پر تھیلی ہو۔ 16 ایکس یا 30 طاقت کی دوا دیجئے۔
نایٹرک ایسڈ (Nitric Acid): جب کلیریا فلور ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جاسکتی ہے۔
سٹیفیسیکیریا (Staphisagna): آنکھ کی تھیلی کے لئے بہترین دوا ہے۔ جو کہ پلوں پر نکلنے والی پھٹیوں سے گوبانہٹیوں کی صورت اختیار کر جاتی ہیں۔

پردہ شبکی کی علیحدگی

(Detachment of Retina)

(دیکھئے "پردہ شبکی")

ایک کے دو نظر آنا — (Diplopia)

(دیکھئے "دوہری بسمارت")

پانی کا اخراج (آنکھ سے)

(Discharge- Watery)

(دیکھئے "آنسو")

رنگت (کی تبدیلی) — (Discolouration)

سٹیفیسیکیریا (Staphisagna): آنکھ کے گرد نیلے یا کالے دائرے بن جاتے ہیں۔
سائیکلے من (Cyclamen): آنکھوں کے گرد نیلے دائرے ہوں۔
چائنا (China): خون کی کمی کے باعث آنکھوں کے گرد نیلے دائرے بن جائیں۔
ورٹرم ایلوم (Veratrum Alb): پیض کے حملے کے بعد یا دوران آنکھوں کے گرد نیلے حلقے

یہ سبز حلقوں کو بھی درست کرتی ہے۔
نیٹرم کارب (Natrium Carb): پیلے چہرے کے ساتھ آنکھوں کے گرد نیلے حلقے۔
فاسفورس (Phosphorus): جیش کے بعد آنکھوں کے گرد نیلے حلقے۔
سٹا (Stea): عیند میں کیڑوں یا قکت دم کے باعث آنکھوں کے گرد نیلے حلقے پڑ جائیں۔
نکس وامیکا (Nux Vom): آنکھوں کے گرد پیلے حلقے۔
سیکیل کار (Cecale Cor): آنکھوں کے ڈھیلے آنکھوں کے گڑھوں میں ڈوب جائیں اور
 آنکھوں کے گرد نیلے حلقے پڑ جائیں۔
اکتیا آر (Actea R): آنکھیں لمبی ہو جائیں، ڈوب جائیں اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ
 حلقے پڑ جائیں۔
بربرس وی (Berbe V): آنکھیں ڈوب جاتی ہیں۔ جن کے گرد نیلاہٹ مائل گڑھے پڑ
 جاتے ہیں یا گہرے سبز حلقے پڑ جائیں۔
مینسی نیلا (Mancinella): آنکھوں کے گرد نیلے حلقے ہوں۔

آنکھوں کے ڈھیلے — (Eye-Balls)

آئیوڈیم، لائیوپیس ویر، کالی میور (Iodium, Lycopus Vir, Kali Mur): آنکھوں کے
 ڈھیلوں کا باہر کو نکلے ہوتا دی ہوئی ترتیب کے مطابق دوائیں استعمال کریں۔
اگنیٹیا (Ignatia): گھڑی کے پینڈولم کی طرح سے آنکھوں کے ڈھیلے حرکت کریں۔ باوجود
 اس کے کہ مریض اپنی نگاہ آپ پر جمائے کی کوشش کرے۔ یہ کیفیت صرف سونے کے دوران
 رہتی ہے۔

پلکیں — (Eye-Lashes)

(دیکھئے "بالوں کا گرنا" اور "پلکوں کا اندر کی جانب اٹکنا یا مڑنا")

مسامات اشکی کی خرابی (بندش)

(Fistula of Lachrymal Duct)

(دیکھئے "آنسو")

آنکھوں کی جھپکاہٹ

(Flicking of the Eyes)

اگیریکس ایم، سائیکلے من، نیتروم میور (Agaricus M, Cyclamen, Natrum Mur) دی گئی ترتیب کے مطابق آزمائی جانی چاہئیں۔

ریشوں کی نشوونما (Fibrous Growths)

(دیکھئے "رسولیاں")

سبز موتیا (Glaucoma)

فسفورس (Phosphorus): سبز موتیے کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے اگر یہ دوا ناکام ہو جائے تو لائیکوپوڈیم اور سیلیسیا آزمائیں۔

سپائی جیلیا (Spigelia): سبز موتیا سر کے بائیں جانب کے شدید درد کے باعث ہو۔

پروٹس سپائی نوسا (Prunus Spinosa): جب سپائی جیلیا ناکام ہو جائے تو اسے آزمایا جانا چاہئے۔

ہیمپٹر سلف کریفائنس (Hepar Sulph, Graphites): بچے نے دانے دار ہوں۔ دی گئی ترتیب کے مطابق یہ دوائیں آزمائیں۔

بوریکس (Borax): آنکھوں کے پچے دانے دار ہوں جبکہ پلکیں اندر کی جانب آنکھوں کی طرف مڑی ہوئی ہوں اور جلن پیدا کریں۔ بچوں کا مواد اور بھلیاں سوئی ہو جاتی ہیں۔ آنکھ کے نیچے والے پچے کھل طور پر اندر کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بچوں کو کھولنے میں دقت محسوس ہو۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): پلکوں کے اندر کی طرف مڑنے کے مرض کے لئے یہ بھی ایک اچھی دوا ہے۔ جب بوریکس ناکام ہو جائے تو اسے استعمال کریں۔

جلیسمم (Gelsimium): یہ سبز موتیے کے لئے مخصوص دوا ہے جبکہ درد سر گردن کی گدی سے شروع ہو۔

اوسیمم (Osmium): سبز موتیا میں یہ دوا استعمال کی جاتی ہے جبکہ مریض قوس قزح کے رنگ دیکھتا ہے۔ جس کے ساتھ اوپر کی جانب یا آنکھوں کے نیچے کی جانب آنکھوں کے (ڈیڈ) میل کے ہمراہ شدید درد ہوتا ہے۔ روشنی کے گرد سبز دائرہ نظر آتا ہے۔ آنکھوں کا دباؤ بڑھا ہوا

ہوتا ہے۔ روشنی سے خوف کھانے کا مرض لاحق ہو۔ نظر کمزور ہوتی ہے۔ آنکھوں اور سر میں تیز اور شدید درد ہوتا ہے۔
 سلفر (Sulphur): جب اچھی منتخب شدہ دوائیں ناکام ہو جاتی ہیں تو اسے عمل انگیز دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ معدے کے نیچے والے حصے میں جلن ہوتی ہے۔
 کالو سنتھس (Colocynth): درد شدید اور معدے میں گیس کے ساتھ ہبڑ موتا ہو تو یہ دوا دی جاتی ہے۔

آنکھ کے پپوٹوں کے دانے

(Granulation of Lids)

(دیکھئے "پپلوں کی سوزش")

سیلان خون — Haemorrhage (Bleeding)

کروٹیلس ہور (Crotalus Hor): آنکھوں سے خون آتا ہے۔ پردہ شبکی سے سوزش کے بغیر خون بہتا ہے۔

لیکسیس (Lachesis): آنکھ کے اندرونی حصہ کی جانب پردہ شبکی سے خون کا بہنا۔ یہ دوا بننے والے خون کو جذب کر لے گی۔

جلمی میم (Gelsemium): آنکھ کے سیلان خون کے لئے یہ ایک بہترین دوا ہے۔ اس سیلان خون کے نتیجے میں اندھا پن لاحق ہوتا ہے۔ 200 طاقت کی دوا دن میں دو بار صبح و شام روزانہ دی جائے۔

فاسفورس (Phosphorus): جب جلمی میم ناکام ہو جائے تو یہ دوا آزمائی جانی چاہئے۔
 آرنیکا ایم (Arnica M): جب سیلان خون آنکھ کے زخم کے باعث ہو۔ 1000 طاقت کی دوا دیجئے۔ دوا روزانہ صبح نہار منہ دی جائے۔

سلفر (Sulphur): آنکھوں کے پپوٹوں سے سیلان خون ہو۔

بال (آنکھوں کے) گریں — (Hair, Falling of)

کالی کارب (Kali Carb): آنکھوں کی بھنوں سے بالوں کا گرنا۔
 ایناٹھیرم (Anatherum): آنکھوں کی بھنوں سے بالوں کے گرنے میں اگر کالی کارب ناکام ہو جائے تو اس دوا کو آزمایا جاسکتا ہے۔

ایلیومینا (Alumina): آنکھوں کی پلکوں کا گرنا۔
 رشاکس (Rhus Tox): آنکھوں کی پلکوں کا گرنا۔
 پلساٹیلہ (Pulsatilla): آنکھ میں پال گرنے کا احساس۔

سوزش 'ورم' (آنکھ کے سفید پردے کا ورم)

Inflammation (Conjunctivitis)

آکونائٹ نیپ (Aconite Nap): (نزولہ 'زکام) صفحہ تک سے 'چوٹ سے 'مگرد سے 'بڑاچی سے 'نہر دوں کے بڑھ جانے کے ہمراہ 'ختنا زیری سوزش ہو۔

ایسٹک ایسڈ (Acetic Acid): جب سخت لیس دار مادہ ہٹانا مشکل ہو۔

بیلادونا (Belladonna): جب آنکھوں میں خون بھرا ہو اور وہ سرخ ہوں۔ بہت زیادہ سوزش ہو اور درد کریں۔

مرک کور (Merc Cor): آنکھ دکھنے کے مرض کے لئے یہ بہترین دوا ہے۔ یہ علاوہ اور مزمن امراض دونوں میں دی جا سکتی ہے اور آپ کبھی بھی اس سے مایوس نہیں ہوں گے۔ (چھینی طاقت استعمال کیجئے۔)

یوفریزیا (Euphrasia): اس وقت یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔ جب آنکھوں سے چھیلنے والا (تیزابی) پانی خارج ہوتا ہے۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): پیپ کا بہت زیادہ اخراج ہو۔ آنکھ کا پردہ دھندلا ہو۔ آنکھوں کے پونے ڈبکیں 'پونے مونے' سوچے ہوئے اور زخمی ہوں۔ صبح کے وقت پونے آپس میں جڑے ہوئے ہوں۔ آنکھوں کے زاویے خون کی مانند سرخ ہوں۔ آنکھوں سے نکلنے والا لیس دار مواد بصارت کے آگے رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اسے بار بار صاف کرنا پڑتا ہے۔ آنکھیں نزلاوی زخموں کی حامل ہوتی ہیں۔ آنکھ کا شفاف پردہ دھندلا ہو جاتا ہے۔ صفحہ کی چیزیں لگانے سے بہتری ہوتی ہے۔

کالی آئیوڈ (Kali Iod): آنکھوں سے گاڑھا سبز مادہ افراط کے ساتھ خارج ہو۔

کریو زوٹ (Krosote): آنکھوں میں سوزش ہو 'سرخ ہوں' جن سے آسانی کے ساتھ سیلان خون ہو۔

ماربیلینم (Morbillinum): چچک کی تکلیف میں جھلا ہونے کے بعد سیلان خون ہوتا ہے۔

ایپس ایم (Apis M): آنکھوں کے پونوں میں ڈنک لگنے کے ساتھ سوزش ہو 'گولی لگنے جیسے درد ہوتے ہیں اور روشنی سے خوف کے مرض میں جھٹا ہو۔

رٹائس (Rhus Tox): گاڑھی پیپ آنکھوں سے خارج ہو۔ بہت زیادہ سوزش ہوتی ہے۔
گرم آنکھوں کا میل بہتا ہے۔ بے چینی ہوتی ہے۔ آدمی رات کے وقت ابتری ہوتی ہے۔
اورم میور (Aurum Mur): دراشی آنکھ کے باعث سوزش، بے چینی پیدا کرنے والا
آنکھوں کا میل (گید) روشنی سے خوف زدہ ہو۔

روٹا جی (Ruta G): تباؤ کے باعث آنکھوں میں درد ہوتا ہے۔ جس میں لہندک سے ابتری
ہوتی ہے۔ (ارجنٹم ٹائٹ) کے برعکس۔
سلفر (Sulphur): پپے نے سوئے ہوں اور سیلان خون آسانی سے ہو۔

الیمنا سیلیکیٹ (Alumin Silicate): آنکھوں میں درد، شام کے وقت آنکھیں جلیں جیسا
کہ دھوئیں سے جلتی ہوں۔ کھلی ہوا میں غارش کے ساتھ آنکھوں میں سوزش ہو۔ پپوں میں
اور آنکھوں کے زاویوں میں جلن ہوتی ہے۔ آنکھوں میں درد ہو جیسا کہ آنکھوں میں دیت
بڑی ہو۔

مینسی نیلا (Mancinella): شدید سوزش جس کے باعث کچھ روز تک چٹائی جاتی رہے۔
ہیپیر سلف (Hepar Sulph): گاڑھے بدبودار پیپ کا اخراج ہو جس کے ساتھ آنکھوں
میں سوزش ہوتی ہے۔ آنکھوں کے شفاف پردے کا زخم جس کے ساتھ بدبودار سیلان خون ہوتا
ہے۔

چوٹ (یا زخم آنکھ میں) — (Injury)

آرنیکا ایم، ہائپرکیم (Arnica M, Hypericum): تمام قسم کی چوٹوں کی تکلیفوں میں آرنیکا
کی ایم کی دو تین خوراکیں چوبیس گھنٹے کے وقفے کے ساتھ مرض کے آغاز میں دی جائیں اگر
اس سے کوئی بہتری نہ ہو تو پھر ہائپرکیم کی 6 یا 30 طاقت کی خوراک ہر دو گھنٹے کے بعد دی
جائے۔

ہیمامیلس وی (Hamamelis V): آنکھ کے عصب کے پھان کے لئے یہ دوا استعمال کی
جاتی ہے۔ اس میں روشنی کا خوف اور آنکھوں میں دھنک ہوتی ہے۔

قرنیہ کی سوجن — (Interstitial Keratitis)

(قرنیہ بغیر باسوری کیفیت کے موٹا اور دھندلا ہو جاتا ہے)

مرک سول (Merc Sol): تیزابی آنسوؤں کے ساتھ آنکھ کے شفاف پردے میں شدید درد۔
ہیپیر سلف (Hepar Sulph): چھوٹے سے اور روشنی سے آنکھوں میں حساسیت ہوتی ہے۔

گاڑھا پیلا مواد خارج ہوتا ہے۔ آنکھ کے شفاف پردہ کے ریشوں کے لیے حصے میں غلاظت ہوتی ہے۔

نیٹرم میور (Natrium Mur): آنکھ کے شفاف پردہ کا آنکلی دھندلا پن تمام حلقہ چشم میں دبا دیا درد ہو۔

نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): آنکلی دھندلاہٹ رات کے درد کے ساتھ 'تیزابی آنسو بہتے ہیں۔ گاڑھی غلاظت نکلتی ہے اور آنکھ کی سطح پر زخم ہونے کا رجحان ہوتا ہے۔

آنکھ کی پتلیوں کی سوزش — (Iritis)

مرکوریس کار (Mercurius Cor): آنکھ کی پتلی کے ہر قسم کے امراض کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ خصوصاً سوزاکی اور آنکلی امراض میں۔ آنکھ کے اندر اور آنکھ کے گرد عمومی طور پر شدید درد ہوتے ہیں۔ نیز ماتھے اور کنٹیوں میں بھی درد ہوتا ہے۔ درد رات کو بڑھ جاتے ہیں۔ روشنی سے حساسیت ہوتی ہے۔ آنکھ کی پتلی کی جھلیاں بے رنگ ہو جاتی ہیں۔ آنکھ کی پتلی سکر جاتی ہے۔ یہ دوا چپکنے کی صورت کو روکتی اور درست کرتی ہے۔ آنکھ کے شفاف پردے کی سوزش نیز آنکھ کے عصب کی سوزش 'ہر قسم کی بصارت کی تکلیف۔

ہیپرسلف (Haper Sulph): جب سوزش قریب کی رگوں 'آنکھ کے شفاف پردے اور پلکوں تک پھیل جائے اور جب اندرونی حصہ میں پیپ بڑ جائے۔ درد گرمی سے دور ہوتی ہے اور حرکت سے زیادہ ہوتی ہے۔ مریض ٹھنڈک محسوس کرتا ہے اور گرم چیزوں سے آنکھ کو ڈھانپنا چاہتا ہے۔

سینڈرون (Cedron): شدید اعصابی درد حلقہ چشم کے اعصاب میں ہوتا ہے۔ خصوصاً دورے کی صورت میں۔

نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): آنکھ کی پتلی کی جھلیوں کے آنکلی مرض کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔

رٹھاکس (Rhus Tox): وجع المفاصل والی آنکھ کی پتلی کی جھلیوں کی تکلیف ہو جو کہ پانی میں آنکھیں کھولنے کے باعث ہو یا وجع المفاصل والے مریضوں میں پانی جائے۔ موچا بند کی جراحی کے بعد لاحق ہو جانے والے آنکھ کی پتلی کی جھلیوں کے مرض کے لئے آنکھیں کھولنے پر بہت زیادہ آنسو بہنے کے ساتھ آنکھوں کے پونے سوج جائیں۔

ٹھوجا (Thuja): آنکھ کی پتلیوں کی جھلی کا آنکلی مرض جس کے ساتھ آنکھ کی پتلی کی جھلیوں پر چھپا ہٹ ہوتی ہے۔ آنکھوں میں شدید تیزانک لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ جن میں اضافہ رات

کے وقت ہوتا ہے اور گرمی سے یہ درد دور ہوتے ہیں۔
آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): آنکھوں کی پتلی کی مھلیوں کا مرض جو کہ چوٹ لگنے سے
 لاحق ہوتا ہے۔ علاوہ انہیں یہ دوا وجع المفاصل والے مھلیوں کے کیسوں میں بھی مدد دیتی ہے۔
اورم میٹ (Aurum Met): آنکھ کی مھلیوں کے مرض میں یہ دوا استعمال ہوتی ہے اور
 مرکز کی یا پوناش کی دوا استعمال کرنے کے بعد بھی یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ آنکھ کے گرد
 ہڈیوں میں گہرائی کے اندر بہت زیادہ درد ہوتا ہے جو چھونے سے اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ درد
 اوپر سے نیچے کی طرف ہو جاتا ہے۔ جس میں آرام اور دباؤ کے باعث ابتری ہوتی ہے۔

سوجن — (Keratitis)

(دیکھئے ”قرنیہ کی سوجن“)

آنکھوں سے پانی کا اخراج — (Lachrymation)

(نیز دیکھئے ”آنسو“ کے ذیل میں)

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): ٹھنڈے لگنے سے آنسوؤں کی ٹہلی بند ہو جاتی ہے۔

پلکوں کا اندر کی جانب اگنا — (Lashes-Ingrowing)

بوریکس (Borax): پلکیں اندر کی طرف اگتی ہیں۔

پلساٹیل (Pulsatilla): پلکیں اندر کی جانب اگتی ہیں۔ یہ دوا بوریکس کے ناکام ہو جانے کے
 بعد استعمال کی جاتی ہے۔

گرافٹس (Graphites): پلکیں بے قابو ہو جاتی ہیں اور اندر کی طرف مل جاتی ہیں۔ آنکھ
 کے ذیل کی طرف اور آنکھ کے سفید پردہ میں سوزش ہوتی ہے۔

دور کی نظر کی کمزوری — (Myopia)

(نیز دیکھئے ادویات ”بصارت“ کے ذیل میں)

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): اخبار کو صرف آنکھوں کے انتہائی قریب کر کے جب
 کہ اخبار ناک کو چھو رہی ہو پڑھ سکے۔

فائیسوسٹگما (Physostigma): جب دور کی نظر کمزور ہونے کی وجہ پلکوں کا تشنج ہو سبز
 مورتیا ہو دور کی نظر کمزور ہو جانے کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ رات کے وقت بیٹائی جاتی

رہے۔
چائنا آف (China Off): ٹائیفس بخار کے بعد دور کی نظر کمزور ہو جائے۔ جس کے ساتھ اس سال بھی ہوں۔
اگیریکس ایم (Agaricus M): پتکوں کے عضلات کا تشنج، بچوں کے چھوٹے کے ساتھ، نظر بہت قریب کی رہ جائے۔ بصارت میں دھندلاہٹ ہو، ہر چیز دھندلی نظر آتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ کمزری کے جانے سے ڈھکی ہوئی ہو۔
فاسفورس (Phosphorus): موم جی کے گرد ہال، سیاہ انعکاس یا پتنگاری اور آنکھوں کے سامنے کالے دھبے ہوتے ہیں۔ دن کے وقت بہتر دکھائی دیتا ہے نیز آنکھوں کے اوپر ہاتھ کا سایہ کرنے سے بھی بہتر دکھائی دے۔
نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid): دور کی نظر کمزور ہو جائے۔ جس کے ساتھ آنکھوں کے سامنے کالے دھبے ٹاپتے ہوئے دکھائی دیں۔ آتشک کے باعث یا مرکری کے غلط استعمال کی وجہ سے نظر بہت قریب کی رہ جائے۔
کاربونیم سلف (Carbonium Sulph): دور کی نظر کمزور ہو جائے۔ دیکھنے میں تکلیف ہو۔ قوس قزح کے بنیادی رنگوں میں تمیز نہ رہے۔ مختلف قسم کے رنگ دیکھ سکتے کی ٹالہیت، آنکھ کے عصی پٹوں میں کمزوری ہو نیز نظر کے سامنے ہال آجائیں۔ آدھا دیکھ سکتے کے مرض کے بعد اچانک بینائی کا جاتے رہتا۔
کلکیریا فلور (Calcareous Flour): آنکھ کے قرنیہ کی دھندلاہٹ۔ اس مرض کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ لمبے عرصہ کے لئے اسے استعمال کرنا چاہئے۔
نیفتھالین (Naphthaline): قرنیہ اور اسی طرح آنکھ کے عرصہ کی دھندلاہٹ۔
مگنیشیا کارب (Magnesia Carb): ناسور یا زخم کے بعد قرنیہ کی دھندلاہٹ۔
سلیشیا (Silicea): پیچک کے بعد قرنیہ کی دھندلاہٹ۔ یہ دوا لمبے عرصہ کے لئے استعمال کرنی چاہئے۔
ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): ناسور یا زخم کے بعد قرنیہ کی دھندلاہٹ۔

آنکھ کے امراض — (Ophthalmia)

(دیکھئے ”سوزش“)

آنکھ کا درد — (Pain in the Eyes)

روٹا (Ruta): پڑھنے سے آنکھوں میں درد لاحق ہو۔
 بیلادونا (Belladonna): سوزش کے باعث آنکھوں کا درد، آنکھیں خون سے بھری ہوں۔
 بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔
 سپیٹا جیلیا (Spigelia): جب بائیں طرف درد سر ہو جو بائیں آنکھ کے ڈھیلے تک آتا ہے۔
 سینگوینیٹا (Sanguinaria): جب درد سر دائیں جانب ہو اور دائیں آنکھ کے ڈھیلے کی طرف جائے۔
 نیٹرم میور (Natrium Mur): جب درد کسی ایک جانب یا دونوں جانب ہوتا ہے اور آنکھ کے ڈھیلوں تک جاتا ہے۔
 سیڈرون (Cedron): جماع کے بعد بائیں آنکھ کے اوپر درد۔
 اونوسموڈیم (Onosmodium): آنکھوں میں کھنچاؤ محسوس ہو۔ جیسا کہ انہیں کھینچا جا رہا ہو۔ باریک لکھائی پڑھنے پر دیکھنے کے لئے چیزوں کو دور رکھنے کی خواہش۔

روشنی کا خوف (نور ترسی)

Photophobia (Intolerance of Light)

بیلادونا (Belladonna): سوزش کے باعث روشنی برداشت نہ ہو سکے جس کے نتیجہ میں آنکھیں خشک اور دھنسی ہوئی ہوتی ہیں جبکہ آنکھوں کا میل نہیں ہوتا۔ روشنی سے خوف کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔
 گرافائٹس (Graphites): روشنی سے خوف کا انتہا درجے کا مرض جو سورج کی روشنی میں لاحق ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ آنکھوں کا میل یا افراط ہوتا ہے۔
 نکس وامیکا (Nux Vomica): بے انتہا شراب نوشی کے باعث یا رات کی عیاشی کے بعد لاحق ہونے والے روشنی کے خوف کے مرض کے لئے یہ راہنما کن دوا ہے۔ شراب نوشی کی زیادتی عصب بعسارت کے آثار ہونے کا باعث بن سکتی ہے چنانچہ یہ دوا اسے درست کرتی ہے۔ دماغی اور عصبی بیجان بھی اس دوا سے درست ہوتا ہے۔
 مرکوریس (Mercurius): آگ کی روشنی آنکھوں کو بہت زیادہ چند صیادیتی ہے۔ آنکھیں آگ کی روشنی اور دن کی روشنی کو برداشت نہیں کر سکتیں۔
 اکنائٹ این (Aconite N): روشنی کے خوف کا مرض لاحق ہو۔ جس کے ساتھ ٹھنڈ یا

زکام کے باعث یا آنکھوں میں تیزابی مادے کے باعث درد والی سوزش ہوتی ہے۔
گلوٹائن (Glonine): جب پیلا ڈونا تکام ہو جائے تو اس دوا کو آزمانا چاہئے۔
رشاکس (Rhus Tox): روشنی بہت ہی زیادہ ناقابل برداشت ہو۔ یہاں تک کہ رات کو
 بھی مریض آنکھیں کھول ہی نہ سکے۔ اس میں آنکھ کی استقامتی سوزش کے ساتھ آنکھیں سرخ
 ہوتی ہیں اور تیزابی مادے کا اخراج ہوتا ہے۔
یوفریزیا (Euphrasia): آنکھوں سے بہت زیادہ جلن دار پانی بہنے کے ساتھ روشنی کے
 خوف کا مرض لاحق ہو۔ مصنوعی روشنی برداشت نہ کر سکے۔
کلکیریا کارب (Calcarea Carb): حتیٰ کہ معمولی روشنی میں بھی نہ کھڑا ہو سکے۔ سورج
 کی روشنی میں کھڑا ہونا تو یقیناً ناممکن ہو۔

آنکھوں کی جراحی کے بعد کی تکلیفات

(Post-Operation of the Eyes)

آرنیکا ایم (Arnica M): سرجری کے بعد اثرات کے لئے یہ دوا بہت کامیاب رہی ہے۔
اگنیشیا (Ignatia): کپٹیوں میں شدید درد ہو۔
رشاکس (Rhus Tox): سر میں گولی لگنے جیسے درد ہوں۔
لیڈم پال (Ledum Pal): انگوری پردہ کاٹنے کے بعد آنکھ کے اندرونی حصہ میں سیلان
 خون۔
برائی اونیا (Bryonia): آنکھ کے ہمراہ سر میں درد ہو۔
اسارم (Asarum): آنکھ اور اسہال کے ساتھ جھٹکے لگنے والا درد۔
کروکس (Crocus): آنکھوں میں ہتھوڑے لگیں اور جھٹکے لگیں۔
تھوچا (Thuja): کپٹیوں میں ڈبک لگنے جیسے درد۔
سنا (Senna): آنکھ کے دوسرے زائد مواد کو جذب کرنے میں مدد دیتی ہے۔
سٹرانیشیا (Strontia): چیزیں خون میں تھری ہوئی محسوس ہوں۔

آنکھ کے بلائی پوٹوں کا فالج

(Ptosis or Paralysis of the Upper lids)

جلسی میم (Gelsemium): آنکھ کے بلائی پوٹوں کا فالج، آنکھوں کے پوٹے بھاری ہوں۔

مریض مشکل ہی سے انہیں کھول سکے۔ آنکھوں کے ذیلوں میں دھمکن محسوس ہو۔ حرکت سے ابتری ہو۔ خنق کے باعث آنکھوں کے عضلات کا فالج ہو نیز اس کا باعث گردن توڑ بخار، جذباتیت یا ٹھنڈ میں جسم کھولنے یا مرطوب موسم ہوتا ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): گنٹھیاوی مریضوں میں، گیلے رہنے کے باعث۔

سپیا (Sepia): جب اس مرض کا تعلق حیض کی بے قاعدگی سے ہو۔

کالمیا ایل (Kalmia L): گنٹھیاوی مریضوں میں، جب پپوٹے سخت محسوس ہوں۔

کاسٹیکم (Causticum): گنٹھیاوی مریضوں میں، جب آنکھ کے عضلات کا فالج، درد سر کا

باعث بنے۔ جس کی وجہ خشک سردی میں جسم کھولنا ہو۔ یہ دالا فالج جلدی میم سے کم اور رشاکس کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔

الیومنا (Alumina): جب اس مرض کا تعلق بڑی آنت کی سستی اور بعد ازاں قبض کے ساتھ ہو۔

کوکیولس (Cocculus): آنکھ کے چھیر کا فالج جو خنق کے بعد لاحق ہو۔ جب جلدی میم ناکام ہو جائے تو اسے استعمال کریں۔

پردہ شبکی اور عصب بصارت کے امراض

(Retina and Optic Nerve Diseases of)

ڈیوبوئی سیا (Duboisia): پردہ شبکی (آنکھ کا شفاف پردہ) میں اجتماع خون۔ پردہ شبکی کی سوزش، پردہ شبکی کی ٹالیاں خصوصاً دریدہ میں لمبی ہو جائیں اور تکلیف دیں۔ آنکھ کے پھوٹے ابھار سوج جائیں۔ پردہ شبکی میں سیلان خون، آنکھ کے ذیلے کے بالائی حصہ میں درد۔

فاسفورس (Phosphorus): پردہ شبکی میں اجتماع خون، آنکھیں روشنی سے حساس ہوں، شبکی روشنی میں بصارت میں بہتری ہو۔ روشنی کے گرد ہال نظر آئے۔ پردہ شبکی کی سوزش۔

پلساٹیل (Pulsatilla): عصب بصارت اور پردہ شبکی میں سوزش و اجتماع خون۔ جس کے ساتھ شدید درد سر ہوتا ہے۔ کھلی ہوا میں درد سر درد ہوتا ہے۔

برائی اونیا (Bryonia): نظر کے سامنے نیلا ہٹ مائل دھند کے ساتھ، پردہ شبکی کی ساتھ سوزش یا اجتماع خون جس کے ساتھ آنکھ میں اور آنکھ کے اوپر شدید اور تیز درد ہو، حرکت سے ابتری ہو۔

مرکیوریس کور (Mercurius Cor): پردہ شبکی کی سوزش جس کے ساتھ رات کے وقت مرض میں واضح زیادتی پائی جائے۔ آگ کی چمک سے حساسیت ہو۔ الیومن (انڈے کی سفیدی)

والی پردہ شبکی کی سوزش کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ پھکنائی کی تنزیل یا بگاڑا کمزور تالیوں سے خون کے غلیظ اور آنکھ کی دیگر تمام مرضیاتی تبدیلیوں کو اور اس طرح گردوں کے امراض کو بھی یہ دوا درست کرتی ہے۔

اگریکس ایم (Agaricus M): عصب بصارت کی کمزوری کے لئے یہ ایک بہترین دوا ہے۔ ایک قابل لحاظ عرصہ تک یہ دوا دن میں چھ مرتبہ روزانہ دی جائے۔

اپیس میل (Apis Mel): البیومن (انڈے کی سفیدی) والی پردہ شبکی کی سوزش جس کے ساتھ آنکھ کے پپٹوں میں درم ہو نیز عمومی استحقائی حالت ہو۔ مریض کو غنودگی ہو۔ جس کے ساتھ پیاس کم اور پیشاب قلیل مقدار میں ہو۔ پردہ شب کے نیچے سیال مادہ ہوتا ہے۔ آنکھ کے ذیلے کے پچھلے حصے میں درد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے پپٹوں کے سوچ جانے کے ساتھ ڈنک لگنے جیسے درد آنکھوں میں ہوتے ہیں۔ پردہ شبکی کا بے تعلق ہونا۔

آرسنک البم (Arsenic Alb): البیومن والی سوزش پردہ شبکی میں ہو جبکہ مریض بے چین ہوتا ہے۔ خصوصاً آدھی رات کے بعد کم مقدار میں پانی کی پیاس کے ساتھ 'پیشاب کم مقدار میں ہو جس کے ساتھ البیومن (انڈے کی سفیدی) ملی ہوئی ہو۔

جلسمی میم (Gelsemium): پردہ شبکی کی البیومن والی سوزش حمل کے دوران ہوتی ہے۔ سفید دھبیاں اور پردہ شبکی میں سیلان خون 'اچانک بصارت میں دھندلاہٹ ظاہر ہو' زخم یا دور کی نظر کی کمزوری کے باعث پردہ شبکی کی بے تعلقی۔ 200 طاقت کی خوراک ہر ہفتہ دینے اور دو مہینے کے بعد طاقت کو بڑھا کر 1000 کر دیجئے اور ہر چند روزہ دن کے بعد ایک خوراک دیجئے۔

لیکس سس (Lachesis): پردہ شبکی میں سیلان خون کے لئے یہ دوا چوٹی کی ہے۔ اس دوا کے استعمال سے سوزش کے ساتھ سیلان خون بھی بہت تیزی سے ختم ہو جاتا ہے۔ عصب بصارت اور پردہ شبکی کی سوزش اور اجتماع خون۔

کروٹیل (Crotalus): سانپ کے زہر میں پردہ شبکی کے اندر سیلان خون کو یہ دوا تیزی سے جذب کر لیتی ہے۔ علاوہ ازیں یہ دوا پردہ شبکی کی سوزش کو بھی آرام دیتی ہے۔

بیلادونا (Belladonna): پردہ شبکی کی مرگی خصوصاً جب اجتماع خون کے باعث درد سر کے باعث لاحق ہو۔ آنکھوں اور پردہ شبکی میں دھن والا درد ہوتا ہے۔ آنکھ کے پردہ شبکی کے امراض سوزش کے ساتھ۔ روشنی کے خوف کا مرض 'چکن والا درد۔

اورم میٹ (Aurum Met): پردہ شبکی کی 'لا تعلق' بصارت کا اوپر والا آدھا حصہ کالے جسم سے ڈھکا ہوتا ہے اور نیچے والا آدھا حصہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ پردہ شبکی میں سوزش ہوتی

ہے اور نظر میں دھندلاہٹ ہوتی ہے۔

چائنا فیرم فاس (China, Ferrum Phos): پردہ شبکی کا قلت دم والا عارضہ جو پینائی کے گھودینے کا باعث ہوتا ہے۔

کوئیم: (Conium): روشنی سے پردہ شبکی کو بے استیا حساسیت ہوتی ہے خصوصاً اگر آنکھوں میں گہرے درد کے ساتھ نظر کی کمزوری کی علامات بھی اس کے ساتھ پائی جائیں۔

آرنیکا ایم: (Arnica M): زخم کے باعث یا چوٹ کے باعث پردہ شبکی کی لاطعلق پردہ شبکی میں سیلان خون۔

نیفتھالین: (Naphthalin): پردہ شبکی کی لاطعلق نرم موتیا بند پردہ شبکی میں رطوبت کا اخراج نیز آنکھ کے کالے پردہ اور پلوں کے جسم سے رطوبت کا اخراج۔ قرنیہ کا دھندلا پن پردہ شبکی سے مواد رستل ہے اور اس کے اوپر جم جاتا ہے۔

نیرم سلی سیلیکم: (Natrurn Salicylicum): پردہ شبکی میں سیلان خون، سیلان خون کے ساتھ ایبوس والے پردہ شبکی کے امراض۔

تشنجی جھٹکے (Spasms)۔

ادیکھے ”پھڑکن“

آنکھ کا بھیجنگا پن

(Squint "Strabismus")

جلسی میم (Gelsimium): یہ بھیجنگا پن کی چوٹی کی دوا ہے۔

سائیکلے من (Cyclamen): اگر جلسی میم ناکام ہو جائے تو اس دوا کو آزمانا چاہئے۔

ہایوسکیمس (Hyoscyamus): جب دماغی امراض کے باعث بھیجنگا پن ہو۔

ڈیپتھیرینم (Diphtherinum): جب تریاق زہر ادویات کے استعمال کے بعد اثرات کے

باعث بھیجنگا پن لاحق ہو، سی۔ ایم طاقت کی دوا دیجئے۔

مگنیشیا فاس (Magnesia Phos): آنکھ کے ذیل کی مواز حرکت بھیجنگا پن، تشنجی بھیجنگا

پن۔

آنکھ کے ڈھیلے کا باہر کو ابھار

(Staphyloma)

کاشتیکم (Causticum): آنکھ کا ڈھیلہ بڑا ہو جاتا ہے اس کا حجم بڑھ کر قرنیہ سے باہر کو نکل آتا ہے اور نظر دھندلی ہو جاتی ہے۔

ایلیکس اکوئی فولیوم (Ilex Aquifolium): قرنیہ کی سوزش، آنکھوں کے ڈھیلے گوشت کے ٹوٹنے کی طرح نظر آئیں، ملحقہ ہائے چشم میں جلن دار درد ہو رات کے وقت بھری ہوتی ہے آنکھ کی (مدر فقیر) یا 1x طاقت کی دوا دیجئے۔

اپیس ایم (Apis M): قرنیہ یا آنکھ کے سکورا کے حجم کا بڑھ جانا۔

گوبانجییاں — (Styes)

پلساٹیلہ (Pulsatilla): گوبانجییاں، خصوصاً اوپر والے پچنے پر۔
سٹیفنی سیکریا (Staphisagria): یہ گوبانجیوں کے لئے ایک عمدہ دوا ہے جو عموماً پلساٹیلہ کے ناکام ہو جانے پر دی جاتی ہے۔ میرے اپنے تجربے کے مطابق یہ دوا میں نے تمام اقسام کے گوبانجیوں کے امراض میں مؤثر پائی ہے۔ خواہ یہ گوبانجیوں مزمن ہوں یا دوسری قسم کی یا اوپر والے پچنے پر ہوں یا نیچے والے پچنے پر۔ بار بار ہونے والی گوبانجیوں، پچنوں کے کناروں پر بھوسی ہو۔

ہیپرسلفر (Hepar Sulphur): جب گوبانجیوں کے بار بار ہو جانے کا رجحان ہو اور جب سٹیفنی سیکریا ناکام ہو جائے۔

الیومنا سلیکیٹ (Alumina Silicate): ورم آلود پچنوں کے ساتھ گوبانجیوں، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، دکھن اور درد ہوتا ہے جیسا کہ آنکھوں میں ریت پڑی ہوئی ہو (نیز دیکھئے "تھیلی" جب گوبانجیوں سخت ہو جائیں۔)

آنسو (Tears)

(نیز دیکھئے "آنکھوں سے پانی کا اخراج")

یوفریزیا (Euphrasia): جب تیزابی آنسو ہمیں اور آنکھوں میں پھان پیدا کر دیں۔

الیئم سیپا (Allium Cepa): آنسوؤں کا اخراج آسانی کے ساتھ ہو۔

مرک کار (Merc Cor): سوزش کے باعث آنکھوں سے پانی بہتا ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): ناک کی رطوبت بند ہو جانے کے باعث بے تحاشہ آنسو بہیں آنکھوں میں جلن ہوتی ہو۔

سلیشیا (Silicea): آنسوؤں والی تلی کے بند ہو جانے میں جب جب رشاکس ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جاتی ہے۔

پتھرولیم (Petroleum): آنسوؤں والے سوراخ کی سوزش جس کے ساتھ پیپ بھی ہو۔

فلورک ایسڈ (Flouric Acid): آنسوؤں والے سوراخ کی رکاوٹ یا پھوڑا۔

مکڑے (Trachoma)

(نیز دیکھیے "سوزش")

رسولیاں (Tumors)

زنگم میٹ (Zincum Met): آنکھوں کے اوپر والے یا نیچے والے پوٹوں پر رسولیاں، رگوں والی رسولیاں۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): تھیلیوں والی رسولیاں۔

کونیم، سٹیفیسیگیا (Conium, Staphisagria): پوٹوں پر دانے۔

کالی یا سکیرام (Kali Bi): ہموار نرم رسولیاں پوٹوں کے نیچے۔

تھوجا (Thuja): آنکھوں کے پوٹوں پر تھیلیاں اس وقت ہوتی ہیں جب حفاظتی ٹیکوں کے اثرات دب جانے کی ہسٹری موجود ہو یا جب حفاظتی ٹیکے نہ لگوائے گئے ہوں۔

کیلڈیم (Caladium): بے انتہا سگریٹ نوشی کرنے والوں میں جب سگریٹ نوشی کے باعث غیر حاضر دماغی لاحق ہو اور یادداشت کھو جائے، یہ دوا تھیلیوں کو تندرست کرتی ہے اور سگریٹ نوشی کی طلب کو ختم کرتی ہے۔

پھڑکن (Twitching)

اگیریکس ایم (Agaricus M): آنکھوں کی جھٹکن اور پھڑکن۔ یہ دوا آنکھوں کے ڈھیلوں کی گھڑی کے پندولم بھی حرکت کو بھی درست کرتی ہے۔ یہ تمام حرکات نیند کے دوران رک جاتی ہیں (1000 طاقت کی ایک ہی ٹوراک دیتے)۔

رافینس (Raphanus): آنکھوں کے پوٹوں کی مسلسل پھڑکن ہو بصارت کو تقریباً روک دیتی ہے۔ اس کے ساتھ آنکھوں کے ڈھیلے گواہی میں حرکت کرتے ہیں۔

مزریع (Mezereum): آنکھوں کے ڈھیلوں کی پھڑکن دائیں رخسار کے عضلات اور معدے کے پیندے کے عضلات کی پھڑکن، تکلیف دہ پھڑکن۔
 مگنیشیا فاس (Magnesia Phos): آنکھوں کا تشنج اور جھٹکے جیسا بہت زیادہ دیر تک پنوں کا تشنج جس کے باعث بینکاپن لاحق ہو۔

قرنیہ کے ناسور (یا پھوڑے)

(Ulcers of the Cornea)

ہیمپیر سلف (Hepar Sulphur): قرنیہ اور اگلے طبق کا پھوڑا، چکن والے شدید درد کے ساتھ پھوڑے کا گلنا سڑنا، روشنی کے خوف کا شدید مرض۔
 مرکوریس سول (Mercurius Sol): اوپر والی سطح یا گہرائی میں ناسور کے لئے قابل لحاظ حد تک رستے کے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں چھیلنے والا مواد ہوتا ہے۔
 سیلیشیا (Silicea): قرنیہ کا گلنے سڑنے والا ناسور، مزمن پھوڑے، قرنیہ کے درم کے بعد نظر کی دھندلاہٹ۔
 گرافٹائٹس (Graphites): گاڑھی کریم کی طرح کی چپ کے ساتھ پھوڑے ہوتے ہیں۔
 پلساتیل (Pulsatilla): آنکھ کے نیلے حصے میں پھوڑے نرم طبیعت والے مریضوں میں نکس کی تکالیف کے ساتھ۔

بصارت (Vision)

(تیز دیکھنے "دور کی نظر کی کمزوری" اور "اندھا پن")

فاسفورس (Phosphorus): ٹائیٹانیڈ بخار کے بعد اندھا پن، جنسی بے اعتدالیوں، رطوبت کے ضائع ہو جانے کے بعد اندھا پن، یہ دوا آسانی بجلی گرنے کے اثرات کے بعد لاحق ہونے والے اندھے پن کو بھی شفا دیتی ہے۔ عصب بصارت کے فلج کے باعث اندھا پن۔
 فائیسو سٹگما (Physostigma): رات کا اندھا پن، سبزموتیا اور دور کی نظر کی کمزوری۔
 پیلوکارپس (Pilocarpus): اس دوا سے دور کی نظر کی کمزوری درست ہوتی ہے۔ معمولی استعمال سے آنکھیں تھک جاتی ہیں، آنکھوں میں گرمی اور جلن ہوتی ہے۔ آنکھوں کے پونے پھڑکتے ہیں، روشنی سے آنکھوں میں سختی اور بیچان پیدا ہوتا ہے۔
 رینن کوکس بی (Ranunculus B): دن اور رات کا اندھا پن جو مستورات میں ہوتا ہے حمل کے دوران۔

سائیکل من (Cyclamen): خارش کے دب جانے کے باعث بصارت کم ہو جاتی ہے آنکھوں کے سامنے بادل یا چلمن آ جاتی ہے۔ آنکھوں کے سامنے دھواں یا دھند آ جاتی ہے۔ بصارت کا آدھا حصہ دائیں طرف والا متاثر ہوتا ہے۔

آیوڈیم (Iodum): نظر کا اچانک چلے جانا۔

کوکولس انڈ (Cocculus Ind): بصارت کا دھیمپڑ جانا اور بصارت میں خلل آنکھ کے عضلات کی فالجی کمزوری نیز عضلات کی مطابقت (تطبیق) میں کمزوری۔

بووشا (Bovista): عصب بصارت کے فالج کے باعث اندھا پن۔

امبر اگریسیا (Ambra Grisea): آنکھ کی حالت میں کسی بھی ظاہری خرابی کے بغیر بصارت میں اعصابی کمزوری آ جاتی ہے۔

سلفر (Sulphur): آنکھوں کے سامنے بادل یا چلمن آ جاتی ہے۔ دھواں یا دھند چھا جاتی ہے۔ صبح کے وقت چلنے پر اتھری ہو۔

نیٹرم میور، چائنا سلف (Natrium Mur. China Sulph): کسی بھی جانب کے نصف حصے کی عدم بصارت۔

اکیڑیکس ایم (Agaricus M): نظر بہت قریب کی رہ جائے، نظر دھندلی ہو جائے، نظر غیر واضح ہو جائے، ہر چیز دھندلی نظر آتی ہے۔ آنکھوں میں جھٹکے لگتے ہیں اور پھر کن ہوتی ہے جو کہ اس مرض کی واضح علامت ہے۔ آنکھوں کے سامنے دھند اور ٹکڑی کے جانے کا احساس ہوتا ہے، آنکھوں کے سامنے رنگوں اور اعداد کا دھوکا ہوتا ہے۔

گرے شیولا (Gratiola): نظر غائب ہو جاتی ہے جو کہ سر میں خون کے اڈہام کے باعث ہو۔

میفاٹیس (Mephites): دور کی نظر کی کمزوری، حروف پڑھتے وقت گڈمڈ ہو جاتے ہیں، تاریک چھپائی پڑھنے کی ناقابلیت۔

لیتھیم کارب (Lithium Carb): دائیں جانب کا آدھا حصہ نظر نہیں آتا۔

کالکیریا کارب (Calcarea Carb): دایاں بائیاں آدھا حصہ نظر نہ آئے۔

اورم میٹ (Aurum Met): بصارت کا نصف زیریں نصف بالائی حصہ نظر نہ آئے اوپر والا آدھا حصہ سیاہ جسم سے ڈھکا ہو اور نچلا آدھا بصارت کے قابل ہو، بڑے حروف میں امتیاز نہ ہو سکے، آنکھوں کے سامنے زرد اجسام تیرتے ہوئے نظر آئیں۔

سپیا (Sepia): مادہ منویہ کے اخراج کے بعد بصارت میں دھندلاہٹ آجائے، آنکھوں کی پتلیاں سبز جانے کے ساتھ بصارت جاتی رہے، بصارت کا کوئی سا آدھا حصہ نظر سے اوچھل

ہو۔
گرافٹائٹس (Graphites): عام فالج کے باعث اندھا پن، جیٹ نظر سے باہر آگ کے نمٹاتے ہوئے نیز مے میڑے راستے۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): رات کا اندھا پن کسی بھی چیز کا صرفہ آدھا حصہ نظر آتا ہے، سونے کے دوران آنکھیں آدمی کھلی رہتی ہیں۔

چائنا (China): پردہ شبکیہ میں قلت دم کے باعث رات کا اندھا پن، آنکھوں کے گرد نیلا رنگ ہو، آنکھوں میں دباؤ ہوتا ہے۔

بو تھ روپس لنسیو لیس (Bothrops Lanciatus): دن کا اندھا پن، سیلان خون کے باعث اندھا پن سورج طلوع ہونے کے بعد مشکل ہی سے پردہ شبکیہ اپنا راستہ دیکھ سکے۔

اکونائٹ نیپ (Acconite Nap): اجتماع خون کے باعث اچانک اندھے پن کا حملہ، اس دوا کو مرض کے ابتدائی مراحل میں آزمانا چاہئے۔

کاسٹیکم (Causticum): اچانک اور متواتر بصارت کا کھو جانا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آنکھوں کے اوپر باریک پردہ پڑا ہوا ہے، نظر دھندلی ہو جاتی ہے جیسا کہ آنکھوں کے سامنے دھند ہوا چلک ہو۔

جلیسیم (Gelsimium): یہ دوا غنودگی کے ساتھ اچانک اور مکمل اندھے پن کی نشاندہی کرتی ہے۔ آنکھیں بھاری ہوتی ہیں اور نظر مدہم ہوتی ہے، جلق کے باعث چٹائی کا جاتے رہنا، بصارت کا نصف بالائی علاقہ متاثر ہوتا ہے۔

لیک لائنٹس (Lachnanthes): جب شبکیہ باندھ کر دیکھنے سے نظر دھندلا جائے، جب بھورے جیسے ہوئے دائرے نظر آئیں، آنکھیں چمک دار ہوتی ہیں اور آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ رخسار سرخ ہونے کے ساتھ۔

مرکیوریس (Mercurius): اندھے پن کے چند لمحاتی دورے، آنکھیں روشنی اور آگ کی چمک سے حساس ہوتی ہیں۔

سکیوٹاڈائروسا (Cicuta Virosa): بہت زیادہ غنودگی کے ساتھ نیز غیر حاضر دماغی کے باعث بصارت کا متواتر عائب ہوتے رہنا خصوصاً جب چل رہا ہو۔ جب خطوط پڑھ رہا ہو تو بے قاعدگی کے ساتھ آگے پیچھے کو جھولے۔

ٹائٹنیئم (Titanium): شروع میں چیز کا صرف آدھا حصہ نظر آسکتا ہے۔ زکام کا رجحان ہموار میں سرعت انزال کے ساتھ نامردی۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): یہ احساس کہ نظری دھندلاہٹ دور ہو سکتی ہے۔ آنسو آئیں آنکھوں

کی پتلیاں سکڑی ہوئی ہوں۔ پرانے کیسوں میں۔
سلیشیا (Silicea): اس دوا کی نشاندہی ہو سکتی ہے یا جہاں بظاہر معلوم ہو کہ مستقل اچھے اثرات کے سلسلے میں دوا ناکام ہے۔

الیومینا سلیکیٹ (Alumina Silicate): بصارت دھندلی۔ رات کے وقت مصنوعی روشنی سے اور بصارت کی تھکان سے ابتری ہوتی ہے۔ بصارت دھندلی اور کمزور ہوتی ہے۔

ڈوبوسیا (Duboisia): آنکھیں ٹھنڈی اور خشکی ہوئی محسوس ہوں۔ چیزیں اور پر کو انہی ہوئی دکھائی دیں۔ چہرے تمام اطراف میں بار بار نظر آتے ہیں۔ قریب نظر مریض کو لگتا ہے کہ اس کے لئے ایک نشست خالی ہے حالانکہ وہاں کوئی نشست نہیں ہوتی، تصور کرے کہ اندھیرا ہے جبکہ بالکل چمک دار روشنی ہو، اپنے سر کے اوپر ہوا میں اپنی گھڑی پر ہاتھ ڈالے۔ جو گھڑی اس سے کھو چکی ہو۔ دو فٹ کے فاصلے سے عبارت پڑھنے سے قاصر ہو اور یہ اسے کئی رنگوں میں دکھائی دیتی ہے مثلاً نیلا، کالا رنگ اور سرفی بالکل بھورا، عصب بصارت میں اجتماع خون، عصب بصارت مفلوج ہو شریانیں سکڑی ہوئی ہوں۔

سنا (Cina): یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ جالی میں دیکھ رہا ہو۔ آنکھیں پونچھنے سے اتفاق ہوتا ہے۔

ورینٹرم (Veratrum): عصب بصارت میں اجتماع خون یا ہیجان کے باعث نظر جاتی رہے۔ موم بنی کے گرد سبز دائرے ظاہر ہو جاتے ہوں جو بعد میں سرخ ہو جاتے ہوں اگر چکر آئیں۔

روٹا (Ruta): دوران مطالعہ آنکھیں آسانی سے تھک جائیں۔ بہت زیادہ مطالعہ کرنے کے باعث نظر دھندلا جاتی ہے۔ جب پڑھتا ہے تو آنکھوں میں جلن اور گرمی محسوس ہوتی ہے۔ پڑھتے وقت آنکھوں کے ذہیلوں میں درد ہوتا ہے۔ پڑھنے کے بعد نظر دھندلا جاتی ہے یا کسی باریک اور عمدہ کام کو کرتے ہوئے نظر کو جملنے کے بعد نظر دھندلا جاتی ہے۔

میڈورینم (Medorrhinum): آنکھوں کے سامنے جھللاہٹ ہوتی ہے۔ خطہ بصارت میں سیاہ اور بھورے دھبے ہوتے ہیں اور بصارت دھندلا جاتی ہے۔ چیزیں دوگنا یا پھوٹی نظر آتی ہیں۔ آنکھوں میں ریت پڑنے یا جھکے پڑنے کا احساس۔

کورینم (Corium): جتنی دیر تک نظر چیزوں پر جمی رہے۔ چیزیں خواہ کتنی ہی پھوٹی ہوں نظر قائم رہتی ہے لیکن نظر ہٹا کر جیسے ہی کسی دوسری چیز پر ڈالی جاتی ہے آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ آ جاتی ہے اور نظر میں گڑبڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے البتہ دوسری چیز پر نظر جمانے کے بعد بصارت پھر سے درست ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کو گھمانے سے غنودگی ہوتی ہے اور گڑبڑاہٹ ہوتی ہے لیکن نظر جماتے ہی یہ کیفیت جاتی رہتی ہے۔ پڑھتے وقت سطریں حرکت کرتی نظر

آئیں۔ چیزیں سرخ نظر آتی ہیں۔

کیوپرم میٹھ (Cuprum Met): پیشاب کے اخراج یا خارش یا پھوڑے پھنسی کے دب جانے سے اندھا پن لاحق ہو۔ اس کے ساتھ جھٹکے بھی ہو سکتے ہیں۔

فیرم میٹھ (Ferrum Met): رات کے اندھیرے میں چیزیں دیکھ سکتے کی اہلیت۔

کاربونیئم سلف (Carboneum Sulph): ہر چیز دھند کے اندر دکھائی دیتی ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے چیزوں کے اوپر کٹڑی کے جالے تنے ہوئے ہیں۔ سبز یا سرخ دائیں آنکھ کا اندھا پن اور بائیں آنکھ کی بصارت بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے۔ عصب بصارت کا ضعف۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): دور کی نظر کی کمزوری، آنکھوں کے سامنے کالی پٹیاں دکھائی دیں۔ قریب پڑی ہوئی چیزیں مریض کو حرکت کرتی دکھائی دیتی ہیں۔

نوٹ (Note): اندرونی استعمال کی مندرجہ بالا ادویات میں اضافے کے طور پر مندرجہ ذیل چند ورزشوں کی سفارش کی جاتی ہے۔ جن سے نظر میں بہتری ہوگی۔

- 1- حوائج ضروریہ سے فراغت کے بعد ٹھنڈے پانی کے نیچے آنکھوں کو کھولنا اور بند کرنا۔
- 2- دن میں کسی وقت اراداً آنکھوں کو بھپکانا خصوصاً آنکھوں پر دیر تک دباؤ پڑنے کے بعد۔
- 3- دن کے اختتام پر آنکھوں کو پوٹوں کے نیچے آہستہ آہستہ دبانایا بھینچنا۔
- 4- حلقہ ہائے چشم میں آنکھوں کو تواتر کے ساتھ گھماتنا۔ یہ آنکھوں کی تندیب کے لئے چند طریقے ہیں جو آپ کی آنکھوں کی حفاظت جوانی سے بڑھاپے تک کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی نینک چھڑانے کا ذریعہ بن جائیں۔

دوہری بصارت — (Vision- Double)

(ایک کے دو نظر آنا)

کاسٹیکم (Causticum): آنکھوں کو دائیں طرف موڑنے پر بصارت دوہری ہو جائے۔ (ہر چیز دو دو نظر آتی ہے۔)

جلیسم (Gelsemium): کسی بھی جانب آنکھوں کو گھمانے سے بصارت دوہری ہو جاتی ہے لیکن سر کو اگڑائے رکھنے پر بصارت اکری ہوتی ہے۔ (یعنی ایک چیز ایک ہی نظر آتی ہے۔) آنکھوں کے چھپر کا قلع بھی ہو سکتا ہے۔

ہائیوسائیمس (Hyoscyamus): قریب نظر جس میں ایک کی بجائے چیزیں دو دو نظر آتی ہیں۔

الیومن (Alumen): موم بتی کی روشنی میں چیزیں دو دو نظر آتی ہیں۔ پیپ والا آشوب چشم

لاحق ہو۔ آنکھوں کی مزمن دکھن۔

سینیکا (Senega): دوہری بصارت۔ صرف سر کو پیچھے کی طرف جھکانے سے ہی بہتری ہوتی ہے۔ جب دونوں آنکھوں سے دیکھے تو چیزیں دو دو نظر آئیں لیکن ایک آنکھ سے دیکھنے پر ٹھیک نظر آتا ہے۔

گرافائٹس (Graphites): لکھتے وقت حروف دوہرے نظر آتے ہیں۔ پڑھتے وقت حروف بھانگنے لگتے ہیں۔

پلمبم (Plumbum): دونوں آنکھوں سے دیکھنے پر بصارت دوہری ہو جبکہ ایک آنکھ سے دیکھنے پر درست ہو جائے۔

سٹرامونیم (Stramonium): حروف اور چیزیں دوہری دکھائی دیتی ہیں۔

ورٹیرم وائر (Veratrum Vir): اجتماع خون والے درد سر کے ساتھ بصارت کا دوہرا ہو جانا۔

اورم فولیٹم (Aurum Foliatum): ہر چیز دوہری نظر آتی ہے چنانچہ مریض کے سامنے ایک چیز دوسری کے ساتھ ملی ہوئی ہو کر پیش ہوتی ہے جس کے ساتھ آنکھوں میں شدید دباؤ ہوتا ہے۔

اورم میٹ (Aurum Met): بصارت دوہری ہو اور چیزیں ایک دوسرے کی جانب گھومتی ہوئی دکھائی دیں۔

بصارت، فریب نظر — (Vision- Illusion)

(نیز دیکھئے ”رنگین بصارت“)

ہائیسو سائیمس (Hycyamus): آنکھوں کے سامنے سرخ دھبے ہوتے ہیں۔

روٹا (Ruta): موسمِ ہتی کی روشنی کے گرد سرخ ہالہ دکھائی دیتا ہے۔

تھوجا (Thuja): آنکھوں کے سامنے پٹیاں تھرتی ہیں۔

ایٹروپین (Atropin): جدھر بھی دیکھے سائے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ دوا فریب نظر کو بھی درست کرتی ہے۔ ہر چیز بڑھی نظر آتی ہے۔

سائیکلے من (Cyclamen): آنکھوں کے سامنے آگ کے شعلے اور چمکتے ہوئے شرارے ہوتے ہیں۔ جلن اور بھلاہٹ کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا۔ بصارت مدھم ہو جاتی ہے۔ چیزیں

دھواں اور دھند میں سے نظر آتی ہیں۔ ایک کی دو دو چیزیں نظر آئیں۔

امونیئم کارب (Ammonium Carb): آنکھوں کے سامنے پیلے دھبے ہوتے ہیں۔

سلفر (Sulphur): آنکھوں کے سامنے کالے دھبے تھرتے ہیں۔ قریب کی چیزیں لمبے فاصلے پر نظر آئیں۔

فاسفورس (Phosphorus): آنکھوں کو بند کرنے پر آگ کا سمندر نظر آتا ہے۔ حروف سرخ نظر آتے ہیں، جب مریض پڑھتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے سے کالے دھبے گزرتے ہیں۔ موم حق کے گرد ہلا ہوتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے سیاہ عکس یا چنگاریاں نظر آتی ہیں۔

بیلادونا (Belladonna): آنکھوں کے سامنے شعلے ہوں۔ آنکھوں کے سامنے تیز روشنی کے جھماکے ہوں، چیزیں لمبی یا الٹی نظر آتی ہوں، چیزیں سرخ نظر آئیں۔

سینڈرون (Cedron): چیزیں رات کے وقت سرخ نظر آتی ہیں جبکہ دن کو پیلی نظر آئیں۔

سٹرامونیم (Stramonium): سیاہ کی بجائے چیزیں سرخ نظر آتی ہیں۔ چیزیں سمت چھوٹی نظر آتی ہیں۔ چیزیں سیاہ نیز میز می اور ترجمی نظر آتی ہیں۔

ایلن ٹھس (Allanthus): رات کے وقت پوٹے بند کرنے پر آنکھوں کے سامنے روشنی کے جھماکے ہوتے ہیں۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): آنکھوں کے سامنے سلیٹی رنگ کے دھبے اور سانپ کی صورت سے اجسام حرکت کرتے نظر آتے ہیں۔

اورم میٹ (Aurum Met): دوہری بصارت اور چیزیں ایک دوسرے میں بھاگتی نظر آئیں۔ جب رات کے وقت دیکھے تو کھچاؤ والا درد ہو۔ آنکھیں بند کرنے پر شدت میں کمی ہو۔

نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid): آنکھوں کے سامنے سیاہ دھبے ٹاپتے ہیں۔

ورٹرم وائر (Veratrum Vir): موم حق کے گرد بڑے بڑے سبز دائرے ظاہر ہوں۔ جو کہ جیسے ہی چکر آتے ہیں، سرخ ہو جاتے ہیں۔

الیومینا (Alumina): موم حق کے گرد پیلا دائرہ، آگ کے دھبے اور سفید ستارے نظر آتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مریض دھند میں سے یا پروں میں سے دیکھ رہا ہو۔

کالی یا نیکیرام (Kali- Bi): آنکھوں کے سامنے کئی رنگ اور چمک دار دھبے ہوتے ہیں۔ چیزیں پیلے پردے سے ڈھکی ہوئی نظر آتی ہیں۔

مرکیوریس (Mercurius): دائیں آنکھ کے سامنے بیٹے کالے کیڑے کھوڑے یا کھیاں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آنکھوں کے سامنے دھند ہوتی ہے۔ نظردھم ہو جاتی ہے۔ آگ کی روشنی جس میں چمکا چوند ہو برداشت نہیں ہو سکتی۔

سیپیا (Sepia): آنکھوں کے سامنے آگ کی چنگاریاں ہوتی ہیں۔ روشنی دیکھنے پر آنکھوں کی جھپکن ہو۔ آنکھوں کے سامنے کالے دھبے ہوتے ہیں۔ آگ کے نیزھے میزھے شعلے رنگوں کا

پر چھ مہینے۔

سنا (Cinba): بصارت پہلی۔

گرافائٹس: (Graphites) جب لکھے تو حروف دہرے نظر آئیں۔ پڑھتے وقت حروف بھاکیں۔

میڈورنیم (Medorrhinum): آنکھوں کے سامنے جھللاہٹ، بصارت دھندلی۔ آنکھوں کے سامنے کالے اور بھورے دھبے ہوں، چیزیں دہری نظر آتی ہیں۔

آنکھوں سے پانی بہے (Watering of) _____
(دیکھئے ”آنسو“)



باب چہارم

کانوں کے اور سماعت کے امراض

(Diseases of Ears & Hearing)

جلن — (Burning)

اورم میٹ (Aurum Met): جب ٹھنڈی ہوا میں چلے تو کانوں میں جلن ہو۔
 سینگونی نیریا (Sanguinaria): کانوں میں جلن ہو جس کے ساتھ رخسار سرخ ہوں۔
 مرکوریس سول (Mercurius Sol): گرمی جلن، پائیں کان میں اتری ہو۔
 امونیا میور (Ammonia Mur): کانوں میں جلن سرخی اور خارش ہو جیسا کہ ٹھنڈے کے کانٹے سے ہوتا ہے۔
 اگیڑیکس مس (Agaricus Mus): جلن، سرخی اور خارش کانوں میں ہوتی ہے جیسا کہ برف کے کانٹے سے ہو۔

بہرا پن — (Deafness)

(نیز دیکھئے ”چکر“)

کالی میور (Kali Mur): یہ بہرے پن کی عام دوا کی ہے۔
 ہیمپٹر سلف (Hepar Sulph): کان میں سوراخ یا پھوڑے کے باعث بہرا پن۔
 فیرم پیکرکیم (Ferrum Picricum): لمبوں کے شور والے علاقے میں رہنے کی وجہ سے یا کسی بھی شور والے کوارٹروں میں رہنے سے بہرا پن لاحق ہو۔ اعصابی بہرا پن جو بغیر خون کی نالیوں میں کسی تبدیلی کے واقع ہو۔
 مرک ڈولس (Merc Dulcis): عمر رسیدہ لوگوں میں نزلادی بہرا پن نیز کان اور حلق کے درمیان ٹالی میں رکاوٹ ہو۔ مرطوب موسم میں اتری ہوتی ہے۔
 سکیوٹاوی 200 ہائیڈروسیانک ایسڈ 200 (Hydrocyanic Acid 200): دماغ کی بھلیوں کے درم (گردن توڑ بخار) کے باعث بہرا پن لاحق ہو۔
 ہر وقت بدل بدل کر دوائی لیے عرصہ تک دیجئے۔

پائیکلو کارمینم (Pilocarpinum): جب کان کے اندرونی غلا (جوف) میں خرابی کے باعث ہیرا پن ہو۔ شور میں بہتر سٹائی دیتا ہو۔ جیسا کہ ریل گاڑی کا شور ہوتا ہے۔

گرافائٹس (Graphites): ایسے ہیرا پن کے لئے جس میں شور کے اندر بہتر سٹائی دے۔

میکسیریئم (Mexerium): کان میں انگڑیما کے بعد یا مزمن نزلے کے باعث جب ہیرا پن لاحق ہو۔ ہو سکتا ہے کہ کان اور حلق کے درمیان والی ٹالی میں رکاوٹ کے باعث ہو۔ کان کا پردہ زخم آلود یا کھنچا ہوا ہوتا ہے۔ پردہ کی جھلی موٹی ہو جاتی ہے۔ ہر مرتبہ کھانے سے پہلے 30 طاقت کی دوا دیجئے۔ جب ہیرا پن انگڑیما کے دب جانے کے باعث ہو تو 30 طاقت کی خوراک روزانہ ایک مرتبہ شمار منہ دی جائے۔

پلسائٹلا (Pulsatilla): ٹھنڈ لگ جانے یا خسرو کے بعد یا سرخ بخار کے باعث ہیرا پن لاحق ہو۔ مرطوب موسم میں ابتری ہوتی ہے۔ نزلے کے باعث حلق اور کان کی ٹالی میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ کونین کے غلط استعمال کے باعث۔

آئیوڈیم (Iodium): گلے اور کانوں کی ٹالی میں رکاوٹ کے باعث ہیرا پن جس کے ساتھ گلے کا بڑھ جانا اور حجرہ میں درد ہوتا ہے۔

برٹاکارب (Baryta Carb): قوت سماعت کمزور پڑ جائے اور جھنجھے کی آوازیں شور کی طرح آتی ہیں۔

کالی آر سنک (Kali Ars): برسوں پرانا ہیرا پن۔

می فائٹس (Mephites): مزمن ہیرا پن یا پیدائشی ہیرا پن اس سے دوا سے درست ہوتا ہے۔ 30 طاقت والی خوراک سے علاج شروع کیجئے اور اونچی طاقتوں تک یہ دوا لمبے عرصہ تک دینی چاہئے مثلاً چھ ماہ تک یا ایک سال تک لے جائیے۔ ٹیور کولینم 200 کی ایک خوراک ہر ماہ عمل انگیز دوا کے طور پر دے دینی چاہئے۔ اس دوا سے پہلے یا بعد میں دو دن تک کوئی دوسری دوا نہیں دینی چاہئے۔

وربسکلم (Verbascum): کان میں رکاوٹ کے باعث ہیرا پن یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کان کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہو۔

کاسٹیکم (Causticum): جب قوت سماعت مرطوب موسم میں بہتر ہو۔ سمعی عصب کے قلعے کے باعث ہیرا پن۔

سلیشیا (Silicea): مرطوب موسم میں ہیرا پن کے مرض میں ابتری ہو۔

لیڈم (Ledum): کان سے بننے والے مواد کے دب جانے کے باعث ہیرا پن لاحق ہو۔

وسکم البم (Viscum Alb): نزلادی ہیرا پن جس کے ساتھ کانوں میں شور ہو۔

آرسنک آئیوڈ (Arsenic Aod): ہر اپن کے ساتھ افسردگی کا مرض بھی ہو۔ رات کے وقت اتری ہوتی ہے۔

میلینٹیم کارب (Mag Carb): خوف یا ٹھنڈ کے باعث ہر اپن ہو جائے۔

میڈورینم (Medorrhinum): دونوں کانوں کا مکمل ہر اپن 'جزوی ہر اپن یا غیر مستقل ہر اپن یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دائیں کان میں کوئی کیڑا چل رہا ہے اور سمعی ٹالی کی اندرونی دیوار کو کھود رہا ہے۔

سلی سلک الیڈ (Salicylic Acid): کانوں میں شور کے ساتھ ہر اپن جس کے ساتھ سمعی صوب کے پکر ہوں۔

فاسفورس (Phosphorus): ہر اپن خصوصاً انسانی آواز کے لئے۔

چینوپوڈیم اینتھ (Chenopodium Anth): بلند آہنگ آوازیں سنائی دیں لیکن باتیں کرنے کی آواز کے لئے قریب قریب ہر اپن ہو۔ گلیوں میں چلنے والی کار یا شور والے سکوتر یا رکشہ پر سوار ہونے کے دوران انسانی آوازیں بہتر سنائی دیں۔ خاموش بیٹنگوں میں کچھ سنائی نہ دے۔

لوبیلیا انفلیٹا (Lobelia Infl): کان سے بننے والے مواد کے دب جانے یا ایگزیریا کے باعث ہر اپن 'گلے میں گولی لگنے جیسا درد ہو۔

وریٹرم الیم (Veratrum Alb): مریض ہر اپن ظاہر کرے۔ (یعنی مصنوعی ہر اپن)

اخراج — (Discharge)

(دیکھئے "کان بہنا")

کان کا درد — (Earache)

اکونائٹ (Aconite): ٹھنڈے کان کا درد ہو۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): جب اکونائٹ ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ نیز کان سے گاڑھا مواد (پچلا ہٹ مائل یا سبزی مائل) بہتا ہے۔

بیلادونا (Belladonna): کھودنے والے سوراخ کرنے جیسے اور پھاڑنے والے درد ہوں جو اچانک آتے ہیں اور بہت شدید ہوتے ہیں۔ یہ دوا پلساٹیلہ کی نسبت زیادہ شدید دردوں کے لئے ہے۔

سلیشیا (Silicea): کان سے بدبودار پیپ کا اخراج ہو۔ جس کے ساتھ ہڈیوں کا گلنا سڑنا ہوتا ہے۔

ہے۔ نیز بدبودار مادوں کے اخراج کے ساتھ ہڈیوں کے پھوٹے پھوٹے ٹکڑے خارج ہوتے ہیں۔

ہیپیر سلفر (Hepar Sulphur): جب کان میں پھوڑا ہو یا کان میں آبلے ہوں۔ پھوڑا کان کے سورخ کو بند کر دیتا ہے۔ پھر جب پھٹ جاتا ہے تو مواد کان کے اندر کی طرف بہتا ہے اور کان کے پردے میں سورخ کر دیتا ہے۔

اکٹریاسپکٹا (Act-Spic): کانوں میں پھڑکن والا درد جبکہ ناک بہہ رہی ہو یا جھینگیں آ رہی ہوں۔

کیمومیلا (Chamomilla): بدترین ناقابل برداشت درد ہوتا ہے جو کہ گرمی کے باعث رات کے وقت لاحق ہوتا ہے۔ یہ دوا بچوں کے کان کے درد کے لئے قریب قریب خصوصیت کی حامل ہے۔

جلسی میم (Gelsemium): حیض کے موقوف ہو جانے کے دوران کان کا درد کان گرم اور بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

ٹیرن ٹولا ہسیانیولا (Tarentula His): جب بچگی کے ساتھ کان کی جھپٹ والی زنائے دار درد۔

کالی میور (Kali Mur): کان کا درد ہو جس کے ساتھ کان کا غدود سوجا ہوا ہو اور کان میں زنائے دار شور والی آوازیں ہوں جبکہ کان میں سوجن ہوں۔

منگنیم (Manganum): جب درد کان سے دانتوں تک مار کرے۔

سپائی جیلیا (Spigelia): کان کا درد جب کان کا میل جمع ہو کر اعصابی عضلات کو دبا رہا ہے۔

کپسیکیم (Capsicum): کان کا درد جس میں رات کے وقت ابتری ہو چنگلی دار پھوڑا کان کے درمیانے حصہ کی سوجن کپٹی کی ہڈی کے درمیانے حصے کی دھکن جس کے ساتھ پھٹنے والے درد سر اور ٹھنڈک ہوتی ہے۔ کان گرم ہوتے ہیں اور درد گلے تک جاتا ہے۔

اوسمیم (Osmium): ناک نکلنے پر کان میں درد ہو۔

مگنیشیا فاس (Magnesia Phos): یہ دوا خالص کان کے اعصابی درد کی نشاندہی کرتی ہے۔

اورم آرس (Aurum Ars): متفق بدبودار پیپ والا گازھا و پیلا مواد کان سے خارج ہوتا ہے۔ درد کان کے اندر کان کے پیچھے کان کی اندرونی جانب ہوتا ہے نیز جلن دار اور ٹانگے لگنے کا مادہ درد ہوتا ہے۔ پہلے پل شور میں سنائی دیتا ہے پھر کم سنائی دیتا ہے اور آخر کار قوت نہایت جاتی رہتی ہے۔

ایٹھوزا (Aethusa): کان کا درد کان میں انگلی ڈالنے یا کان کو انگلیوں سے چوڑا کرنے سے

بستر ہوتا ہے۔

شور۔ (Noises)

کالی میور (Kali Mur): کانوں میں شور کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ اس میں کانوں میں ریل گاڑی کا شور، پرندے کی آوازیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ نکلنے پر ناک نکلنے پر جھپٹن والا اور زناٹے دار شور ہوتا ہے۔

کالی آیوڈ (Kali Iod): کانوں میں سمگلانے اور سنسانے جیسی آوازیں آتی ہیں۔ جیسا کہ چھت پر بارش ہو رہی ہو یا دریا بہہ رہا ہو۔

کالی سلف، بیرٹا میور (Kali Sulph, Baryta Mur): جب چبائے تو کانوں میں شور ہو۔ کریوزوٹ، پٹرولیم (Kreosote, Petroleum): حیض کے دوران کانوں میں شور محسوس ہوتا ہے۔

فیرم میٹ، وریٹرم البم (Ferrum Met, Veratrum Alb): حیض سے پہلے شور سنائی دیتا ہے۔

لیڈم پال (Ledum Pal): کانوں میں شور ہو جیسے کہ گھنٹیاں بج رہی ہیں یا آندھی چل رہی ہے۔ کانوں میں گرجن ہو یوں لگے جیسے آندھی چل رہی ہو۔

الیومینا (Alumina): چباتے وقت کانوں میں کڑکڑاہٹ والا شور۔ ایلو (Aloe): اچانک جیسے کوئی چیز دھماکے سے پھٹے اور تصادم ہو۔ بستر میں جانے سے پہلے یہ کیفیت بائیں کان میں ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شیشہ ٹوٹ گیا ہو یہ اس دوا کی عجیب علامت ہے۔

وسکم البم (Viscum Alb): نرلاوی ہراپن کے ساتھ کانوں میں شور۔ نائٹرک ایسڈ (Nitric Alb): کانوں میں گرجن، چباتے ہوئے کانوں میں کڑکڑاہٹ۔ مینسی نیلا (Mancinella): یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کان بند ہو چکے ہوں۔ گھنٹیاں بجتے جیسا گرجے جیسا اور ڈھول بجتے جیسا شور کانوں میں ہوتا ہے۔ نیز کانوں میں آوازیں آتی ہیں۔

میوری اسکم ایسڈ (Muriaticum Acidum): کانوں میں سنسانا جیسا شور۔ گرافٹس (Graphites): زناٹے دار شور یا بندوق چلنے جیسا شور۔

برٹا کارب (Baryta Carb): ناک نکلنے پر شور کی گونج سنائی دے۔ قوت سماعت میں کمزوری کے ساتھ زناٹے والا شور۔

کینابیس انڈیکا (Cannabis Indica): کانوں میں شور ہو۔

ڈالکامارا (Dulcamara): کانوں میں جھنجھٹاہٹ والا شور ہوتا ہے۔ جو کہ رات کے وقت آتا ہے۔

کاسٹیکم، لائیکو پوڈیم، فاسفورس، سیپیا

(Cacusticum, Lycopodium, Phosphorus, Sepia): صدائے بازگشت اور پھر اس کی بازگشت سنے۔

کان درد — (Otalgia)

(دیکھئے ”کان کا درد“)

کان بہنا

Otorrhoea (Discharge From the Ears)

کالی بائیکرو میکم (Kali Bich): جب کانوں سے چپکنے والا مواد خارج ہو۔

ہیپیر سلف (Hepar Sulph): جب کان سے مادہ خارج ہونے کی وجہ سے کان کے اندر پھوڑا ہو۔ کان میں سوراخ کو بھی یہ دوا درست کرتی ہے۔

سورنیم (Psorinum): جب اوپر دی گئی ادویات ناکام ہو جائیں اور عمل نہ کریں تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ کان سے متعفن مادہ خارج ہو۔

اورم میٹ (Aurum Met): جب کان کا پردہ مکمل طور پر ضائع ہو جائے اور ہڈیاں گلنے لگنے لگیں۔ بدبودار مادوں کا اخراج ہو۔ ضدی اخراج کانوں میں جھنجھٹاہٹ اور سرسراہٹ ہو۔

ٹیلیوریم (Tellurium): بہت عرصہ سے لاحق اخراج مواد کے مرض کو یہ دوا تندرست کرتی ہے۔ چھٹی طاقت دی جائے اونچے درجے کے ڈائی لیوشن ناکام ہو جاتے ہیں۔ متعفن مواد خارج ہوتا ہے۔ جس سے خون آلود مچھلی کے چورے کی سی بو آتی ہو، پتلا اور پانی کی طرح کا مواد خارج ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ جلن اور مچھلن ہوتی ہے۔

پلساتیلہ (Pulsatilla): جبکہ مواد کریم کی طرح کا گاڑھا ہو اور اس کا رنگ پیلاہٹ مائل یا سبزی مائل ہو۔

گرافیٹس (Graphites): چپکن والا متعفن چھٹے والا شمد کے رنگ کا مواد بہتا ہے۔ جو جلد کے جس حصے کو چھوتا ہے اسے چھیل دیتا ہے۔ مریض کے لئے ٹھنڈا اور جسم کو خشک کرنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ جس کے باعث کان کے اخراج میں زیادتی ہو جاتی ہے اور گلے کے غدود

بڑھ جاتے ہیں۔

سکارلینی ٹینم (Scarlatinum): جب سرخ بخار کے بعد کان سے مواد خارج ہو۔
سٹریپٹوکوکس (Streptococcin): جب سٹریپٹوکوکس کے بد اثرات کے باعث کانوں سے
 مواد خارج ہو۔ 200 طاقت کی دوا دیتے۔

گیرٹنر (Gaertner): جراثیمی ماحول میں جب بچہ دھلا پتلا اور کمزور ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ
 اس کے عضلات ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ ذہنی بے چینی ہوتی ہے اور
 اندھیرے سے اور تھمائی سے ڈرتا ہے۔

ہائیڈراستس (Hydrastis): جھنچھاہٹ والا پیپ دار مواد خارج ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ یا
 جس سے پہلے تمام ہلتی بھلیوں کا عمومی نزلہ ہوتا ہے۔

وایولا اوڈوراٹا (Viola Odorata): کانوں کے آگے جھنجھٹاہٹ اور بڑبڑاہٹ ہوتی ہے۔ یہ
 دوا رکے ہوئے مواد کو خارج کرتی ہے یا چند روز میں اخراج کو رفع کر دیتی ہے۔ Qi کی ایک
 خوراک سے دونوں کانوں کے اخراج کو جس کے ساتھ بہرا پن بھی ہوتا ہے 'آرام آ جاتا ہے۔
کلکیریا کارب (Calcarea Carb): سفید رنگ کا ہلتی کریم کی طرح کا پیپ دار گاڑھا مواد
 خارج ہو۔

سیلیشیا (Silicea): ہڈیوں کے گلنے سڑنے کے باعث بدبودار مواد کا اخراج ہوتا ہے۔ جس کے
 ساتھ ہڈیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی خارج ہوتے ہیں۔

مرکیورس (Mercurius): کان کی آتش کی حالت میں خصوصاً کان کے درمیانی حصہ سے پتلی
 اور تیزابی پیپ خارج ہوتی ہے۔ تانسلز کی سوزش کے باعث سماعت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔
 کانوں سے سبز گاڑھا تیزابی اور متعفن مواد خارج ہوتا ہے۔

ایتھوزا (Aethusa): دائیں کان سے پہلے رنگ کا مواد خارج ہو۔ جس کے ساتھ ٹانگے ٹانگے
 جیسا سرد ہوتا ہے۔ جو کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے اور ہلانے سے کم ہوتا ہے۔

نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): آنکھوں سے آنسو بننے کے ساتھ کان سے زردی مائل سفید
 مواد خارج ہوتا ہے۔ چہرہ پھولا ہوا ہوتا ہے اور پیشاب کی بو ایسی ہوتی ہے جیسے گھوڑے کے
 پیشاب کی ہوتی ہے۔

سینی کیولا (Sanicula): کان سے مچھلی کے چورے کی طرح کا مواد خارج ہو۔

ایلپس کورالینس (Elaps Corallinus): کانوں سے پیلا اور سبز مواد خارج ہوتا ہے۔

کلکیریا سلف (Calcarea Sulph): بدبودار اور پیپ دار مواد خارج ہو۔ جس کے ساتھ
 گاڑھی اور خون والی پیپ ہوتی ہے۔

کاربونیم سلف (Carbonium Sulph): کانوں سے خون والا متعفن بدبودار اور پیچپ والا مواد خارج ہو۔ کان سرخ ہوتے ہیں۔ کانوں کے پیچھے پھسیاں ہوتی ہیں۔ کانوں میں شور ہوتا ہے۔
 کالی آیوڈ (Kali lod): گاڑھا سبز مواد کان سے باافراط خارج ہوتا ہے۔ مریض گرم مزاج ہوتا ہے۔ جسے ٹھنڈ میں بہتری محسوس ہوتی ہے۔

کان کے پردہ کا سوراخ

(Perforation of the Drum)

سیلیشیا 200 (Silicea 200): یہ ہر چند روز کے بعد دی جانی چاہئے۔
 ہیمپٹر سلف (Hepar Sulph): یہ دوا روزانہ دن میں چار مرتبہ چار وقتوں کے ساتھ دی جانی چاہئے۔ سوائے اس روز کے جب سیلیشیا دی گئی ہو، یہ قاتل لحاظ مدت تک دی جانی چاہئے مثلاً چھ مہینے سے لے کر آٹھ مہینے تک۔

میل — (Wax)

کونیم (Conium): کانوں میں میل جمع ہو جاتا ہے۔



باب پنجم

ناک، گلے، حلق اور حنجرہ کے امراض

(Diseases of Nose, Throat,
Pharynx & Larynx)

حصہ اول — ناک

ناک کی اسفنجی سوزش — (Adenoids)

بیسی لینم (Bacillinum): اس دوا سے علاج کا آغاز کرنا چاہئے اور 200 طاقت کی دوا ہر چدرہ روز بعد دینی چاہئے۔ نیز اس کے ساتھ دیگر ادویات جن کی نشاندہی کی گئی ہے 'دینی چاہئیں۔ اس دوا کے استعمال والے دن سے دو دن قبل اور دو دن بعد کوئی دوا نہیں دینی چاہئے۔

اگر سفن نوٹینز (Agraphis Nutans): یہ ناک کی اسفنجی سوزش کے لئے بہترین دوا ہے۔ یہ دوا 3x طاقت میں دی جاسکتی ہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): پہلے اور موٹے بچوں میں 'ٹھنڈے (حلقہ) پاؤں' رات کو سر پر پینٹ آتا ہے۔

کلکیریا فاس (Calcarea Phas): دبے پتلے اور کمزور بچوں میں 'جن کا چہرہ پتلا ہوتا ہے۔ اس دوا کی ہومیو پتھی میں بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے۔ بچہ چڑچڑا اور ضدی ہوتا ہے 'بغیر زکام کے چھینکیں آتی ہیں۔

کلکیریا آیوڈ (Calcarea Iod): بعض مخصوص کیسوں میں یہ دوا مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ مرک آیوڈ (Merc Iod): ناک کی اسفنجی سوزش کے علاج میں اس دوا کو بھی نہیں بھولنا چاہئے۔

ہائیڈرا سٹس کین (Hydrastis Can): ناک کی اسفنجی سوزش کے لئے مخصوص دوا ہے۔ ہلکی ہلکی چلی ہوتی ہے اور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

برٹا آیوڈائٹ (Baryta Iodide): ناک کی اسٹغنی سوزش کے لئے یہ بہت مفید دوا ہے۔
بشرطیکہ بچہ ذہنی طور پر کمزور ہو۔

سس ٹس کین (Cistus Can): کٹھ مالا یا جھڑوا یا خنازیر کی سوزش اور گلے کے غدود سے
پیپ کا آنا۔ حلق کے کٹے کے پیچھے جلن ہوتی ہے۔ گلے کی خشکی دور کرنے کے لئے ضروری
تھوک نکلتا پڑے۔

بیرونی علاج: ہائیڈرائشس اور ٹنگر۔۔۔ 10 گرام
خالص ٹکسیرن۔۔۔ 60 گرام

رات کو بستر پر لیٹتے وقت مندرجہ بالا ادویات کے آمیزے میں روئی کو اچھی طرح بھگو کر
ناک کے اندر لگایا جائے۔ اس سے بہت زیادہ آرام ہو گا اور ناک کی اسٹغنی سوزش کو درست
کر دے گا۔

ناک سے سیلان خون

(Bleeding From the Nose)

برائی اوڈیا (Bryonia): یہ بہت عمدہ دوا ہے اور اسے سب سے پہلے آزمانا چاہئے۔ 9th ڈائی
لیشن دیکھئے۔

ملی فولیم (Millefolium): یہ ٹکسیر کی عمومی دوا ہے۔ اسے ٹکسیر کی وجہ جانے بغیر دیکھئے اور
جب برائیوڈیا ناکام ہو جائے تب دیکھئے۔

ٹریلیئم (Trillium): ناک سے خون بہنے کے لئے یہ عمدہ دوا ہے۔ اس میں ناک سے بہنے والا
خون چمک دار سرخ یا گہرا سرخ اور لوتھڑے دار ہوتا ہے۔ اس کے مد ٹنگر کو متاثرہ حصے پر
لگانے سے خون رک جاتا ہے مثلاً دانت ناک وغیرہ سے۔

آرنیکا ایم (Arnica M): جب چوٹ کی وجہ سے خون بے۔ ناک ٹھنڈا ہوتا ہے۔

امونیا کارب (Ammonia Carb): ناک سے خون بے۔ جب صبح کے وقت چہرہ
دھوئے۔

گرافٹس (Graphites): جب خون نکلنے سے پہلے یا ساتھ چہرہ اور گردن خون کی زیادتی
سے سرخ ہو۔ ناک سے خون بہنے کے ساتھ سر کی جانب اٹو دھام خون ہوتا ہے۔

کروکس (Crocus): گہرا تار دار خون۔

ہیمامیلس (Hamamelis): جب خون گہرے رنگ کا ہو۔

میلی لوتس (Melilotus): چہرے کی شدید سرخی کے ساتھ۔

فاسفورس (Phosphorus): متواتر اور افراط کے ساتھ خون کا بہنا سیلان خون کا رجحان۔
 آرم ٹریپ (Arum Trip): مسلسل ناک کو چھیڑتے رہنا یہاں تک کہ خون بہنے لگے۔
 وائپرا (Vipera): ناک سے خون بہنے کے لئے عظیم دوا ہے۔ حتیٰ کہ مدت العمر والے
 کیسوں میں یہ استعمال ہوتی ہے۔

نیٹرم سلف (Natrium Sulph): حیض سے پہلے دوران یا بعد ناک سے خون کا بہنا۔
 کروٹیلس ہور (Crotalus Hor): بوڑھے افراد میں اور جن کی صحت چاہ ہو چکی ہو، ایسے
 افراد میں ناک سے خون کا سیلان ہوتا ہے۔ جب تمام دیگر دوائیں ناکام ہو جائیں تو یہ دوا دی جا
 سکتی ہے۔ چہرہ کی خون والی سرخی کے ساتھ خون کی حالت میں نقص ہو چکر آئیں یا بے ہوشی ہو
 جائے۔

امونیم میور (Ammonium Mur): تھنوں سے خون کے پھٹکے نکلتے ہیں۔
 اگیکیلس (Agaricus): ناک نکلتے وقت ناک سے خون کا آنا۔
 یونی اونم (Eupionum): جب حیض میں خون کا آنا بند ہو جائے تو ناک سے خون کا سیلان
 ہو۔

آر سینیکم البم (Arsenicum Alb): ناک سے شدید سیلان خون، جس کے ساتھ جلن دار
 درد ہوتا ہے اور تھکان ہوتا ہے۔

ارگریرون (Erigeron): چمک دار سرخ خون کے سیلان کے لئے یہ مخصوص دوا ہے۔ نیز جسم
 کے تمام حصوں میں اجتماع خون ہوتا ہے۔

پلساٹیللا (Pulsatilla): حیض کے دب جانے کے ساتھ ناک سے خون بہنے کے لئے یہ ایک
 مفید دوا ہے۔ ناک سوج جاتی ہے اور بند ہو جاتی ہے۔ ذائقہ اور بو والی حس کھو جاتی ہے۔

مرکیوریس سول (Mercurius Sol): ناک کی پر درد سوزش۔ گندے ناک والے بچے۔
 متواتر اور باافراط نکسیر۔

تھلاسپی برسا (Thlaspi Bursa): ناک سے کم مقدار میں خون بہتا ہے۔ ناک کی بڑ میں
 مدہم درد ہوتا ہے۔ خون اور بلغم کا آزادانہ اخراج۔

بوسٹا (Bovista): صبح سویرے ناک سے خون بہتا ہے۔ سر میں انتشار ہو۔
 رشاکس (Rhus Tox): ناک سے خون بہتا ہے۔ رات کے وقت نیز آگے کو جھٹکنے پر خون
 گہرا سرخ ہوتا ہے۔

نزله — (Catarrh)

(دیکھئے ”زکام“)

ٹھنڈ (نزله) — (Cold)

(دیکھئے ”زکام“)

زکام (نزله) — (Coryza)

(حاد و مزمن)

(نیز دیکھئے ”تب کالی اور آنکھ“)

ایگریکس (Agaricus): زکام کے بغیر ہی ناک سے پانی بہتا ہے۔

نیٹرم میور (Natrur Mur): پانی کی طرح کا شفاف مواد ناک سے خارج ہوتا ہے۔ جس کے باعث آبلوں کی طرح کی پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ڈانٹے اور سوتکھنے کی حس زائل ہو جاتی ہے۔

اکونائٹ (Aconite): مرض کے اچانک حملہ کے وقت یہ بہترین دوا ہے لیکن یہ مرحلہ عموماً بغیر علاج کے گزر جاتا ہے۔ شروع کے مرحلہ میں مریض کو بخار ہوتا ہے جس کے ساتھ نتھنوں میں خشکی اور جھنجھناہٹ ہوتی ہے نیز بے چینی بھی ہوتی ہے۔

برائیونیا (Bryonia): سر میں اجتماع خون کے ساتھ ناک بند ہو جاتی ہے۔ مریض ناک کے ذریعے سانس نہیں لے سکتا۔ چھاتی میں درد کے ساتھ خشک کھانسی ہوتی ہے۔ یہ فلو کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔

فیرم فاس (Ferrum Phos): یہ زکام کے ابتدائی مراحل کے لئے مخصوص دوا ہے اور 30 ڈاکلوژن کی خوراک دینا چاہئے۔

جلسی میم (Gelsemium): ناک سے گاڑھا مادہ خارج ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس میں چھینٹیں آتی ہیں۔ سر درد ہوتا ہے۔ کمر میں جاڑا لگتا ہے اور دھکن والے درد ہوتے ہیں۔ مریض نڈھال اور کمزور ہوتا ہے۔

آرسنک البم (Arsenic Alb): پانی کی طرح کا مواد ناک سے بہتا ہے جو کہ تیزابی اور پتلا ہوتا ہے۔ یہ اس دوا کی علامات ہیں۔ چھینٹیں آتی ہیں اور بازوؤں اور ٹانگوں میں درد ہوتا ہے جیسا کہ جلسی میم میں ہوتا ہے۔ فلو کے لئے یہ بہترین دوا ثابت ہو چکی ہے۔

کاربو ووج (Carbo Veg): معدہ کی خرابی کے باعث زکام لاحق ہو جاتا ہے۔ جب مریض

زیادہ گرم کمرے میں جائے تو چھینکوں کے ساتھ زکام ہو۔

ایلیئم سیپا (Allium Cepa): آنکھوں سے نرم مادہ خارج ہونے کے ساتھ ناک سے تیزابی مادہ خارج ہو تو ایسی صورت میں یہ دوا مفید ہوتی ہے۔ عضلات میں دکن ہوتی ہے اور تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہے۔ جب گھر سے باہر ہو تو بہتری ہو جبکہ گرم کمرے میں ابتری ہو۔ پھولوں کی خوشبو اور حسیناؤں کی جلد سے بہت زیادہ حساس ہوتا ہے۔

یوفریزیا (Euphrasia): یہ ایلیئم سیپا کے بالکل برعکس ہے۔ آنکھوں سے اور ناک دونوں سے مواد خارج ہوتا ہے لیکن یوفریزیا میں آنکھوں سے خارج ہونے والا مواد تیزابی ہوتا ہے جبکہ ناک سے خارج ہونے والا مواد نرم ہوتا ہے۔

سورینم (Psorinum): مزمن زلوں میں اس دور کے متعلق سوچنا چاہئے اور IM طاقت کی خوراک دینی چاہئے۔ اگر اس سے بہتری ہو تو کسی دوسری دوا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پانی کی طرح کا مواد ناک سے خارج ہوتا ہے۔ دھول اور تمباکو کی خوشبو سے ابتری ہوتی ہے۔ ناک میں گدگدہ اور خارش ہوتی ہے۔

لائکوپریسیکم (Lycopersicum): گھر سے باہر زکام میں ابتری ہو۔

ایپک (Ipec): دم گھٹنے والے دوروں کے بعد زکام ہوتا ہے۔ زکام کے باعث آواز بالکل جالی رہتی ہے۔ جھڑک کی آواز کی بھیلیوں میں اجتماع خون ہوتا ہے۔

لیمنا مائنر (Lemna Minor): ناک کے پچھلے حصہ میں مواد کے گرنے کے ساتھ مزمن زلہ فتنوں کا گومڑ ناک کی بندش کو کم کرتا ہے۔

ڈلکامارا (Dulcamara): خشک زکام ذرا سا کپڑے اتارنے سے تازہ ہو جائے۔ گیلا ہونے سے یا مرطوب ترہ خانے میں رہنے سے یا کھلی ہوا میں اور رات کے وقت ابتری ہوتی ہے۔ ٹھنڈے نم دار موسم میں ناک بند ہو جاتی ہے۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): جب ناک سے گاڑھا زردی مائل سبز مادہ خارج ہو۔ جسے عام طور پر پکا ہوا زکام کہتے ہیں۔ اس مرض کے لئے یہ مفید دوا ہے۔ پیاس کی غیر موجودگی اس دوا کی خاص علامت ہے۔ زکام ہو جس کے نتیجے میں سوتھکنے کی اور ڈانٹنے کی حس کھو جائے۔

آرسنک آیوڈ (Arsenic Iod): یہ آرسنک الیم کے بعد والے مراحل کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان دونوں دواؤں میں کمی اور زیادتی کا فرق ہوتا ہے۔ آرسنک الیم کا مریض گرمی میں یا گرم چیزیں لگانے سے بہتر ہوتا ہے۔ جبکہ آرسنک آیوڈ کا مریض گرمی سے ابتری محسوس کرتا ہے۔

ہائیڈراستس (Hydrastis): اس دور کے ذیل میں خارج ہونے والا مادہ گاڑھا نہ بنے والا

رسی دار، زرد، خون ملا اور تیزابی ہوتا ہے۔ ناک میں ناسور بھی ہو سکتا ہے۔ کھلی ہوا میں بہتری ہوتی ہے۔ ناک بند ہو جائے۔ ناک کے پچھلی جانب سے رسی دار، بلغم حلق میں گرتا ہے۔

سناپیرس (Cinnabaris): مرغن زکام کے لئے۔

سبیل (Sumbul): ناک اور حلق کا زکام۔

سینگلونی نیریا نائٹ (Sanguinaria): ناک کے پچھلے حصے کا زکام سانس کی نالیوں کا (برونکائٹس) اور حنجرو کا مزمن زکام۔

کلکیریا سلف (Calcarea Sul): راسخ ہو چکے ہوئے پرانے زکام والے کیسوں میں، کھلی ہوا میں بہتری ہو، خشک زکام۔ ناک سے خون آمیز، چھیننے والا، بدبو دار، چھپ دار، گاڑھا، پیلا یا سبزی مائل مواد خارج ہوتا ہے۔ ناک سے چھلکے خارج ہوتے ہیں۔ ناک سے گندی بدبو آتی ہے۔

مرگ کار (Merc Car): گاڑھا، تیزابی، لیس دار اور چھیننے والا مواد، ناک سے خارج ہوتا ہے۔

تھیرائیڈین (Theridion): گاڑھا، پیلا یا سبزی مائل، پیلے رنگ کا مواد خارج ہونے کے ساتھ ضدی قسم کا زکام۔ چھینکوں کے شدید قسم کے دورے ہوتے ہیں۔

سلیسیا (Silicea): پاؤں کا پھیند دب جانے کے باعث ناک کا زکام لاحق ہو۔

سائی پسیس ناگرا (Sinapis Nigra): حاد زکام، جس کے ساتھ چھینکیں آئیں، پانی بے، خارش ہو اور ناک اور آنکھوں میں جلن ہوتی ہے۔ ناک میں خشکی ہو یا تیزابی مواد خارج ہو۔

آئیوڈیم (Iodium): ناک سے گاڑھا زردی مائل مبز مواد خارج ہو۔ اس سے جلن ہوتی ہے نیز پھلین ہوتی ہے۔ جیسے ہی تکلیف شروع ہوتی ہے۔ مریض کمزور ہوتا شروع ہو جاتا ہے نیز بھوک لگتی ہے۔ ناک کی نالی میں سوزش ہو۔ قوت شامہ جاتی رہے۔ حلق اور ناک کی نالی کے بند ہو جانے کے باعث بہرا پن لاحق ہو۔ گلا بیٹھ جاتا ہے۔ ناسلز کا مرض لاحق ہو۔ آرا جلنے کی آواز کا سا تحفہ ہونے کے ساتھ، خشک، چھوٹی اور بھونکنے کی سی کھانسی۔ جلن ہو اور دم ٹھٹھے۔

کالی ہائیڈ (Kali Hyd): گاڑھا پیلا ہٹ مائل مواد خارج ہوتا ہے۔ ناک میں کچے پن اور جلن کے ساتھ گرم کرے میں بہتری ہوتی ہے۔ بیرونی ناک دبانے سے بہت دکھتا ہے۔ تمام چہرے میں درد ہوتا ہے اور مرض انتہا درجے کا بے چین ہوتا ہے۔ مریض کھلی ہوا میں چلنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ جس سے وہ ٹھکنا نہیں ہے۔

کاجوپٹم (Cajuputam): مسلسل تھوکنے کا رتجان، غلیظ بلغم کی بہت زیادہ مقدار تھوکے جیسے مریض محسوس کرتا ہے کہ ناک کی نالی سے گلے میں گر رہا ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vom): گرم کمرہ میں ناک کا بند ہو جانا۔
ناٹریک الیڈ (Nitric Acid): شدید خارش اور ناک کے بند ہو جانے کے ساتھ ناک کا نزلہ۔ رات کے وقت ناک سے تیزابی پانی جیسا مواد خارج ہو۔ یہ مواد پیلا بدبودار تیزابی ہوتا ہے جو بالائی ہونٹ پر سوزش پیدا کر دیتا ہے۔ ہر موسم سرما میں زکام لاحق ہو۔ ابھی ایک زکام سے آرام ہوتا ہے کہ دوسرا لاحق ہو جاتا ہے۔

کافیا (Coffee): درد اور رونے کے رجحان کے بعد زکام لاحق ہو۔
سٹس کین (Cistus Can): ناک کا مزمن نزلہ جس کے ساتھ متواتر اور شدید چھینکیں ہوتی ہیں۔ ٹھنڈے موسم میں اور ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے ابھری ہوتی ہے۔ نچر کی طلب ہوتی ہے۔ باغی جھلیاں متاثر ہوتی ہیں۔ جس کے ساتھ گاڑھا زرد اور بدبودار بلغم ہوتا ہے۔ پرانا اور تکلیف دہ نزلہ لاحق ہو۔ کچا پن محسوس ہوتا ہے سینہ اور ناک خالی جانے کے بعد۔ اس کچا پن کو اس وقت آرام ہوتا ہے۔ جب ناک اور سینہ دوبارہ بلغم سے بھر جاتا ہے۔

سپیا (Sepia): خشک زکام ناک میں دھکن ہو۔ ناک میں سوزش ہو اور ناک میں زخم آنا اور وغیرہ ہوں۔ نیز کھرنڈ ہوتے ہیں۔ ڈاٹ دار لہجے اور سبز مواد کا اخراج ہوتا ہے۔ مریض شور و سستی اور خوشبوؤں سے بہت زیادہ حساس ہوتا ہے۔ کھانا پکانے کی خوشبو سے تنگی ہوتی ہے۔
انٹیم ٹارٹ (Antim Tart): سرد موسم کے دوران سینے کا نزلہ لاحق ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ سفید بلغم ہوتا ہے اور شدید نقاٹ ہوتی ہے۔ پیچیدہ آتا ہے۔ ٹھنڈ لگتی ہے۔ چہرے پر پیلاہٹ اور نیلاہٹ ہوتی ہے۔

ہیپیر سلف (Hepar Sul): ناک کان گلے، مطلق اور سینے کا نزلہ۔ باغی جھلیاں بھی اس سے مہرا نہیں ہوتیں۔ ناک چلنے کے ساتھ اور چھینکوں کے ساتھ زکام ہوتا ہے۔ جب کہ مریض ٹھنڈی ہوا میں جاتا ہے۔ پانی کا سامان شروع میں ناک سے بہنا شروع ہوتا ہے اور آخر میں گاڑھا زرد بدبودار مواد خارج ہوتا ہے۔ نکلنے وقت گلے میں درد ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گلے میں کرپیں بھری ہوئی ہیں۔ بستر سے قدم باہر نکالتے ہی تمام تکلیفات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

میڈورہینم (Medorrhinum 200): مندی قسم کا ناک کا نزلہ۔ قوت شمار کے جاتے رہنے کے ساتھ۔ ناک کا پیچھے والا حصہ بند ہو جاتا ہے۔ بلغم سفید اور پیلا ہوتا ہے۔ جب دیگر ادویات جن کی نشاندہی کی گئی ہے ناکام ہو جائیں تو اس دوا کو آزمائیں۔

مرکیوریس سول (Mercurius Sol): گاڑھا سبزی مائل تیزابی متعفن مواد خارج ہونے کے ساتھ زکام کا لاحق ہونا۔ جس کے ساتھ ناک کی ہڈیاں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ ناک سے خون

ہوتا ہے اور خون آلود مواد خارج ہوتا ہے۔ رات کے وقت اتھری ہوتی ہے اور دن میں بہتری ہوتی ہے۔

اورم آرسنک (Arum Ars): پرانے سخت قسم کے زکام کے لئے یہ سب سے زیادہ مفید دوا ہے۔ ناک کی ہڈیوں کا ٹکنا سڑنا لاحق ہوتا ہے 'زکام متواتر بننے والا بھی ہو سکتا ہے اور خشک بھی۔ خارج ہونے والا مادہ خون آلود، بدبودار، متعفن، سبزی مائل، پیپ دار، گاڑھا یا پانی کی طرح کا اور پیلا ہوتا ہے۔

گمشیا کارب (Magnesia Carb): خشک زکام جس کے باعث سانس منہ کے ذریعہ لینا پڑے۔

امونیا کارب (Ammonica Carb): خشک، بندش والا زکام، جو رات کے وقت اتھرو جاتا

یہ نیکس لین (Naphthaline): حاد زکام جس کے ساتھ پھیلنے والا مواد متواتر خارج ہو نیز بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں۔

فلانی ٹولا کا (Phytolacca): سب سے زیادہ پریشان کن اور بہت دیر تک رہنے والا نزل۔ پرلے درجے کا سخت پرائنا اور طویل مدت تک رہنے والا نزل جس کے ساتھ ناک کی ہڈیاں تپا ہو جاتی ہیں۔ ناک کی مکمل تباہی و بربادی۔ جب سواری کرے تو چھنی طور پر منہ کے ذریعہ سانس لینا پڑے۔

ایلن تھرس جی (Allanthus G): تلخ اور خراش دار، جلن والا زکام، جس جگہ لگتا ہے جلن پیدا کر دیتا ہے اور پھیل دیتا ہے۔ نحتوں میں دھکن پیدا کرتا ہے اور خراشیں ڈال دیتا ہے۔

کالی آئیوڈ (Kali Iod): آنکھوں، ناک اور گلے کا مزمن نزل۔ جس کے ساتھ سبز رنگ کا پیپ دار، پلٹی مواد خارج ہوتا ہے۔ جو بعض اوقات بہت زیادہ متعفن ہوتا ہے۔ معمولی لعنت سے زکام دوبارہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ناک سرخ ہو جاتا ہے اور سوج جاتا ہے۔ ہڈی میں سوراخ ہوں۔ آواز ناک سے آتی ہے یا آواز بیٹھ جاتی ہے یا بالکل بند ہو جاتی ہے۔ گرمی سے اور بستر کی گرمی سے اتھری ہوتی ہے۔

کالی کارب (Kali Carb): کھلی ہوا میں ناک کھل جاتی ہے۔ جس کے ساتھ جلن اور درد سر ہوتا ہے جو کہ بہت شدید ہوتا ہے۔ گرم کمرے میں ناک بند ہو جاتی ہے۔ جب مریض ناک سے مواد خارج کرتا ہے تو سکون محسوس کرتا ہے جیسا کہ اخراج کے ساتھ درد سر بھی رفع ہو گیا ہے۔

کیڈمیم سلف (Cadmium): ناک کا نزل جو کہ اتنا زیادہ ترقی کرتا ہے کہ ہڈیوں کے ٹکٹے

سڑنے کے باعث ناک کی ہڈیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہڈیوں کا نامور "ہڈیوں میں درد ہو" چھینگیں
آئیں "زکام ہو۔ آبلے ہوں اور پھوڑے پھنسیاں ہوں۔

برومیم (Bromium): حاد زکام "چھینکوں اور ناک کے اندر جلن کے ساتھ نیز ٹھنڈی ہوا میں
سانس لینے سے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ ناک سے خون بہتا ہے۔ ناک میں نامور ہوتا ہے۔
جون "جوالائی کے نزلہ وغیرہ میں یہ دوا مفید ہوتی ہے۔ گرم موسم کے زکام کے لئے یہ مفید دوا
ہے۔

الومین (Alumen): زکام کا رجحان جو گلے میں جگہ بنا کر بیٹھ جاتا ہے۔ ان لوگوں میں یہ
مرض ہوتا ہے جنہیں زکام ہونے کی عادت ہو نیز جن کے ٹانسز بڑھے ہوئے ہوں اور سخت
ہوں۔

باسم پیرو (Balsamum): سانس کی نالیوں کا نزلہ جس کے ساتھ پیپ دار بلغم افراط کے
ساتھ خارج ہوتی ہے۔ نقابت ہوتی ہے "سرخ بخار ہوتا ہے۔

سنا (Senna): بار بار کی چھینگیں ہوں۔ جن کے باعث حرارت ہوتی ہے۔ خصوصاً ہاتھوں میں
تھکوت ہوتی ہے اور تنفس میں دقت ہوتی ہے۔

الومینا (Alumina): مسلسل نزلہ کی حالت "ناک اور گلا خشک ہوتا ہے اور بندش ہوتی ہے۔
آنکھوں کے اوپر پیشانی میں درد ہوتا ہے۔ ناک میں لمبے "ہزیدہ دار چھلکے ہوتے ہیں۔ مزمن
نزلہ ہوتا ہے۔ بصارت "دھندلا جاتی ہے۔ جیسا کہ دھند میں سے دیکھ رہا ہو۔

تب کلاہی — (Hay Fever)

(نیز دیکھئے "زکام")

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): تب کلاہی کا علاج اس دوا سے شروع کرنا بیش سے مفید ہوتا
ہے۔ یہ مرض کے حملے کو توڑ دیتی ہے اور بعض اوقات بالکل ہی تندرست کر دیتی ہے۔ یہ دوا
پندرہ روز میں صرف ایک خوراک دی جانی چاہئے۔ اس طرح سے صرف چار خوراکیں دی جائیں
اور پھر ہر چھ ماہ کے بعد ہی صرف اسے دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے اور تقریباً دو سال تک
ایسا کرنا چاہئے۔ خوراک 200 ڈائی لیوشن ہے۔

سورینم (Psorinum): یہ دوا ایسے مریضوں کے لئے مفید ہے۔ جو سردی سے حساس ہوتے
ہیں۔ 200 ڈائی لیوشن کی ایک خوراک عمل انگیز دوا کے طور پر دی جائے "دیگر نقابت کی گئی
دواؤں کے ساتھ۔

سبادیلا (Sabadilla): متواتر سینے والے زکام اور شدید چھینکوں کے لئے جن کے متعلق

مریض نہیں جانتا کہ ان کا اختتام کب ہو گا۔ ٹھنڈ سے ابتری ہو۔ تپ کھلی کی دسے والی صورت۔

سٹیکٹا پلمونیریا (Sticta Pulmonaria): جب ورم زرخہ (برونکائٹس) کا راجحان بھی ہو۔
سکینم 3x (Succinum 3x): ایک یا دو گرین دوا 12 چائے کے چمچوں میں حل کر لیں اور ایک چائے کا چمچ ہر دو گھنٹے کے بعد لیا جائے۔

آرسنک آئیوڈ (Ars. Iod): متواتر چھینکیں اور پانی کی طرح کا مواد ناک سے افراط کے ساتھ خارج ہو۔ جو بالائی ہونٹ کو جلانے۔ پانی کی طرح کا جلانے والا مواد آنکھوں سے خارج ہو جیسا کہ آرسنک البم میں ہوتا ہے۔ لیکن آرسنک البم کے مریض گرم اشیاء لگانے سے بہتر ہوتے ہیں اور گرم پانی ناک میں کھینچنے سے بھی بہتر ہوتے ہیں۔ آرسنک آئیوڈ کے مریض گرم کمرے میں ابتر ہوتے ہیں اور کھلی ہوا میں اور ٹھنڈی چیزیں لگانے سے بہتر ہوتے ہیں۔

آرسنک البم (Arsenic Alb): پتلا پانی جیسا مواد ناک سے خارج ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ بیجان ہوتا ہے اور چھینکیں آتی ہیں۔ بے چینی ہوتی ہے۔

کورنیکو کالی سلف (Chornico Kali Sul): متواتر چھینکوں کے ساتھ 'پانی بننے کے ساتھ' پانی کا سا بلغم خارج ہونے کے ساتھ 'ناک سرخ ہو جانے کے ساتھ' بعض اوقات ورم زرخہ والے دمہ کے ساتھ۔ تپ کھلی لاحق ہو۔

مرک 'کالی آئیوڈ' (Merc. Kali Iod): چھینکوں 'کھانسی اور آنکھوں سے پانی بننے کے ساتھ ناک سے پانی جیسے بلغم کا سیلان ہوتا ہے۔

سناپس نائیگرا (Sinapis Nigra): تپ کھلی جس کے ساتھ زکام 'چھینکوں کا آنا اور پانی کا بہنا ہوتا ہے نیز آنکھوں میں خارش اور جلن ہوتی ہے۔ ناک کی خشکی یا تیزابی اخراج ہو۔

کاربووتج (Carboveg): بیجان کے ساتھ جو بڑھ کر چھاتی تک پہنچ جاتا ہے۔ جس کے ساتھ آواز بیٹھ جاتی ہے اور کچا پین ہوتا ہے۔ پانی کا سامادہ ناک سے خارج ہوتا ہے۔

ایلیئم سیپا (Allium Cepa): جب ناک سے چھیلنے والا مواد خارج ہو جبکہ آنکھوں سے سلاوہ اور نرم مواد خارج ہو۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ حنجرہ میں یا حنجرہ سے نیچے 'آنکھڑے پھسنے ہوئے ہوں۔ یہ بھی گرم کمرے میں ابتر ہو جاتا ہے۔

نیفتھالین (Naphthaline): تپ کھلی کو روکنے اور دور کرنے کے لئے تقریباً یہ ایک مخصوص دوا ہے۔ آنکھوں اور ناک سے چھیلنے والا مواد خارج ہو۔ آنکھوں کے پونے سو جے ہوں۔ دمہ کا راجحان ہو۔

سلفر (Sulphur): آنکھوں سے 'کھن سے' جانوروں کے گوشت سے اور پھلی وغیرہ سے

الرجی کے باعث تپ کالی یا دمہ لاحق ہو۔ جب اچھی منتخب دوائیں ناکام ہو جائیں تو اس دوا کو عمل انگیز دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پروں سے یا پروں والے نگیہ سے تپ کالی لاحق ہو۔

سپیا (Sepia): صبح کی چھینکیں بستر میں آتی ہیں۔ ایر آلود موسم میں ابتری ہوتی ہے۔ رفاقت کے وقت یا جب ہمدردی ظاہر کی جائے تو ابتری ہو۔ رشتوں سے بے تعلقی ہو جائے۔ مریض باصول ہوتا ہے۔ اسے پیاس نہیں لگتی۔ سردی سے ابتری ہوتی ہے۔ سانس بدبودار ہوتا ہے۔ چہرہ زردی مائل ہوتا ہے۔

یوفرزیا (Euphrasia): آنکھوں سے جلن دار مواد یا افراط خارج ہو اور ناک سے سادہ نرم مواد خارج ہو۔

آئیوڈیم (Iodum): ناک سے گاڑھا زردی مائل سبز مواد خارج ہوتا ہے۔ یہ جلن اور چین پیدا کرتا ہے۔ جیسے ہی تکلیفات کا آغاز ہوتا ہے۔ مریض فوری طور پر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسے بھوک زیادہ لگتی ہے۔ تپ کالی کی دسے والی صورت۔

سینگولی نیریا (Sanguinaria): پھولوں کو سونگھنے اور خوشبوؤں سے تپ کالی لاحق ہو۔ مریض پھولوں سے حساس ہوتا ہے، ہاتھ اور پاؤں جلتے ہیں، مریض انہیں بستر سے باہر ہی رکھتا ہے تاکہ سکون حاصل ہو۔

شیفی سگریا (Staphisagria): زکام کے ساتھ یا زکام کے بغیر چھینکیں آئیں۔ آواز میں گاڑھا بگم ناک سے خارج ہو اور بعد میں پتلا مواد خارج ہو۔ غارش ہو، پھیائی کی ہڈیوں میں تیز باریک پھانسیں جھیں، سینہ میں خگی ہو۔

کلکیریا فاس (Calcareea Phos): زکام کے بغیر چھینکیں۔

کالی ہائیڈ (Kali Hyd): گاڑھا زردی مائل مواد خارج ہو، گرم کمرے میں کچے پن اور ناک میں جلن کے ساتھ ابتری ہوتی ہے۔ ناک کی بیرونی سطح دبانے سے بہت زیادہ دکھتی ہے۔ تمام چہرے میں درد ہوتا ہے اور مریض اتنا درجہ کا بے چین ہوتا ہے۔ مریض کھلی ہوا میں چلنا چاہتا ہے جو اسے بالکل بھی نہیں تھکاتا، تپ کالی کی دمہ والی صورت۔

اوزینا — (Ozena)

(یز دیکھئے "آتشک")

(ناک کا مزمن مرض جس میں متعفن مواد کا اخراج ہوتا ہے جو کہ ناک کے ناسور یا ناک کی ہڈیوں کے گھٹے سڑنے پر منحصر ہو۔)

اورم میٹ (Aurum Met) : یہ رہنما کن دوا ہے، عضلات و ریشوں کی گہری تباہی جڑ پکڑ جاتی ہے، 'ناک کی ہڈی کا گٹنا سڑنا' متعفن مواد خارج ہوتا ہے، 'سورخ کرنے والے یا کھودنے والے درد ہوں' رات کے وقت اتری ہوتی ہے۔

اورم آر سیکلم (Aurum Ars) : ناک کی بندش اور خارش کے ساتھ مرض "اوزینا" لاحق ہو، 'ناک کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے'، 'جلن دار اور کھودنے والا درد'، 'ناسوری درد' متواتر چھینکیں، 'ناک سوجی ہوئی ہو۔

ہیپوزائینیم (Hippozaenium) : یہ دوا ناک کی کڑی ہڈی کے ناسور میں جھکا ہونے والے مژمن کیسوں کی نشاندہی کرتی ہے، 'تیز ہڈیوں کا ناسور ناک کی درمیانی ہڈی کو تنگا کرتا ہے اور ناک کی ہڈی تک پہنچ جاتا ہے۔

تھوجا (Thuja) : سبزی مائل پیلے مواد کے اخراج کے ساتھ اوزینا لاحق ہو۔
مرک کار (Merc Cor) : ناک میں ناسور ہو، 'چھیلنے والا مواد خارج ہو'، 'خصوصاً ناک سے گاڑھا چھلنے والا مواد خارج ہوتا ہے'، 'جس کے ساتھ ہمیشہ جلن دار درد ہوتا ہے۔
مرک ویر (Merc Vir) : ہڈیوں میں دکھن کے ساتھ۔

میزریم (Mezerium) : ناک اور چہرے کی ہڈیوں میں جلن دار درد کے ساتھ۔
پٹرولیم (Petroleum) : ناک کے پتھروں میں گھرنڈ بنتے ہیں اور چہرے آتے ہیں۔
پلساٹیل (Pulsatilla) : زرد رنگ کا مادہ مواد خارج ہونے کے ساتھ شام ہوتے ہوئے اتری ہو۔

ہائیڈراستس (Hydrastis) : خون آلود، باافراط مواد خارج ہونے کے ساتھ ناسور ہونے کے درمیان کے ساتھ۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb) : گاڑھا، پیپ دار، متعفن مواد خارج ہونے کے ساتھ ناک کی جڑ میں سوجن اور زخم ہونے کے ساتھ۔

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum) : عمل انگیز دوا کے طور پر دی جا سکتی ہے جیسا کہ بعض اوقات مرض کی بنیاد ناک کی ٹی بی پر ہوتی ہے۔

کالی آئیوڈ (Kali Iod) : آنکلی مژمن "اوزینا" ناک کی ہڈیاں کھتی مڑتی ہیں جس کے باعث ناک چھٹی ہو جاتی ہے، 'سبز رنگ کا مادہ باافراط خارج ہوتا ہے۔

ناک کی رسولی (Polypus)

لیمنا مینور (Lemna Minor) : ناک کی رسولی کے لئے یہ دوا چوٹی کی ہے۔ 1x ذاتی لیوشن

دیکھئے۔

ٹیوکریم (Teucrium): پہلو پر لیٹنے سے ناک بند ہو جانے کے ساتھ۔
سنگوئی تیرا سی (Sanguinaria C): جب یہ مرض حلی کے ساتھ درد سر کے ہمراہ ہو۔
تھوجا (Thuja): ناک کی نالی میں سوزش کے ساتھ ناک کی روسولی گندی ہو آتی ہے، قوت
 شامہ کے کھوجانے کے ساتھ ناک سے سبزی مائل پتلا مواد خارج ہوتا ہے۔
کلکیریا کارب، نائٹریک ایسڈ (Calcarea Carb, Nitric Acid): یہ دونوں دوائیں
 بھی ناک کی روسولی کے لئے مفید ہیں۔
ایومن (Alumen): دائیں جانب کی ناک کی روسولی۔

ناک کی نالی کا پھوڑا (Sinus)

کالی پائی، سیلیشا (Kali Bi, Silicea): سیلیشا 200 طاقت کی خوراک ہر پندرہ روز کے بعد
 دیتے اور یہ دوا دینے سے دو دن پہلے اور دو دن بعد تک کوئی دوسری دوا نہ دی جائے۔ سچ
 والے وقفہ کے دوران کالی پائی 30 طاقت کی خوراک روزانہ چار مرتبہ ہر چار گھنٹے کے بعد دی
 جائے۔

آئیوڈیم (Iodium): ناک کی نالی کا پھوڑا، گولی لگتے جیسے اور ہتھوڑا لگتے جیسے درد سر کے
 ساتھ نیز یہ درد نچلے جڑے میں بھی ہوتے ہیں۔ خصوصاً نزلے کے حملے کے دوران یہ درد
 ہوتے ہیں۔ آگے کو جھٹکنے سے اعتری ہوتی ہے، یہ دائیں جانب کے سر، کان اور نچلے جڑے کو
 متاثر کرتے ہیں۔

کالی آئیوڈ (Kali Iod): ناک کی نالی میں پھاڑنے والا یا جھٹکنے لگتے جیسے درد ہوتا ہے۔ کھونے
 والا اور درد کرنے والا زکام بار بار لاحق ہوتا ہے۔ ناک سرخ اور درم آلود ہوتا ہے۔ گاڑھا، سبز
 اور بدبودار مواد خارج ہوتا ہے۔

بو (متعفن) — Smell (Fetid)

اناکارڈیم (Anacardium): سو گھنٹے کی حس غلط ہو جاتی ہے۔

سیلیشا (Silicea): ناک کے نزلہ میں۔

ہیپیر سلف (Hepar Sulp): پرانے پتھر کی طرح کی بو محسوس ہوتی ہے۔

مرکیورس سول (Mercurius Sol): حلق کے نزلہ و زکام میں۔ پرانے زکام میں۔

کالی پائی (Kali Bi): سخت گندی بو محسوس ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ پانی کا سا مواد ناک سے

ہوتا ہے۔

اورم میٹ (Aurum Met): جب ناک چھینکا جائے تو گندی بو آتی ہے۔
 سلفر (Sulphur): گندی بوؤں کا شکار 'سانس گندا' پانڈہ شدید متعفن بو والا ہوتا ہے۔
 اعضائے قاسم کی گندی بو جسے کمرے میں مریض کے کپڑوں کی بو کی بجائے سونگھا جاسکتا ہے۔
 تمام خارج ہونے والے ماوے متعفن اور پھیلنے والے ہوتے ہیں۔ جن سے سخت بدبوئیں آتی ہیں۔ باوجود دھونے کے مریض کی بغلوں سے تیز چپٹے والی بو آتی ہے۔

قوت شامہ (دھبی یا کھو جائے)

Smell (Diminished or Lost)

الیومنا (Alumina): حس شامہ گھٹ جائے۔ متواتر زکام ہو، ناک کی نوک چر جائے۔ نتھنے دھکیں اور سرخ ہوں۔ چھونے سے اتری ہو۔ گاڑھے پیلے مواد کے ساتھ کھریڑ جتے ہیں۔
 اورم میٹ (Aurum Met): دلی ہوئی آتشک کے باعث ناک کی بدوئیں کی وجہ سے حس شامہ جاتی رہے۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): ٹائیفائیڈ بخار میں سونگھنے کی حس مدہم پڑ جائے۔

مزیریم (Mezerium): ناک کی خشکی کے باعث حس شامہ کمزور ہو۔

مرک کور (Merc Cor): گلا خراب ہونے کے ساتھ حس شامہ میں کمزوری۔

پلساٹیل (Pulsatilla): نزلہ کے باعث حس شامہ جاتی رہے۔

نیٹرم میور (Natrur Mur): گاڑھے مواد میں اگر پلساٹیل ناکام ہو جائے تو یہ دوا دینی چاہئے۔

کیوپرم میٹ (Cup Met): ناک کی آگے کی ٹالی کے نزلہ و زکام میں۔

ایلیپس (Elaps): ناک کی جھلی کی مزمن سوزش میں 'اوزینا' میں۔

تھوجا (Thuja): ناک کی ٹالی کی سوزش جس کے ساتھ ناک سے سبزی مائل بدبودار مواد خارج ہوتا ہے۔ قوت شامہ جاتی رہتی ہے اور ٹھنڈ سے الرجی ہوتی ہے۔

بنیزوئیک ایسڈ (Benzoic Acid): حس شامہ مدہم پڑ جاتی ہے۔ بو درست نہیں ہوتی، بہت زیادہ گاڑھا پشاپ، احتمالی گندی بو کے ساتھ۔

کالی آیوڈیم (Kali lodatum): سونگھنے کی حس نہ رہے۔ یوں محسوس ہو کہ کوئی کیرا ناک کی جڑ میں رینگ رہا ہے۔

مگنیشیا میور (Magnesia Mur): نزلہ کے بعد سونگھنے کی حس اور ذائقہ کی حس کھو جائے۔

بو کی حساسیت (Smell (Hypersensitive))

گرافائٹس (Graphites): پھولوں سے بہت زیادہ حساسیت ہوتی ہے 'بو بہت تیز آتی

کاچیکیم (Colchicum): خوراک سے حساسیت ہوتی ہے 'خوراک کی خوشبو سے آپے میں نہ رہے۔ انڈوں کی خوشبو سے مہلکی اور تے ہوتی ہے۔

بیلادونا (Belladonna): تمباکو سے حساسیت ہوتی ہے۔

سلفر (Sulphur): زیادہ حساسیت کے لئے یہ ایک عمومی عمل انگیز دوا ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): تیز خوشبوؤں سے کھانسی لاحق ہو۔ پھولوں کی خوشبو سے بے ہوشی ہو جائے۔

سپیا (Sepia): کھانا پکانے کی خوشبو سے مہلکی ہوتی ہے۔

سلفر ایسڈ (Sulphur Acid): کلن کی خوشبو سے زیادہ حساسیت ہوتی ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vom): پھولوں کی خوشبو سے چکر آتے ہیں۔

بو کا وہم (Smell (Illusion of))

سلفر (Sulphur): بو کے وہم والے مرض کا علاج اس دوا سے شروع کیا جائے۔ اگر یہ دوا کام نہ کرے تو نیچے دی گئی ادویات ان کی علامات کے لحاظ سے استعمال کی جائیں۔

گرافائٹس (Graphites): جلتے ہوئے بالوں کی بو کا وہم۔

اناکارڈیم (Anacardium): جلتے ہوئے اسفنج کی بو کا اور مرغیوں کی بیٹوں کا وہم۔

کروٹن ٹک (Croton Tig): پاخانے کی بو کا وہم۔

چائنا (China): لاش کی بو کا وہم۔

بیلادونا (Belladonna): سڑے ہوئے انڈوں کی بو کا وہم تیز مچھلی کے چورے کی بو کا وہم۔

پلساتیل (Pulsatilla): پرانے متعفن نزلہ کی بو کا وہم۔

کالکیریا کارب (Calcarea Carb): کھانسی کی بو کا وہم۔

یوفوربیم (Euphorbium): چوہے کی بو کا وہم۔

سانیکولا (Sanicula): بچے کے اعضائے ناسل سے مچھلی کے چورے کی بو آنے کا وہم۔

بچے کے اعضاء سے نسلانے کے باوجود مچھلی کے چورے کی بو آئے۔

چھینکیں — (Sneezing)

(دیکھئے ”تپ کاہی“)

خراٹے — (Snoring)

لیمنا مائنر (Lemna Minor): ناک بند ہو جانے کے باعث مریض خراٹے لے۔ ناک کی ہڈیوں کا لمبا ہو جانا۔

ہیپوزائیم (Hippozaenium): ناک کی سوجن اور ناک کے سرخ ہو جانے کے ساتھ خراٹے ہوں۔ نیز اس کے ساتھ خدی قسم کا نزلہ بھی ہوتا ہے۔ ناک کی کڑی ہڈی تنگی ہو جائے۔ ریزہ کی ہڈی کا ناسور یا اس کا بڑھ جانا۔

اوپیم (Opium): دم میں خراٹے ہوں۔ مرگی میں، فشی میں، زہنگی کے تشنج میں، خراٹے ہوتے ہیں۔ مریض کھلے منہ کے ساتھ خراٹے لیتا ہے۔ سینے میں اجتماع خون کے ساتھ خراٹوں کا آنا۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): بے قاعدہ قسم کے دردزہ کے ساتھ تشنج کے بعد خراٹے۔

دھبے (ناک پر) — (Spots)

سلفر (Sulphur): ناک پر بھورے اور سیاہ دھبے ہوں۔

سیپیا (Sepia): ناک پر پھیلی ہوئی پیلے رنگ کی کاٹھی۔

حصہ دوم — گلا (حلق)

دم گھٹنا — (Choking)

(نیز دیکھئے ”ضیق النفسی“ اور ”گلے کی دکھن“)

کیمومیلہ (Chamomilla): جب مریض محسوس کرے کہ کوئی چیز گلے کی جانب اوپر کو چڑھ رہی ہے جس سے اس کا گلا دب کر دم گھٹ جائے گا۔

سپاکی جیلہا (Spigelia): ناک کے پھیلی جانب کی ٹالی سے افراط کے ساتھ بخم آنے کے باعث دم گھٹنا۔

لکس (Lachesis): یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے اس کا گلا پکڑ رکھا ہے اور اس سے اس کا دم گھٹ جاتی گا۔ صبح کو جاگتے پر اتری ہو۔ دوسرے والا دم گھٹنے کا مرض، گرم سیال

بازرنگے سے دم گھٹنے، گرم چائے رنگے سے یا گرم مشروبات رنگے سے دم گھٹتا ہے۔

میکس (Cactus) دل کی تکلیف کے ساتھ دم کا گھٹنا۔

میفاٹیکس (Mephites) دم گھٹنے جبکہ مریض کھا رہا ہو یا پی رہا ہو۔

ایسڈ نائٹرک (Acid Nitric) یوں محسوس ہوتا ہے کہ گھٹانے کے دوران ایک لقمہ حلق کے ساتھ چپک گیا ہے۔ جس کے باعث حلق میں انقباض محسوس ہو۔ دم گھٹنا، گھٹنا بہت مشکل ہو، چہرے کو بگاڑ دے اور سر کو نیچے کو گرائے۔

سکیوٹاواروسا (Cicuta Vir) ہڈی کا کوئی ٹوکیلا نکڑا نکل لینے کے بعد یا حلق کے کسی دوسرے زخم کے باعث حلق بند ہو جاتا ہے اور گلا دبے اور دم گھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔

مگنیشیا فاس (Magnesia Phas) دم گھٹنے کے احساس کے ساتھ دوروں والا انقباض حلق۔ پہلے ٹانسز بڑھ جاتے ہیں اور پھر تالو کی سرفی ظاہر ہوتی ہے۔ خشکی ہوتی ہے اور رنگے میں دقت ہوتی ہے۔

میڈوررہنم (Medorrhinum) سانس کی ٹالی کے تشخ کے ساتھ جھرو میں کٹ کٹ کی آواز آتی ہے۔ سانس خارج کرنا مشکل ہوتا ہے البتہ سانس اندر کو کھینچنا آسان ہوتا ہے۔ برومین (Bromine) سانس کی ٹالی کا تشخ یا انقباض۔

کروپ کھانسی (غیر خنثی)

Croup (Non Diphtherie)

(تیز دیکھے "درم جھرو")

اکونائٹ نیپ (Aconite Nap) یہ دوا مرض کے آغاز میں دی جائے۔ گلا میں درد ہوتا ہے اور رنگے میں مشکل ہوتی ہے۔ بھاری آواز والی 'ٹنگ ٹنگ' بھونکنے والی کھانسی ہوتی ہے۔ تیز بخار ہوتا ہے۔ بے چینی ہوتی ہے۔ مریض خوف زدہ ہوتا ہے۔ حلق اور گلے میں جلن ہوتی ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش ہوتی ہے جسے بہت مشکل سے گلا جاتا ہے۔

سپونجیا (Spongia) درم جھرو کے ساتھ بیٹھی ہوئی آواز والی کروپ کھانسی، کھانسی کی آواز ایسی ہوتی ہے جسے کھڑی کو کسی آرت سے کانا جا رہا ہو۔

کالی یاٹیک (Kali Bich) ضیق النفس، بیٹھی ہوئی آواز کے ساتھ کھردری کھانسی۔ سانس کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسے کسی دھات کی ٹالی میں ہوا گزر رہی ہو۔

بیلادونا (Belladonna) جب بھونکنے والی کھانسی ہو کھانسی کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسے کتے کے بھونکنے کی آواز ہوتی ہے اور کھانسی وقت ہنرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ جلد گرم اور خشک ہوتی

ہے۔ نبض بھرپور تیز ہوتی ہے۔ ٹانسز ورم دار اور سرخ ہوتے ہیں۔
 سینگوئی نیریا سی (Sanguinaria C): جب جگر میں جلن اور خشکی ہو۔ سٹی دار آواز کے
 ساتھ 'ٹینٹی ہوئی آواز والی کروپ کھانسی ہوتی ہے۔
 ہیسپر سلف (Hepar Sulphur): کروپ کھانسی اور ورم جگر کے متواتر حملے جن کی وجہ
 ٹھنڈی ہوا میں کپڑے اتارنا ہو۔ ٹینٹی ہوئی آواز والی 'ٹنگ' بھونکنے والی کھانسی ہوتی ہے 'تنفس
 کی آواز سٹی دار ہوتی ہے۔ کھڑکھڑاہٹ والی اور دم کھٹنے والی کھانسی 'صبح کے وقت اتھری ہوتی
 ہے۔ بچہ کا دم کھانسی کے دورے کے دوران کھٹتا ہے۔
 فاسفورس (Phosphorus): جبکہ آواز مستقل ٹینٹی رہے اور مرض کے عود کر آنے کے
 آثار ظاہر ہوں۔

انٹیم ٹارٹ (Antim Tart): چہرہ ٹھنڈا نیلاہٹ مائل اور ٹھنڈے پینے سے بھرا ہوتا ہے۔
 نبض آہستہ چلتی ہے۔ آواز بالکل نہیں نکلتی۔ تنفس آرا چلنے کی سی آواز والا ہوتا ہے۔ نیز
 سانس کی آواز میں کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سانس کی ہوا خارج نہ
 ہونے والے پنجم میں سے ہو کر آرہی ہو۔

سمبوکس (Sambucus): آدمی رات کو ہونے والے کروپ کھانسی کے شدید دورے۔
 نر خرے والی 'مرنے کی آواز والی اور دم گھونٹنے والی کھانسی۔
 لیکسیس (Lachesis): سرخ 'گمرا' سیاہی مائل گلے کا زخم (ٹاسور) 'ٹھوس اشیاء کی
 نسبت خالی تھوک لگنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جگر کو چھونے سے درد ہوتا ہے۔ بہت زیادہ
 نقاہت ہوتی ہے۔

خناق — (Diphtheria)

لیکسیس (Lachesis): ناک سے پتلا مواد خارج ہوتا ہے جو کہ تیزابی ہوتا ہے۔ گلا گمرا
 سرخ 'گمرا' بھورا 'نیلاہٹ مائل جھٹک والا ہوتا ہے۔ گلے کی تہلی زیادہ تر بائیں جانب سے متاثر
 ہوتی ہے اور پھر مرض کا اثر دائیں جانب کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ گردن کے غدود سوج جاتے ہیں۔
 اونگھ آتی ہے اور نبض باریک ہو جاتی ہے۔ بازو اور ٹانگیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ سونے کے بعد
 اتھری ہوتی ہے۔ مائعات اور تھوک لگنے سے بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ 200 طاقت ڈائی لیوٹن
 کی خوراک ہر دو گھنٹے کے بعد دیجئے۔

لیک کینم (Lac Canium): لیکسیس کے برعکس اس میں اطراف تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔
 ایک جانب سے مرض شروع ہوتا ہے۔ متواتر بائیں جانب رہتا ہے پھر دکن اور سوزش اچانک

مخالف جانب کو تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر چند گھنٹوں کے بعد واپس نکتہ آغاز پر لوٹ آتی ہے۔
جھلی سبزی مائل، پیلی اور دہی کی طرح کی ہوتی ہے۔ اگر ناسور بن چکے ہوں تو وہ چاندی کے شیشے
کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ گھلاقلج سے متاثر ہو جانا ہی چنانچہ جو مائع پئے جاتے ہیں۔ واپس
ناک کے راستے خارج ہو جاتے ہیں۔

بیلادونا (Belladonna): گلے کی سوزشی کیفیت، درد سر اور اینٹھن کے ساتھ شدید چکن والا
درد ہوتا ہے۔

کرونیلس (Crotalus): جب ناک سے خون مستقل بہتا ہو۔ خوف دہن کی ہنسی جھلیوں
سے رس رس کر خون ناک اور منہ کے ذریعے خارج ہوتا ہے۔

ناجا (Naja): جب حملہ حنجرہ پر ہوا ہو۔ مریض دم گھٹنے کے احساس کے ساتھ گھبراہٹ لیتا ہے۔
سانس متعفن ہوتا ہے اور کھانسی ہنسی ہوئی آواز والی چھوٹی ہوتی ہے۔ کچے پن کا احساس حنجرہ
میں یا اوپر والے حصہ میں ہونے کے ساتھ۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): 4 سے 8 بجے شام سے مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دائیں
جانب سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ بچہ خوف کے ساتھ، غصہ کے ساتھ یا ناراضگی کے ساتھ
نیند سے جاگ جاتا ہے۔ ناک کے تھنوں کے پتھروں کی سی حرکت اس مرض کی نمایاں ترین
علامت ہے۔ گلے میں خشکی کا احساس پایا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز گلے سے نیچے نہیں اترتی۔
خوراک اور مشروبات ناک کے ذریعہ واپس باہر آ جاتے ہیں۔

ایپس (Apis): جب گلے میں سوزش ہو۔ ڈنک لگنے جیسے درد کے ساتھ یا تو یہ شدید ہو سکتی
ہے یا پھر یہ بغیر درد کے ہو سکتی ہے۔ گرمی سے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ زبان کے کناروں پر
آبلے ہوتے ہیں۔ غنودگی اور افسردگی ہوتی ہے۔ طلق کا کوا بڑھ جاتا ہے۔ اعضاء پھولے
ہوئے، شیشے کی مانند، چمک دار سرخ ہوتے ہیں۔ پیشاب بہت کم آتا ہے۔ آنکھوں میں پھلاوٹ
(سوجن) ہوتی ہے۔

کاربالک ایسڈ (Carbolic Acid): تیز بخار کے ساتھ، بہت زیادہ جلن ہوتی ہے لیکن حلق
میں درد نہیں ہوتا جو کہ آگ کی طرح کا سرخ ہوتا ہے اور ڈھیر یا (خلاق) قلعہ سے ڈھکا ہوتا
ہے۔ نبض انتہا درجہ کی تیز ہوتی ہے۔

مرک سائی نیٹس (Merc Cyanatus): بہت برے جان لیوا کیسوں میں یہ دوا استعمال
ہوتی ہے۔ اچانک حملے کے ساتھ خلاق لاحق ہو۔ انتہا درجہ کی فکارت اور خوف زدہ کر دینے والا
ضعف (دھڑن تختہ) چھوٹی تیز اور بے ترتیب نبض، جھلی سبزی مائل ہوتی ہے اور ناک تک
پھیل جاتی ہے اور ایک طویل سطح کو متاثر کرتی ہے۔ IM کی صرف ایک خوراک دینیے یا GM

ذاتی لیوشن دیجئے۔

برومیم (Bromium): زیادہ گرمی لگ جانے کے باعث یا بچے کو موسم سرما میں یا ذات کے وقت پسینے کے باعث خناق لاحق ہو۔

ڈیپتھیرینم (Diphtherinum): عمل انگیز دوا کے طور پر استعمال کرنی چاہئے۔ 200 طاقت کی خوراک دینی چاہئے۔ علاج اسی دوا سے شروع کیا جاسکتا ہے۔ انتہا درجہ کی کمزوری کے ساتھ ناک سے خون کا اخراج ہو۔ تقریباً آغاز ہی میں انتہا درجہ کی نقاہت ہو جاتی ہے۔ نبض کمزور ہوتی ہے اور تیز چلتی ہے۔ قوت حیات کا رد عمل کمزور ہوتا ہے۔ لگتا بغیر درد کے ہوتا ہے لیکن مانتات تے ہو جاتے ہیں یا ناک کے راستہ واپس باہر آ جاتے ہیں۔ سانس اور مادوں کا اخراج بہت متعفن ہوتا ہے۔

فالٹی ٹولا کا (Phytolacca): جب نگتے وقت درد گلے سے کان تک مار کرتے ہیں۔ زبان کی جڑ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ جب کچھ نگلا جائے۔ جلن ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی کوئلہ رکھا ہو یا آگ ہو یا گرم سرخ لوہا ہو۔ خشکی ہوتی ہے۔ نگتے میں دقت ہوتی ہے۔ ہاتھوں میں رعشہ ہونے کے ساتھ گلے میں ڈھیلا اٹکا ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ نگتے کی مسلسل خواہش ہوتی ہے۔ گرمی سرخ، نیلی یا راکھ کے رنگ والی جھلی ہوتی ہے۔ گرم مانتات نہیں پی سکتا۔

جٹسی میم (Gelsemium): خنثی قلع کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ تکلیف کہیں بھی ہو یہ دوا استعمال کی جاسکتی ہے۔ خناق کے نتیجہ میں جھجھکا کا قلع۔

اورم ٹرائی ٹیلیم (Arum Triph): حلق اور منہ کی جلن، خشکی اور کچا پن ہوتا ہے۔ تیزابی مواد کے اخراج کے ساتھ جو ناک سے ہوتا ہے اور جو نعتوں کو اور بالائی ہونٹ کو پھیل دیتا ہے۔

کینتھرس (Cantharis): یہ دوا نشانہ دی کرتی ہے اس مرض کی جس میں پیشاب متواتر آتا ہے اور جس سے پہلے دوران اور آخر میں پھیلن (جلن) ہوتی ہے۔ پیشاب میں ایلیومن خون اور / یا چمکے ہوتے ہیں۔

کالی بائیک (Kali Bich): اس دوا کی نشانہ دی کی جاتی ہے ایسے ڈیپتھیریا کے لئے جس میں چھیننے والے وقتہ دار درد ہوتے ہیں اور جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور ہر مرتبہ چھوٹی جگہ تک محدود ہوتے ہیں۔ زبان پر گاڑھا پیلا ہٹ مائل بھورا پٹم کا سامع داتا ہے۔ حلق کا کوا ڈھیلا ہوتا ہے گلے میں ذات کے احساس کے ساتھ۔

میورٹیک ایسڈ (Muriatic Acid): حلق کی پھیلی ہوئی گرمی سرخی، حلق کا کوا سوچا ہوا ہو۔ ٹائسلز بھی متورم ہوتے ہیں۔ نگتے کی نااہلیت ہوتی ہے۔ آواز ٹنٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ نچلے جیزے کے غدد سوچے ہوتے ہیں۔ گمرا سڑا ہوا خون ناک سے خارج ہوتا ہے۔ بہت زیادہ مقدار

میں ہوتا لیکن بہت زیادہ نفاہت ہوتی ہے۔
ناٹرک ایسڈ (Nitric Acid): کھانا اور پینا عملاً ناممکن ہوتا ہے۔ حلق کا کوارسنے والے مواد سے چھپا ہوتا ہے۔ جھپٹن ہوتی ہے۔ جیسے کہ نوک دار ٹکڑی سے 'شیشے کے ٹکڑے سے یا گرم تار سے ہو۔ تھوک آتا ہے 'بخار ہوتا ہے۔ نفاہت ہوتی ہے اور کھانسی ہوتی ہے۔ پیشاب کی بہت تیز ہوتی ہے جیسا کہ گھوڑے کے پیشاب کی ہوتی ہے۔

آواز کا بیٹھ جانا (حاد) — Hoarsness (Acute)

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): بے تحاشہ بولنے کے باعث آواز کا بیٹھ جانا جیسا کہ مبلغین حضرات گلوں اور مقررین میں ہوتا ہے۔

آرم ٹرائی قلم (Arum Triphi): تھکاوٹ اور ٹھنڈ لگ جانے کے باعث۔ عوام الناس کے ساتھ باتیں کرنے والوں (بیان کرنے والوں) میں 'نیلائی کی بولی لینے والوں میں 'اوانکاروں اور گلوکاروں میں یہ مرض پایا جاتا ہے۔ جنہیں تقریبات میں اس قسم کا کام (کرتب) پیش کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہی جھوٹے سے انہیں ٹھنڈ لگ رہ جاتی ہے اور گلا بیٹھ جاتا ہے جسے اس دوا سے فوری افادہ ہوتا ہے۔

سپونجیا (Spongia): جیسا آرم ٹرائی قلم میں ہوتا ہے۔ حنجرو حساس ہو جاتا ہے اور لگتا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ان علامات کے ساتھ سپونجیا اور آرم ٹرائی قلم ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتی ہے۔ ہوا گٹنے سے آواز جاتی رہے۔

جلی میم (Gelsemium): جب ہشیر یا کسی دوسرے مرض کے ساتھ حنجرو کا مکمل قلعہ لاق ہو۔ گلے کا اعصابی طور پر بیٹھ جانا 'حیض کے عرصہ کے دوران آواز کا جاتے رہنا۔
پلمبم (Plumbum): جب جلی میم نامکام ہو جائے یا کاسٹیکم زیادہ مدت کرے تو اس دوا کے متعلق سوچنا چاہئے۔ آواز کی مالی کے قلعے کے باعث 'آواز بیٹھ جانے کے پرانے کیسوں میں اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔

بیلادونا (Belladonna): حلق میں اجتماع خون کے باعث 'گڈڈ آوازیں نکلتی ہیں 'دور کے ساتھ۔

کاسٹیکم (Causticum): آواز والی مالی کی کمزوری کے باعث 'گلا بیٹھنے میں صبح کے وقت ابتری ہو۔

فاسفورس (Phasphorus): سوزش اور باقلم کا اڑدھام جو کہ آواز میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ کپڑا اتارنے کے باعث آواز کا جاتے رہتا۔ حنجرو پیوستہ باافراط ہونے کے ساتھ آواز کا کھو جانا۔

جس کے ساتھ جلد کا بہت تیزی والا بھجان ہو۔ ٹھنڈے پانی کی پیاس ہوتی ہے۔ گلے کا بیٹھنا شام کے وقت اتر ہوتا ہے۔

ریو میکس (Rumex): سخت چپکنے والے بلغم کے اجتماع اور حنجرہ کی مسلسل چھیلن کے باعث۔

برومیم (Bromium): ضرورت سے زیادہ گرمی کے باعث۔

مرک سول (Merc Sol): یہ دوا گلا بیٹھ جانے کے لئے مخصوص دوا ہے۔

ایپیکاک (Ipecac): زکام کے باعث آواز کا مکمل طور پر بیٹھ جانا یا آواز والی ٹالی میں اجتماع خون کے باعث۔

بریشا آیوڈ (Baryta iod): حنجرہ میں رکاوٹ یا کسی چیز کے اگنے کے باعث آواز بیٹھ جائے۔

انٹیم کروڈ (Antim Crud): گرمی میں جسم کھولنے کے باعث آواز بیٹھ جائے۔

انیشیا (Ignatia): ہسٹریائی کیسوں میں گلا بیٹھ جائے۔

کالی میور (Kali Mur): (ٹھنڈا) زکام کے باعث آواز کا بیٹھ جانا، چپکنے والا سخت بلغم ہو، کھانسی سخت، خشک، کروب اور بھونکنے والی ہو۔

سینگا (Senega): البیومن والے بلغم کے بہت زیادہ اجتماع کے ساتھ آواز کا بیٹھ جانا۔ سینے میں جلن، دکھن اور ٹانگے لگنے کا سا احساس ہوتا ہے۔

لیکسیس (Lachesis): آواز کی ٹالی کے قلع کے باعث۔

مینٹھ پیرپٹا (Mentha Piperita): بلند آواز سے بڑھنے کے باعث آواز کا کمزور ہو جانا، یہ دوا گلوکاروں کی مدد کرتی ہے۔ آواز کو قائم رکھنے کے لئے۔

البیومینا (Alumina): گلوکاروں اور بیان کرنے والوں (زیادہ بولنے والوں) میں آواز کا بیٹھ جانا

جو کہ نزلہ کے گلے میں گرنے کے ساتھ ہو۔ جب کہ ہاتھ کریں۔ گلوکاروں میں آواز کی تھڑکی (آواز کا بیٹھ جانا) جو کہ قلع یا زیادہ گلنے کے باعث ہو۔

البیومن (Alumen): آواز مکمل طور پر جاتی رہے۔ آواز کھو جانے کا مزمن مرض، یہ سب تازہ ٹھنڈے مشروبات پینے کے باعث ہو۔

رشاکس (Rhus Tox): آواز کا بیٹھ جانا بولنے سے درست ہو۔ چھاتی میں چھیلن کا احساس۔

سانس میں ٹھنڈ اور شدید جھینٹکیں۔ اس دوا کے استعمال سے تھوڑی دیر میں ہی آواز درست ہو جاتی ہے۔ آواز کا بیٹھنا ٹھنڈ گنا شروع کرتے وقت یا گھٹگو کے آغاز میں ہو۔

کاربو ویج (Carbo Veg): تپ کابی کے باعث آواز بیٹھ جائے اور کپا پین ہو۔ پانی کی طرح کا مواد خارج ہو۔ بھجان کے ساتھ جو چھاتی تک پھیل جائے۔

سمبوکس نائیگرا (Sambucus Nig): گرمی کھوکھلی کھانسی کے ساتھ آواز کا بیٹھ جانا سینے میں ٹھن ہو 'متواتر جھانپاں آتی رہیں۔ بے چینی ہو اور پیاس لگے۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): ذیلی کھانسی یا گڑھے زرد مواد کے ناک سے اخراج کے ساتھ آواز کا مکمل طور پر جاتے رہتا۔

کوکا (Coca): آواز جاتی رہے۔ بولنے کے بعد آواز بیٹھ جائے۔ ہر آدمی گھٹنے کے بعد درختچہ کے پانچ یا چھ قطرے دیئے جائیں اور جب متوقع آواز کی طلب ہو تو بولنے سے دو گھنٹے قبل پانچ چھ قطرے لئے جائیں۔

میلینڈرینم (Malandrinum): چیچک یا خسرہ کے باعث آواز کا بیٹھ جانا۔

اکونائٹ این (Aconite N): خشک اور سرد ہوا میں جانے سے آواز کھو جائے۔

سینا (Cina): ٹھنڈی ہوا لگنے سے آواز کا بیٹھ جانا لاحق ہو۔ جب اکونائٹ این 'فاسفورس اور سپونجیا تاکام ہو جائیں تو یہ دوا دی جائے۔

سٹرامونیم (Stramonium): قوت گویائی کھو جائے۔ صرف بیٹھی ہوئی اور پھٹی ہوئی آواز میں بول سکے۔ جس کے بدلے میں دکھن ہو۔ بھونکنے والی کروپ کھانسی ہو۔ شدید نشہ دوروں کے باعث لگنے کی نااہلیت ہو۔

ایبروٹانم (Abrotanum): گھٹیا کے باعث بوڑوں کی گانٹھوں میں التوائی دردوں کے باعث آواز کا بیٹھ جانا 'IM طاقت کی خوراک دیجئے۔

ارجنٹم میٹ (Argentum Met): عوام الناس کے اندر تقریریں کرنے والوں میں آواز کا بیٹھ جانا یا پیشہ ور گوئیوں میں آواز کا بیٹھ جانا۔ گوئیوں کے حلقوم کی مزمن سوزش۔

کلکیریا فاس (Calcareia Phas): آواز بیٹھ جائے۔ مریض گلے یا بولنے سے قبل حلق سے بلغم کھٹکھٹا کر نکالتا ہے۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): گوئیوں میں حلق کی مزمن سوزش 'آواز بلند کرنے پر کھانسی ہوتی ہے۔

مینگانم (Manganum): مقررین حضرات اور گلوکاروں کے لئے یہ ایک حیران کن دوا کہلاتی ہے اگر ارجنٹم نائٹ ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جائے۔ گلے میں بلغم جمع ہونا بھی اس دوا کی علامت ہو سکتی ہے جیسے ہی مریض گلا صاف کرے مزید بلغم جمع ہو جائے۔

اوکزالک ایسڈ (Oxalic Acid): دل کی تکلیفات کے ساتھ آواز کا کھو جانا 'آواز کے نقصان کے ساتھ دل کی دھڑکن کا جالہ ہوتا ہے۔

آواز کا بیٹھ جانا (مزمن) — Hoarseness (Chronic)

برٹا کارب (Baryta Carb): کھانسی اور ہوا کی ٹالی میں بلغم کے باعث آواز بیٹھ جائے اور آواز کھو جائے، زبان کا فالج، مزمن کیسوں میں۔

کاربو ویج (Carbo Veg): خمدی قسم کے کیسوں میں صبح کے وقت اور شام کے وقت بات کرنے سے اتھری ہوتی ہے۔

ہیپر سلف (Hepar Sulph): مزمن آواز کے بیٹھ جانے کے مرض کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ خصوصاً جب مریض کی ہسٹری میں دوران علاج پارہ کا زیادہ استعمال ہوا ہو۔ بڑوں میں آواز کا کھو جانا اور خشک بھونکتی ہوئی اور تیشی ہوئی آواز ہوتی ہے۔ خصوصاً صبح کے وقت اور شام کے وقت یا جب ٹھنڈی ہوا میں چلا جائے۔

سلفر، کلکیریا کارب، سیلیشیا (Sulphur, Calcarea Carb, Silicea): علاج کی تکمیل میں ان ادویات کو آزمانا چاہئے۔ مخصوص کیسوں میں یہ دوائیں ناگزیر ہو جاتی ہیں۔ انہیں یکے بعد دیگرے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

سنی شیو اور ٹینس (Senecio Aureus): حیض کے دب جانے کے باعث آواز بیٹھ جائے۔

فالج (گلے کا) — (Paralysis)

لیک کینٹم (Lac Can): ذہن پر یا کے ساتھ گلے کا فالج، جب مریض کوئی چیز پے تو ناک کے راستے واپس باہر آ جائے۔

ورم حلق — (Pharyngitis)

بیلادونا (Belladonna): عضلات اور حلق کے کوئے کا ڈھیلا پڑ جانے کوئے کی سوزش، گلے میں مریض گلنے کا احساس۔

سینگوئی نیریا ٹائٹ (Sanguinaria Nit): دائیں جانب کی حلق کی سوزش اتر ہو۔ سوزش حلقوم کا مزمن مرض۔

گوائیگم (Guaiacum): یہ بعض اوقات درد کو رفع کرتی ہے۔

زینک میٹ (Zincum Met): جب سوزش، شراب، تمباکو یا کسی دیگر پھان کے باعث ہو۔

فانی ٹولا کا (Phytolacca): حلق گھرا سرخ یا نیلا ہٹ مائل سرخ ہوتا ہے۔ حلق کھردرا، خشک اور گرم محسوس ہوتا ہے۔ کانوں میں گولی لگنے کے سے درد ہوتے ہیں۔ کچھ بھی لگا نہیں جاسکتا

حتی کہ پانی بھی۔ یہ کنٹھیادی دردوں کو بھی آرام پہنچاتی ہے۔

سٹس کیکن (Cistus Can): ناک اور حلق سے سانس اندر کھینچنے کے مرض کے ساتھ یہ دوا خاص تعلق رکھتی ہے۔ تلخ ذائقے والا بلغم خارج ہوتا ہے۔ گدگدی ہو اور کھرچن ہو۔ بعض اوقات حلق میں ریت کا احساس ہوتا ہے۔ گلے کی خشکی اور گرمی مریض کو متواتر پانی پینے پر مجبور کرتی رہتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے حلق میں درد ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا سے حساسیت اس دوا کی عظیم علامت ہے۔

سینگوکی نیمیا کیکن (Sanguinaria Can): بلغمی جھلی سرخ ہو اور ہموار ہو۔ نیز تھوک کے فقہان کے ساتھ جھلی کی سطح دودھیا اور وارنش کی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جن علامات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان علامات کے ساتھ حلقوم کے حاد اور مزمن ورم کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔

کالی میور (Kali Mur): نیا لے اور سفید رنگ کے مواد کے رسنے کے ساتھ حلقوم کی سوزش کے لئے بہترین ادویات میں سے یہ ایک دوا ہے۔ ٹانسز کی سوجن اور سوزش جس کے ساتھ ٹانسز پر خاستری رنگ کے ٹاسوری دھبے ہوتے ہیں۔

الیومینا الیومن (Alumina, Alumen): تھوک کے فقہان کے ساتھ یہ دوا خشک نزلادی حلقوم کی سوزش کی نشاندہی کرتی ہے۔

لائیکو پوڈیم (Lycopodium): خشک نزلے کے لئے بہترین ادویات میں سے ایک ہے۔ ناک رات کے وقت بند ہو جاتی ہے۔ تھوک نہیں ہوتا۔

سٹیکٹا پل (Sticta Pul): ناک کی جڑ میں دباؤ اور بھراؤ کے احساس کے ساتھ 'خشک' حاد و مزمن زکام کے لئے۔ ناک چھینکنے کی مستقل خواہش۔

ویٹھیا (Wyethia): حلق اور حنجرہ کی مزمن سوزش کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ اس میں صاف بوتلے کے لئے مریض کو مسلسل گلا صاف کرنے کی خواہش رہتی ہے۔ 30 طاقت ڈائی لیوشن کی خوراک دیجئے۔

سپیا (Sepia): ٹگتے وقت گلا خشک ہو اور گلے میں کھرچن ہو۔ بوتلے اور گاتے وقت آواز بیٹھ جائے۔ بلغم کے اخراج کے ساتھ متواتر کھانسی ہو۔

کالی بائی (Kali Bi): یہ ایک بہترین دوا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے جیسے گلے میں پھلی کی ہڈی چھس گئی ہو جسے نکالنے کے لئے مریض "ہاک ہاک" کی آواز نکالتا ہے۔

ورم حلق (مزمن) — Pharyngitis (Chronic)

مرکیورس سول (Mercurius Sol): گلا دکھ، گلے میں کچا پن ہو، گلا خشک ہو اور گلے میں جلن ہو۔ موسم کی تبدیلی پر گلے میں زخم اور سوزش ظاہر ہوتی ہے۔ مسلسل ٹگنے کی خواہش

ہوتی ہے۔ آواز کھو جاتی ہے۔ سانس متعفن ہوتا ہے۔
 مرکوریس کور (Mercurius Cor): گلا، سرخ، سوزشی، خشک، سخت ہو جس کے ساتھ
 سکڑن کا احساس ہوتا ہے۔ حلق کا کوا متورم ہوتا ہے اور نگلنے میں درد ہوتا ہے۔
 آرسینکیم آیوڈ (Arsenicum Iod): جب غیر موافق پس منظر تپ دق کی جانب رجحان کا
 باعث ہوتا ہو۔

کالی بروم (Kali Brom): جب حلقوم کی مطلقاتی کی کیفیت ہو۔
 کالی آیوڈ (Kali Iod): حلقوم میں بہت زیادہ بھجان میں۔
 ارجنٹم میت (Argentum Met): گویوں کے حلق کی سوزش کا مزمن مرض۔
 کالی بلیک (Kali Blich): حلقوم کا مزمن ناسور۔

ورم حلق (نزلاوی) — Pharyngitis (Catarrhal)

ارجنٹم نائٹ الومینا (Argentum Nit, Alumina): دی گئی ترتیب کے مطابق یہ دوائیں
 آزما کی جاسکتی ہیں۔
 کالکیریا آیوڈ (Calcaria Iod): خنازیری اور سوکھا مسان والے نوکوں میں۔

ورم حلق (اعصابی) — Pharyngitis (Nervous)

بپتیشیا (Baptisia): بہت عرصہ پہلے ایک گولی نگلنے، بڑی یا کنکری وغیرہ نگلنے کا احساس ہو۔
 مریض کو بھٹ یہ احساس رہتا ہے کہ گلے میں کوئی بڑی پھٹلی کا کاٹکا پھنسا ہوا ہے حالانکہ وہاں
 کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بپتیشیا اس احساس کو ختم کرتی ہے لیکن اگر یہ ناکام ہو جائے تو درج ذیل
 ادویات استعمال کی جائیں۔
 اگنیشیا (Ignatia): گلے میں رکاوٹ کے اعصابی احساس کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔
 سٹس کین (Citua Ceni): حلقوم، گلے اور ناک میں ٹھنڈک کا احساس۔

ورم حلق (گنٹھیاوی) — Pharyngitis (Rhaumatic)

لائیکو پوڈیم (Lycopodium): حلق کے چھوٹے عضلات کا گٹھیا، نگلنے میں دقت ہوتی ہے
 اور حلق کو ذرا سا سکیڑنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ہنسی جھلی چلی ہوتی ہے لیکن سوجن نہیں ہوتی۔
 گلے میں کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی لیکن گٹھیا کی ہستری تشخیص کی جانب ہماری رہنمائی کرتی ہے۔

دکھن (گلے کی) — (Sore)

بیلادونا (Belladonna): حلق میں اجتماع خون اور سرخی کے ساتھ حلو کیسوں میں یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔ نگلنے میں دقت ہو۔ حلق خشک ہو۔ ٹانسلز سو جے ہوئے اور بڑھے ہوئے ہوں۔ حلق کی دائیں جانب میں دکھن ہو۔ درد کے ساتھ جو دائیں کان تک پڑھ جائے۔

سیباڈیلا (Sabadilla): مسلسل نگلنے کے رجحان کے ساتھ اس بات کا احساس کہ کوئی ڈھیلا حلق میں موجود ہے یا کوئی بیرونی جسم حلق میں موجود ہے۔ گرم مشروبات پینے سے بہتری ہوتی ہے۔

مگنیشیا کارب (Magnesia Carb): حیض کے وقت گلے میں زخم ہوں۔ سوہن اور زخم بائیں سے دائیں جانب منتقل ہو جاتے ہیں یا پھر اس کے برعکس دائیں سے بائیں منتقل ہوتے ہیں اور حیض کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔

لیکسیس (Lachesis): گلے میں دکھن والی سوہن ہو۔ ٹانسلز ہوں، خناق ہو، جن میں نفوس غذا نگلنے سے بہتری ہو لیکن مائعات نگلنے میں دقت پائی جاتی ہے۔ گرم مشروبات سے بہتری ہو۔ گلے میں ڈھیلا ہونے کا احساس۔

سٹس کین (Cistus Can): ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے بہتری ہو۔ گاڑھا، زرد رنگ کا چمڑے کی طرح کا بلغم صرف مقامی ذرائع سے ہی صاف ہو۔

مرک ہائیڈ (Merc Biniod): جب مرض کا اثر بائیں جانب سے شروع ہو۔ خالی نگلنے یا خوراک نگلنے سے بہتری ہو۔

کالی آیوڈ (Kali Iod): پرانا ناسور گلے میں گھرا ہوتا ہے۔ جو تمام نرم ریشوں کو حلق کے کوا کو اور نرم تالو کو تباہ کر دیتا ہے۔

لیک لائنٹس (Lachnanthes): گردن کے انڈاؤ کے ساتھ گلے میں دکھن۔

فالی ٹولا کا (Phytolacca): جب درد کان کی طرف جائے۔ حلق کا کوا بڑا ہو جائے۔ بھلی گہری سرخ یا خاموشی رنگ کی ہوتی ہے۔ گرم مشروبات سے بہتری ہو۔ دائیں جانب گلے میں دکھن ہو جس کے ساتھ درد دائیں کان تک پھیل جاتا ہے۔ نگلنا مشکل ہوتا ہے۔

گواکیم (Guaiaacum): اعضاء کی حساسیت کے ساتھ گلے میں سوزشی دکھن ہو۔ گرمی سے زیادتی ہوتی ہے۔

اگیریکس مس (Agaricus Mus): گلے میں تشنج ہو اور بے اختیارانہ عجیب قسم کی دم گھٹنے جیسی آواز آئے۔

ایپس مل (Apis Mel): ٹائیفائیڈ میں یا ذقیصیریا کے بعد عضلات کی طاقت کھو جائے۔ حلق کی

کرسمی ہڈی کے پھجان کے باعث، حلق میں ڈنک لگنے جیسے درد ہوں۔

اوپیم (Opium): قلع میں حلق کی دکھن۔

ہیپیر سلف (Hepar Sul): گلے میں تیز درد ہو جیسا کہ گلے میں کسج (چھنی) لگی ہو۔ ٹانسلز میں پیپ ہو اور پھوڑے ہوں۔

نکس و امیکا (Nux Vom): سگریٹ نوشوں میں، شرابیوں میں اور مبلغین میں گلے کے پھجان کے لئے یہ دوا مفید ہے۔ گلے میں کچا پن اور کھرچن ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سگریٹ نوشی، شراب نوشی یا تبلیغ کرنا (یعنی دوران تبلیغ بہت زیادہ بولنے سے) ہو۔

اگنیشیا (Ignatia): یوں محسوس ہو جیسے مریض ہڈی نکل رہا ہے۔ جو مسلسل گھوم رہی ہے، زچگی میں۔

سٹرامونیم (Stramonium): عضلات کی کھچن سے یا عضلات کی تشفی سکڑن سے، تشفی کے ساتھ۔ گلے کی خشکی میں، نچلے جڑے کے غدود میں درد کے ساتھ۔ گردن توڑ بخار میں، سوزشی دکھن کے بدلے میں صرف پھنی ہوئی اور بیضی ہوئی آواز میں ہی بول سکے۔

لیکسیس (Lachesis): خناق (و فقیریا) میں، ٹانسلز کی تکلیف میں، حلق کی خشکی میں، ہر دوسرے روز گلابند ہو جائے۔ آغاز دائیں جانب سے ہوتا ہے۔

لوبیلیا انگیلیٹا (Lobelia In): کوئی چیز دل سے اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے جو خوراک سے جا کر ملتی ہے اور اس کا راستہ روک لیتی ہے۔

لائی سین (Lyssin): گلے کی سوزشی دکھن میں مانتات ناک کے راستے واپس آ جاتے ہیں۔ کالی کارب (Kali Carb): خوراک آدھے راستے میں رک جاتی ہے۔ جس کے ساتھ لے بھی ہوتی ہے۔ (خوراک کی تالی کی تھکن)

آرم ٹی (Arum T): اداکاروں، دالوں اور مقبروں یا یا آواز بلند پڑھ کر سانسے والوں میں گلے کی سوزشی دکھن۔

برینا کارب (Baryta Carb): سر ٹانسلز کے پرانے (مزمن) امراض میں۔

آئیوڈیم (Iodum): حنجرہ میں، بھراؤ یا دباؤ کے ساتھ گلے کی دکھن۔

نگھنا (Swallowing)

ڈیفٹھیرینم (Diphtherinum): مانتات ناک کے راستے واپس ہو جائیں۔ جب کہ مریض انہیں نکل رہا ہو۔

لائیکو پوڈیم (Lycopodium): جب خوراک اور مشروبات ناک میں آ جائیں۔

لیک کینیم (Lac Can): پیتے ہوئے مائعات ناک کے راستہ واپس نکل آئیں۔ نگلے میں وقت ہو۔ تقریباً نگلنا ممکن ہی نہ ہو اور درد کانوں تک جائیں۔

ناٹرک ایسڈ (Nitric Acid): نگلنا بہت مشکل ہو۔ چہرہ بگڑ جائے اور مریض اپنا سر نیچے کی جانب گرائے۔ مریض کوئی چیز نگل نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ ایک چمچ بھر پیچ (پانی وغیرہ) بھی نہیں نگلی جاسکتی کیونکہ کانوں میں شدید درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

اکونائٹ این (Aconite N): نگلنا مشکل ہو یہاں تک کہ کھاتے وقت مریض اپنی گردن کے پشت والے حصے کو اپنے ہاتھ سے دباتا ہے۔ گردن میں جلن اور درد ہوتا ہے۔

رٹا ٹکس (Rhus Tox): تھوک نگلنے میں وقت ہو۔ پیچک میں 'سرخ بخار' میں 'ذخیرہ' میں تقریباً ناممکن ہو۔ (یعنی نگلنا)

سٹرامونیم (Stramonium): نگلے کے شدید تشنج کے باعث نگلنا مشکل ہو۔

لیکسیس (Lachesis): ٹھوس چیزیں 'مائعات کی نسبت زیادہ آسانی سے نگل سکے۔ گرم مشروبات گلا گھونٹ دیں۔

بیلادونا (Belladonna): نگلے کی سوزشی دکن کے باعث مائعات یا ٹھوس غذا نگلنے میں وقت پیدا ہو جاتی ہے اور غذا ناک میں چلی جاتی ہے اور بعض اوقات ناک کے راستے باہر نکل آتی ہے۔

ہائیوسکامس (Hyoscamus): نگلے 'زبان' حلق اور غذا کی نالی کے پھوں میں اکڑن کے باعث نگلنے میں وقت پیدا ہو جاتی ہے۔ مائعات ناک کے ذریعے باہر نکل آتے ہیں یا پھر سانس کی نالی میں چلے جاتے ہیں۔

جلمی میم (Gelsemium): خوراک کی نالی کا فالج جس کے باعث نگلنے کی قوت جاتی رہے۔

کاسٹیکم (Causticum): حلق اور خوراک کی نالی کے فالج کے باعث خوراک غلط راستے پر چلی جاتی ہے مثلاً سانس کی نالی میں گھس جاتی ہے یا ناک کی پچھلی جانب کی نالی میں داخل ہو جاتی ہے۔

سکیوٹاوائروسا (Scutella Vir): خوراک کی نالی کا تشنج جو نگلنے کی طاقت میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔

ورم اوزتین (ٹانسلز کاوم) — (Tonsillitis)

اکونائٹ این (Aconite N): مرض کے آغاز میں ہی اس دوا کے متعلق سوچنا چاہئے۔ پریشانی، بے چینی اور سوزشی دکن اس دوا کی رہنما کن علامات ہیں۔

بیلادونا (Belladonna): یہ دوا نشاندہی کرتی ہے۔ اس کیفیت کی جب ٹانسلز میں ہوا لگنے کے باعث سوزش ہو۔ وہ سرخ اور خون سے بھرے ہوئے ہیں۔ چپکے والے درد ہوتا ہے جو کانوں تک پھیل جاتا ہے۔

سیلیسا (Silicea): شدید ورم لوزتین، چھین والے درد ہوں۔ جب پھوڑا پھٹ جائے اور درست نہ ہو تو اس کیفیت کی نشاندہی یہ دوا کرتی ہے۔

مرک آئیوڈ (Merc iod): ٹانسلز کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ خصوصاً جب درد بائیں جانب ہو۔

سٹریپٹوکوکین (Streptococcin): تیز بخار کے ساتھ ٹانسلز کے ورم میں اس دوا کو عمل انگیز دوا کے طور پر استعمال کیا جائے۔

فائی ٹولاکا (Phytolacca): جب درد کانوں میں گولی لگنے کی مانند ہو۔ بائیں بھلیوں اور حنجرہ میں دھبوں کی طرح پھنسیاں ہوں۔ ٹھنڈے مشروبات گوارہ ہو جائیں لیکن گرم مشروبات کو ٹکنا ناممکن ہو۔ گلے میں سوزش ہو یا ورم ہو جس کا رنگ گہرا سرخ یا تقریباً نیلا ہوتا ہے۔ آواز بیٹھ جائے اور خشک کھانسی ہو۔

ہیمپیر سلف (Hepar Sulph): جب پیپ ٹاگزیر ہو۔ گلے میں ٹاسور ہوں۔ گلے میں کھجیاں ہونے کا یا پھلی کا کاٹنا ہونے کا احساس ہو۔ گرم مشروبات سے بہتری ہو۔

اپیس مل (Apis Mel): ذہن جیسے اور جلد دار دردوں کے ساتھ گلے میں سوجن ہو۔ ٹھنڈک سے بہتری ہو۔ زبان اور حلق کا کوا سوج جائے اور پھول جائے۔ حلق کا کوا نیچے کو ٹنک جاتا ہے اور جس کے باعث دم کھٹ جاتا ہے۔ موت کے خطرے کے ساتھ۔

برٹاکارب (Baryta Carb): مزمن طور پر ٹانسلز کے بڑھ جانے کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ پس ماندہ ذہنیت کے ساتھ بچوں کی نشوونما بہت آہستہ ہوتی ہے۔ ناک سے متواتر خون بہنے کے ساتھ ناک کے پچھلے حصے کا نزلہ لاحق ہو۔ ٹھنڈ لگ جانے کے باعث ٹانسلز میں پیپ پڑ جائے۔ کھلی ہوا میں بہتری ہو۔ نیز خشک موسم میں بھی بہتری ہو۔ مزمن امراض میں 200 ڈائی لیوٹن کی خوراک استعمال کی جائے جبکہ حاد امراض میں 6 ڈائی لیوٹن کی خوراک دیں۔

لاروسیراس (Laurocerasus): گلے اور خوراک کی نالی کی تشنجی کھینچن۔ مشروب خوراک کی نالی اور معدہ کی نالی میں آواز کے ساتھ چکر کھاتا ہوا گزرتا ہے۔

اوپیم (Opium): جب پے جانے والے مائع نیچے جانے کی بجائے ناک کے راستے باہر آ جائیں۔ خوراک کی نالی کا فالج، مائعات نالی کے راستے پر چلے جاتے ہیں۔

برومائن (Bromine): سانس کی نالی کا تشنج اور کھنچاؤ۔

انگیشیا (Ignatia)۔ درد اور تکلیف جو کہ نگلے میں ہو، نگلے سے اس میں افادہ ہو یا بہتری ہو، نگلے کے عمل کے دوران۔

ہنیشیا (Baptisia)۔ صرف مائع چیز ہی نگل سکتے۔ معمولی ٹھوس چیز بھی نگلے کو بند کر دے۔
ٹیوبرکولینم (Tuberculinum)۔ یہ عمل انگیز دوا ہے اور ہر ماہ 200 ڈاک کی لیوٹن کی خوراک دینی چاہئے۔

تھوجا (Thuja)۔ یہ دوا برٹا کارب کی جگہ دینی چاہئے۔ ٹانسلز پڑھنے کے مزمین مرض میں ہر ہفتہ 200 کی خوراک دینی چاہئے۔ جس ہفتہ ٹیوبرکولینم دینی ہو۔ اس ہفتہ کے دوران ان ادویات کو ہرگز نہ دیا جائے۔

آئیوڈم (Iodum)۔ بہت زیادہ بھوک کے ساتھ وزن میں کمی واقع ہو جائے۔ بہت زیادہ پیاس کے ساتھ فوری بھوک لاحق ہو۔ معمولی محنت سے تھکات ہو جائے نیز ساتھ میں لینے بھی آتا ہے۔ ٹانسلز اور تھالی رائڈ گلیٹڈ (سپر نمائندہ) کا بڑھ جانے گرم اور مرطوب موسم میں بہتری ہو۔ کھلی ہوا اور کھانے سے بہتری ہو۔ کان اور حلق کی الحاقی نالی کے بند ہو جانے سے بہرہ پن لاحق ہو۔

مرک پروٹو آئیوڈ (Merc Proto Iod)۔ ناک کی نالی کے پچھلے حصہ کے مزمین نزلہ کے ساتھ ٹانسلز کے بہت زیادہ بڑھ جانے کا مرض۔

لائیکو پوڈیم (Lycopodium)۔ جب مرض کا اثر دائیں سے بائیں جانب جائے اور گرم مشروبات سے بہتری ہو۔ تھوک لمبی تاروں والا ہو۔ گرمے رنگ والے مشتعل، کھائی دینے والے حصوں کے لئے خاص دوا ہے۔

گن پائوڈر (Gunpowder)۔ جراثیمی ٹانسلز میں۔

رشاکس (Rhus Tox)۔ نگلے کا گنٹھیا جو ٹانسلز پر اثر انداز ہو۔ نگلے کی استقلالی سوچن، دم گھٹنے کے احساس کے ساتھ جب کہ مائع نگلے جائیں۔

انگیشیا (Ignatia)۔ خوراک کے بغیر جب مائعات نگلے جائیں تو درد خصوصاً بڑھ جائے۔

مرکیوریس (Mercurius)۔ ٹانسلز دائیں جانب سے شروع ہوں جب کہ ٹھنڈے مشروبات سے بہتری ہو۔ زبان پر گاڑھا طبع ہو۔ جس کے ساتھ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ ناک میں کھٹنے والی گندی بو ہوتی ہے۔ قبض لاحق ہو۔

مرکیوریس بن آئیوڈ (Mercurius Bniod)۔ خنثی نگلے میں زہرناک کے باعث ذہر پھیل جانے کی کیفیت ہوتی ہے۔ زہر کا اثر بائیں جانب سے دائیں جانب مقرر کرتا ہے۔

کلیکریا آئیوڈ (Calcarea Iod)۔ جب برٹا کارب اور ٹیوبرکولینم کے کورس مرض کو دفع

کرنے میں ناکام ہو جائیں تب اس دوا کے متعلق سوچنا چاہئے۔ نیز جب کہ تھائیرائیڈ والا غدہ بھی بڑھا ہوا ہو۔

برٹا میور (Baryta Mur): یہ دوا بھی اس وقت کارآمد ہوتی ہے۔ جب نکلے وقت درد ہو اور یوں محسوس ہو جیسے گلے میں ڈاٹ لگا ہو۔ (اور گلابند ہو۔)

کلکیریا فاس (Calcarea Phos): جب ٹانسلز پر پہلی لمبی سوجن ہو۔

کلکیریا کارب IM اور ٹیوبرکولینم IM (IM and Tuberculinum IM)

(Calcarea Carb. IM): ہر چند ہر روز کے بعد بدل بدل کر دوا دینا بچوں میں مزمن ٹانسلز کے مرض کو رفع کرتا ہے۔ جب کہ اس کے ساتھ چربی کی نشوونما کا رجحان ہو نیز مٹی کھانے پلستر کاغذ وغیرہ کھانے کا رجحان ہو۔ IM طاقت کی دوائیں استعمال کرنے سے دو ماہ قبل یہی ادویات 200 طاقت کی خوراکوں میں آزمائی جائیں۔ اگر یہ ادویات ناکام ہو جائیں تو انہیں برٹا کارب 200 اور تھوجا 200 سے بدل دیا جائے جو کہ ٹیوبرکولینم 200 کے ہمراہ ہر ہفتہ استعمال کی جائیں۔ البتہ ٹیوبرکولینم ہر ماہ دینی چاہئے۔ (یعنی مہینے بعد دی جائے۔ یہ مذکورہ دونوں ادویات کے ساتھ ہر ہفتہ نہ دی جائے۔)

ٹانسلز دور کرنے کے بعد کی تکالیف

(Tonsillectomy)

(Ailment after Removal of Tonsils)

سٹرپٹوکوکسین (Streptococcin): ٹانسلز دور کرنے کے بعد لاحق ہونے والے تمام امراض کے لئے جب کہ مریض چلا پڑ جاتا ہے۔ دبا پتا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں۔ بھوک نہیں رہتی لاپرواہی ہو جاتی ہے۔ لمبے عرصہ تک IM ڈائی لیوشن ہر ماہ دیجئے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): ٹانسلز دور کرنے کے بعد جو علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ ان کے لئے جیسا کہ ناک کی ٹالی کے پچھلے حصہ کا نزلہ اور بروٹکائٹس (سانس کی ٹالیوں کی تکالیف) 200 طاقت کی خوراک ہر ہفتہ دیجئے۔

سلفر (Sulphur): دل میں جلن ہو۔ منھائیوں کی طلب ہوتی ہے۔ سارے دن کے دوران بھوک نہیں لگتی البتہ پھر رات گئے بہت زیادہ بھوک ظاہر ہوتی ہے۔ موسم تبدیل ہونے پر اور طوفان آنے سے قبل علامات میں اضافہ ہوتا ہے۔ غارش ہوتی ہے۔

حلق کا کوا (Uvula)

ایپس ایم (Apis M): حلق کے کوا کے بڑھ جانے کے لئے یہ مخصوص اور چوٹی کی دوا ہے۔
 مینسی ٹیلا (Mancinella): حلق بری طرح سوج جانے کے ساتھ حلق کا کوا بڑھ جاتا ہے۔
 مرک کار (Merc Car): پھوٹی طاقت کی مرک کار دوا حلق کے کوا پر لگائیے۔ فوری اور مستقل طور پر آرام ہو جائے گا۔
 ہائوسکیمس (Hyoscyamus): گدگدی والی کھانسی کے ساتھ حلق کے کوا کا بڑھ جانا لاحق ہو، نیچے لیٹنے میں اتھری ہو۔
 ایومن (Alumen): جب گلے میں کمرچن یا پھیلنے کے ساتھ حلق کا کوا ذھیلا پڑ جائے۔

حصہ سوم — حنجرہ، نخرہ

ورم حنجرہ (Laryngitis)

(نیز دیکھئے کروپ کھانسی)

اکونائٹ این (Aconite N): جب نثریجان خشک کھانسی ہو۔ بے چینی اور پریشانی کے ساتھ بخار ہو۔ جلد خشک اور گرم ہو اور آواز ٹھنسی ہوئی ہو۔
 سپونجیا (Spongia): عموماً اکونائٹ دینے کے 6 گھنٹہ بعد دی جانی چاہئے یا پھر جیسے ہی تحض تیز ہو جائے اور بھونکنے والی کھانسی ہو۔ آواز ٹھنسی ہوئی ہو اور آواز جاتی رہے۔ جس کے ساتھ ہوا کی ٹالی کے بالائی حصہ میں درد ہو تو یہ دوا دی جائے۔
 ایلیم سیپا (Allium Capa): ٹھنسی ہوئی آواز والی، شدت والی، گھٹیاں بجنے والی اور تشنجی دوروں والی کھانسی جو حنجرہ میں مستقل گدگدی (سر سرائٹ) کے باعث ہو۔ جس کے ساتھ خام طور پر پھاڑنے والا درد ہوتا ہے۔ حنجرہ کی شدید کھانسی۔
 ایسپر سلف (Hepar Sulph): یہ چانا چاہئے کہ جب جلد مسلسل جلتی رہے حتیٰ کہ اکونائٹ دینے کے باوجود جلن باقی رہے تو یہ دوا دینی چاہئے۔ کروپ کھانسی ہو اور آواز بٹھ جائے۔ صبح کے وقت اتھری ہوتی ہے۔
 لیکسٹس (Lachesis): حلق حساس ہوتا ہے۔ گلانا مشکل ہوتا ہے۔ گرم مشروبات سے زیادتی ہوتی ہے۔ جب مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دوا دینی چاہئے۔
 کالی ہالی (Kali Bi): جب گازھا، لیس دار اور تار دار بلغم خارج ہو تو اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

کاسٹیکم (Causticum): جب آواز کے عضلات میں کمزوری واقع ہو جائے۔ سخت قسم کی کھانسی ہوتی ہے جو پیشاب کی اکسائیٹ کا باعث بنتی ہے۔

فسفورس (Phosphorus): خشک، بھائی، پیلے اور قلت دم والے حشرہ میں آواز کا بیٹھ جانا جو کہ صبح کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔

منگنیم (Manganum): خشک بیٹھی ہوئی آواز والی کھانسی میں یہ دوا استعمال کریں۔

کلورم (Chlorum): اگر 12 اور 30 کی طاقت میں دی جائے تو یہ بھی کارآمد ہوتی ہے۔

سلیسیم، نیٹرم میور (Selenium, Nat Mur): تپ دق والے حشرہ کے امراض میں۔

سمبوکس نائگرا (Sambucus Nigra): لیس دار بلغم کا حشرہ میں اجتماع۔ آواز بیٹھ جائے گا گھونٹنے والی، خالی، کمری کھانسی، اضطراب اور پیاس کے ساتھ سانس سے سوں سوں کی آواز آتی ہے۔

کاربووٹیج (Carbo Vegi): تپ دق والی یا علاوہ ازیں جب نزلہ، زکام، ناک سے شروع ہو اور آخر کار نیچے چھاتی اور حشرہ میں جم کر بیٹھ جائے۔

سبل سیرولیٹا (Sabal Serrulata): حشرہ کی دق۔

ریومیکس (Rumex): پریجان، مسلسل سرسراہٹ۔ ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے اتھری ہو۔

حشرہ کے تشنجی جھٹکے

(Laryngo-Spasm)

برومیم (Bromium): سینے کی ہڈیوں کے نیچے سرسراہٹ اور جلن کے ساتھ تشنجی کھنچاؤ۔ سانس اندر لے جانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، سانس باہر نکالنے کی نسبت، کیونکہ سانس کھینچتے ہوئے کھانسی آتی ہے۔ غدد بڑھ جاتے ہیں۔ خصوصاً کان کے قریب کے غدد اور غدد ورقہ (تھائی رائیڈ)۔

کیوپریم میٹ (Cuprum Met): سانس کی نالی کے اوپر کے سرے والا تشنج جس کے ساتھ چہرہ نیلا ہو جاتا ہے۔ انگوٹھے کھینچ جاتے ہیں اور ہتھیلیوں میں گھس جاتے ہیں جبکہ انگلیاں ان کے اوپر بھینچ جاتی ہیں۔

کلورم (Chlorum): سانس کی نالی کے اوپر والے سرے کا تشنج۔ بھجان کے باعث زخروں کی ہڈی کا تشنج نیز ہوا کی نالی کا تشنج، آواز کے پٹوں کے تشنج کے باعث ضیق النفسی ہوتی ہے۔ چہرہ نیلا پڑ جانے کے ساتھ آنکھیں وحشیانہ طور پر کھل جائیں۔ گھورنے والی کیفیت ہو اور

آنکھیں باہر کو نکل آئیں۔ برومیم کے برعکس کلورم کا مریض سانس آسانی سے اندر کو کھینچ سکتا ہے لیکن سانس خارج کرنا مشکل ہوتا ہے۔
کلکیریا کارب (Calcarea Carb): حنجرہ کا تشنج جبکہ یہ تشنج اعصابی تکلیف کے باعث نہ ہو۔ یہ ایک بنیادی دوا ہے۔



مسوڑھوں، منہ، دانتوں اور زبان کے امراض

(Diseases of Gums, Mouth, Teeth & Tongue)

(حصہ اول --- مسوڑھے)

پھوڑے اور سوزش

(Abscess and Inflammation)

مرکبوریس (Mercurius): پیپ دار مسوڑھوں کے آبلے، مسوڑھے سوچے ہوتے ہیں۔ اسٹخنی اور ان سے خون بہتا ہے۔ سانس بدبودار ہوتا ہے۔ بستر کی گرمی سے اور رات کے وقت ابتری ہوتی ہے۔

ہیمپیر سلف (Hepar Sulph): جب پیپ مسوڑھوں سے بہنا شروع ہو جائے تو یہ دوا دینی چاہئے۔ یہ دوا پھوڑے کو بخانے کا اور ختم کرنے کا دہرا عمل کرتی ہے۔ 3x طاقت کی خوراک دیجئے۔

سلیشیا (Silicea): جب ہیمپیر سلف ناکام ہو جائے تو یہ دوا آزمانی چاہئے۔

ہیکلا لایا (Hecula Lava): مسوڑھوں کے پھوڑوں کے لئے یہ عمدہ دوا ہے۔ خصوصاً بوسیدہ دانتوں کے پھوڑوں کے لئے۔ 3 ایکس طاقت کی دوا دیجئے۔

ہیلاڈونا (Belladonna): سوزش کے لئے جبکہ، مسوڑھوں میں تپکن والا درد ہو۔

مرک آئیڈ (Merc lid): یہ دوا ہیلاڈونا کی جگہ استعمال ہو سکتی ہے۔ بہت زیادہ دردوں والے کیسوں میں۔

کلکیریا فلور (Calcarea Fluor): یہ دوا مفید ثابت ہوتی ہے۔ جب کیلشیم کی قلت ہو اور دانتوں کا انجیل ضائع ہو جائے۔

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): غلط دانت لگانے کے بعد مسوڑھوں میں درد ہو اور مسوڑھے سوج جائیں۔

سیلان خون — (Bleeding)

(خیز دیکھئے پائو ریا)

مرکوریس سول (Mercurius Sol): مسوڑھوں میں ناسور ہو اور مسوڑھوں سے خون نکلے۔ مسوڑھوں میں خارش ہوتی ہے "جلن ہوتی ہے اور مسوڑھے سرخ ہوتے ہیں۔

فاسفورس (Phasphorus): یہ دوا مسوڑھوں سے خون بہنے کے لئے عمدہ دوا ہے۔ علاج دوا سے شروع ہونا چاہئے۔ یہاں تک کہ دیگر ادویات کی علامت واضح ہو جائیں۔

کلکیریا فلور (calcareia Fluor): یہ دوا بھی مفید ثابت ہوئی ہے جبکہ مسوڑھوں سے خون بہنے کے ساتھ دانتوں کا گلنا سڑنا بھی ہو۔

کاربووٹیج (Cabo Veg): جب دانت ڈھیلے پڑ جائیں اور مسوڑھوں سے الگ ہو جائیں۔ دانت تیزی سے نکلنے لگتے ہیں یا گرنے لگتے ہیں۔ دانت صاف کرتے وقت یا دانت کو مسمومی سے بچانے سے خون بہہ لگتا ہے۔ گرمی اور سردی یا تکلیف غذا سے درد ہوتا ہے۔

لیکسیس (Lachasis): گل سے نکلنے والے پانی کی بے انتہا پیاس کے ساتھ مسوڑھوں سے خون کا بہنا۔ گتھیا میں جکڑا ہونے کا رجحان دانتوں کے ارد گرد سے خون رستا ہے۔

انٹیم کروڈ (Antim Crudi): مسوڑھے دانتوں سے الگ ہو جاتے ہیں اور ان سے بڑی آسانی سے خون بہتا ہے۔

سٹیفی سکیگیا (Staphisagria): مسوڑھے اسٹیفی ہوتے ہیں۔ جن سے خوراک نکلنے سے یا اچلی نکلنے سے خون بڑی آسانی سے بہنے لگتا ہے۔

ٹیریہ ستم (Terebinth): البیومن کے اخراج کے ساتھ مسوڑھوں سے خون بہتا ہے۔

کاسٹیکم (Causticum): دانتوں کے ناسور میں مسوڑھوں سے آسانی سے خون بہتا ہے۔

سڈرون (Cedron): دوران حیض مسوڑھوں سے خون نکلے۔

کلکیریا کارب (Calcareia Carb): حیض دب جانے میں مسوڑھوں سے سیلان خون ہو۔

سلفر (Sulphur): تھائیرائیڈ کے مریض میں مسوڑھوں سے سیلان خون ہوتا ہے۔

الیومن (Alumen): دانتوں سے پیچھے بٹے ہوئے مسوڑھوں سے خون نکلے۔ دانتوں کا گلنا یا گرنا۔

مند کی دکھن و زخم — (Canker-Sores)

آرس البم (Ars Alb) : مند اور زبان میں جلن و گرمی اور بہت زیادہ خشکی کے ساتھ۔
 ہائیڈروکوتائل (Hydrocotyle) : پوٹاشیم کلورائیٹ کے غلط استعمال کے بعد۔
 لیکسیس (Lachesis) : بلیٹی بھلی سے ملحقہ جگہ کمرے اور غوانی رنگ کے ساتھ۔
 مرک سول (Merc Sol) : جب مند سے تھوک آئے اور مند میں دکھن ہو۔
 نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid) : تیز چبھنے والے درد، بہت زیادہ مصلیات کھانے کے بعد
 خصوصاً اس دوا کی شکایت کی جاتی ہے۔

گر جانا (مسوڑھوں کا)

(Falling Away)

مرک سول (Merc Sol) : مسوڑھے گر جاتے ہیں یا لٹک جاتے ہیں۔

پائوریہ (Pyorrhoea)

(تیز دیکھے "سیلان خون" اور "مسوڑھے")

کیلنڈولا (Calendula) : پائوریہ کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ 30 طاقت کی خوراک کچھ
 عرصہ کے لئے دینی چاہئے۔

کلکیریا رینالس (Calcareo Renalis) : یہ ایک عمدہ دوا کہلاتی ہے۔

مرکریس (Mercurius) : سفید اسٹمپی مسوڑھے ہوتے ہیں۔ مند سے گندی بو آتی ہے۔ 6
 طاقت کی دوا استعمال کیجئے۔

سیلیشیا (Silicea) : پروردورم، مسوڑھوں میں چیپ پیدا ہوتی ہے۔ مسوڑھوں پر آبلے ہوتے
 ہیں۔

گن پاؤڈر (Gunpowder) : جب مسوڑھوں میں چیپ ہوتی ہے اور یہ چیپ بہتی ہے۔

کالی کارب (Kali Carb) : مند سے اور ذیلیہ دانتوں سے گندی بو کے ساتھ پائوریہ۔

پلانٹے گویبجر (Plantago Major) : دانت چھوٹنے سے حساس ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔
 چاقو مارنے جیسے اور سوراخ کرنے جیسے درد ہوتے ہیں۔

کریوزوٹم (Kerosotum) : گندی بو کے ساتھ بیمار دانت، کھینچنے والے اور چکن والے
 درد، مسوڑھوں میں ناسور ہوتے ہیں اور جلد جلد خون بہتا ہے۔

ہنیشیا (Baptisia) : مسوڑھے گہرے سرخ اور بدبودار ہوتے ہیں۔ مسوڑھوں سے خون رستا ہے۔ تھوک متعفن ہوتا ہے۔

اعصابی درد (مسوڑھوں کا) — (Neuralgia)

(نیز دیکھئے "دماغ" کے ذیل میں "اعصابی درد")
شیفی سگریا (Staphisagria) : یہ بہترین دوا ہے اور اسے سب سے پہلے آزمانا چاہئے۔
کوکلی نیلا (Coccinella) : اوپر دی گئی دوا کے بعد اسے آزمانا چاہئے۔

رسولی — (Tumor)

مگنیشیا کارب (Magnesia Carb) : داڑھ کی ہڈی کی رسولی۔
نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid) : اخروٹ جتنی جسامت کی رسولی مسوڑھوں پر ہو۔
سیلیشیا (Silicea) : جب رسولی دو دانتوں کے درمیان ہو۔

ناسوری کیفیت (پھوڑے وغیرہ) — (Ulceration)

مرک کار (Merc Cor) : جب ناسور کے ساتھ بہت زیادہ پانی جیسا تھوک ہو۔
کریو زوٹم (Kreosotum) : جب مسوڑھے نپلاہٹ ماکل سرخ 'نرم' اسفنجی ہوں۔ جن سے خون نکلے اور سوزش ہو۔
نایٹرم میور' نائٹرک ایسڈ (Natrum Mur, Nitric Acid) : یہ دوائیں بھی مسوڑھوں کے ناسور کے لئے مفید ہیں۔

حصہ دوم — جبرڑا

کڑکڑاہٹ (جبرڑے کی) (Cracking)

رٹاکس (Rhus Tox) : جبرڑے میں کڑکڑاہٹ ہو۔ کنٹھیا کے ساتھ یا کنٹھیا کے بغیر۔
نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid) : اگر رٹاکس ناکام ہو جائے تو یہ دوا آزمائی جاسکتی ہے۔
گرے ٹینم (Granatum) : جبرڑے میں پردرد کڑکڑاہٹ ہو۔
آرم تراکی فلم (Arum Triph) : نکلنے وقت جبرڑے کے جھڑ میں درد ہوتا ہے جیسا کہ سوچ آئی ہو۔

بوسیدگی (گلنا، سڑنا) — (Decay)

(دیکھئے ”جڑے کا گلنا سڑنا“)

جڑے کی ریشہ دار رسولی (Epulis)

تھوجا (Thuja): یہ دوا انکولس (جڑے کی ریشوں والی رسولی) کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔
 کلکیر یا کارب (Calcarea Carb): جب تھوجا ناکام ہو جائے تو اس دوا کو آزمانا چاہئے۔
 دوا کی طاقت 200 یا CM استعمال کرنی چاہئے۔
 پلمبرم ایسی قلم، ایک (Plumbum Acet, Lac Can): اگر اوپر دی گئی ادویات ناکام ہو جائیں تو انہیں بھی آزما سکتے ہیں۔
 برائیو نیا (Bryonia): نچلے جڑے کے بائیں زاویے کی رسولی یا سوجن۔
 میگنیشیوس پولس آرک (Magnesia Polus Acid): جڑوں میں سوجن اور درد
 خصوصاً بائیں جڑے میں۔ ٹھنڈک سے حساسیت کی نشاندہی ہوتی ہے۔

جڑے کا بند ہو جانا — (Lock Jaw)

اکٹیا سیائی کانا (Actea Spicata): جب بالائی جڑے میں درد ہو۔
 مگنیشیا فاس (Magnesia Phos): جڑے بند ہو جائیں۔ یہ تکلیف ٹھنڈے پانی میں کھڑے
 ہونے کے باعث ہوتی ہے۔
 انگو سچرا (Angustura): جڑے بند ہو جائیں، ہونٹ پیچھے کو مگر جاتے ہیں۔ جس سے دانت
 نظر آتے ہیں۔

جڑے کا گلنا سڑنا — (Necrosis)

(Decay of the Jaw)

انگو سچرا ویرا (Angustura Vera): یہ دوا 200 طاقت کی دہنی چاہئے۔
 فاسفورس (Phosphorus): بائیں جانب کے زیریں جڑے کا گلنا سڑنا۔
 سیلیشیا (Silicea): یہ دوا مختلف طاقتوں میں آزمائی جاسکتی ہے۔ بشرطیکہ اوپر والی ادویات ناکام
 ہو جائیں۔
 اگیئر ٹیکس ایم (Agaricus M): بالائی جڑے کی ہڈی اور دانتوں میں درد ہو۔

حصہ سوم۔۔۔ ہونٹ

سیلان خون — (Bleeding)

آرم ٹرائی قلم (Arum Triph): ٹائیفائیڈ بخار وغیرہ میں ہونٹوں سے خون نکلے۔ مریض ہونٹ چباتا ہے۔ یہاں تک کہ خون جاری ہو جاتا ہے۔
 برومیم (Bromium): کالی کھانسی میں ہونٹوں سے خون نکلے۔
 لیکسیس (Lachesis): بخاروں میں نیو خناق میں ہونٹوں سے خون بہتا ہے۔
 نیٹرم میور (Natrum Mur): ہونٹوں سے خون نکلے۔

آبلے (چھالے ہونٹوں کے) — (Blisters)

(دیکھئے "بخار" کے ذیل میں)

ہونٹوں کا ناسور — (Cancer of Lips)

(دیکھئے "ناسور" "متفرقات" کے ذیل میں)

پھٹنا (ہونٹوں کا) (Cracked)

اورم سلفیوریٹم (Aurum Sulphuratum): ہونٹوں میں دراڑیں پڑ جائیں یعنی ہونٹ پھٹ جائیں۔
 آرم ٹرائی قلم (Arum Triph): ٹھنڈی ہوا سے ہونٹ پھٹ جائیں۔
 براہیونیا (Bryonia): ٹائیفائیڈ بخار کے دوران اسال میں۔
 نیٹرم میور (Natrum Mur): لیبرا بخار کے بعد ہونٹ پھٹ جائیں۔
 سپیا (Sepia): داد میں ہونٹ پھٹ جائیں۔
 انٹیم گروڈ، گونڈورا، انگو، زنک میٹ (Antim Crud, Gondurango, Zincum Met): منہ کے کنارے پر پے درد دراڑیں۔

کھینچنا (ہونٹوں کا) — (Drawn Back)

انگو بھرا (Angustia): ہونٹ پیچھے کو خم کھا کر گر جائیں یعنی کھینچ جائیں جس سے دانت نظر آئیں۔

سوجن — (Swelling)

کیڈمیم سلف (Cadmium Sulph): ہونٹوں کی سوجن۔

رسولی — (Tumor)

کونڈوراٹگو، کونیم، کاربودیج، شیخی سیریا

Veg.

Staphisagria)

یہ دوائیں مریض کی حالت کے مطابق آزمائی جاسکتی ہیں۔ کونیم سخت رسولیوں کی نشاندہی کرتی ہے اور ایسے کیسوں میں سب سے پہلے یہی دوا استعمال ہوتی ہے۔ نرم رسولیوں میں سب سے پہلے شیخی سیریا آزمائی جاسکتی ہے۔ فاسفورس، سلفر، سیلیشیا (Phosphorus, Sulphur, Silicea): سخت قسم کی رسولیوں کے علاج میں اس دوا کی مانگ کی جاسکتی ہے نیز علاج کے شروع میں بھی اسے دیا جاسکتا ہے۔ خصوصاً جب عمومی حالت کی نشاندہی ہو یا گزشتہ دی جانے والی ایک دوا یا ایک سے زائد ادویات کے بعد بھی اس دوا کو دیا جاسکتا ہے جبکہ پہلی دوائیں مرض کو دور کرنے میں ناکام ہو چکی ہوں۔

پھڑکن (ہونٹوں کی) — (Twitching)

اولیم انیل (Oleum Ani): ہونٹوں کی پھڑکن۔

حصہ چہارم — (منہ)

خشکی (منہ کی) (Dryness)

آر سینکیم البم (Ars Alb): پھوٹے پھوٹے وقفوں سے تھوڑے پانی کی پیاس کے ساتھ منہ کا خشک ہونا۔

برائی اونیا (Bronia): لمبے وقفوں سے زیادہ مقدار میں پانی کی پیاس کے ساتھ منہ کا خشک ہونا۔

نکس موسکاٹا (Nux Mosch): منہ کی بہت زیادہ خشکی، زبان اتنی خشک ہوتی ہے کہ منہ کی چست کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ تھوک روئی کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ طلق خشک ہوتا ہے اور سخت ہوتا ہے۔ پیاس نہیں ہوتی۔

لکے سس (Lachesis): منہ کی خشکی، مریض اپنی زبان کو باہر نکالنے کے قابل نہ ہو۔
 الیومن (Alumen): منہ، طلق اور زبان کی خشکی جس کے ساتھ برف والے ٹھنڈے پانی کی
 پیاس ہو۔ منہ میں جلن ہوتی ہے نیز منہ میں ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔ منہ گندا اور اسلجی ہوتا
 ہے۔

نکس دامیکا (Nux Vom): کھانے کے بعد یا صبح کے وقت سانس بدبودار ہوتا ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): شام کے وقت یا رات کو سانس بدبودار ہوتا ہے۔

اورم میٹ (Aurum M): لڑکیوں میں بلوغت کے وقت سانس کا بدبودار ہونا

آرم ٹراپفل (Arum-Trip): منہ سے متعفن بو آتی ہے۔

کپسکیم (Capsicum): گرم چبھتی ہوئی اور بدبودار ہوا جھپکڑوں سے آتی ہے اور گلے کا
 ذائقہ گندا ہوتا ہے جب کہ مریض کھانسی رہا ہوتا ہے۔

ہائیوسکیمس (Hyoscamus): منہ کی خشکی، زبان جلے ہوئے چڑے کی طرح خشک ہوتی
 ہے اور زبان کا ذائقہ چڑے کی طرح کا ہوتا ہے۔ منہ میں اتنی خشکی ہوتی ہے کہ کھڑکھڑاہٹ
 ہوتی ہے۔

برٹامیور (Baryta Mur): منہ کی خشکی، زبان پر دراڑیں ہوں۔ مسوڑھوں سے خون بہتا
 ہے۔ لیس دار بلغم منہ کو بھر دیتا ہے۔ منہ سے گندی بو آتی ہے۔ جلد میں کانٹے کی سی کیفیت
 ہوتی ہے اور جلن ہوتی ہے۔

مرکوری ایلیس پیرنس (Mercurialis Perennis): منہ اور گلے کی خشکی، یہاں تک کہ
 کھانڈ بھی منہ میں گھلنے سے انکار کر دے۔ کھانے سے خشکی میں اضافہ ہو۔ سانس گرم ہوتا ہے
 اور ہونٹوں کو خشک کر دیتا ہے۔

اپیس (Apis): یہ دوا بھی منہ کی خشکی میں مفید ہوتی ہے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): ذیابیطس والے مریضوں میں منہ کا خشک ہو جانا۔

پورٹیم فاس، فاسفورس (Uranium Nit, Phosphorus): یہ دوا میں بھی ذیابیطس والے
 مریضوں میں منہ کی خشکی کے لئے مفید ہوتی ہیں۔

سلی سیلک ایسڈ (Salicylic Acid): زبان کی جلن کے ساتھ منہ کی خشکی، جلن، دکھن اور
 متعفن محسوس کے ساتھ منہ کے بد اثرات اور سوزشی دکھن۔

وریرٹرم البم (Veratrum Alb): پسینہ آنے کے دوران بڑھی ہوئی ہے انتہا پیاس۔

کھلنا (منہ کا) — (Open)

لیکیس، کاسٹیکم (Lachesis, Causticum): منہ کھولنا دشوار ہو۔
 اوجیم (Opium): سونے کے دوران منہ کھلا رہے۔ منہ بند نہ کر سکے۔
 بوفو (Bufo): مرگی کے حملہ سے قبل منہ کھلا ہو۔
 سلفر، لائیگو پوڈیم (Sulphur, Lycopodium): منہ بند نہ کر سکے۔

تندوا (زبان کے نیچے والی تھیلی دار رسولی) (Ranula)

(A Cystic Tumor Beneath the tongue)

تھوجا (Thuja): زبان پر یا منہ میں نیلا پٹ مائل یا گانٹھ دار وریدیں ہوں۔
 امبرا گریسیا (Ambra G): متعفن سانس کے ساتھ۔
 ہائیڈروفوبینم (Hydrophobinum): جب اعادہ کا خدشہ ہو یا جب تندوا کا اعادہ وقفہ وقفہ سے ہو۔
 کلکیریا کارب (Calcarea Carb): اگر اوپر والے تمام علاج ناکام ہو جائیں تو یہ دوا آزمائی جاسکتی ہے۔
 مرک سول (Merc Sol): تندوا سخت اور لمبا ہو۔ یہ دوا تھوجا کے متبادل کے طور پر دی جاسکتی ہے۔

تھوک — (Salivation)

مرک سول (Merc Sol): مسوڑھوں اور منہ میں دکھن کے ساتھ عام تھوک، حمل کے دوران بھی سونے کے دوران نکیہ کو تھوک سے گیلا کر دے۔
 نیٹرم میور (Natrium Mur): زبان پر ناسور کے ساتھ خندی قسم کا تھوک آنے کا مرض۔
 ہونٹوں کے زاویوں اور منہ کی اندرونی دیواروں میں زخم (ناسورا) ہوں۔ جن کے ساتھ مسلسل اور باقراط شفاف قسم کا تھوک آئے۔
 ایسٹک ایسڈ (Acetic Acid): جلن دار پانی کی منہ بھر الٹی اور دن رات تھوک کا باقراط اخراج، کھٹی ذکاریں آئیں۔
 آئیوڈیم، نائٹرک ایسڈ (Iodum, Nitric Acid): پارے والے تھوک میں اگر پہلی دوا ناکام ہو جائے تو دوسری دوا دینی چاہئے۔
 آئرس وی (Iris V): جب تھوک آنے کے ساتھ اعصابی درد سر ہو۔ تار دار تھوک۔

ایلیٹیم سیڈوا (All Sat): کھانے کے بعد بہت زیادہ مقدار میں تھوک آئے۔ بات چیت کے دوران تھوک کے قطرے گرتے ہیں۔

جیہوراندی (Jaborandi): جب تھوک آنے کی وجہ اعصابیت ہو۔ حمل کے دوران۔
مرکیوریس، نائٹریک ایسڈ (Mercurius, Nitric Acid): بدبودار اور متعفن تھوک آتا ہے۔

پیکریک ایسڈ (Picric Acid): سفید بھاگ دار تھوک جس کے بار فرش تک لٹک جاتے ہیں۔

کالی بانیکرام (Kali Bich): رسی دار تھوک۔

سائیکلے من (Cyclamen): نمکین تھوک۔

ایگنیشیا (Ignatia): کھٹا تھوک۔

ورینٹرم البم (Veratrum Alb): بے ذائقہ تھوک، 'عظیم کمزوری'، جسم ٹھنڈا ہو، 'غشی' کا رجحان۔

سینچریس کون (Cenchrus Con): سونے کے دوران بہت زیادہ مقدار میں تھوک منہ سے نکلے رہتا رہتا ہے۔

انی فلیگس (Epiphegus): لیس دار تھوک، درد سر میں تقریباً مستقل کھولنے کی خواہش ہو۔

آرسنک البم (Ars Alb): نحیف و زار، کمزور، لاغر اور زرد رواسخاص میں 'متلی' دل کی جلن اور خوراک کی قے کے ساتھ تھوک آئے۔ حمل کے دوران۔

سلفر (Sulphur): خون کی آمیزش کے ساتھ تھوک آتا ہے۔ جس کے ساتھ ہوا سیرکار رجحان ہو۔

پلساتیلہ (Pulsatilla): جب متلی اور غذا سے نفرت کے ساتھ تھوک آئے۔ حمل کے دوران۔

کیمومیلہ (Chamomilla): متحاس والا تھوک آئے۔

کریوسوٹم (Kreosotum): دوران حمل تھوک آئے۔

کالچیکم (Colchicum): سوزش دار منہ میں تھوک بھر جائے۔ جس کے باعث متلی ہو۔

برٹامیور (Baryta Mur): منہ سے گندی بو آنے کے ساتھ تھوک آئے۔

برٹا کارب (Baryta Carb): سونے کے دوران منہ سے تھوک بہتا رہتا ہے۔

دکھن (منہ کی) — (Stomatitis)

(Sore)

ہیلاڈونا (Belladonna): منہ خشک و سرخ ہو نیز منہ میں جلن ہو۔ پیاس نہ ہو۔

کپسیکیم (Capsicum): منہ کی سادہ سوزش، جلن کے ساتھ۔

نٹرم میور (Natrur Mur): منہ کی سادہ سوزش، زبان پر نقشے جیسے نشانات اور جزیروں کی طرح کی سرخ دھبوں کے ساتھ۔ منہ اور زبان خشک، گرم اور جلتے ہوئے محسوس ہوں۔

ہیمپٹر سلف (Hepar Sulph): منہ کے کناروں پر بھوسی وار دھبیاں، ٹھوڑی پر پھنسیاں ہوں۔ نرم تالو کا تاسور جو حلق کے کوسے کو کھالیتا ہے اور نرم تالو کو تباہ کر دیتا ہے اور بعد ازاں منہ کی چھت کی ہڈیوں والے حصے کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اشتادہ جے کی گندی بو منہ سے آتی ہے جیسا کہ سڑے ہوئے پیپر کی ہوتی ہے۔ پارے کے غلط استعمال کے باعث۔

مرک کار (Merc Cor): منہ کی تاسوری سوزش۔

میورٹیک ایسڈ (Mur Acid): منہ میں چھالے ہوں، زبان میں کھلی یا خارش ہو، تاسوروں کا اعادہ ہو۔

آرم ٹرائی قلم (Arum Trip): منہ میں بہت زیادہ سوزشی دکھن ہو۔ زبان سرخ ہو۔ دانوں کا ابھار، ہونٹ اور منہ کے کنارے پھٹے ہوئے ہوں، ناک میں پھڑکن ہو۔

ریوم (Rheum): سونے کے بعد بدبودار بلغم سے منہ بھر جائے۔

بوریکس (Borax): باغی جھلی جھریوں وار دکھائی دیتی ہے جیسا کہ جل گئی ہو۔ منہ کی خشکی، پیاس اور تھکے کے ساتھ منہ کی سوزش، چھالوں کو چھونے سے ان کے اندر سے آسانی کے ساتھ خون بہتا ہے۔

ہائیڈروکوتائل (Hydrocotyle): زبان ذیلی ہوتی ہے۔ دانتوں کے نشانات اس پر نظر آتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جل گئی ہو۔ خصوصاً زبان کا سامنے والا حصہ۔

سینگوئی نیریا (Sanguinaria): منہ کی چھت اور تالو جلتے ہوئے یا گرم پانی سے دھوئے ہوئے محسوس ہوں۔

ہائیڈراسٹ (Hydrastis): چھالوں والے دھتے ہوئے منہ کے لئے خاص طور پر فائدہ مند دوا ہے۔ زبان پر بھاری قسم کا طبع ہوتا ہے۔ منہ میں نیکی تاسور ہوتے ہیں۔ منہ سے چیچا بلغم خارج ہوتا ہے۔

بپٹسٹیا (Baptisia): گرمے سرخ یا ارغوانی رنگ کا نمدودوں کا تاسور گندہ اور بدبودار تھوگ

زیادہ مقدار میں بہتا ہے۔ زبان دکھتی ہے۔ اس میں شکاف ہوتے ہیں اور زخم ہوتے ہیں۔
(سل والے پارے کی اصل والے)

آرسینکیم البم (Arsenic Alb): نیلے اور نیلگوں چھالوں کی نشاندہی اس دوا سے ہوتی ہے۔ جو کہ منہ میں اور زبان پر ہوتے ہیں۔ بخار کے ساتھ گالوں اور مسوڑھوں کی ناسوری مسوڑھ ' ناسوری حصہ کے درمیان میں کالا دھبہ ہوتا ہے۔ شدید بے چینی اور نقاہت ہوتی ہے۔

نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): پارے کے غلط استعمال کے باعث یا آتشک کے باعث ناسور۔ تھوک تیزابی اور بدبودار ہوتا ہے۔ جو منہ کے کناروں کو چھیل دیتا ہے۔ دانت پیلے اور ڈھیلے اور گرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دوا ناسور اور گنگرین والے زخموں کو درست کرتی ہے۔ منہ سے گندی بو آتی ہے۔

ایتھوزا (Aethusa): منہ اور گلے کی سادہ چھالوں والی حالت جس کے ساتھ نکلنے میں وقت ہوتی ہے۔ معدے کی خرابی کے باعث بچہ دہی کی طرح جما ہوا دودھ منہ سے نکالتا ہے۔ اس دوا کی علامات میں تے اور نقاہت شامل ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): مسوڑھوں سے خون بننے کے ساتھ منہ کا ناسور ' مسوڑھوں پر نچہ یا جلی لکیریں ہوتی ہیں۔ عام نقاہت۔

میریورس سول (Mercurius Soli): منہ کے زخموں میں یہ دوا بہت مفید ہے جبکہ مریض کی ہسٹری میں پارے کا غلط استعمال نہ ہو۔ بہت زیادہ تھوک کے ساتھ مسوڑھوں کے ناسوری زخم۔ سانس متعفن ہوتی ہے اور رات کے وقت زیادتی ہو جاتی ہے۔
سیپیا (Sepia): زبان میں درد ہوتا ہے۔ جیسا کہ جل گئی ہو۔

الیومن (Alumen): منہ کا ناسور اور منہ کی خشکی ' ٹھنڈے پانی کی پیاس۔

سفی لینم (Syphilinum): رات کے وقت سوتے ہوئے بہت زیادہ مقدار میں تھوک بننے کے ساتھ منہ کا ناسور اور مریورس کی طرح اس میں ٹکیہ گیلا ہو جاتا ہے۔

نیٹرم سلف (Natrium Sulph): جب منہ میں چھوٹے چھوٹے چھالے ہوں یا استدار سے کی حساسیت والے ناسوری زخم ' جن میں منہ میں ٹھنڈا پانی رکھنے سے آرام ملتا ہے۔

ہیلی بورس ناگمر (Helieborus Niger): بہت زیادہ تھوک کے ساتھ منہ کے چھالوں کے لئے مفید دوا ہے نیز اس میں بیلاہٹ مائل سرخ کناروں والے زخم ہوتے ہیں۔ زبان سن ہو جاتی ہے اور سوخ جاتی ہے۔ حلق میں کڑوا ذائقہ ہوتا ہے۔

سلفیورک ایسڈ (Sulphuric Acid): منہ میں چھالے ' زبان بہت زیادہ سوی ہوئی ہوتی ہے۔ تھوک بہت زیادہ بہتا ہے۔ سانس متعفن ہوتی ہے۔ منہ سے خون بہتا ہے۔

لکسیس (Lachesis): جلن اور کچے پن کے ساتھ منہ میں چھالے ہوتے ہیں اور ننگے داغ ہوتے ہیں۔ مسوڑھے سوہنے ہوئے استغنی اور سیلان خون والے ہوتے ہیں۔ زبان سوہی ہوئی ہوتی ہے۔ جلتی ہے، کپکپاتی ہے۔ سرخ اور خشک ہوتی ہے اور زبان کی نوک پر شکاف ہوتے ہیں۔

بولنے میں دقت — (Speech- Difficult)

سڈرون (Cedron): دوران حیض بولنے میں دقت ہو۔
جلسی میم (Gelsemium): زبان کے بھاری پن کے باعث بولنے میں دقت ہو۔
امونیا کارب (Ammonia Carb): بولنے میں دقت درد کے ساتھ ہو۔
کیوپرم میٹ (Cuprum Met): جب گلے میں تشنج کے باعث بولنے میں دقت ہو۔
مرکوریس (Mercurius): منہ اور زبان کی کپکپاہٹ کے باعث بولنے میں دقت ہوتی ہے۔ مریض ہکلا کر بولتا ہے۔
اگیریکس ایم، روٹا، سٹرامونیم (Argersicus M, Ruta, Stram): جب زبان کے تشنج کے باعث بولنے میں دقت ہو۔
ڈلکامارا (Dulcamara): جب زبان کی سوجن کے باعث بولنے میں دقت ہو۔
لکسیس (Lachesis): ٹائیفائیڈ بخار میں۔
ارجنتم میٹ (Argentum Met): جب لیس دار تھوک کے باعث بولنے میں دقت ہو۔
سٹینم (Stannum): جب چھاتی یا گلے کی کمزوری کے باعث بولنے میں دقت ہو۔
کالی بروم (Kali Brom): بولنے میں چھکپاہٹ ہوتی ہے۔
ہائپرکیم (Hypericum): بولنے میں جھٹکے لگتے ہوں۔
کیمومیل (Chamomilla): بولنے میں دقت کے ساتھ الفاظ چھوڑ جائے۔
نکس دامیکا (Nux Vom): الفاظ اور الفاظ کے حصص چھوڑ جائے۔
لائکوپوڈیم (Lycopodium): مریض غلط الفاظ اور الفاظ کے غلط حصص استعمال کرتا ہے۔
گلونائن (Glonoine): بولنے میں دقت ہو اور گفتگو غیر واضح ہو۔ مشکل ہی سے بول سکے۔
بیوفو (Bufo): زبان میں لڑکھڑاہٹ اور ہکلاہٹ، جب اس کی غیر مربوط گفتگو سمجھ میں نہ آئے تو مریض غصے میں آ جاتا ہے۔
کوکولس (Coeculus): غیر واضح گفتگو۔
امونیا میور (Ammonia Mur): درست گفتگو نہیں کر سکتا۔

تھوچا (Thuja): الفاظ کے چھوٹے چھوٹے حصے استعمال کرے۔
اکونائٹ این (Aconite N): گفتگو میں کیکپاہٹ اور ہکلاہٹ ہوتی ہے۔

قوت گویائی جاتی رہے — (Loss of Speech)

(Speech Wanting)

لیکیس (Lachesis): زبان منہ سے باہر نکالنے میں دقت کے ساتھ مکمل طور پر قوت گویائی کا جاتے رہتا۔

ہائیوسکیمس (Hyoscyamus): خوف کے باعث قوت گویائی جاتی رہے۔ سن ہو جانے اور بڑھکڑاہٹ کے ساتھ زبان کی حرکت کرنے کی قوت میں کمی آ جاتی ہے۔

سٹرانسیم کارب (Strontium Carb): نایفائیڈ بخار کے باعث۔
کاسٹیکم (Causticum): جب عضو کے فالج کے باعث قوت گویائی جاتی رہے۔
نکس وامیکا (Nux Vom): مرگی کے حملے کے بعد۔

اکٹاریس (Actea Race): مریض ایک لفظ کا حصہ بھی نہیں بول سکتی۔ گو وہ بولنے کی کوشش کرتی ہے۔

فیرم پکریکیم (Ferrum Picricum): عوام الناس میں تقریریں کرنے والوں میں آواز کا بند ہو جاتا۔

تھوکننا — (Spitting)

کوکولس (Cocculus): مسلسل تھوکنے کی خواہش۔

کروٹیلس ایچ (Crotalus H): کالا خون تھوکنے۔

ایپی فیکس (Epiphegus): اعصابی درد سر کے ساتھ مسلسل تھوکننا، تھوک لیس دار ہوتا ہے۔

سٹرامونیم (Stramonium): منہ میں جھاگ کے ساتھ مسلسل تھوکننا۔

کاجوپٹم (Cajuputam): مسلسل تھوکنے کا ارتقان۔

ہکلاہٹ — (Stammering)

سٹرامونیم (Stramonium): ہکلاہٹ کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ ایک لفظ ادا کرنے سے پہلے وہ لمبے وقت کے لئے خود کو تھکاتا ہے۔ قابل لحاظ عرصہ تک اس دوا کو استعمال کیا جائے۔

چہرہ بگڑ جاتا ہے اور بولنے کے لئے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے۔

بووشا (Bovista): بچوں میں ہکلاہٹ۔

کالی بروم (Kali Brom): ہکلاہٹ ہو، آہستہ اور دقت کے ساتھ بولے۔

کلییریا کارب (Calcarea Carb): زبان کے لمبا ہونے، بھاری ہونے اور تالو کے سخت

ہو جانے کے ساتھ ہکلاہٹ ہو۔ CM طاقت کی خوراک دینی چاہئے۔

ہائیوسائیمس (Hyoscyamus): جب سٹرامونیم ناکام ہو جائے تو یہ دوا آزمائی جاسکتی ہے۔

نیٹرم کارب (Natrium Carb): زبان کے بھاری پن کے باعث ہکلاہٹ۔

سیکونڈاواٹروسا (Cicuta Vir): جب اپنے الفاظ نکل جائے۔

کاسٹیکم (Causticum): جب جوش یا اشتیاق ناراضگی کے باعث ہو یا اس سے ہکلاہٹ میں

زیادتی ہو۔ فابئی کیفیت کے باعث ہکلاہٹ۔

ارجنٹم نائٹ، لائیکوپوڈیم، ورٹرم البم (Arg Nit, Lycopodium, Veratrum Alb):

جب ٹائیفائیڈ بخار کے باعث ہکلاہٹ ہو۔

لیکسیس (Lachesis): اس قسم کے حروف مثلاً (X, S, V, T, A, P) میں 'و'، 'ت'، 'ا'، 'پ'

وغیرہ پر ہکلائے۔

سیڈرون (Cedron): عورتوں میں مباشرت کے بعد ہکلاہٹ ہو۔

بولو (Bulo): ہکلاہٹ اور لڑکھاہٹ جب بے ربط گفتگو سمجھ میں نہ آئے تو مریض فہمے میں

آجائے۔

منہ کی دکھن (سوزشی) — (Stomatitis)

(دیکھئے "دکھن")

ذاائقہ (Taste)

چائنا (China): ہرچہ بشمول پانی کا ذائقہ کڑوا ہو۔

براہیونیا، نیٹرم میور، پلساٹیلہ، سلفر (Bryonia, Natrium Mur, Pulsatilla, Sulphur):

جب غذا کا ذائقہ کڑوا ہو تو دی ہوئی ترتیب کے مطابق یہ دوائیں آزمائی جاسکتی ہیں۔ یہاں

تک کہ کسی مخصوص دوا کی علامات ظاہر ہو جائیں۔

ایکونائٹ این (Aconite N): پانی کے علاوہ ہرچہ کا ذائقہ کڑوا ہو۔

کریوسوٹم (Kreosotum): پینے کے بعد غذا کا ذائقہ کڑوا محسوس ہوتا ہے۔

کاربوویج، بوریکس (Carboveg, Borax): کھانے سے پہلے ذائقہ کڑوا محسوس ہو۔
 سائیکے من (Cyclamen): ذائقہ نمکین ہوتا ہے۔ ذائقہ مدہم پڑ جاتا ہے یا گہڑ جاتا ہے۔
 کیمفر (Camphor): ہر قسم کی غذا کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے۔
 ورٹرم ویر (Veratrum Vir): پانی کا ذائقہ میٹھا محسوس ہو۔ مٹھائیوں سے نفرت ہوتی ہے۔
 مرک سول (Merc Sol): روٹی میٹھی محسوس ہوتی ہے۔
 کیورم میٹ (Cup Met): دھات کا ذائقہ پھلنا اور پھٹنا۔
 رشاکس (Rhus Tox): ذائقہ ترش دھات کا سا اور گریس کی طرح کا سا۔
 نکس وامیکا (Nux Vom): ذائقہ برا ہو اور ترش ہو۔ جس کے ساتھ تمام اقسام کے ذائقے بدل بدل کر آئیں۔ دودھ کا ذائقہ دل خراب کر دینے والا ہو۔ جیسا کہ پھنے ہوئے دودھ کا ہوتا ہے۔

یووشا (Bovista): خون کا ذائقہ۔
 لایکو پوڈیم (Lycopodium): ہر چیز کھنی محسوس ہوتی ہے۔
 نیکرم میور (Natrur Mur): کھانے کے لیے عرصے بعد تک غذا کا ذائقہ باقی رہے، نمکین ذائقہ۔
 کیپسکیم (Capsicum): سڑے ہوئے پانی کی طرح کا خراب ذائقہ جب کھانے تو منہ سے تیز نکلتا ہوا بدبودار ذائقہ آئے۔
 ہائیڈراستس (Hydrastis): غذا کا ذائقہ عجیب ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد دیر تک ذائقہ باقی رہتا ہے۔
 آیوڈیم (Iodium): برا ذائقہ جیسا کہ صابن کا ہو۔ زبان کی نوک پر نمک والا ذائقہ ہوتا ہے۔ یہ مٹھایا نمکین ہو سکتا ہے۔
 کوکولس (Cocculus): مسلسل تھوکنے کی خواہش کے ساتھ مٹھا دھات والا ذائقہ۔
 میڈورینم (Medorrhinum): طبع والی زبان کے ساتھ تانبے کا ذائقہ، رخساروں اور ہونٹوں کی اندرونی سطح پر چھالے ہوتے ہیں۔
 مرکوریس (Mercurius): ذائقہ نمکین، مٹھا، دھات والا، لٹپٹا یا سڑے ہوئے انگوٹوں جیسا ہوتا ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): قے کے رجحان کے ساتھ گلے سڑے گوشت کا سا ذائقہ، منہ میں جلنے کا ذائقہ، کڑوا ذائقہ، تمام غذاؤں کا ذائقہ مدہم ہو جائے۔
 سٹرامونیم (Stramonium): ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ تمام غذائیں کڑوی محسوس ہوں۔ قوت

ذائقہ کھو بھی سکتی ہے۔

وریتروم البوم (Veratrum Alb): منہ میں ذائقے کا نہ ہونا، بے ذائقہ تھوک، پیٹ نہ آنے کے دوران امتداد رعبے کی پیاس۔

ناسوری کیفیت — (Ulceration)

(دیکھئے ”دکھن“)

حصہ پنجم۔۔۔ دانت

بوسیدگی (دانتوں کی) — (Caries)

کلکیریا فلور (Calcarea Fluor): دانتوں کی بوسیدگی اور گھٹے سڑنے کے لئے یہ دوا چوٹی کی ہے جبکہ ساتھ میں دانتوں کا انیل بھی چاتا ہے۔ درد یا درد کے بغیر دانتوں کا غیر قدرتی طور پر ڈھیلا ہو جانا۔ دانت اپنی جگہوں پر ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔

سٹیفنی سگریا (Staphisagria): جب دانت کالے ہو جائیں اور ان میں گہرے رنگ کی دھاریاں ہوں اور گھٹے سڑنے لگیں۔ معمولی چھونے سے دانتوں میں حساسیت ہو۔ کھانے یا پینے کے بعد دانت درد کریں۔ دودھ کے دانت مکمل طور پر نشوونما نہ پائیں اور کالے ہو جائیں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں۔

مرک سول (Merc Sol): دانتوں کا گلنا سڑنا اور ڈھیلا پڑ جانا۔ مسوڑھوں سے خون بہتا ہے۔ بچوں کے معاملہ میں جبکہ دانت میخوں کی طرح سے ہوں۔ یہ دوا ہلکی طاقت میں مثلاً 6 طاقت مسئلاً تین ماہ تک دینی چاہئے۔ پھر ایک ماہ یا کچھ عرصہ کے بعد یہ کورس دہرانا چاہئے۔

پلانٹیکو (Plantago): تیزی کے ساتھ دانتوں کا گلنا سڑنا اور گرنا۔ دانتوں میں ”دکھن“ ہو، مسوڑھوں سے خون بہتا ہے۔

کریوسوٹم (Kreosotum): جب دانت جیسے ہی وہ ظاہر ہوں، سیاہ ہو جائیں اور گل سڑ جائیں۔

فلورک ایسڈ (Fluoric Acid): دانتوں کا تیزی کے ساتھ بوسیدہ ہونا، دانتوں کا ناسور۔ تھوچا (Acid Phos): دانت جڑوں سے گل سڑ جائیں۔ جبکہ دانتوں کے اوپر والے حصے مضبوط ہوں۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): دانت زرد ہوں، مسوڑھوں سے خون بہے اور مسوڑھے سوج

جائیں اور دانتوں سے الگ ہو جائیں۔ مسوڑھوں میں پردہ لگا نہیں ہوں۔
سفلیٹیم (Syphilinum): دانت ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹیں اور پیلے پڑ جائیں۔ دانت مسوڑھوں کے کناروں سے گل سڑ جائیں اور ٹوٹ جائیں۔

ٹیوبرکولینم بوو (Tuberculinum Boiv): جب دانتوں کی نشوونما نہ ہو یا وہ ظاہر ہی نہ ہوں۔ یہ دوا دانت پیدا کرتی ہے۔ بچوں میں دانت گندے اور تقریباً سبز رنگ کے نظر آتے ہیں۔ اس دوا کی ایک خوراک دانت صاف کر دے گی۔

چیرانٹھس (Cheiranthus): عقل دائرہ کے نکلنے وقت کی تکالیف کے لئے۔

آرنیکا مونٹ (Arnica Mount): دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جانے سے ہر آدمی گھٹنے کے بعد اس دوا کی ایک یا دو خوراکیں لی جائیں۔ یہ جراحی کے صدمات کو روک دے گی۔ جراحی کے بعد دو یا تین خوراکیں ہر ایک گھنٹے کے بعد لی جائیں۔

ایپیکاک (Ipec): دانت نکلنے کے بعد خون کا بہنا اگر خون چسک دار سرخ ہو اور زیادہ مقدار میں بنے تو یہ دوا دی جائے۔

فاسفورس (Phosphorus): جراحی کے بعد دانتوں کی خلاؤں سے خون کا بہنا ہر چند رہ سنت کے بعد اس دوا کی دو یا تین خوراکیں دیجئے۔ دانت بے رنگ ہو جائیں 'ٹیالے ہو جائیں' کھوکھلے ہو جائیں 'مسوڑھوں سے خون بنے' دانتوں کی خلاؤں سے خون کا اخراج ہو 'بجڑے کا گنا سڑا۔

مزیئم (Mezerium): دانت تیزی سے گلیں سڑیں اور دانت لمبے محسوس ہوں۔
سیلیسیا (Silicea): سوکھا مسان (Rickety) کے مریض بچوں کے دانتوں کی بوسیدگی۔
کلکیریا فاس (Silicea): دانت دیر سے نکلیں اور جلد بوسیدہ ہو جائیں۔ دانت پھوٹنے سے اور دباؤ سے حساس ہوں۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): موناپے والے بچوں میں دانتوں کی بوسیدگی۔ دانت ظاہر ہی نہیں ہوتے یا جہاں ظاہر ہوتے ہیں وہیں تباہ بھی ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کے اوپر چھوٹے بد صورت تاج ہوں انوکہ سیاہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی خون کو روکنے والی دوا ہے کیونکہ دانت نکلنے کے بعد بننے والے خون کو منجمد کرنے میں یہ بہت زود اثر دوا ہے۔

کاربوو وچ (Carbo Veg): دانت بہت تیزی سے بوسیدہ ہوں۔ مسوڑھے اسٹنچی ہوتے ہیں۔ جن سے خون آسانی کے ساتھ بہتا ہے۔ گرم 'ٹھنڈی اور نمکین غذا سے دانتوں میں کھینچنے والے اور پھاڑنے والے درد ہوں۔

نیٹرم سلف (Natrurn Sulph): دانت ڈھیلے پڑ جائیں اور گر جائیں۔ مسوڑھے دانتوں سے

جدا ہو جاتے ہیں۔ دانتوں میں درد ہو جو گرم چیزوں سے اتر ہو جائے اور ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈی ہوا میں بھتر ہو۔

بدنمائی (دانتوں کی) — (Deformity)

(نیز دیکھئے "بوسیدگی (دانتوں کی)")

سفلیئم (Syphilinum): دانت بدنما ہو جائیں۔ مڑنا کر ان کی شکل بگڑ جائے۔ دانتوں پر دھبے ہوں۔ جلد بوسیدہ ہو جائیں۔ بچوں میں کپ کی شکل کے دانت۔ شدید درد ہو۔ دانتوں کی جڑوں میں رنگن ہو جیسا کہ وہاں کوئی کیزا ہو۔

گرنا (دانتوں کا) — (Falling Out)

(نیز دیکھئے "مسوڑھے" کے ذیل میں ادویات)

مرک وائیو (Merc Viv): سادہ قسم کے کیسوں میں۔
فاسفورس (Phosphorus): مسوڑھوں میں پیپ کے ساتھ دانتوں کا گرنا۔

دانتوں کا ناسور — (Fistula Dentalis)

سلیشیا (Silicea): دانت کا ناسور، مسوڑھوں میں ابلے ہوں۔ دانتوں کی جڑوں میں پھوڑے ہوں۔ مسوڑھے ٹھنڈی ہوا سے حساس ہوں۔
ایسڈ فلوریکم (Acid Fluoricum): دانتوں کا ناسور جس سے مسلسل خون والا، نمکین مواد خارج ہوتا رہے۔ دانت گرم محسوس ہوتے ہیں۔ پلائی چیزے کے دانت اور ہڈیاں متاثر ہوتی ہیں۔

الگ ہونا — (Separation)

کاربودیج (Carbo Veg): دانتوں سے مسوڑھوں کا جدا ہو جانا۔ دانت ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔
اسٹیمنی مسوڑھے: دانت تیزی سے بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ مسوڑھوں سے خون بہتا ہے۔ گرمی اور ٹھنڈک دونوں سے درد ہوتا ہے۔
ایومین (Alumen): دانت ڈھیلے پڑ جائیں اور بوسیدہ ہو جائیں۔ مسوڑھے دانتوں سے جدا ہو جائیں۔ مسوڑھوں سے خون جاری ہو۔

دانت کا درد — (Toothache)

آرم ٹرائی قلم 200 (Arum Triph 200): زیریں جڑے کی بوسیدہ اور ٹوٹی ہوئی داڑھ میں درد ہو، خصوصاً بائیں جانب۔

چینوپوڈیم (Chenopodium): جب درد میں جھٹکے سے افادہ ہو۔

کافیا کروڈ (Coffea Crud): جب درد کو ٹھنڈے یا پرف والے پانی کو منہ میں لینے سے افادہ ہو۔ 200 ڈائی لیوشن کی خوراک دیجئے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): دوران حمل دانت کا درد جس میں ٹھنڈک اور آرام سے اضافہ ہو۔ چہل قدمی سے افادہ ہوتا ہے۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): منہ میں ٹھنڈا پانی رکھنے سے یا کھلی ہوا میں چہل قدمی سے درد میں افادہ ہو۔ حاملہ عورتوں میں اعصابی دانت کا درد، مریض کو پیاس نہیں لگتی جبکہ پچھلے بہت آتا ہے۔ گرم چیزوں سے اور گرم کمروں میں ابتری ہوتی ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): جب ہاتھ پانی میں ڈبوئے سے دردوں میں اضافہ ہو جائے۔ برتن یا کپڑے دھونے والی مستورات میں دانت کا درد۔

ہیکلا لانا (Hecla Lava 3x): دانت کا درد، مسوڑھوں کے پھوڑے، جڑوں میں سوجن، دانتوں کے نکلنے میں وقت ہو۔

کریوٹوٹم (Kreosotum): بوسیدہ دانتوں اور سکریوٹی مسوڑھوں کی وجہ سے دانت کا درد لاحق ہو۔ دودھ کے دانتوں کا وقت سے پہلے ہی بوسیدہ ہو جانا، وہ پیلے اور گہرے رنگ کے ہوتے ہیں اور پھر بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔

ایلیئم سیپا (Allium Cepa): جب درد میں بہتری ٹھنڈی ہوا یا ٹھنڈے پانی سے کھلی کرنے سے ہوتی ہو۔ دانتوں میں خلال کرنے سے اور انہیں چوسنے سے بھی درد میں افادہ ہوتا ہے۔

بیلادونا (Belladonna): دانتوں میں ٹپکن والے درد کے ساتھ دانتوں کے لمبے ہو جانے کے احساس کو یہ دوا درست کرتی ہے۔

نیٹرم میور (Natrum Mur): دانت کا درد، دانت بہت زیادہ حساس ہوں۔ دانتوں کو ہوا دینے سے اور دانتوں پر زبان کا یا خوراک کا دباؤ ڈالنے سے دانتوں میں درد ہو۔ دانت ڈھیلے پڑ جائیں۔ کھینچنے والا درد دانتوں سے آگے بڑھ کر کان تک چلا جائے۔

میگ نیش پولس آرس (Magnatis Polus Arc): دانتوں میں اور بائیں جانب کے زیریں جڑے میں درد ہو جس کے ساتھ ایک رخسار میں سوجن، حرارت اور سرخی ہو۔ جسم میں ٹھنڈک ہو۔

اگیریکس ایم (Agaricux M): دانتوں اور بالائی جڑے کی ہڈی میں درد ہو۔
لائیکو پوڈیم (Lycopodium): مسوزھے سوچے ہوئے 'گرم اور نرم ہوں' اچھٹے والا
 دانتوں کا درد گرم مشروبات سے بہتر ہو جبکہ پھونے سے یا دانتوں پر دباؤ ڈالنے سے ابتر ہو۔
سپیا (Sapia): دوران حمل دانت کا درد ہو۔

انٹیم کروڈ (Antim Crud): کھوکھلے دانتوں میں دانت کا درد ہو۔ درد بعض اوقات سر تک
 گھٹتا چلا جائے۔ رات کے وقت کھانے کے بعد اور ٹھنڈے پانی سے ابتری ہو۔ زبان کے ساتھ
 دانت کو پھونے سے درد پیدا ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اعصاب کو پھاڑا جا رہا ہو۔
 کھلی ہوا میں چہل قدمی سے بہتری ہوتی ہے۔ ہر مرتبہ کھانے کے بعد یوسیدہ دانتوں میں کترنے
 جیسا درد ہو۔

نایٹرم کارب (Natrux Carb): مٹھائیاں کھانے سے یا مٹھے پھل کھانے سے دانتوں میں
 درد ہو۔

بسمتھ (Bismuth): ٹھنڈا پانی منہ میں رکھنے سے درد میں افادہ ہو۔
چائنا آف (China Off): بچے کو دودھ پلاتے وقت دانت کا درد ہو۔
گلیمرٹس (Glematis): گلنے سڑنے والی دائرہ میں درد ہو۔ روئی کا ریزہ کھوڑ میں چلے جانے
 سے بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے بہت زیادہ افادہ ہوتا ہے۔ تمباکو نوشی سے بھی
 درد میں اضافہ ہوتا ہے۔

مرک سول (Merc Sol): جب گلنے سڑنے والے دانتوں کی جڑوں میں سوزش ہو۔ دانت
 کالے اور گندے ہوں اور جلد گل سڑ جائیں۔ دھڑکن والے درد جن میں رات کے وقت یا
 مرطوب موسم میں ابتری ہو۔ دانت لمبے اور دکھتے ہوئے محسوس ہوں۔ گرم یا ٹھنڈی چیزوں
 کے گلنے سے ابتری ہو۔

اگنس کاسٹس (Agnus Castus): گرم غذا یا مشروبات سے دانت کا درد لاحق ہو۔
ہایوسایامیلا (Hyoscyamilla): دانت بہت لمبے 'بہت ڈھیلے محسوس ہونے کے ساتھ درد
 کریں۔

کیمومیلا (Chamomilla): جب دانت کے درد میں گرم غذا یا گرم مشروبات کے باعث
 ابتری ہو۔ یہ درد ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ برداشت نہ ہونے والا درد جو دانتوں کی پوری قطار
 کو متاثر کرے اور اس کی لہریں کانوں اور چہرے تک جائیں۔ دن کے دوران درد غائب ہو جاتا
 ہے جبکہ رات کے وقت جب مریض گرم بستر میں جاتا ہے تو درد دوبارہ آ جاتا ہے۔

سٹیفیسایگرا (Staphisagria): دانت کا درد آنکھوں تک پھیل جاتا ہے۔ کالے 'سڑے

ترے 'بوسیدہ' پرت والے دانت۔ چھوٹے سے اور ٹھنڈے مشروبات سے بہت زیادہ حساس۔ دورانِ حیض دانت کا درد ہو۔ گلے سڑنے والے دانتوں کی جڑوں میں کترن 'گلے سڑنے والے دانتوں میں درد' معمولی چھوٹے سے لٹری ہو۔

کلکیریا فلور (Calcarea Flour): دانت کے درد کے لئے ایک عمدہ دوا ہے جبکہ ٹیٹیم کی قلت ہو اور دانتوں کی پالش (انیل) اتر جائے۔ دانتوں کے ساتھ اگر کوئی غذا چھو جائے تو دانت کا درد شروع ہو جائے۔

پلانٹے گوجر (Plantago Major): دانتوں کا درد کانوں تک پھیل جاتا ہے۔ اس دوا کا پتھر بیرونی طور پر لگایا جاسکتا ہے۔ اس سے فوری آفاقہ ہوتا ہے۔

کوکسی نیلا (Coccinella): دانتوں 'سوڑھوں اور منہ کا اعصابی درد جس میں رات کو ابتری ہو۔

اولیم انیلس (Oleum Ani): دانتوں کو آپس میں دباؤ سے دانت کا درد بہتر ہو۔
مگنیشیا کارب (Magnesia Carb): حیض سے پہلے اور حیض کے دوران نیز حمل کے دوران دانت کا درد ہوتا ہے۔ پھرے کے بائیں جانب درد ہو جاتا ہے۔ دانتوں کی جڑیں مکمل طور پر ٹھیک ہوں۔

نیٹرم سلف (Natrum Sulph): دانت کا درد گرمی سے لٹری ہو اور ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈی ہوا سے بہتر ہو۔ سوڑھے دانتوں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ دانت ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔

کاربو ووج (Carbo Veg): دانتوں میں کھینچنے والے اور پھاڑنے والے درد 'گرمی ٹھنڈک اور تنگیں غذا سے ہوں۔ سوڑھوں سے خون بہتا ہے۔ سوڑھے اسٹیفی ہوتے ہیں۔ جب دانت صاف کئے جائیں تو خون بہتا ہے۔ دانتوں سے سوڑھے جدا ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کی تمام جھلار لمبی اور نرم محسوس ہوتی ہے۔

ریفانس (Raphanus): حمل کے ابتدائی مراحل کے دوران دانت کا درد۔
روڈوڈینڈرون (Rhododendron): طوفان بادوباراں سے پہلے یا طوفان بادوباراں کے دوران دانتوں کا درد ظاہر ہوتا ہے۔

آرنیکا ایم (Arnica M): دانت نکالنے کے بعد دانتوں سے خون بہتا ہے۔ دانت بھروانے یا دانتوں میں سوراخ کرانے سے ہونے والا درد۔

سپاگی جیلیا (Spigelia): بوسیدہ دانتوں میں پھاڑنے والے درد ہوں جو متاثرہ جانب دائرہ کی ہڈی تک پھیل جاتے ہیں۔ گلے سڑنے والے دانتوں میں ٹھنڈے یا ٹھنڈے پانی سے دردوں والے

جھٹکے ہوں۔ نیگے پر سر رکھ کر آرام کرنے سے درروں میں اتھری ہوتی ہے اور سر اٹھانے سے اتفاق ہوتا ہے۔

الیومن (Alumen): دانتوں سے خون بہتا ہے جو کہ لگتے سڑتے ہوں اور مسوڑھے بھی گل جائیں۔ دانت ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ دانت نکلوانے کے بعد خون بہتا ہے۔

حصہ ششم۔۔ زبان

کاٹنا۔۔ (Biting)

(دیکھئے ”کاٹنا“ ”مترقات“ کے ذیل میں)

سرطان (Cancer)

الیومن (Alumen): شام کے وقت جلن دار درد کے ساتھ زبان خشک اور کالی ہو۔ دھن ہو اور ٹانگے لگنے کا احساس ہو۔ زبان کی نوک میں اتھری ہوتی ہے۔ جب کبھی سوزش ہوتی ہی تو زبان میں سختی کا رجحان ہوتا ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): زبان کا سرطان یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ سوئی ہوئی زبان کے مرکز میں سوراخ ہو۔ زبان کے کنارے اوپر کو ابھرے ہوئے اور سخت ہوتے ہیں۔ شدید سیلان خون کے ساتھ زبان کا سرطان۔ ایسے کیس میں 200 طاقت کی ایک خوراک ہر ہفتہ دی جائے۔

اپیس ایم (Apis M): رسولیاں زبان کی سختی زبان کا سخت سرطان یا کھلا ہوا سرطان جس کے ساتھ ڈنک لگنے جیسے جلن دار درد ہوں۔ زبان خشک ہوتی ہے اور سوئی ہوئی ہوتی ہے نیز سوزش ہوتی ہے جس کے ساتھ لگنے کی نااہلیت ہوتی ہے۔ زبان پر شکاف ہوتے ہیں۔ دھن ہوتی ہے۔ زبان زخم آلود ہوتی ہے یا زخم کے دھبوں سے بھری ہوتی ہے۔ زبان کا سرطان۔

آر سینک البم (Ars Alb): زبان نیلاہٹ مائل رنگ والی یا سفید ہوتی ہے۔ زبان پر ناسوری زخم ہوتے ہیں۔ نیلے رنگ کے ساتھ جب آر سینک البم والی علامت نمایاں ہوں تو اس کا علاج دوا کی طاقتوں سے کیا جائے گا۔ جب علاج بالشل زیادہ سادہ ہو تو پھوٹی طاقتیں درکار ہوتی ہیں۔ اس کیس میں آر سینک سرطانی ریشوں اور سرطانی عناصر کے نظام پر براہ راست عمل کرتی ہے۔ آر سینک ہائیڈرائڈ (Ars Hydrs): زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ بے قاعدہ اور گہرے ناسور ہوتے ہیں۔ گرہ دار سوجن ہوتی ہے۔ منہ گرم اور خشک ہوتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی پیاس ہوتی ہے۔

ہائیڈرا سٹس (Hydrastis): زبان کا سرطان، زبان پر دانٹوں کے نشانات دکھائی دیتے ہیں۔ زبان کے کناروں کی جانب کٹاؤ یا شکاف ہوتے ہیں۔

کونڈوراگو (Condurango): زبان کا سرطان، منہ کے کونوں میں شکاف پر درد ہوتے ہیں۔ زبان کی بالائی سطح پر زبان کی نوک کی دائیں جانب پر درد گومڑیا پھنسیا ہوں۔

کالی سائی ٹیم (Kali Cyanatum): زبان کی دائیں جانب سرطانی ناسور ہونٹ اور منہ کی بائیں جملی جلی ہوتی ہے۔ زبان کا رنگ گہرا ہوتا ہے۔ جس پر سفید طبع ہوتا ہے۔

آرم میٹ (Arum Met): منہ میں دھات کا ذائقہ ہوتا ہے۔ زبان پر بھورے مائل فر کا ہلکا سا طبع ہوتا ہے۔ ذائقہ کی قوت جاتی رہتی ہے۔ بالکل بھرا ہوتا ہے۔ منہ میں کڑوا ذائقہ ہوتا ہے۔ خشکی کا احساس ہوتا ہے۔ ذائقہ کی حس نہیں رہتی۔ زبان چڑے کی طرح سخت اور ناقابل حرکت ہو جاتی ہے۔ سورج غروب ہونے سے سورج طلوع ہونے تک مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ خود کشی کا رجحان ہوتا ہے۔ آتشک اور / یا پارے کے بد اثر کے باعث شخصیت میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے۔

آرم میور (Arum Met): زبان مچھی یا سپاٹ ہوتی ہے۔ منہ میں برا ذائقہ ہوتا ہے۔ قریب قریب حس ذائقہ کھو جاتی ہے۔ سرطان لاحق ہو۔ زبان چڑے کی طرح سخت ہوتی ہے۔ مشکل ہی سے زبان کو حرکت ہوتی ہے۔ زبان پر سرخی، خشکی اور ناسوری زخم ہوتے ہیں۔

بینزائیڈ (Benz Acid): ہلکے نیلے رنگ کی زبان، پیشاب تیز و والا اور تیز رنگ والا ہوتا ہے۔ گہرے شکافوں اور پھلے ہوئے زخموں کے ساتھ زبان کی سطح اسٹخنی ہوتی ہے۔ ناسوری رسولی منہ کے بائیں جانب ہوتی ہے۔ جیزوں کے ملنے والی نرم جگہ پر اور دائرہ کے پیچھے ناسوری رسولی ہوتی ہے۔

کلکیریا کارب (Calc Carb): دردوں والی اور شکافوں والی زبان، پارے کے غلط استعمال کے بعد زبان کی سوزش، سفید طبع دار زبان، گندی، برے ذائقے والی زبان، ہونٹ اور ہاتھ سفید اور ٹھنڈے ہو جائیں۔ زبان کی ہڈی کے پیچھے دائیں جانب ننگے وقت زبان کے نیچے درد ہوتا ہے۔ زبان کے نیچے والے غدود سوجے ہوئے ہوتے ہیں۔ زبان اوپر کی طرف دھکیلی جاتی ہے تیز بائیں جانب دھکیلی جاتی ہے۔ گول ٹیم شکاف اتار چڑھاؤ والی کیوتر کے انڈے کی جسامت کی رسولی کے ذریعے، تیندوا، کینسر زبان کا یا زبان کے آتشکی گومڑیا، پھوڑے، شکاف یا درزیں زبان کے نصف پہلو کی سوجن۔

کلکیریا فلور (Calc Fluor): پیپ دار ابھار، پیدائشی آتشک جو خود کو منہ اور حلق کے ناسوری زخموں کی حیثیت سے ظاہر کرتے ہیں۔ اعضاء میں سوراخ کھودنے جیسے درد ہوں اور

حرارت کے ساتھ بوسیدگی اور گلنا 'سزنا' زبان پر شکاف ظاہر ہوتے ہیں۔ سوزش کے بعد سختی آ جاتی ہے۔

کاربو انیل (Carbo Ani): زبان کی نوک پر جلن اور منہ میں کچا پن ہوتا ہے۔ زبان کی نوک اور زبان کے کناروں پر پھالے ہوتے ہیں۔ تالو اور زبان خشک ہوتے ہیں۔ زبان پر ابھار ہوتا ہے۔ غدد گرہ دار ابھار والے سو جے ہوئے 'سوزشی' ہوتے ہیں۔ جن کے ساتھ بھالے گئے جیسے کانٹے جیسے یا جلن دار درد ہوتے ہیں۔ زخموں والے ابھار ہوتے ہیں۔

کاربولک ایسڈ (Carbolic Acid): بدبودار مادوں کا اخراج ہو۔ ہونٹوں کی اندرونی جانب اور رخساروں کی اندرونی سطح پر ناسوری زخموں کے قطعات ہوتے ہیں 'منہ اور معدے میں جلن کا احساس ہوتا ہے' متعفن مادوں کا اخراج ہوتا ہے۔

کاسٹیک (Causticum): زبان کی ناقابل برداشت دکھن جیسا کہ گرم اچلتے ہوئے پانی سے دھوئی گئی ہو۔ زبان کی نوک پر پردرد دانے 'زبان کا قلع' زبان میں درد ہو جیسا کہ مریض نے اپنی زبان کو کاٹ لیا ہو۔ منہ میں جلن دار درد ہو۔ نیز تالو اور زبان کی نوک پر جلن دار درد۔

کرومیک (Cromicum Ac): علامات اچانک ظاہر ہوتی ہیں اور اچانک چلی جاتی ہیں اور پھر دوبارہ دورے کی صورت میں آتی ہیں۔ ناک کے پچھلے حصے کی رسولیاں۔

سائٹرس (Citrus): زبان کے کینسر والے درد میں سرک ایسڈ بیرونی طور پر لگایا جاتا ہے۔

کونیم (Conium): بولنا مشکل ہوتا ہے۔ زبان اور منہ میں بگاڑ ہوتا ہے۔ زبان اور ہونٹ خشک اور چھپے ہوتے ہیں۔ زبان سوتی ہوئی پردرد اور اکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ غدد سو جے ہوئے اور ابھار والے ہوتے ہیں۔ جس کے ساتھ بھجنا بھٹ اور ٹانگے گئے کا احساس ہوتا ہے۔ گہبی مار یا کپت مار اور خراشیں لگنے کے بعد۔ ناسوروں سے خون بہتا ہے۔ جس کے ساتھ متعفن رطوبت خارج ہوتی ہے۔ ایک حصے میں ٹنگرین ہو جاتی ہے۔ ہڈیوں کا چھپا ہوا سرطان۔ غددوں کی سرطانی سوجن اور ابھار۔ ہونٹوں کا سرطان 'چرے پر پھیلتے ہوئے ناسور' گہبی مار یا اندرونی چوٹوں کے بعد جلنے ٹانگے گئے کے بعد سرطان اور سرطانی ناسور ہوتے ہیں۔ متاثرہ حصوں میں ڈنک لگتے ہیں۔

کروٹیل (Crotalus Hor): زبان سرخ اور سوزشی دکھن والی ہوتی ہے۔ زبان پیلی سخت اکڑی ہوئی اور من ہوتی ہے۔ سوزش کے باعث زبان اتنی زیادہ سوج جاتی ہے کہ منہ میں جگہ باقی نہیں رہتی۔ زبان اپنی جسامت سے دو گنا زیادہ سوج کر موتی ہو جاتی ہے۔ زبان باہر نکل آتی ہے۔ آنکھ 'سیلان خون کے رنجان کے ساتھ زبان کا سرطان۔

رنگینی (زبان کی) — (Colouration)

رشاکس (Rhus Tox) زبان کے کناروں کے علاوہ بلغم کے ساتھ زبان پر نقشے بنے ہوتے ہیں۔

وریتروم ویر (Veratrum Vir) منہ اور ہونٹوں کے خشک ہونے کے ساتھ زبان کے مرکز میں سرخ دھاری ہوتی ہے۔ زبان پر طبع چڑھا ہوتا ہے۔

ٹربینتھینا (Terbinthina) زبان ہموار، شفاف، سرخ ہوتی ہے۔ نقشے والی زبان۔

کاربو ویتج (Carbo Veg) زبان کالی ہوتی ہے۔

مرک سول (Merc Sol) سرخ کناروں کے ساتھ۔

آرسینک ایلیم، ہائیوسکیمس (Arsenic Alb, Hyoscyamus) زبان بھوری ہوتی ہے۔

نیٹرم سلف (Natrium Sulph) زبان پر سرخ دھجیاں ہوتی ہیں۔

ٹاراکسیم (Taraxacum) نقشے والی زبان جو گہرے سرخ، نرم دھبوں والے ٹکڑوں کو چھوڑ دیتی ہے جبکہ صاف ہو۔ یہ نرم دھبے حساس ہوتے ہیں۔

کالی میور (Kali Mur) نقشے دار زبان، بھورا ہونے کی طرف مائل سفید رنگ کا طبع زبان پر ہوتا ہے۔

دراڑیں (زبان کی) — (Cracks)

بیلادونا (Belladonna) زبان شکاف دار خشک اور جھلسی ہوئی ہوتی ہے۔

سیکیل کار (Secale Cor) شکاف دار خشک زبان، زبان کی نوک میں جھنجھٹا ہٹ ہوتی ہے۔ جبکہ زبان کی نوک سخت ہوتی ہے۔

رینن کولس ایس (Ranunculus) چھلی ہوئی اور شکاف دار زبان۔

آرم ٹرائی فلم (Arum Trip) زبان میں شکاف ہو۔ درد ہوتا ہو اور خون بہتا ہو۔ ناک سے تیزابی مواد خارج ہونے کے ساتھ زبان کی سوزش، زبان اور حلق کی خارجی کمزوری جو نکلنے کو ناممکن بنا دے اور غذا و مائع ناک کے راستے باہر دھکیل دے۔ زبان سرخ ہو جس پر سرخ دانے نکلے ہوئے ہوں۔ زبان تقریباً نیکی نظر آتی ہے۔

رہس وی (Rhus V) زبان درمیان سے شکاف دار ہوتی ہے۔

کالی بانی (Kali Bi) زبان شکاف دار ہوتی ہے اور گلاس کے پینڈے کی طرح چمکتی ہے۔

کونڈورانگو (Condurango) پردرد شکاف ہوتے ہیں۔

ہائیوسکیمس (Hyoscyamus): زبان سخت شکاف دار ہوتی ہے۔ جس سے خون بہتا ہے۔ بولنے میں دقت ہو یا قوت گویائی جاتی رہے۔ زبان اطاعت نہ کرے۔

خشک (زبان) — (Dry)

ہائیوسکیمس (Hymoscyamus): زبان منہ میں لڑکھڑاتی ہے اور جلتے ہوئے چڑے کی طرح خشک ہوتی ہے۔

میورٹیک ایسڈ (Muriatic Acid): ٹائیٹریٹ بخار میں زبان چڑے کی طرح خشک ہو جائے۔

کیمفر (Camphor): پیشاب کی بندش کے ساتھ ٹائیٹریٹ بخار میں زبان خشک ہوتی ہے۔
فاسفورس 'مرک سول' (Phosphorus, Merc Sol): اسہال میں زبان خشک ہو۔ دی گئی ترتیب کے مطابق دوائیں استعمال کی جائیں۔

نکس موسکاٹا (Nux Mosch): رات کے وقت زبان خشک ہوتی ہے۔ جیسا کہ پاؤڈر بن کر گر جائے گی۔ زبان منہ کی چھت کے ساتھ چپک جاتی ہے۔

بیلادونا (Belladonna): زبان کسی کلوے یا قاش کی طرح منہ میں لڑکھڑاتی ہے۔

براہیونیا (Bryonia): پیاس کے ساتھ زبان خشک ہو۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): پیاس کے بغیر زبان خشک ہو۔

سیکل کور (Secale Cor): زبان خشک اور شکاف دار ہوتی ہے۔ خون کی طرح کی روشنائی زبان سے نکلتی ہے۔ گاز صامع ہوتا ہے۔ زبان کی نوک میں جو کہ سخت ہوتی ہے 'جھنجھٹاٹ' ہو۔

سوزش (زبان کی) — (Inflammation)

مرکیوریس (Mercurius): زبان بہت زیادہ سوجی ہوئی اور باہر کو نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ منہ میں مٹھا ذائقہ ہوتا ہے۔ زبان ڈھیلی ہوتی ہے جس کے ساتھ زبان پر دانگوں کے نشان ہوتے ہیں۔ رات کے وقت منہ کی تمام جگہ کو گھیرے ہوئے مڑ جائے گی۔

اکونائٹ این (Aconite N): اگر بہت زیادہ بخار ہو تو یہ دوا مرکیوریس کے بعد دینی چاہئے۔
کینٹھارس (Cantharis): اگر زبان کی سوزش جلنے یا گرم ابلنے ہوئے پانی سے دھونے کے باعث ہو۔

ایپس ایم (Apis M): حاد سوزش 'خشک زبان جس کے ساتھ ڈنک گٹنے چیسے اور جلنے چیسے درد ہوتے ہوں جو حلق تک جاتے ہوں۔

ایسڈ آکزالک (Acid Oxal): اگر زبان سوچی ہوئی، دکھتی ہوئی، جلن دار اور ریا جھاگ دار ہو۔

بیمنزوئک ایسڈ (Benzoic Acid): زبان کی سوجن اور زبان کی ناموری کیفیت جبکہ جوڑوں میں درد ہو۔ جو طوفانی موسم اور ٹھنڈ لگ جانے کے باعث اچانک رک جاتے ہوں۔

پلساٹیل (Pulsatilla): جب سیلان خون کی بندش اور گنڈھیاوی تکالیف کے باعث ہو۔
بیلادونا (Belladonna): جب تکلیف مرکبوریس سے تیزی کے ساتھ ٹھیک نہ ہو یا جب سرخ باددالی سوزش ہو۔

آرسینک الیم، لیکسیس (Ars Alb, Lachesis): جب متکثرین کی علامات ظاہر ہونے کا خدشہ ہو تو ان دواؤں کے متعلق سوچنا چاہئے۔

کروٹیل (Crotalus Hor): زبان اتنی سوج جاتی ہے کہ معمول کی جسامت سے تقریباً دوگنی ہو جاتی ہے۔ زبان کا اتنا سوج جانا کہ منہ میں جگہ باقی نہ رہے۔

بیرونی استعمال کے لئے — (For Local Application)

آرنیکا (Arnica): آرنیکا کے مدد ٹمچر کے 20 قطرے 6 کھانے کے پچھوں کے بقدر پانی میں ملا کر دن میں 3 مرتبہ اس پانی کے غرارے کرنے چاہئیں۔

ارٹیکا یورس (Urtica Urens): آرنیکا کی طرح سے لوشن تیار کیا جائے۔ جو ایسے مخصوص کیسوں میں مفید ہے جبکہ جلن کا احساس ہو۔ معمولی تبدیلی کے ساتھ یا جب تکالیف جلنے یا گرم پانی سے زبان کو دھونے کے باعث لاحق ہوں۔

اعصابی درد (زبان کا) — (Neuralgia)

مینگانم (Manganum): زبان کا اعصابی درد۔

اگیریکس الیم، آرسینک الیم (Agaricus M, Arsenic Alb): جلن کے ساتھ زبان کے اعصابی درد کے لئے یہ دوا میں دی گئی ترتیب کے مطابق آزمائی جائیں۔

فلج (زبان کا) — (Paralysis)

کاسٹیکم (Causticum): زبان کے فلج کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ زبان کے فلج کے نتیجے میں ہکلاہٹ ہوتی ہے۔ یہ دوا سب سے پہلے آزمائی جائے۔

ڈالکامارا (Dulcamara): زبان سوچی ہوئی اور سخت ہوتی ہے۔ فلج زدہ محسوس ہوتا ہے۔

زبان باہر نہیں نکلی جاسکتی۔

جلسی میم (Gelsemium): زبان بہت موٹی محسوس ہوتی ہے اور مریض مشکل ہی سے بول سکتا ہے۔

پلمبم (Plumbum): یہ ایک اور اہم دوا ہے جو کہ دیگر دواؤں کے ناکام ہو جانے تک ہرگز نہیں دینی چاہئے۔

لیکسیس (Lachesis): جب مریض ساری زبان کو باہر نکالنے کے قابل نہ رہے تو اس دوا کو آزمانا چاہئے۔ زبان یوں محسوس ہوتی ہو جیسے منہ میں چبڑا ہو۔ بولنا مشکل ہوتا ہے۔

برٹا کارب (Baryta Carb): بوڑھے لوگوں میں زبان کا قانچ 'بوڑھے لوگوں میں زبان کی تختی' وقت سے پہلے بوڑھے ہو جانے والے لوگوں میں اور جن کے ننھے جواب دے جائیں۔

تندوا (زبان کا) — (Ranula)

(دیکھئے منہ کے ذیل میں تندوا)

ناسوری کیفیت (زخم وغیرہ) (Ulceration)

(نیز دیکھئے منہ کے ذیل میں دکن)

ایسڈ میور (Acid Mur): بار بار عود کر آنے والے ناسور اور ٹھکس۔ زبان کی سوجن ابھار اور قانچ۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): ناسور زبان کے نیچے ہو۔

نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid): کالی کھانسی میں زبان کے نیچے ناسور ہو۔

مرکوریس (Mercurius): جب ناسوری کیفیت آنکھ کے باعث ہو۔

گرافٹس (Graphites): غلط اور کچی ناسوری کیفیت 'آنکھی زخم'۔

کاربووج (Carbo Veg): جلن دار دردوں کے ساتھ بہت بدبودار مواد خارج ہوتا ہے۔

شام کے وقت اور رات کے دوران ابتری ہوتی ہے۔

کالی بائی (Kali Bi): زبان میں ناسور ہوتے ہیں۔ زبان موٹی خشک ہموار سرخ اور شکاف دار

ہوتی ہے اور شیشے کی طرح چمکتی ہے۔

بپٹسیا (Baptisia): زبان سوتی ہوئی ہوتی ہے۔ زبان میں درد ہوتا ہے اور بدبو آتی ہے۔

کالے خون سے ڈھکی ہوئی ہے۔ نکل 'تخت اور خشک ہوتی ہے۔ جیسا کہ چبڑا ہوا یا جیسا کہ لکڑی

کی نئی ہوئی ہو۔ لکڑوں لکڑوں میں چھالے ہوتے ہیں۔ اسر ہوتے ہیں۔ جو پن کے سر سے

بڑے نہیں ہوتے۔ یہ ناسور کالے اور بدبودار ہو جاتے ہیں۔
امونیم میور (Amm Mur): زبان کی نوک پر جلن دار چھالے ہوتے ہیں۔
یوپونیم (Eupionum): زبان ابھری ہوئی گانٹھوں سے چھپی ہوتی ہے۔
کونڈوراگو (Condurango): زبان پر بند منہ والے ناسور۔
سلفیورک ایسڈ (Sulphuric Acid): سوزشی زبان پر ناسور ہوں۔ منہ میں چھالے ہوتے
 ہیں۔ تھوک بہتات کے ساتھ آتا ہے۔ سانس بدبودار ہوتا ہے۔



باب ہفتم

سینہ، پھیپھڑے اور کھانسی کے امراض

(Diseases of Chest, Lungs & Cough)

حصہ اول۔۔۔ سینہ اور پھیپھڑے
ہوا کی نالیوں کی سوزش (حاد)

Bronchitis (Acute)

اکونائٹ اس (Aconite N): یہ دوا ابتدائی مراحل میں دی جاتی ہے جبکہ بخار تیز ہوتا ہے اور پھیپھڑوں میں خشکی کے ساتھ جاڑا لگنے سے لاحق ہوتا ہے نیز یہ کیفیت پسینے کے رک جانے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے نکلنے بدن پر لگنے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ پانی جیسا خون کی دھاری والا بلغم خارج ہوتا ہے۔ یہ کبھی بھی گاڑھا اور خون کی دھاری والا نہیں ہوتا۔ غیر ضروری پریشانی اور عظیم پریشانی ہوتی ہے۔

برائیونیہ (Bryonia): خشک کھانسی ہو جو سر کو اور جسم کے فاصلے والے اعضاء کو تکلیف دیتی ہے۔ جس کے ساتھ بخار ہوتا ہے اور بہت زیادہ مقدار میں پانی کی شدید پیاس لپے وقتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مریض خاموشی سے نیچے لیٹ جانا چاہتا ہے اور خلل اندازی کو پسند نہیں کرتا۔
ایپیکاک (Ipec): تیز سنناہٹ کے ساتھ کھانسی ہوتی ہے۔ بلغم ساری چھاتی میں بھرا ہوتا ہے جس کے ساتھ شدید کھڑکھڑاہٹ والی کھانسی ہوتی ہے۔ تے آتی ہے اور گلا کھونٹے جانے کا احساس ہوتا ہے۔

انٹیم ٹارٹ (Antim Tart): اس دوا کی علامات ہو ہو اپیکاک کی طرح ہوتی ہیں۔ سوائے اس کے کہ اس میں زیادہ نفاہت اور ٹھنڈا جھینڈ آتا ہے۔ بلغم ساری چھاتی میں کھڑکھڑاتا ہے۔ سنناہٹ ہوتی ہے۔ ڈھیلی کھانسی، بلغم خارج نہ ہو۔ سانس کے لئے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔
بیلادونا (Belladonna): سانس چھوٹا ہوتا ہے تیز آتا ہے۔ سانس لینے میں دباؤ ہوتا ہے اور سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ کھانسی خشک ہوتی ہے اور تشنگی ہوتی ہے۔ آواز بھاری اور

جیٹھی ہوتی ہوتی ہے۔ بعض اوقات مکمل طور پر آواز کھو جاتی ہے۔ پیشاب گہرے رنگ کا اور کم مقدار میں ہوتا ہے۔ جلد گرم اور خشک ہوتی ہے لیکن ڈھکے ہوئے حصوں پر پھیند آتا ہے۔
ہائوسکائیامس (Hyoscyamus): مسلسل خشک کھانسی ہوتی ہے۔ مریض کے لینے پر اتھری ہو جاتی ہے۔ بیٹھنے پر اور آگے کو جھکنے پر بہت زیادہ افادہ ہوتا ہے۔

سٹیکٹا پلوم (Sticta Pulm): ناک بند ہو جاتی ہے۔ ناک میں اور حلق میں بلغم ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ ہوا کی نالیوں میں سوزش ہوتی ہے۔ ہلکے دبے دبے درد آنکھوں کے ذمیلوں میں ہونے کے ساتھ نیز کانوں کے درد کے ساتھ سر درد لاحق ہو۔

ریو میکس (Rumex): گلے میں گدگدی کے ساتھ کھانسی ہوتی ہے جو کہ ٹھنڈی ہوا کے درجہ حرارت کی تبدیلی بات چیت کرنے اور کھانے سے اتھرو جاتی ہے جیسے ہی مریض اپنے سر کو بستر کے کپڑوں سے ڈھانپتا ہے اور اسی ہوا میں بار بار سانس لیتا ہے تو وہ بہتر محسوس کرتا ہے اور کھانسی بھی نہیں ہوتی۔ کھڑکی کھولنے پر مت کو اور ناک کو ہچکا کرنے پر گدگدی اور کھانسی میں شدت آ جاتی ہے۔

ہیپیر سلف (Hepar Sulph): جب کھانسی کھڑکھڑاہٹ، کھڑوری اور دم گھٹنے کے ساتھ ڈھیلی پڑنا شروع ہو جائے۔ دم گھٹنے میں کھانسی کا ہونا اس دوا کی قائل قدر علامت ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): یہ دوا نیم حار اور دیر تک چلنے والی کھانسی کے کیسوں میں مناسب دوا ہے۔ نیز ایسے مریضوں میں جو نرم مزاج لمبے پتلے دہلے زیادہ بڑھے ہوئے یا تپ دق والے ہوتے ہیں۔ سینے میں جھجھکے کے کھنچاؤ کے ساتھ دم گھٹنے والے درد ہوتے ہیں آواز بیٹھ جاتی ہے۔ بلغم کھڑکھڑاتا ہے۔ جو کہ خون آلود ہوتا ہے اور بلغم ٹھیکین اور بیٹھے ڈانٹے والا ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد کھانسی میں اتھری ہو جاتی ہے۔

کریوزوٹ (Kreosote): ہوا کی نالیوں کی سوزش جس کے ساتھ خوف زدہ کر دینے والا بدبودار شخص اور بلغم ہوتا ہے۔ جس کے باعث کسی بھی آدمی کے لئے مریض کے پاس جانا ناممکن ہو جاتا ہے۔

مرکیوریس (Mercurius): ہوا کی نالیوں کی سوزش والا نزلہ جس کے ساتھ چھاتی کے نیچے والے درمیانی حصہ میں کھردرا پن اور دھکن ہوتی ہے۔ خشک کھڑوری جھکے دار کھانسی ہوتی ہے جو بہت زیادہ کھپا دینے والی ہوتی ہے۔ بلغم پانی والا ہوتا ہے۔ تھوک پیلا اور پیپ دار ہلتی ہوتا ہے۔

سلفر (Sulphur): جب داغ یا قلععات جذب نہ ہوں تو یہ دوا بطور عمل انگیز دی جائے۔ جب اچھی منتخب شدہ دوائیں ناکام ہو جائیں۔ تب ہی اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): یہ ایک اور اہم دوا ہے جسے علاج کے آغاز میں دینا چاہئے یا پھر جب اوپر دی گئی ادویات مرض کو روکنے یا شفا دینے میں ناکام ہو جائیں۔

ہوا کی نالیوں کی سوزش (مزمن)

Bronchitis --- (Chronic)

نیفتھالین (Naphthaline): ہوا کی نالیوں کی سوزش جس کے ساتھ بلغم سینے میں دبا ہوا رکھا ہوا ہوتا ہے۔ چلنے میں تنفس چھوٹا ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت تنفس میں ٹھنکی ہوتی ہے اور سیلیاں بھتی ہیں۔ پرورد تعجبی کھانسی جس کے ساتھ بلغم خارج کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ یہ دوا دے میں 'کال کھانسی' میں 'تپ کالی' میں 'پھپھڑوں کے تپ دق' میں اور 'تھنہ کھانسی' میں مفید ہوتی ہے۔

گرینڈیلیا (Grindelia): یہ دوا پھپھڑے اور معدے کے اعصاب پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ پہلے خون کا دباؤ اونچا کر دیتی ہے اور اس طرح نبض کو تیز کر دیتی ہے اور خون کے دباؤ کو کم کر دیتی ہے اور نبض کو دھیرا کر دیتی ہے۔ اس دوا کی دیگر علامات نیفتھالین کی طرح ہیں۔

نوٹ (Note): اوپر دی گئی ادویات میں عظیم مماثلت کے پیش نظر یہ دونوں دوائیں ایک دوسرے کی جگہ بدل بدل کر ہر ایک دو گھنٹوں کے بعد مریض کی حالت کے مطابق دی جاسکتی ہیں۔ ڈائی لیوشن B طاقت کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ دونوں ادویات اکثر کیسوں کو نمٹالیں گی اور انہیں علاج کے شروع میں دینا چاہئے۔ یہاں تک کہ دیگر ادویات کی علامات ظاہر ہو جائیں جو کہ ان سے لانا مختلف ہوں۔

کیپریکیم (Capricum): ہوا کی نالیوں کی مزمن سوزش جس کے ساتھ گھرے تنفس کے ساتھ متعفن سانس اور بلغم خارج ہو۔

اویری (Aviara): بچوں میں ہوا کی نالیوں اور پھپھڑوں کے امراض۔ خسرو میں ادویات لگانے کے باعث ہوا کی نالیوں کی سوزش نیز نمونیہ بھی لاحق ہوتا ہے۔ 200 ڈائی لیوشن کی ایک خوراک ہر ہفتے دیگر نشاندہی کی گئی ادویات کے ساتھ دی جائے۔

بسیلینم (Bacillinum): پیپ دار بلغم کے اخراج کے ساتھ دم گھونٹنے والے مزمن نزلہ کے باعث بیمار ہونے والے اشخاص کے لئے یہ دوا مفید ہے۔ جس کے ساتھ پیپ دار بلغم کا اخراج ہوتا ہے۔ دیگر نشاندہی کی گئی ادویات کے ہمراہ اس دوا کی ہر ہفتہ 200 طاقت کی ایک خوراک دی جائے۔

ڈروسرا (Drosera): مزمن درم نرخرہ میں یہ دوا مفید ہے۔ جس کے ہمراہ تعجبی دوروں

والی کھانسی آدمی رات کے بعد اتر ہو جاتی ہے۔ کھانسی خشک، بلند آواز، ہمیری آواز والی اور بے درد ہوتی ہے۔ جو مریض کو اپنا سینہ پکڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ نفوس غذا کھانے میں مجبور کر دیتی ہے۔ نفوس غذا کھانے پر دقت ہوتی ہے۔ حنجرہ میں بلغم کا اجتماع ہوتا ہے۔

۱۔ آنتیم آرسینکیم (Antim Arsa): جب شخص مشکل، تیز، ساں ساں کی آواز والا اور کھڑکھڑاہٹ والا ہو۔ ضیق النفسی نمایاں ہو، بے چینی ہو۔ جلد نم دار ہو، جلد کبھی گرم اور کبھی سرد ہو۔

۲۔ آنتیم آئیوڈ (Antim Iod): گاڑھے، بھاری اور چٹا ہٹ مائل پیپ دار بلغم کے اخراج کے ساتھ کھانسی کے متواتر دورے ہوتے ہیں۔

کالی بائی کرومیکم (Kali Bich): حنجرہ، حلق اور نالیوں میں پیچھے بلغم کے باعث، ڈھیلی کھانسی ہو، سیٹیوں کی آواز کھڑکھڑاہٹ کے ہمراہ، بلغم سخت، تار دار اور چپکنے والا ہوتا ہے۔ بلغم مشکل ہی سے نکلتا ہے چنانچہ اکثر مریض کو کھانسی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ الٹی ہو جاتی ہے۔ اگر بلغم کا اخراج نہ ہو اور اخراج بالکل رک جائے تو گھٹنیا کا آغاز ہو جاتا ہے۔

کالی سلف (Kali Sulph): درم زرخہ کے نمونے کے بعد سینہ میں کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے۔ بلغم کے اخراج کے بغیر کھڑکھڑاہٹ ہو۔

کاسٹیکم (Causticum): ہمیری کھوکھلی خشک کھانسی ہو۔ سینے میں درد ہوتا ہے۔ خصوصاً چھاتی کی ہڈیوں کے پیچھے۔ دھکن کے ساتھ چھاتی میں کھڑکھڑاہٹ ہو۔ چھاتی سخت (اکڑاؤ والی) ہوتی ہے۔ ضرور ہی گھرا سانس لینا پڑے۔ کھانسی وقت بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔

کاربو ویج (Carbo Veg): حنجرہ اور ہوا کی نالیوں میں کپا پن اور کھرچن کے ساتھ شام کے وقت آواز بیٹھ جاتی ہے۔ سینہ میں دباؤ ہوتا ہے۔ بوڑھے لوگوں میں درم زرخہ، بہتات کے ساتھ پیلے رنگ کا بلغم خارج ہوتا ہے۔ درم زرخہ سے سیلان خون ہو۔

۱۔ آنتیم ٹارٹ (Antim Tart): چھاتی میں کھڑکھڑاہٹ والی آواز کے ساتھ، نبض کمزور اور تیز ہوتی ہے۔ کھچڑے کمزور اور جزدی طور پر مفلوج ہوتے ہیں۔

آرسینکیم البم (Ars Alb): آنکھوں، ناک، حلق اور آنتوں سے پتلا تیزابی مادہ درم زرخہ والی نالیوں کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ اعتماد درجہ کی بے چینی اور تھابت ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے وقفوں کے ساتھ تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس ہوتی ہے۔

سکوٹلا (Squilla): باقراط لہلہا اور چپکنے والا بلغم خارج ہوتا ہے چونکہ خارج ہونے والا مادہ لہلہا (کھسکتے والا) اور چپکنے والا ہوتا ہے۔ اس لئے اسے خارج کرنے کے لئے مریض کو بہت دیر تک کھانسی پڑتا ہے۔ تاکہ وہ بلغم کو اخراج کے لئے اکھاڑ سکے اور باہر نکال سکے۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): گلے، ناک اور آنکھوں سے پیلے رنگ کا بلغم بہتات کے ساتھ خارج ہو یا چپ دار بلغمی مادہ خارج ہوتا ہے۔ مریض کھلی ہوا میں بہتر ہوتا ہے۔ پیشانی میں درد سر بھی ہو سکتا ہے۔

امونیا کارب (Ammonia Carb): بلغم کے اخراج کا فقدان اس دوا کی نمایاں علامت ہے اگر بلغم کچھ تھوڑی بہت خارج ہو بھی تو خون کی آمیزش والی ہوتی ہے جو کہ دھاری کی طرح ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن، کمزوری اور نبض کی تیزی پائی جاتی ہے۔

لیڈم (Ledum): جب ورم زرخہ کے ساتھ نیچوں میں ہوا کی موجودگی پائی جائے۔

نارسیسس (Narcissus): مزمن کیسوں میں 1-3 ملاقت کی خوراک دیجئے۔

کلورم (Chlorum): جب ورم زرخہ کے بعد سانس رکنے کا مرض لاحق ہو۔

سبل سر (Sabal Serr): زرخہ کی ٹالیوں کی پھلاوٹ کے ساتھ مزمن ورم زرخہ۔

ورم زرخہ کا نمونیہ — (Broncho-Pneumonia)

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): ورم زرخہ کے نمونیہ کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ مرض کے آغاز میں 200 ملاقت کی ایک خوراک دینی چاہئے۔ 24 گھنٹوں کے بعد دیگر نشاندہی کی گئی ادویات دی جاسکتی ہیں۔

ایپیکاک (Ipecac): سینے میں کھڑکھڑاہٹ ہو اور تے و حلی کا رجحان ہو۔ گلا کھٹنے کا احساس ہوتا ہے اور چھینکے ہوئے کھنچاؤ یا سکڑاؤ کا احساس ہوتا ہے۔

براکی اونیا (Bryonia): جب خشک کھانسی ہو اور لمبے وقفوں کے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں پانی کی پیاس ہوتی ہو۔ مریض خاموش لیٹے رہنا پسند کرتا ہے یا سینے میں درد کے باعث بے چین رہتا ہے۔ تنفس مشکل اور پردرد ہوتا ہے۔

چیلیڈونیم (Chelidonium): دایاں پیچھے بڑا متاثر ہوتا ہے۔ تیز اور چھوٹا سانس اندر کی جانب کھینچے وقت ہوتا ہے۔ خشکی تنفس ہو۔ چھوٹی چھوٹی لیکن تھکا دینے والی کھانسی، کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے۔ بلغم کے اخراج میں دقت ہو۔ ٹانگے لگنے کا سادرد۔ دائیں کندھے کے جوڑے کے نیچے والے حصے میں ہوتا ہے۔ ناک کے نتھنے پھڑپھڑاتے ہیں۔

آئیوڈین (Iodine): دائیں جانب کا نمونیہ بہت تیز حرارت کے ساتھ۔ خون کی دھاری والا بلغم خارج ہوتا ہے۔ چھاتی کا پھیلاؤ مشکل ہو۔ عمل تنفس میں دقت، سانس کی آواز کے ساتھ ہو۔ ذات الجنب (پھیپھڑوں کی جمیلیوں میں سوزش) والا بہاؤ۔ کمروں میں گرمی میں اور مرطوب موسم میں کھانسی میں ابتری ہو۔

فاسفورس (Phosphorus): کم مقدار میں بلغم کے اخراج اور سینے میں گھٹن (دباؤ) کے ساتھ خشک کھانسی۔ خونی اور پیپ دار بلغم کے ساتھ ڈھیلی کھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ 30 طاقت سے نیچے والی طاقتوں میں یہ دوا نہیں دینی چاہئے۔

آرسنک آئیوڈ (Ars Iod): یہ دوا آرسنیک ایلیم والی علامات کی حامل دوا ہے لیکن یہ صرف کمی بیشی میں اس سے مختلف ہے۔ آرسنیک ایلیم کے مریض گرمی میں بہتر محسوس کرتے ہیں جبکہ آرسنیک آئیوڈ کے مریض گرم چیزیں لگانے سے بہتر ہو جاتے ہیں نیز گرم کمروں میں بھی بہتری ہوتی ہے۔

گلیسرین (Glycerine): انفلوئنزا والا نمونیہ، زکام یا افراط ہوتا ہے اور ضیق النفسی ہوتی ہے۔ دونوں پھیپڑوں میں انجماد ہوتا ہے۔

لوبیلیا انفلٹا (Lobelia Infl): بچوں کا ورم زرقہ والا نمونیہ۔ سینے کے امراض سے عمل شغلیاب نہ ہونے میں خصوصاً جہاں تپ دق کا خطرہ ہو۔

انٹیم ٹارٹ (Antim Tart): پھیلے ہوئے اور دھوانے ہوئے نچھنے جو کہ ہر سانس کے ساتھ پھڑپھڑاتے ہیں۔ پھیپڑے بلغم سے بھرے ہوتے ہیں جسے اکھاڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ پھیپڑوں سے کھڑکڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔ عظیم نقاہت ہوتی ہے۔ رد عمل کا فقدان ہوتا ہے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): انٹیم ٹارٹ ہی کی طرح کی علامات اس میں بھی ہوتی ہیں لیکن جب انٹیم ٹارٹ ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جائے۔ نچھنوں کی پھڑپھڑاہٹ ہر سانس کے ساتھ اور تکلیف کا دائیں جانب سے شروع ہوتا۔ اس دوا کی اہم علامات ہیں۔ جس کے ساتھ ابھارہ بھی ہوتا ہے۔

سلفر (Sulphur): یہ ایک عمل انگیز دوا ہے اور پھیپڑوں میں داخل نہ ہونے والے دھبوں یا قلععات کے لئے اس دوا کو قطعی نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ جب اس طرح قلععات ہوں تو یہ دوا بخار کو شفا دیتی ہے۔ نظر انداز کئے گئے کیسوں میں اور سوراخی طبیعت والے کیسوں میں جن کے ساتھ تپ دق کا رجحان بھی پایا جاتا ہے۔ بہت مفید دوا ہے۔ کمزوری اور بے ہوشی پائی جاتی ہے۔

خنازیر (Bronchocele)

برومیم (Bromium): پھیپڑے کے دائیں حصہ (لو) پر خنازیر ہو۔ رات کو سوتے وقت 2x کی ایک خوراک روزانہ دی جائے۔

نزلہ (ورم نرخرہ والا)

Catarrh --- (Bronchial)

برشا کارب (Baryta Carb): بوڑھے لوگوں میں دم گھونٹنے والی کھانسی۔ بھچپڑوں میں دھوکے کا احساس ہوتا ہے چنانچہ سانس لینا ناممکن ہو جاتا ہے۔

گلیسرین (Glycerine): انفلوئنزا والا نمونیہ، باافراط زکام ہوتا ہے اور ضیق النفسی ہوتی ہے۔ دونوں بھچپڑوں میں انجماد ہو جاتا ہے۔ 200 طالت کی خوراک دیجئے۔

آرم ٹرائی فلفم (Arum Triph): جب خنجرہ والی کھانسی کے ساتھ ہو۔

نٹرم میور (Natrum Mur): مزمن ورم نرخرہ والا نزلہ۔ سردیوں والی کھانسی اور دمہ۔ بلغم باافراط خارج ہوتا ہے۔

بالسکم پیرو (Balsamum Peru): اورم خنجرہ والے نزلہ کے لئے قابل قدر دوا ہے۔ چھاتی میں بلند آواز والی کھڑکڑاہٹ ہوتی ہے۔ بلغم گاڑھا کریم کی طرح کایا جیٹاہٹ مائل سفید خارج ہوتا ہے۔

پکس لکویڈا (Pix Liquida): ورم نرخرہ والے نزلہ اور بھچپڑوں کے سل کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ پیپ دار مادے والا بلغم خارج ہوتا ہے۔ بو اور ذائقہ گندہ ہوتا ہے۔ بائیں جانب کی پبلی کی تیسری ہڈی میں درد ہوتا ہے۔

(جو ادویات ”نزلہ“ تاک کے ذیل میں دی گئی ہیں۔ ان کا مطالعہ بھی کر لینا چاہئے۔)

دباؤ (چھاتی میں) — (Oppression)

(نیز دیکھئے ”دمہ — کھانسی“)

ناجا (Naja): چھاتی میں دباؤ ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ دم گھٹنا اور سانس میں رکاوٹ بھی پائی جاتی ہے۔

سینہ میں درد

Pain in Chest --- (Pleurodynia)

آرنیکا (Arnica): سینے میں دکھن اور خراش محسوس ہوتی ہے۔

رینن کولس بی (Ranunculus B): پسلیوں کے وجع المفاصل کے لئے یہ سب سے اچھی

دوا ہے۔ چھاتی میں تیز ٹانگے لگنے جیسا درد ہوتا ہے۔ نیز چھاتی میں ایک مقام پر دھکن ہوتی ہے۔ حرکت سے ابتری ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ سانس لینے سے بھی یا دباؤ سے یا موسم کی تبدیلی سے بھی ابتری ہوتی ہے۔ مخصوص اوقات میں تکلیف دو قسم کی ضیق انقبض ہوتی ہے۔ گل تھیریا (Gultheria)۔ یہ دوا دونوں پھپھڑوں کی درمیانی جگہ کے اندرونی حصہ میں درد کی نشاندہی کرتی ہے۔

رشاکس (Rhus Tox)۔ جب کندھوں میں گولی لگتے جیسے درد ہوں۔ سینگا (Senega)۔ ٹانگے لگتے جیسے درد کے ساتھ نزلہ اور زکام میں۔ چھاتی میں خنکی اور بہت زیادہ بلغم کا احساس ہوتا ہے۔ آواز ٹھنسی ہوئی ہوتی ہے۔ گلے میں دھکن ہوتی ہے۔ جو مریض کو بات چیت کے دوران تکلیف دیتی ہے۔ چھتکس آنے سے کمانسی رک جاتی ہے۔ ریو میکس سی (Rumex C)۔ ہائیں پھپھڑے میں ٹانگے لگتے جیسے اور ڈنک لگتے جیسے درد ہوتے ہیں۔ سل کا ابتدائی مرحلہ۔

اسکلی پیاس (Asclepias)۔ چھاتی کے نچلے حصہ میں تیز ٹانگے لگتے جیسا درد ہوتا ہے۔ حرکت سے ابتری ہوتی ہے۔

کالی کارب (Kali Carb)۔ چھاتی میں ٹانگے لگتے جیسا درد ہوتا ہے۔ خصوصاً ہائیں جانب رات کے 2 بجے سے 3 بجے تک ابتری ہوتی ہے۔

ٹرائی فولیم پی (Trifolium P)۔ رات کے وقت کمانسی کے ساتھ آواز کا بیٹھ جانا اور دم لگنے کے دورے ہوتے ہیں۔ گردن اکڑ جاتی ہے۔

اکٹیارسی موسا (Actea Racemosa)۔ دائیں جانب ابتری ہوتی ہے۔ خصوصاً اعصابی کمزوری والی مستورات میں۔

اکلیپھا انڈ (Acalypha Ind)۔ چھاتی میں مسلسل شدید درد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ خونیں بلغم آتا ہے۔

تنگ چھاتی — (Pigeon Chest)

فاسفورس (Phosphorus)۔ یہ دوا تنگ چھاتی (جب چھاتی کی ہڈیاں اندر کو مڑ کر چھاتی کو بہت زیادہ تنگ کر دیتی ہیں) کے مرض کے لئے واحد دوا ہے۔ جو کبھی مکالم نہیں ہوتی۔ یہ دوا لمبے عرصہ کے لئے دی جاتی ہے مثلاً کم از کم تین ماہ تک جس کے دوران چھاتی اپنی معمولی حالت پر آ جاتی ہے۔

ذات الجنب — (Pleurisy)

برائی اونیا (Bryonia): یہ دوا نشاندہی کرتی ہے ایسے درروں کی جو ٹانگے لگنے جیسے 'جلن دار' اور چاقو لگنے جیسے ہوتے ہیں اور جن کا مقام پھیپھڑوں کا پردہ ہوتا ہے۔ یہ درد حرکت سے ابتر ہو جاتے ہیں۔ درروں میں کمی اس وقت ہوتی ہے۔ جب مریض آرام کر رہا ہو یا درد والی جانب کروٹ لے کر لیٹا ہو۔

رہن کولس بی (Ranunculus B): پھیپھڑوں کے پردہ (یعنی جھلی) میں سوزش، استسقاء اور چپٹاؤ کے ساتھ ہوتی ہے۔ سینہ کے عضلات میں درد یا دکھن ہوتی ہے۔ ذات الجنب کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ درد والی جانب دباؤ یا چھونا برداشت نہیں ہو سکتا۔

آر سینیکم البم (Arsenicum Alb): جب پانی کی تھوڑی مقدار کی چھوٹے چھوٹے وقفوں سے پیاس ہو اور نمایاں تھابت کے ساتھ بہت زیادہ بے چینی ہو۔ درد جلن دار ہوتے ہیں۔ جنہیں حرارت اور گرمی سے آرام ہوتا ہے۔ دسے والا تنفس ہوتا ہے اور ضیق النفسی ہوتی ہے۔

ارانیہ ڈایا، ایکاک، نکس وامیکا (Aranea Dia, Ipec. Nux Vom): اس دوا کی سفارش ڈاکٹر گلارک نے جسمانی امراض میں کی ہے جب کہ جسم میں پانی بھر جائے اور ذات الجنب کے ساتھ معادی بخار (وقفوں سے ہونے والا بخار) ہو۔ تیسری طاقت کی دوا دیجئے۔

کینتھرس (Cantharsis): انتہا درجہ کی حرارت اور چھاتی میں جلن کے ساتھ ذات الجنب کے دوسرے مرحلہ کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ بہت زیادہ مقدار میں رطوبت خارج ہوتی ہے۔ اسعائے مستقیم اور مقعد میں جلن ہو سکتی ہے۔

بیلادونا (Belladonna): تشنہ جھکوں کے ساتھ بچوں میں ذات الجنب۔ اجتماع خون کی قسم کا۔

ایپس مل (Apis Mel): یہ دوا اس حالت کی نشاندہی کرتی ہے جب پسینہ بہت زیادہ مقدار میں خارج ہو لیکن سوزش کینتھرس کی نسبت کم ہوتی ہے۔ بہت زیادہ رطوبت خارج ہو جانے کے باعث ضیق النفسی اور دم گھٹنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

اسکلی پیاس، سنیگا (Asclepias, Senega): جب برائی اونیا ناکام ہو جائے۔ تو ان دواؤں کے متعلق سوچا جاسکتا ہے۔

کالی کارب (Kali Carb): مزمن ذات الجنب، سینے میں ٹھنڈک کے ساتھ خیر ٹانگے لگنے جیسے پھرنے والے اور جلن دار درد ہوتے ہیں۔ کھانسی اور دسے والا تنفس، 3 بجے شب کو ابتری ہوتی ہے۔ حرکت یا درد والی جانب کروٹ لے کر لیٹنے سے درد میں ابتری ہوتی ہے۔

ٹھنڈی چیزیں لگانے سے عارضی طور پر درد ختم ہو جاتا ہے۔
شائم (Stannum): چاقو لگنے کے سے درد ہوتے ہیں۔ آگے کو جھکنے سے اور زیادہ تر پائیں
 جانب جھکنے سے اتھری ہوتی ہے۔

آرسنک آئیوڈ (Arsenic Iod): پیپ والا ذات الجنب جس کے ساتھ بہت زیادہ نفاہت
 ہوتی ہے۔ جس میں سانس باہر نکالتے وقت اتھری ہوتی ہے۔ تیز دلی ہوئی کھانسی۔
ہیپیر سلف (Hepar Sulph): جب پیپ کا اجتماع ہو جائے۔ سرخ بخار اور ہاڑے کے
 بخار کے اور پسینے کے بار بار حملوں کے ساتھ تمبلیاں کمزوری بہت زیادہ طول پکڑ جائے وانی

سلفر سورینم (Sulphur, Psorinum): سانس چھوٹا ہو جانے کے ساتھ 'چھاتی میں دباؤ کے
 ساتھ اور نفاہت کے ساتھ مزمن ذات الجنب والی رطوبات کا اخراج۔ سورنم ایسے وقت میں
 دی جاتی ہے جب خصوصاً بدبودار سانس اور پیپ زیادہ متعفن ہوتی چلی جائے۔
سیلیشیا (Silicea): پتلی 'بدبودار پیپ' ست رفتاری کے ساتھ پھپھڑوں کے پردوں سے خارج
 ہوا کرے جو کہ بہت لمبے عرصہ تک چلتی رہے۔ کمزوری آہستہ آہستہ لاحق ہوتی ہے۔

ذات الجنب سے متعلق (مرض)

(Pleurodynia)

(ذات الجنب کے ذیل میں دی گئی ادویات ملاحظہ کیجئے۔)

نمونہ (Pneumonia)

اکونائٹ (Aconite): پہلے مرحلہ میں جب بخار اونچے درجہ کا ہو اور ہاڑے سے لاحق ہو
 ہو۔ پھپھڑوں میں ٹنگی ہو۔ سخت خشک کھانسی جو قدرے درد والی ہوتی ہے۔ پانی کی طرح کا بلغم
 خون کی دھاری کے ساتھ خارج ہوتا ہے لیکن کبھی گاڑھا اور خون کی دھاری والا نہیں ہوتا۔
 غیر ضروری پریشانی۔

وریرٹرم ویراکنڈ (Veratrum Viride): پھپھڑوں میں سخت قسم کی ٹنگی میں دل کا شدید
 اشتعال (جوش) جس کی نشاندہی نبض کی تیزی سے ہوتی ہے۔ مٹی ہوتی ہے، اٹھنے پر بے ہوشی
 ہوتی ہے۔ زبان وسط سے سرخ ہوتی ہے۔

برائی اونیا (Bryonia): جب انجماد کی (برقانی) کیفیت کا آغاز ہو چکا ہو۔ کھانسی ابھی تک سخت
 اور پردرد ہوتی ہے۔ تنفس میں دباؤ ہوتا ہے۔ مریض خاموشی سے لیٹے رہتا چاہے۔ 1x دیتے

البتہ بعد میں جب افادہ شروع ہو جائے تو 200 طاقت دہلی دوا دی جائے۔
 انٹیم ٹارٹ (Antim Tart)۔ یہ دوا برائی اونیا کی جگہ استعمال ہو سکتی ہے۔ بشرطیکہ سینے میں
 کھڑکھڑاہٹ کی آواز پائی جائے نیز گھچڑوں کے فالج کا خطرہ لاحق ہو۔
 فاسفورس (Phosphorus)۔ اگر برائی اونیا اور انٹیم ٹارٹ ناکام ہو جائیں تو اس دوا کی
 نشاندہی کی جاتی ہے۔ یہ دوا 200 ذاتی لیوشن میں دی جاتی ہے۔
 سلفر (Sulphur)۔ جب پیسے آنے لگیں تو اس دوا کو ہرگز نہیں بھولنا چاہئے۔ یہ دوا تحلیل نہ
 ہونے والے دھبوں (سوزشی قلعے) کے بننے کو روکتی ہے نیز انہیں شفا بھی دیتی ہے۔
 چیلڈونیم (Chelidonium)۔ صفراوی علامات کے ساتھ نمونیہ لاحق ہو۔
 ٹیوبرکولینم (Tuberculinum)۔ ساختی خرابیوں اور زہر کے اثر کو ختم کرنے کے لئے اس
 دوا کو بطور عمل انگیز دوا استعمال کرنا چاہئے۔

نگس دامیکا 30، آپیکاک 30، ارسے نیاڈایاڈیما 30

(Nux Vom 300, Ipecac 30, Aranea Diadema 30) ہائیڈروجن دہلی ساخت
 میں۔ (اس اصطلاح سے مراد ایسے مریض ہیں جو مرطوب موسم اور مرطوب رہائش گاہوں سے
 بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایسے مریض اپنے نظام میں پانی کی بہت زیادہ مقدار کے حامل
 ہوتے ہیں۔ اس لئے مرطوب موسم یا مرطوب رہائش گاہوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔) دائیں
 گھچڑے میں انجماد کی اس قدر کم کیفیت، بیاں گھچڑا بالکل صاف ہوتا ہے۔ بدل بدل کر کبھی
 بہتری محسوس ہوتی ہے اور کبھی بہتری محسوس ہوتی ہے۔ جازا محسوس ہوتا ہے۔ یہ ادویات دی
 گئی ترتیب کے مطابق آزمائی جاسکتی ہیں۔

سینیگا (Senega)۔ نمونیہ جب ذات الجنب کے ساتھ ہو۔ چھاتی میں درد ہوتا ہے جو حرکت
 سے آرام پاتا ہے۔ کھانسی اور دمہ آرام سے بہتر ہوتا ہے۔

آئیوڈیم (Iodium)۔ جب گھچڑوں کا انجماد شروع ہو چکا ہو اور ضیق النفسی نمایاں ہو۔
 متاثرہ جانب کے رخسار پر سرخی ہوتی ہے۔

سٹریکینیا فاس (Strychnia Phas)۔ جب انٹیم ٹارٹ ناکام ہو جائے تو اس دوا کی نشاندہی
 کی جاتی ہے۔ اس کی تمام علامات انٹیم ٹارٹ دہلی ہوتی ہیں مثلاً چھاتی کی کھڑکھڑاہٹ، کھڑور تیز
 نبض، ضیق النفسی، صفراویہ وغیرہ۔ ان سب کے ساتھ ضعف قلب بھی ہوتا ہے۔ اس دوا
 کی تیسری طاقت دی جاتی ہے اور ہر گھنٹے کے بعد دہرائی جاتی ہے۔ مریض کی حالت کے مطابق۔

سٹانم آئیوڈ (Stannum Iod)۔ یہ دوا نمونیہ کے آخری مرحلہ کی نشاندہی کرتی ہے۔ جب
 نمونیہ انجماد والے حصہ کے پھوٹے پھوٹے علاقوں میں استحکام پکڑ لیتا ہے البتہ انجماد سے بچے

ہوئے حصوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تحلیل نہ ہونے والے نمونیہ میں اگر سلفر 200 تکام ہو جائے۔
گرینڈیلیا (Grindelia)۔ انٹیم ثارت والی علامات کے ساتھ دل کی پختائی کا بگاڑ پایا جائے تو یہ
دوا ضروری ہو جاتی ہے۔ سونے کا خوف مبدا سوتے میں دل رک جائے۔ ضرور ہی لیٹ کر جاگا
کرے اور اپنے دل کی دھڑکن پر نگہ رکھے۔

سٹروپھنٹس (Strophanthus)۔ نمونیہ کے دوران دل کے ٹپل ہو جانے کے خدشہ کے
لئے یہ بہترین دوا ہے۔ نبض کمزور، تیز اور بے ترتیب ہوتی ہے۔ چوٹی کے قریب ٹپکے لگنے
جیسے اور پھر کن والے درد ہوں۔

تپ وق۔ (Tuberculosis)

فاسفورس (Phosphorus)۔ تپ وق کے علاج میں یہ چوٹی کی دوا ہے۔ یہ دوا پھیپھڑوں اور
لمبی ہڈیوں کے ساتھ خاص تعلق رکھتی ہے۔ مریض کھوکھلے سینے والا یا چوڑے چھاتی (چھاتی کی
ہڈیاں مڑ کر ایسی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ جیسی چوڑے کی چھاتی کی ہوتی ہے) والا ہوتا ہے
اور خون بھی تھوک سکا ہے۔ ٹیٹھی ہوئی آواز والی، شدید کھجلی دلی کھانسی ہوتی ہے۔ جس میں
ہستے اور باتیں کرتے ہوئے سینے کے دباؤ کے ساتھ اچھری ہو جاتی ہے۔ اس دوا کو بھی 30
طاقت سے نیچے استعمال نہ کیا جائے۔

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum)۔ یہ ایک عمل انگیز دوا ہے اور اسے 200 یا اونچی طاقتوں
میں ہر ہفتہ یا چند روز کے بعد دینا چاہئے چنانچہ دوا کی طاقت 200 یا 1000 ہونی چاہئے۔ اسے
صرف پھوٹی گولیوں کی صورت میں دینا چاہئے چنانچہ 4 یا 5 گولیوں کی ایک خوراک بنائی جائے۔
بہتر یہ ہے کہ ایک ڈرام دلی شیشی میں گولیاں بھر کر اس میں دوا کے 2 یا 3 قطرے گرائے
جائیں اور انہیں خوب ہلا کر تر کر لیا جائے۔

آرسینکیم آئیوڈ (Ars iod)۔ جب اشتعال کے باعث ”تھو“ یا مروڑ لاحق ہو۔ کمزوری اور
نفاہت اس دوا کی نمایاں علامات ہیں۔ شدید پیاس ہوتی ہے لیکن سرد پانی معدہ میں تکلیف پیدا
کر دیتا ہے۔ اس لئے مریض گرم پانی پینا چاہتا ہے۔

آئیوڈم (Iodum)۔ جب تعدد متاثر ہو جائیں تو اس دوا کو طلب کیا جاتا ہے۔ مریض عموماً
سیاہ جلد والا ہوتا ہے۔ اس کی جلد خشک اور غیر صحت مند ہوتی ہے اور اس کا درجہ حرارت
اوپر اٹھتا ہوتا ہے۔ نفاہت آہستہ آہستہ ہوتی ہے اور کھانسی مسلسل اور جھنجھلا دینے والی ہوتی ہے۔
کلکیریا آئیوڈ (Calcarea iod)۔ جب سارنیتی (Mesenteric) تعدد ملوث ہوں۔ شدید
نفاہت ہوتی ہے۔ مریض کے اندر ہڈیوں اور جلد کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ پیٹ بہت زیادہ پھولا

ہوتا ہے۔ غدد دلے اور گاتھ دار ہو جاتے ہیں۔ پاخانہ متواتر آتا ہے۔ جس کا رنگ سبز ہوتا ہے یا پھر کئی رنگوں میں بدلتا رہتا ہے۔ نیز اس کے ہمراہ اچھارہ ہوتا ہے۔

ٹیوبرکولینس بوو (Tuberculinum Bov): اگر یہ دوا 1000 طاقت کی یا سی۔ ایم طاقت کی دی جائے تو کھانا جاتا ہے کہ یہ مرض کو روکنے والی اور شفا دینے والی بن جاتی ہے۔ زندگی بھر میں صرف ایک یا دو خوراکیں تین یا چار ماہ کے وقفے کے ساتھ دی جائیں۔

کاربو انیملس (Carbo Animals): پھپھڑوں کے تپ دق کے آخری مرحلہ کے لئے دم کھونٹے والی اور ٹنٹنی ہوئی آواز والی کھانسی ہوتی ہے جو سارے دماغ کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ سبز پیپ دار بلغم اور پس ہوتی ہے۔ بدبودار تھوک (کھنکھار) بیٹھا متعفن نیز ضیق انسانی ہوتی ہے۔ سابل سیر (Sabal Serr): جنمہ والے تپ دق کے لئے مخصوص ہے۔

گالیک ایسڈ (Gallicum Acid): جب پھپھڑوں کے سیلان خون کے ساتھ تپ دق ہو۔ بہت زیادہ بلغم کا اخراج ہوتا ہے اور رات کے وقت بلغم بیٹھا ہوتا ہے۔

چائنا سلف (Chin Sulph): دق لاحق ہو جس کے ہمراہ (1) وزن کم ہو جائے۔ (2) برسوں تک کھانسی مسلسل رہے۔ (3) چہرہ میں دائیں جانب درد ہو جب کہ کھانسی دب جائے۔ (4) مرطوب موسم میں بہتری ہو۔ (5) ہر چوتھے روز بہتری ہو۔ دوسرے الفاظ میں یہ دوا ہائیڈروجنی سائٹ (جن مریضوں کے جسم میں پانی کی زیادتی ہو) والے دق میں بہت عمدہ ہے۔

فاسفورس مکالی نائٹ (Phosphorus, Kali Nit): بخار شام کے وقت جائے کے ساتھ لوٹ آتا ہے۔ وزن کم ہو جاتا ہے۔ رات کو پینہ آتا ہے اور ہلکی کھانسی ہوتی ہے۔ (ان دواؤں کے ہر دو گھنٹے کے بعد بدل بدل کر مسلسل استعمال کے تین ہفتوں کے بعد بخار غائب ہو جاتا ہے لیکن ایک سال کے بعد دوبارہ آ جانے کا خدشہ رہتا ہے چنانچہ ٹکس و امیکا اور آر ٹینکیم اہم کے بدل بدل کر استعمال سے اس رجحان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

سٹانم آیوڈ (Stannum iod 3x): صاف رنگ والی جلد اور لمبی ٹیکوں والے اشخاص میں تپ دق کا مرض۔ گلے میں کھلبلی کے باعث مسلسل ہونے والی کھانسی۔

ویکی ٹائی نم 200 (Vaccinum 200): تپ دق میں کھانسی کے لئے عمل انگیز دوا ہے۔

اوسمیم 200 (Osmium 200): جب پیشاب سے ہفتہ جیسی بو آئے۔ ذکاروں سے مولی کی بو آئے اور پینہ سے لسن جیسی بو آئے۔ سانس کی ٹالی میں بیجان ہوتا ہے۔

لائکوپس ورگ (Lycopus Virg): پھپھڑوں کی دق کے ابتدائی مرحلہ میں پھپھڑوں کی بائیں چوٹی متاثر ہوتی ہے جس میں پاخانہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔

کوکیولس انڈ (Cocculus Ind) : جنفرہ کا دق ورم زرخہ کے نزل کے بعد۔
 ویکلس ٹوسٹا سی ایم (Helix Tosta CM) : جب تب دق کے ساتھ پھپھڑوں سے خون
 آئے، مسلسل آواز بیٹھی رہے، خشک کھجلی والی کھانسی، جو رات کو اتر ہو جائے اور نیند اڑ
 جائے۔ ضیق النفس جس میں میڑھیاں چڑھنے سے اتری ہو۔

سلفر (Sulphur) : پرمردہ، زرد رنگ والے اور لاغرا شکم میں تب دق۔ کھانسی شدید سخت
 اور خشک ہوتی ہے۔ بجائے اس کے کہ مرطوب اور ہلکی کھانسی ہو۔ پاؤں اور ہاتھ جلتے ہیں۔
 اونچی طاقت کی خوراک دینی چاہئے مثلاً 200 طاقت کی اور اسے دہرائیں چاہئے ورنہ ہو سکتا
 ہے کہ دوسری خوراک تب دق کی حالت کو تیل دکھانے کے معداق ہو جائے۔ (یعنی اس دوا کو
 دہرانے سے تب دق میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔)

الستونیا سی (Alstonia G) : اسہال کے ساتھ بکا بخار۔ 1x خوراک دیجئے۔
 کلکیریا فاس (Calcareia Phos) : جب مریض بہت زیادہ کمزور ہوتا چلا جائے تو اس دوا کو
 آزمایا جاسکتا ہے۔

لیک نٹھس (Lachnanthes) : رات کے پینے، خشک کھانسی، کمر یا گردن میں اکڑن اور درد
 کے ساتھ نیز چہرے پر سرخی کے دائروں کے ساتھ دق لاحق ہو۔ ٹائیفائیڈ بخار یا ٹائیفائیڈ والے
 نمونیہ (ٹائفو نمونیہ) میں بھی۔

پکس لکویڈا (Pix Liquida) : پیپ دار پانی والے بلغم کے ساتھ، جس کی یو گندی اور
 ذائقہ گندا ہوتا ہے۔ پھپھڑوں کی دق کے تیسرے مرحلہ میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ اس کے
 ساتھ پبلی کی تیسری ہڈی میں درد ہوتا ہے۔

گواکیم (Guaiacum) : ٹی بی کے ترقی یافتہ مرحلہ میں جس کے ساتھ پھپھڑوں کی ہائیں
 چوبی میں ذات الجنب کے درد ہوتے ہیں نیز جس کے ساتھ بدبودار، پیپ دار بلغم ہوتا ہے۔

بتین (Betain) : بتین کے 4 گرین، شوگر ملک کے 96 گرین میں ملا کر دن میں 4 مرتبہ اتنی
 مقدار میں دیجئے۔ جتنی مقدار گھریلو چاقو کی نوک پر آجائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تب دق کے لئے
 مفید دوا ہے۔

یربا سانتا (Yerba Santa) : ورم زرخہ والی ٹی بی جس کے ہمراہ رات کے پینے ہوں اور
 جسم کھل رہا ہوں۔ جس کا باعث زرخہ کا متواتر نزل ہوتا ہے۔

سکارم لیکٹس (Saccharum Lactis) : (سل) دق کے آخری مرحلہ میں اسہال لاحق
 ہوں۔

سٹانم (Stannum) : باافراط ہیز رنگ کا بلغم خارج ہونے کے ساتھ فکھت لاحق ہو۔ تب دق

میں بلغم کا ذائقہ بٹھا ہو۔ چھاتی کمزور محسوس ہوتی ہے۔ مشکل ہی سے بات کر سکے۔
تھوجا (Thuja)۔ سوزاک میں جٹا رہنے والے مریضوں میں یہ دوا بطور عمل انگیز دینی
 چاہئے۔ IM ذیلی لیوشن دیجئے۔
سفی لینیم (Syphitium)۔ آنکھ میں جٹا رہنے والے مریضوں میں یہ دوا بطور عمل انگیز
 استعمال ہوتی ہے۔ IM ذیلی لیوشن دیجئے۔
کوٹوبارک (Coto Bark)۔ مزمن تب دق والے اسل بڑی مقدار میں ہوتے ہیں جو بہت
 کمزور کر دیتے ہیں۔ درہنچر کی بڑی خوراکیں دی جائیں۔
ڈرو سرا (Drosera)۔ جنمہ دلی دق کے لئے مخصوص ہے۔ گھٹنوں کے جوڑوں کی ٹی بی یا
 جسم کے دوسرے حصوں کی ٹی بی کے لئے۔
سلیشیا (Slieea)۔ دھچکوں والی کھانسی جس کے ساتھ بے حد گندی بو والا بلغم ہو۔ جو مائع میں
 پیندے تک ڈوب جاتا ہے۔ بلغم ڈھیلوں کی طرح کا بیٹا یا سبز ہوتا ہے۔ ٹھنڈے مرطوب موسم
 میں ابتری ہوتی ہے اور ٹھنڈے خشک موسم میں بہتری ہوتی ہے۔ دق کی نرلاوی صورت۔
لائکوپوڈیم (Lycopodium)۔ غیر صحت مند نشوونما والی گردن اور چھاتی کے ساتھ خسرو
 اور کل کھانسی کے بچوں کو لاحق ہونے والی دق۔ بیت پھول جاتا ہے۔ سبزی مائل بلغم خارج
 ہوتا ہے اور چھاتی کمزور ہوتی ہے۔
سینی شیو (Senecio)۔ جیش کی رکاوٹ کے ساتھ دق لاحق ہو۔

حصہ دوم۔ کھانسی

دمہ — (Asthma)

دمہ ایسے تکلیف دہ امراض میں سے ایک ہے۔ جن سے آسانی کے ساتھ شفا نہیں ملتی۔
 مرض کے علاوہ حملہ پر قابو پانے کے لئے مرض میں تخفیف کرنے والی ادویات کے استعمال کے
 بعد ایک ڈاکٹر کو ساتھیاتی طریقہ علاج کی طرف رجوع کرنا چاہئے تاکہ مریض کو اس کے مرض
 سے مستقل نجات دلائی جاسکے۔ ساتھیاتی طریقہ علاج کے لئے اہم ادویات حسب ذیل ہیں۔ ان
 ادویات کو دیگر شکایات کی گئی۔ ادویات میں اضافے کے طور پر استعمال کرنا چاہئے۔ ادویات
 درج ذیل ہیں:

- 1- ثوبر کو لینیم
- 2- تھوجا

3- نیرم سلف

4- میڈورینم

5- سفی لینم

1- مندرجہ بالا ادویات بطور عمل انگیز ادویات کے دی جائیں۔ ان کی طاقت 200 سے نیچے نہ ہو۔ (IM یا CM طاقتیں قابل ترجیح ہیں۔) ان ادویات کے استعمال سے دو تین روز قبل اور دو تین روز بعد تک کوئی دوسری دوا نہ دی جائے۔ مندرجہ بالا ادویات میں سے اگر کوئی دوا مطلوبہ اثر ظاہر نہ کرے تو پھر مریض کو مزید ادویات دینے سے احتراز کرنا چاہئے۔

2- ایک اشارہ یہ ہے کہ پرہیزی غذا بھی بہت ضروری امر ہے۔ سفید چینی یا اس سے بنی ہوئی مصنوعات (یعنی کھانے کی چیزیں) 'سفید آٹا' گوشت 'مچھلی' دودھ اور حلوة جات (Puddings) کے استعمال سے احتراز کرنا چاہئے۔ سالم گندم کا آٹا 'بارپاؤس کی چینی' شہد 'سلاد اور تازہ سبزیاں' انڈوں اور پنیر کے ساتھ کھائی جائیں۔

اکونائٹ 1x اور اپیکاک 1x (Aconite ix and Ipec ix) یہ ادویات حملہ کے دوران مرض میں تخفیف کر دیں گی اور سانس اور کھانسی میں آسانی پیدا کر دیں گی۔ اکونائٹ مل میں کام کرنے والوں کے دمہ کے لئے بھی مفید ہے۔

اپیکاکوانہ (Ipecacuanha): تشنجی دوروں والا دمہ جس کے ساتھ پریشانی 'سنتابٹ' نفس کا چھوٹا پن 'دم کھٹنے کا احساس' حرکت سے اتھری اور مسلسل کھانسی جس کے باعث تے ہوتی ہے' کے ساتھ سینے پر بہت زیادہ وزن ہوتا ہے۔ چھاتی بلغم سے بھری ہوتی ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں پر ٹھنڈا ایسٹہ آتا ہے۔ جلدی امراض کے ساتھ دمہ 200 طاقت میں یہ دوا دیجئے۔

زنگی بر (Zingiber): گھیس کے علاقہ والا دمہ 'آواز بیٹھ جاتی ہے۔ جھڑکے نیچے درد ہو۔' نفس میں دقت ہو۔ سینے میں ٹانگے ٹکیں (یعنی ٹانگے ٹکے کا احساس ہوں یا ٹانگے ٹکے کا سادرد ہو۔) جوں جوں صبح ہوتی ہے۔ اتھری میں اضافہ ہوتا ہے۔

کالی کارب (Kali Carb): اکثر اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ خصوصاً جب دمہ کا حملہ رات کے وقت آدمی رات گزر جانے کے بعد ہو۔ اس حملہ سے مریض کو لانا بیٹھ جانا پڑتا چنانچہ یہ حالت مریض کو آرام پہنچاتی ہے۔ موسمی تبدیلیوں سے حساسیت ہوتی ہے۔ نیز ٹھنڈی ہوا کے جھوکے سے بھی مریض حساس ہوتا ہے۔ مریض بے چین ہوتا ہے۔ خوف سے اور تصورات سے بھرا ہوتا ہے۔

بیلادونا (Belladonna): جب دمے والے نفس کے شدید تشنجی دورے ہوتے ہیں۔ جن

میں چھاتی کا احتیاض پایا جاتا ہے۔ نیز خلق کے احتیاض کا احساس ہوتا ہے جیسا کہ مریض کا گلا کھونٹا جا رہا ہو۔ تشفی دوروں کو ختم کرنے والی دوا ہے۔

اسپی ڈوس پریا (Aspidosperma): وقت جنس کے ساتھ دم کے لئے یہ ایک مؤثر دوا ہے۔ 2x یا 3x ڈائی یوشن دیجئے۔

گرینڈیلیا (Grindella): جب بلغم کا غیر معمولی اجتماع ہو۔ جب مریض سوئے تو سانس رک جائے۔ پھلے ہوئے دل کے ساتھ کھینچوں میں ہوا ہوتی ہے۔ ورم نخرہ کے مریض بوڑھے اشخاص میں دم، ورم نخرہ کے باعث عصب ہوائی (Pneumogastric) کا جزوی فالج لاحق ہوتا ہے۔ بھوک کو واپس لانے کے لئے اور دل کی دھڑکن اور ضیق النفسی میں افادہ کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔

کاربونیم سلف (Carboneum Sul): سانس میں دقت اور تیزی کے ساتھ لاحق ہونے والے دم میں اس دوا نے بہت اچھی خدمت کی ہے۔ الکوحل کے غلط استعمال کے بعد تباہ شدہ جسمانی ساخت (کے لئے)۔

پلموولپس (Pulmo Volpis): سیٹیوں کی بہت زیادہ آواز اور کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ نیز کھچڑوں کے استقاء کے ساتھ۔

بلاٹا اوری (Blatta Ori): ورم نخرہ کے ساتھ اور ورم نخرہ کے بغیر دم کے لئے عمدہ دوا ہے۔ گاڑھے اور پیپ دار بلغم کے ساتھ ضیق النفسی ہوتی ہے۔ دوران حملہ 2x یا 3x ڈائی یوشن دیا جاسکتا ہے۔

کلورالم (Chloralum): سنسناہٹ والے تنفس کے ساتھ دم، جب لینے ہوئے سانس ٹاک کے راستے اندر جاتا ہے لیکن منہ کے راستے ہونٹوں کو پھلاتے ہوئے باہر آتا ہے۔

امبروسیا آرٹ (Ambrosia Art): ریگ ویڈ کے زرگل کو دیکھنے کے باعث تپ کالی کے ساتھ دم۔

ارالیارسی موسا (Aralia Racemosa): زکام کے ساتھ اولے بدلنے والا دم۔ لینے ہوئے یا آدمی رات کے وقت بلند آواز کے ساتھ سنسناہٹ اور کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے۔ سانس لینے کے دوران، منھ نیند کے بعد، بلغم گرم اور نمکین ہوتا ہے۔ خلق میں کھلبلی اور سینے میں کھچاؤ کے باعث کھانسی ہوتی ہے۔ دھچکوں سے بچنے کے لئے بیٹھ جانا چاہئے۔

کالی بانیک (Kali Bich): جب دمے کا حملہ جماع کے باعث یا جماع کے بعد ہوتا ہے۔ صبح سویرے اٹھتی ہوتی ہے۔ رسی دار بلغم کا اخراج اس کی نمایاں علامت ہے جو کہ افراط کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔

کالی فاس (Kali Phos): اعصابی دمہ میں۔ IM طاقت کی دوا بطور عمل انگیز دیتے۔
کالی ٹائٹ (Kali Bich): بڑھی ہوئی شيق النفس، غشی اور متلی جس کے ساتھ مدہم ٹانگے
گلنے جیسے اور جلن دار درد چھاتی میں ہوں یا پھر آزادانہ بلغم کا اخراج ہو۔

کالی سلف 3 (Kali Sulph 3): پیلے رنگ کا بلغم خارج ہوتا ہے۔ سینے میں کھڑکھراہٹ ہوتی
ہے۔ سانس مشقت والا ہوتا ہے۔ بات چیت تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے۔

الیومینا سلیکیٹ (Alumina Silicate): کھانسی کے باعث تنفس رک جاتا ہے۔ دمہ والا
تنفس جس کے ساتھ سینہ میں کھڑکھراہٹ ہوتی ہے۔ کھانسی کے باعث سانس میں دقت ہوتی

سلفر (Sulphur): جب دمہ پھوڑے پھنسی کے دب جانے کے باعث لاحق ہو یا جب دمہ
پھوڑے پھنسی کے تبادلے میں لاحق ہو چنانچہ جب دمہ ظاہر ہوتا ہے تو پھوڑے پھنسی غائب ہو
جاتے ہیں۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): غصہ کے جوش کے باعث یا تھکان کے باعث جس میں تنہے
پھولتے پھکتے ہیں 'دمہ لاحق ہو۔ اعصابی دمہ۔ جاڑا والے مریضوں میں دمہ کا لاحق ہونا۔ ہیٹ ہی
ان لوگوں کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے۔ ایسے مریض آسانی کے ساتھ تھک جاتے ہیں۔ جب بھی کبھی
ٹھنڈ لگتی ہے۔ دائیں جانب کے گھٹپھڑے میں بلغم جم جاتا ہے۔ معدہ کے گیس والے علاقہ سے
جلن اوپر کی جانب کھانے کی ٹالی کے اوپر والے حصہ تک بڑھتی ہے۔ جس کے ساتھ ڈکاریں
آتی ہیں۔ شام 4 بجے سے 8 بجے تک مرض میں زیادتی ہوتی ہے۔

ناجا (Naja): تنفس میں دقت کے ساتھ لیٹا نہ جاسکے۔ شدید پھیپھلیں ہوتی ہیں جن کے باعث
سانس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ پھیپھڑوں کی خشکی، تنفس کی دقت کے ساتھ 'نبض آہستہ ہوتی

نایٹرم سلف (Natrum Sulph): مرطوب موسم میں یا برسات میں دمہ کا حملہ ہو۔ جب
مریض ہر مرتبہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ حملوں کا شکار ہو جائے تو اس دوا کو آزمانا چاہئے۔ حملے
صبح سویرے ہوتے ہیں۔ کھانسی ڈھیلی اور بہت زیادہ نمی کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیس دار بہری
مانگل پیلا بلغم خارج ہوتا ہے۔ سفید رنگ کا بلغم کھڑکھراہٹ اور شور کے ساتھ بڑی مقدار میں
خارج ہوتا ہے۔ یہ بلغم گاڑھا اور رسی دار ہوتا ہے۔ سینے میں دکھن اور دباؤ ہوتا ہے۔ مریض
اپنی چھاتی کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیتا ہے۔ جس سے کھانسی میں افادہ ہوتا ہے۔ ورم نرخرہ کے
ساتھ دمہ اور چھاتی کی بناوٹ میں بگاڑ، مزمن گھٹنیا کے ساتھ اٹھنے پھرنے والا دمہ۔ اگر یہ دوا
ناکام ہو جائے تو میڈورینم کو بطور عمل انگیز دوا کے دیا جائے۔

امبرا گریشیا (Ambra Grisea): بوڑھے لوگوں میں اور بچوں میں دم، سانس لینے کے دوران چھاتی میں سیلیاں بگتی ہیں۔ معمولی تھکاوٹ کے ساتھ ضیق النفسی ہوتی ہے۔

امونیا کارب (Ammonia Carb): ضیق النفسی کے ساتھ جس میں گرم کمرے میں اتھری ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ دم گھٹنا محسوس ہوتا ہے۔ رات کے دو بجے سے پانچ بجے تک کھانسی ہوتی ہے۔ سینے میں بہت زیادہ کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ کھانسی ہو۔

می فائینس (Mephites): شرایوں میں دم، شدید قسم کی خشک کھانسی ہر جملے کے وقت یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مریض مرجائے گا۔

ڈرو سرا (Drosera): مدقوق لوگوں میں دم، بستر کی گرمی سے تکلیف میں اتھری ہو۔ خشک کھانسی ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ بلغم خارج نہیں ہوتا۔ اگر ڈرو سرا تکام ہو جائے تو می فائینس آزمائی جائے۔

لیکیسیس (Lachesis): دم کے اچانک غلبے سے مریض نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ مریض اپنی گردن یا چھاتی پر معمولی سادھاؤ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آخر کار وہ پانی والا بلغم کھانسی کر نکالتا ہے۔ جس کے ساتھ بہت زیادہ افادہ ہوتا ہے۔ سونے کے دوران اور سونے کے بعد اتھری ہوتی ہے۔

یربا سانتا (Yerba Santa): جب بلغم کے اخراج سے افادہ ہو۔

آر سینک البم (Ars Alb): علو اور مزمن کیموں میں یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ مشقت والا تنفس، انتہا درجے کے اضطراب، ہائے داسے اور سبے چینی کے ساتھ دم ہوتا ہے۔ بہت زیادہ تھکاوٹ اور اذیت ہوتی ہے جیسا کہ جاں کنی کے وقت میں ہو۔ اس کے ساتھ ٹھنڈے سینے بھی آتے ہیں۔ چلنے سے، پہاڑی کے اوپر چڑھنے سے یا بیڑھیاں چڑھنے پر سانس کی تکلیف میں اتھری ہو جاتی ہے۔ بستر پر جانے کے وقت یا رات کے پہلے حصے کے دوران حملہ ہوتا ہے۔ یہ دوا آدمی رات کے بعد مرض میں اضافے کو بھی شفا دیتی ہے۔ جب عام دسے کے ساتھ تپ کاٹی والا دم بھی شریک ہو۔ پھوڑے پھنسی کے دب جانے کے بعد دم ظاہر ہو۔

برا یونیا (Bryonia): رات کے وقت تنفس میں رکاوٹ یا صبح ہوتے ہوئے تنفس میں رکاوٹ کی نشاندہی اس دوا سے ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ متواتر کھانسی، چھوٹی پسیلوں کے نیچے درد اور دائیں طرف ٹیک لگانے کی نااہلیت ہوتی ہے یا بائیں طرف بہت زیادہ تکلیف کے بغیر چنانچہ مریض پشت پر لیٹنے پر مجبور ہوتا ہے۔ بات چیت کرنے سے یا معمولی حرکت سے اتھری ہوتی ہے۔ خوراک کی نالی یا نرخرہ کا مہبان۔

نکس وامیکا (Nux Vom): معدے کے طاقے والا دم، غیر خوش کن اور پریشان کن

خواب دیکھنے کے بعد راتوں کو دم گھٹنے والی سختی کے حملے ہوتے ہیں۔ کمر کے بل لیٹنے سے یا کروٹ بدل کر لیٹنے سے یا اٹھ کر بیٹھ جانے سے حملے میں افادہ ہوتا ہے۔ اچھارہ بھی ہوتا ہے۔ گیس والی ٹالی کے سوج جانے سے تکلیف کا آغاز ہوتا ہے۔

۱۔ انتیم ٹارٹ (Antim Tart): دم گھوٹنے والی کھانسی کے ساتھ تنفس میں دقت کے لئے اس دوا کا استعمال کرنا چاہئے نیز ہوا کی ٹالیوں میں بہت زیادہ بلغم جم جانے کے باعث چھاتی کے آگے والے حصے میں پریشان کن تکلیف کے لئے بھی اس دوا کو استعمال کرنا چاہئے۔ عمر رسیدہ لوگوں میں اور بچوں میں اس دوا کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ تنفس تیز پر درد اور پر شور ہوتا ہے۔

۲۔ اوپیم (Opium): رکاوٹ والے تنفس کی نشاندہی اس دوا سے ہوتی ہے۔ خواہ کھچڑوں میں اجتماع خون یا کھنکھانی دوروں کے باعث ہو۔ جن کے ساتھ دم گھوٹنے والی کھانسی ہوتی ہے اور چہرے کا رنگ نیلا ہوتا ہے۔ سینے میں بلغم بہت بلند آواز کے ساتھ کھڑکھڑاتا ہے۔ اعتماد سے کی اذیت اور دم گھٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ دوران نیند سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ خوفناک خواب نظر آتے ہیں۔

۳۔ گرافائٹس (Graphites): پھوڑے پھنسی کے ساتھ اولتے بدلتے ہوئے دسے کے

دورے۔

۴۔ سمبوکس نائگرا (Sambucus Nig): تیز اور پر مشقت تنفس جس کے ساتھ بلند آواز والی سنبھٹ ہوتی ہے۔ وزن کے ساتھ چھاتی کی تکلیف۔ گھاگھٹنے کی اذیت اور خوف کے ساتھ۔ بعض اوقات چہرے اور ہاتھوں پر سوجن ہوتی ہے اور رنگ نیلا پڑ جاتا ہے۔ عام حرارت ہوتی ہے۔ لرزہ ہوتا ہے۔ کھسر پھسر سے زیادہ بلند آواز کے ساتھ بولنے کی اہلیت ضعیف رہتی۔ دم گھوٹنے والی کھانسی ہوتی ہے۔ علامات لینے ہونے کی صورت میں بڑھ جاتی ہیں۔ بچوں، بیکری کا کام کرنے والوں اور مل میں کام کرنے والوں میں دم، بچے سانس رکھنے کے باعث دھچکا گھٹنے سے جاگ جاتے ہیں۔ جسم پر لمبیت ہوتا ہے۔

۵۔ آرم ٹرائی قلم (Arum Triph): خصوصاً تب کافی 'چھینکوں' درد اور حلق میں کھنچاؤ (جس کے ساتھ بعد دوپہر بہت زیادہ زکام بہتا ہے) کے لئے یہ مفید دوا ہے۔

۶۔ موسکس (Moschus): اعصابی علاقے کا دم، خصوصاً ہسٹریائی مستورات میں یا ٹھنڈے گھٹنے کے باعث بچوں میں سانس کی ٹالی کے اوپر والے حصے میں کھنچاؤ والے کھنکھانی دوروں کا احساس نیز اس کے ساتھ حلق میں دم گھٹنے کا احساس ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ سلفر کے دھوئیں میں سانس لیا جا رہا ہے۔

۷۔ کیوپرم میٹ (Cuprum Met): یہ دوا موسکس کے مماثل علامات کی نشاندہی کرتی ہے

لیکن اسے موسکس کے ٹاکام ہو جانے کے بعد دینا چاہئے۔ تھنجی دوروں والا دمہ 'خوف زدہ کر دینے والے جھٹکے' گلے میں گھجن۔

لوبیلیا انفلیٹا (Lobelia Inflata): سینے کی سختی 'سانس کی ٹالی میں کھلبلی کا احساس اور سانس لینے میں مشقت ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ مریض کو سانس لینے کی خاطر منہ چوڑا کر کے کھولنا پڑتا ہے۔ سینے کے دباؤ کو دور کرنے کے لئے گہرا سانس لینا پڑتا ہے کیونکہ سینے میں شدید تکلیف ہوتی ہے۔ چھاتی کی ہڈی کے نیچے ہلکی کھلبلی ہوتی ہے۔ جبکہ گہرا سانس کھینچا جاتا ہے۔ کھانسی یا بلغم کا اخراج نہیں ہوتا۔ ٹھنڈ اور تھما کو کے دھویں سے جس کی بو ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): یہ دوا مرطوبیت والے دمہ کے لئے مفید ہے۔ ٹھنڈے پانی کی شدید پیاس ہوتی ہے۔ جو معدے میں جا کر جیسے ہی گرم ہوتا ہے۔ قے کے ذریعے باہر آ جاتا ہے۔ استہدار جے کی تکلیف 'الیومن کے ساتھ پیشاب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): جب فاسفورس ٹاکام ہو جائے تو اسے آزمانا چاہئے۔ 3 ایکس طاقت کی دوا سب سے پہلے دینی چاہئے۔ پھر اس کے بعد 200 طاقت کی دوا دی جائے۔ نیٹرم آرسینیکم (Natrium Ars): الرتجی یا خارش کے ساتھ اولٹے بدلتے والا دمہ۔ کونکے کے ذرات سانس کے ذریعے اندر جانے کے باعث دمہ ہو جائے۔

اگریکس ایم (Agaricus M): دبلے پتلے بید کی طرح کی پتلی جسامت والے اعصابی اور بے چین قسم کے اشخاص میں دے کی نشاندہی اس دوا سے ہوتی ہے۔ ان افراد کے عضلات میں چڑکن اور کیکپاہٹ ہوتی ہے۔ اعصاب میں جھنجھٹا ہٹ ہوتی ہے۔ بے ذول اور بھدے اشخاص ادھر ادھر ڈھیر ہونے والے چیزوں کو گرائیں اور انہیں توڑیں۔ بہت زیادہ ٹھنڈ کا احساس ہو۔ تھکاوٹ کا رجحان ہوتا ہے۔ رات کے سینے میں چھاتی کا نزل ہوتا ہے۔ شدید کھانسی کے دورے چھینکوں سے رک جاتے ہیں۔ سانس رکتی ہے۔ دل کی دھڑکن ہوتی ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں جھٹکے لگتے ہیں۔ جس کی وجہ استہدار جے کی تھکاوٹ اور کمزوری ہوتی ہے جو صبح کے وقت ہوتی ہے لیکن شام ہوتے ہوتے مریض خوش باش اور ہر کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔

تھوجا (Thuja): جب حفاظتی ٹیکوں کے لگوانے کے بعد دمہ لاحق ہو۔ چہرہ زرد ' بیمار ' موسم کی طرح کا اور چمک دار ہوتا ہے۔ چہرے پر کیل آتے جاتے رہتے ہیں۔ بعد دوپہر خشک کھانسی لاحق ہوتی ہے۔ خشک یا ڈھیلی کھانسی کے ساتھ بچوں کا دمہ ' گاڑھے سبز مائل پیلے مواد کے اخراج کے ساتھ پرانا نزلہ ' جب اچھی منتخب شدہ دوائیں ٹاکام ہو جائیں تو اس دوا کو عمل انگیز

دوا کے طور پر دینا چاہئے۔

ہیمپٹر سلف (Hepar Sulph): ٹھنڈی خشک مشرق کی جانب سے آنے والی ہوائی خشک جسم کو گلنے کے بعد دمہ لاحق ہو۔ کسی بھی قسم کی ٹھنڈ سے اتھری ہوتی ہے۔ مرطوب موسم میں مستحکم جسم کا افادہ ہوتا ہے۔

کیلینڈیم (Caladium): غدارش والے سرخ باد کے ساتھ اولٹے پد لٹے والا دمہ۔
سٹیکٹا پی (Sticta P): خشک کھانسی جو شام کو اور رات کے وقت اتر ہو جاتی ہے۔ مریض سویا لیٹ نہیں سکتا۔ جتنا زیادہ وہ کھانستے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ مزید کھانستا چاہتا ہے۔ دودھ میں کمی کے ساتھ عورتوں میں دمہ کی نشاندہی اس دوا سے ہوتی ہے۔

برومائن (Bromine): ملاحوں کا دمہ جب وہ ساحل پر جائیں۔ جیسے ہی وہ سمندر کے اندر چلے جاتے ہیں 'افادہ ہو جاتا ہے۔ گر دیا ہوا کے جھونکوں سے دمہ میں اتھری ہو۔

سیلیسیا (Silicea): یہ دوا سانسوں کے مریضوں کی نیز جاڑے والے مریضوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ چھاتی کے نزلے کے راسخ ہو جانے والے کیسوں میں دسے کی زوں زوں والی آوازیں چھاتی سے آتی ہیں۔ گھبراہٹ کے ساتھ دم کا گھٹنا 'حرکت کرنے کی نااہلیت۔ یہ حالت زیادہ گرمی گلنے اور زیادہ تھکاوٹ کے باعث 'جس کے ساتھ سانس کی نالیوں کی مزمن سوزش اور سانس کی نالی کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ مرطوب دمہ 'بھدی کھڑکھڑاہٹ سینہ میں ہوتی ہے اور ساری چھاتی بلغم سے بھری لگتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ مریض کا دم گھٹ جائے گا۔ یہ کیفیت سوزاک کے دب جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ نیتوں میں ہوا کا بھر جانا۔ جہاں پلک دھیمی پڑ گئی ہو اور ریشے اتنے زیادہ پھول جاتے ہیں کہ ٹوٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ نئے چاند کے دوران یا پھر دسے چاند کے دوران اتھری ہوتی ہے۔

ایگنیشیا (Ignatia): جذبات کے باعث 'تھمرداری کے باعث اور بار بار لاحق ہونے والے غموں کے باعث دمہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

میڈورہینم (Medorrhinum): جب دیگر اچھی منتخب شدہ دوائیں عمل کرنے میں یا مکمل شفا دینے میں ناکام ہو جائیں تو اس دوا کو عمل انگیز دوا کے طور پر دمہ کے مرض میں دیا جاتا ہے۔ دم گھٹنے والی کھانسی 'خجرو بند ہو جاتا ہے چنانچہ ہوا اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ صرف چہرے کے بل لیٹنے سے افادہ ہوتا ہے۔ گرمی کھوکھلی کھانسی لینے سے اتر ہو جائے۔ معدے کے بل لیٹنے سے بہتری ہوتی ہے۔ تنفس میں دقت ہوتی ہے۔ مریض بچکے کی طرح ہلنا چاہتا ہے۔ ٹھنڈ محسوس کرتا ہے لیکن اوڑھنے والے کپڑے اتار پھینکتا ہے۔ گرمی سے بھی اتھری ہوتی ہے۔ مرطوب ہوا کے جھونکوں سے اور گر جھنے چکنے والے طوفانوں سے بھی اتھری ہوتی ہے۔ سورج

طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے تک اتھری ہوتی ہے۔ بیٹہ شام کے وقت بہتری ہوتی ہے۔ سمندر پر یا ساحل سمندر پر بہتری ہوتی ہے۔ خشکی پر اتھری ہو (برومیم کے برعکس) منٹھیا کے جاولے میں یا اس کے ساتھ دمہ لاحق ہو۔

اکٹیاریس (Actea Race): حیض کے دوران یا بات چیت کرتے ہوئے اور رات کے وقت شدید تکلیبی دورے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بلغم کا اخراج شاندار ہوتا ہے۔

ریومیکس (Rumex): درجہ حرارت کی کسی بھی قسم کی تبدیلی سے مثلاً گرم کمرے سے باہر ٹھنڈی ہوا میں جانا اور اس کے برعکس نیز بات چیت کرنے سے اور ہنسنے سے شدید کھانسی کے حملے ہوتے ہیں۔ ہنسی کی ہڈی کے نیچے کچے پن والا درد محسوس ہوتا ہے۔ کھانسی چھاتی اور سر کو ہلا دیتی ہے۔ بلغم کا اخراج کم ہوتا ہے اور بلغم مشکل سے اکھڑتا ہے۔

سینیگا (Senega): بلغم کی بلند کھڑکھاٹ کے ساتھ دمہ لاحق ہو۔ بلغم سخت اور رسی دار ہوتا ہے۔ جس کو اکھاڑا نہیں جاسکتا۔ خشک گلے کے ساتھ مریض ہانپتا ہے اور کھانستا ہے۔ مزمن درم زرخہ 'یہ دوا عضو شخص کی نزلاوی کیفیت کو بھی درست کرتی ہے۔

ایسڈ سلف (Acid Sulph): چھوٹی چھوٹی خشک کھانسی کے ساتھ دمہ لاحق ہو۔ کھانسی مسلسل ہوتی ہے۔ جس کا اختتام ابکائی پر ہوتا ہے جس کے ساتھ مواد منہ تک آ جاتا ہے یا سٹے کرنے پر ہوتا ہے۔ چھاتی کمزور ہوتی ہے۔ نیز جلن دار اور ٹانگے گتے جیسے دردوں سے پڑھوتی ہے۔ خوف زدہ کر دینے والی تکلیف ہوتی ہے اور چھاتی میں دمہ گھٹتا ہے۔ جس میں افادہ ناکہیں نیچے کی جانب لٹکانے سے ہوتا ہے۔

کاربوویج (Carboveg): معدہ میں گیس کے اجتماع کے ساتھ دمہ لاحق ہو۔ پوتھوس (Pothos): سانس کے ذریعے گرد اندر جانے کے باعث دمہ لاحق ہو یا دمہ میں اتھری ہو۔ پاخانہ کرنے سے افادہ ہوتا ہے۔

کولوسینٹھس (Colocynthis): بد ہضمی اور اچھارہ کے ساتھ دمہ لاحق ہو 'سمندر کے کنارے یا سمندر کی جانب جانے سے اتھری ہوتی ہے۔ ٹھنڈے کا احساس ہوتا ہے حتیٰ کہ گرم موسم میں بھی ٹھنڈے لگتی ہے۔

سورینم (Psorinum): بازو پھیلا کر لیٹنے سے نمایاں افادہ محسوس ہوتا ہے۔ مریض خود کو بستر پر گرا دیتا ہے۔ تاکہ سانس لینے میں آسانی پیدا ہو۔ بازو جسم کے قریب لانے سے اتھری ہوتی ہے۔ موسم سرما میں اور ٹھنڈے موسم میں تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بلغم چپکنے والا اور بدبودار خارج ہوتا ہے۔ بوڑھے آدمیوں کا دمہ۔

ہائپرکیم (Hypericum): دھند والے موسم میں دمہ میں اتھری ہو۔ زیادہ مقدار میں بلغم کے

اخراج اور افراط کے ساتھ پیٹھ آنے سے دمہ کے حملوں میں اتفاق ہوتا ہے۔
ڈالکامارا (Dulcamara): مرطوب موسم کے دوران دمہ لاحق ہو یا مرطوب ترہ خانوں میں رہنے سے دمہ لاحق ہو۔

کریمیکو کالی سلفیورکیم (Chromioq Kali Sulphuricum): برسنوں کے کھسنے کے مطابق یہ دوا دمہ کے لئے مخصوص ہے۔ جس دمہ کے ساتھ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے نیز گاڑھا مواد خارج ہوتا ہے جسے نکھارنا مشکل ہوتا ہے۔

سبادیلا (Sabadilla): کانسی دمہ کے لئے ایک اہم دوا ہے۔ جس دمہ کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے۔ چیچکنیں آتی ہیں اور پانی والا مواد خارج ہوتا ہے۔

ہائیڈروسیانک ایسڈ (Hydrocyanic Acid): پھانسی میں شدید کھچاؤ کے ساتھ اعصابی دمہ کا شدید تملہ۔

سینگولی نیریا سی (Sanguinaria C): بوؤں کے باعث لاحق ہونے والا دمہ یا بوؤں کے باعث جس دمہ میں ابتری ہو۔ یہ دوا ایسے دمہ کے لئے خصوصی طور پر موزوں ہوتی ہے۔ ٹیٹھی ہوئی آواز والی کھانسی، سخت اور خشک کھانسی ہوتی ہے۔

سفلینیم (Syphilinum): دمہ جو ہر موسم گرما میں عود کر آئے۔ IM طاقت کی دوا دیتے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): ایسے اشخاص میں دمہ جو بزدل اور پھیلانی ہوتے ہیں۔ ایسے اشخاص کا مزاج بدلتا رہتا ہے۔ آسانی سے ہنسنے بھی ہیں اور آسانی سے روتے بھی ہیں۔ اندھیرے سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ موت سے ڈرتے ہیں۔ شکی مزاج ہوتے ہیں۔ مونہ پے سے پہلے ناخوش ہوتے ہیں۔ بلیوں کے خواب دیکھتے ہیں۔ IM طاقت کی صرف ایک خوراک دیتے اور کچھ عرصہ انتظار کیجئے۔

عارضہ قلب کے ساتھ دمہ — (Cardiac Asthma)

اکونائٹ این (Aconite N): اونچے فشار خون کے ساتھ دمہ، خشک کھانسی ہوتی ہے اور موت کا خوف رہتا ہے۔

ناجا (Naja): تنفس میں دقت ہو۔ مریض لیٹ نہیں سکتا، شدید چیچکنیں آتی ہیں۔ جس سے سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ بغیر آہستہ چلتی ہے۔

سبل سر (Sabal Ser): امراض قلب والا دمہ جس کے ساتھ سنسٹاہٹ اور سخت کھانسی ہوتی ہے۔ ٹھنڈے مرطوب موسم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حلق خشک ہوتا ہے۔ 2x یا 3x دلی ٹیوشن دیتے۔

بریٹا کارب (Baryta Carb): بلند فشار خون کے ساتھ دم لاحق ہو۔ جس کے ساتھ نبض بھرپور اور سخت ہو۔ غرور کی سوزش کا رجحان ہو۔ آنکھوں کے سامنے کالے دھبے ہوتے ہیں۔ آنکھ کے ڈھیلوں میں بھراؤ کا احساس ہوتا ہے۔ کانوں میں گونج ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ سماعت میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ یوں محسوس ہو جیتے دھواں سانس کے ذریعے اندر چلا گیا ہو۔ چھاتی سے گہری کھڑکھڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔

بریٹا میور (Baryta Mur): بلند فشار خون کے ساتھ دم سے پرانے مریضوں کی نشاندہی اس دوا سے ہوتی ہے۔ یادداشت کھو جائے یا یادداشت کمزور پڑ جائے۔ بطن خارج کر سکنے کی طاقت کی عدم موجودگی کے ساتھ دم گھٹنے والی کھانسی ہوتی ہے۔ موسم کی ہر قسم کی تبدیلی کے ساتھ ابتری ہوتی ہے۔

وسکم ایلیم (Viscum Albi): اپنے اشخاص میں دم کا مرض ہو گردوں کے امراض میں مبتلا ہوں یا جنہیں بلند فشار خون کا مرض لاحق ہو اور ممکن ہے اس کا باعث پیشاب میں الیومن (اندوں کی سفیدی کا ساموا) خارج ہوتا ہو۔ جب مریض لیٹتا ہے تو دم گھٹنے کا احساس ہوتا ہے۔ نبض کمزور اور تار کی طرح کی ہوتی ہے۔ دل میں بھاری پن اور دباؤ کا احساس ہوتا ہے۔

کریٹائی گیس (Crataegus): دم والے اپنے اشخاص جن میں دل کا ٹھل ہو جانا اور بلند فشار خون پایا جائے۔ اعتماد رہے کی ضیق انفسی ہوتی ہے۔ دل جھپٹ جاتا ہے۔

آرم میٹ (Arum Met): امراض قلب والا دم، ضیق انفسی کے ساتھ اور جب تنفس دل کے ساتھ ملوث ہو۔

آرم میور (Aurum Mur): دم جس کے ساتھ بلند آواز والی کھانسی اور پیٹے رنگ کا بطن ہوتا ہے۔ دل کے اوپر درد ہوتا ہے۔

سٹرکولیا (Sterculia): یہ ایسے دم کے لئے دوا ہے۔ جس میں دل کمزور ہوتا ہے۔ خصوصاً شرایین میں۔

امونیا کارب (Ammonia Carb): کمزور دل کے ساتھ 'تھابت کے ساتھ' دل کی دھڑکن کے ساتھ اور حرکت کرنے پر تنفس میں دقت کے ساتھ۔

ڈیجی ٹلیس (Digitalis): امراض قلب والے دم کے لئے یہ ایک رہنما کن دوا ہے۔ تنفس میں یک دم التواء ہو جائے۔ (یعنی کچھ دیر کے لئے سانس رک جائے) گلے میں موجب پریشانی پسند آج جانے کا احساس (یعنی دم گھٹنے کا احساس) کھانسی کے ساتھ۔ دل میں ٹانگے لگنے (جیسے دروں) کے ساتھ بے قاعدہ نبض۔

اپوسائی نم کین (Apocynum Can): پیشاب میں کھار آنے کے رجحان کے ساتھ دم۔

گردوں میں درد اور دل کی کمزوری کے ساتھ استسقاءی سو جن ہوتی ہے۔ دل کی ٹالیوں کی ناکافی چمک، تنفس چھوٹا، خون کی شریانوں کے کھنچاؤ میں کمی۔

گیٹسٹس جی (Cactus G): دم گھٹنے کے میعاد ہی جملے جن کے ساتھ غشی ہوتی ہے۔ چہرے پر ٹھنڈے پسینے آتے ہیں اور نبض کھو جاتی ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ سینے کا نچلا حصہ بڑی سختی سے کسی رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ دباؤ ہوتا ہے اور دل کی دھڑکن ہوتی ہے جو نیچے لیٹ جانے سے رک جاتی ہے۔ چھاتی میں خون کا اجتماع ہوتا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے جیسے دل دور سینہ کسی ٹکڑے میں رکھ کر پیچھے جا رہے ہیں۔ دن کے گیارہ بجتے بجتے دورہ آ جاتا ہے۔ کھلی ہوا میں اتفاق ہوتا ہے۔

کھانسی — (Cough)

اکونائٹ (Aconite N): خشک، کروب، ٹینھی ہوئی آواز والی، دم گھونٹنے والی، بلند آواز والی اور کمزوری کھانسی۔ پھندا لگنے والی، سخت، گھٹیناں پیچھے جھپی اور سینیاں پیچھے جھپی کھانسی جو خشک ہواؤں یا ہوا کے جسموں سے لاحق ہو۔

بیلادونا (Belladonna): جب حلق میں خون کے اجتماع کے باعث کھانسی لاحق ہو۔ خشک، بھونکنے والی کھانسی، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے جب کھانسا جا رہا ہو۔

برائی اونیا (Bryonia): جب حاد نزلہ زکام کے حملہ کے بعد خشک کھانسی لاحق ہو۔ منہ کی خشکی پائی جاتی ہے۔ چھاتی کے اطراف میں ٹانگے لگنے جیسے درد ہوتے ہیں (یعنی سونیاں گھبھتی ہیں)۔

کالی بائی (Kali Bi): جب بلغم لیس وار ہو جسے رسی کی طرح کھینچا جاسکے۔ کھانسی ڈھیلی ہوتی ہے۔

ہائوسامیس (Hyoscyamus): خشکی کھانسی جس میں لینے پر اتھریا ہوتی ہے اور بیٹھنے پر اتفاق ہوتا ہے۔ پینے، کھانے اور بات چیت کرنے سے اتھری ہوتی ہے۔

سائیکل من (Cyclamen): رات کے وقت کھانسی ہوتی ہے۔ جب کہ مریض سو رہا ہوتا ہے۔ سوتے سوتے کھانستا ہے، جاکتا نہیں۔ خصوصاً بچوں میں۔

کالی کارب (Kali Carb): خشک، دوروں والی کھانسی ہوتی ہے۔ کھانسی سے لیس وار بلغم یا وہیپ ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ جسے ضرور ہی اٹکنا پڑتا ہے۔ رات کے ۲ بجے سے ۹ بجے کے دوران اتھری ہوتی ہے۔

پلساتیلہ (Pulsatilla): ڈھیلی کھانسی جب کہ دو گرم کردوں میں اتھرو جائے اور کھلی ہوا میں

بہتر ہو۔

فاسفورس (Phosphorus): گرم کمرے سے ٹھنڈے کمرے میں جانے سے کھانسی لاحق ہو۔ 'بولے' کھانے اور پینے سے بہتری ہوتی ہے نیز بائیں جانب لیٹنے سے بھی بہتری ہوتی ہے۔

سپونجیا (Spongia): خشک کھانسی سانس کی آواز کے ساتھ 'آواز ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی آرا لکڑی کاٹنے کے لئے چلایا جا رہا ہو۔ 'ٹھنڈے' اور 'ٹھنڈے' مشروبات 'تمباکو نوشی' سر نیچے کر کے لیٹنے سے بہتری ہوتی ہے۔ نیز جب پڑھا جائے 'گایا جائے' باتیں کی جائیں اور اگلا جائے تب بھی بہتری ہوتی ہے۔ گرم چیزیں کھانے اور پینے سے بہتری ہوتی ہے۔ سانس کے دوران کروانی سنناہٹ کی آواز ہوتی ہے۔

ہیمپیر سلف (Hepar Sulph): جب خشک ٹھنڈی ۱۰۲ جسم کو لگنے سے کھانسی ہو۔ چلتے وقت بہتری ہوتی ہے۔ جسم کے نہ ڈھانچے پر کھانسی ہو۔ سینے کی کمزوری 'پریشانی' بیضی ہوتی آواز والا سنناہٹ والا نفس۔

پتھرولیم (Petroleum): کھانسی رات کے وقت بہتر ہو جائے لیکن دن کے دوران بہتری ہو جب کہ اسال لاحق ہوں۔

سینگوالی نیریا کین (Sanguinaria Can): سوزش کے بعد خشک اور مرطوب کھانسی 'ورم ترخہ والی کھانسی جو کہ صغیرہ میں اور چھاتی کے اوپر والے حصہ میں گدگدی کے ساتھ ہوتی ہے۔ کھانسی مریض کو رات کے وقت بیدار کر دیتی ہے۔ کھانسی اس وقت تنگ نہیں رہتی جب تک کہ مریض اٹھ کر بیٹھ نہ جائے اور ہوا خارج نہ کرے۔

کیپسکیم (Capsicum): کھانسی جس کے ساتھ جسم کے فاصلے فاصلے کے حصوں میں درد ہو اور سانس متعفن ہو۔ لوگوں کے لئے کمرے میں بیٹھنا ناممکن بنا دے۔ سانس کی پٹی کے باعث 'گندی بو' والی ہوا تیزی کے ساتھ گھنچڑوں سے خارج ہوتی ہے۔ 2000 طاقت کی خوراک دیجئے اور ہر بارہ یا پندرہ گھنٹوں کے بعد دہرائیئے۔

میفاٹس (Mephites): ہر صبح کھڑکھاہٹ والی کھانسی ہو۔ جب بلند آواز میں بولے یا پڑھے تو کھانسی ہو۔ کھانسی کے ہر دورے کے دوران پیشاب اور پاخانہ خطا ہو جائے۔

اناکارڈیم (Anacardium): کھانے کے بعد کھانسی 'بو اور ذائقہ کھو جائے۔ کھانسی اور تے کے ہر دورے کے بعد زور دار ڈکار آتے ہیں۔

نیٹرم میور (Natrium Mur): پیشانی میں درد سر کے ساتھ کھانسی ہوتی ہے۔ پیشاب بلا ارادہ خطا ہو جاتا ہے۔ نیز جگر کے علاقہ میں ٹانگے لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ کھانسی کے ساتھ آنسو

ہتے ہیں۔

ایلیم سیپا (Allium Cepa): حنجرہ میں گد گدی کے باعث کھانسی ہو۔ متواتر کھٹکھٹانے کا رجحان تاکہ گد گدی سے پھٹکارا حاصل ہو۔

امونیا کارب (Ammonia Carb): انفلوئنزا کے بعد کھانسی جب برائی اونیا اور دیگر ادویات ناکام ہو جائیں۔ آواز بیٹھ جانے کے ساتھ کھانسی، مریض خون تھوکتا ہے۔ گلے میں گد گدی جیسا کہ گلے میں گرد ہو۔ صبح کے 3 بجے کے قریب کھانسی ہو۔

کاسٹیکم (Causticum): بلغم چھاتی سے اوپر چڑھانے کے لئے زیادہ گہری کھانسی نہ کر سکے یا جزوی طور پر بلغم اوپر چڑھتا ہے لیکن پھر حلق میں واپس پھسل کر چلا جاتا ہے۔ پیشاب کھانسنے کے دوران اچھل کر خارج ہو سکتا ہے۔ کھانسی میں بولنے اور نزلے سے اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ ٹھنڈا پانی گھونٹ گھونٹ پینے سے یا چکیوں کے ساتھ پینے سے آفاقہ ہوتا ہے۔

کوکولیوس (Cocculus): بلند آواز کے ساتھ بولنے یا داغوں کو پرش کرنے سے کھانسی اور قے ہوتی ہے۔

ڈرو سرا (Drosera): کھانا کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد تھپی دوروں والی کھانسی۔ کیویرم میٹ (Cuprum Met): ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے کے باعث کھانسی لاحق ہو لیکن ٹھنڈا پانی پینے سے رک جائے۔ گلے میں غرغرے کی آواز کے ساتھ کھانسی ہو جیسا کہ بوتل سے پانی انڈیلا جا رہا ہو۔

سیلیشیا (Silicea): جھٹکے دار کھانسی، جس کے ساتھ ٹانگوں کا قسم کا مواد تھو کے جو کہ ڈھیلے دار، پیلا یا سبز ہوتا ہے۔ جو مائع کے اندر پیندے تک ڈوب جاتا ہے اور اس کی بو بہت گندی ہوتی ہے۔

چیلیڈونیم (Chelidonium): ہوا کی نالیوں میں گرد کے احساس کے باعث کھانسی ہو۔ اکتیار آر (Actea R): خشک پھالنے والی کھانسی، رات کے وقت اتھری ہو نیز بولنے کی ہر کوشش کے ساتھ کھانسی آتی ہے۔

اکلی فائڈیکا (Acalypha Ind): خونی بلغم کے اخراج کے ساتھ شدید خشک کھانسی، کھانسی رات کو سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔

کورلیم ریب (Coralium Rub): بچوں کا سانس کم ہو جاتا ہے اور ان کے چہروں کا رنگ ارغوانی اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ سانس کے لئے بھینٹتے ہیں۔ یہ کیفیت قے کے بعد ہو سکتی ہے۔ ہوا کی نالیوں میں برقانی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اعصابی اور چھوٹی بندوق چلنے جیسی آواز والی کھانسی۔

سٹارنم آئیوڈ 3x اور سٹیفنی میگکریا 30 (Stannum Iod 3x and Staphisagria 30):

سگریٹ نوشی کرنے والوں میں کھانسی۔

سینی گا (Senega): جب کھانسی کا اختتام پھینکوں پر ہو۔

ٹیرنٹولا ہسپانیولا (Tarentula H): کھانسی میں افادہ سگریٹ نوشی سے ہو۔ رات کے وقت لیٹ جانے پر خشک کھانسی ہوتی ہے اور صبح کے وقت اٹھنے کے بعد چھاتی میں پھاڑنے والے درودوں کے ساتھ خشک کھانسی ہوتی ہے۔

ٹرائی فولیم پی (Trifolium P): ہنگلی گھٹنے کے بعد کھانسی ہو۔

نیپتھالینم (Naphthalinum): دم گھٹنے والی یا دھچکے گھٹنے والی کھانسی۔ مریض سانس لینے کے قابل نہ رہے۔ بعض اوقات اتنی شدید ہوتی ہے کہ پیسہ برہنہ نکلتا ہے۔

انٹیم ٹارٹ (Ant Tart): جب بچہ غصہ میں بھرا ہو۔ اول بدل کر کھانسی اور ہمتائیاں لے۔
کروٹن ٹیگ (Croton Tig): جب (ایگزیمیا) کھجلی 'خارش' کے دب جانے کے باعث کھانسی لاحق ہو۔ یہ دوا اول بدل کر آنے والی کھانسی اور پھوڑے پھنسی کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے مثلاً کھانسی غائب ہو جاتی ہے جب کہ پھوڑے پھنسی ظاہر ہو جائیں اور کھانسی ظاہر ہو جاتی ہے جب کہ پھوڑے پھنسی غائب ہو جائیں۔ دسے والی کھانسی جو رات کے وسط میں یعنی آدھی رات کو آتی ہے جس کے باعث مریض گہری غیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔

یوفریزیا (Euphrasia): کھانسی جو بعض اوقات خشک ہو لیکن عموماً ڈھیلی ہو۔ دن کے دوران کھانسی میں اتھری ہوتی ہے۔ رات کے وقت تکلیف دہ نہیں ہوتی۔ خون کا ہوا غائب ہو جانے کے بعد کھانسی لاحق ہو۔

لیکٹو کا (Lactuca): درودوں میں کھانسی آئے۔ جس کے ساتھ دم گھٹنے کا احساس ہو۔

ٹیوبرکولینم بوو (Tuberculinum Bov): حیض کے ہوا کے رک جانے کے ساتھ نوجوان لڑکیوں میں کھانسی لاحق ہو۔

سکوٹلا (Squilla): خشک 'سخت کھانسی' چھینکوں کے ساتھ 'کھانسنے' کے دوران پیشاب نکل جاتا ہے۔ کھانسی کے ساتھ ضیق، نفسی، نمکین، چپکنے والا باافراط بلغم خارج ہو۔

ریو میکس (Rumex): کھانسنے وقت پیشاب خطا ہو جائے۔ مسلسل خشک 'اذیت دینے والی کھانسی' ہوا بدلنے یا کمرہ بدلنے سے اتھری ہوتی ہے۔ گلے کے گڑھے کو چھونے یا دبانے سے کھانسی میں اشتعال پیدا ہوتا ہے۔

مینگانیم (Manganum): لیٹ جانے سے کھانسی میں اتھری ہو اور ہڈیوں کی حساسیت پائی جائے۔

انٹیم کروڈ (Antim Crud): آگ میں دیکھنے سے کھانسی میں اتھری ہو۔

کو کس کیکشائی (Coccus Cacti): گاڑھے رسی دار اور پیپ دار بلغم کے ساتھ کھانسی ہو۔ یہ موسم گرما کے آخری مہینوں میں شروع ہوتی ہے اور تمام موسم سرما کے دوران جاری رہتی ہے۔ یہ ٹھنڈے موسم میں آتی ہے لیکن حقیقتاً ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈی ہوا سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ گرم کمروں اور گرم مشروبات سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ گلے میں گدگدی یا سرسراہٹ ہوتی ہے۔ تھکنی دوروں والی کھانسی، کالی کھانسی، شرایبوں کی کھانسی۔
برومیم (Bromium): گرم موسم میں لاحق ہونے والی کھانسی، یہ گرد یا گرد آلود چیزوں کو پکڑنے سے ابتر ہو جاتی ہے۔

برٹا کارب (Baryta Carb): جگر یا ہوا کی نالی میں پتھروں کے باعث مشتعل ہو جانے والی کھانسی، پیٹ کے بل لینے سے افادہ ہوتا ہے۔

آرم ٹرائی قلم (Arum Triph): سینے میں کچے پن کے احساس کے ساتھ کھانسی ہو۔ پھچھڑوں میں دھن محسوس ہو۔ ہوا کی نالی میں اور نرخرہ کی نالیوں کی لمبی شاخوں میں جلن ہوتی ہے۔

امبرا گریسیا (Ambra Grasea): جب زیادہ لوگ موجود ہوں تو کھانسی میں ابتری ہو۔ اعصابی مریضوں میں بھی موسیقی سے ابتری ہو جو کہ معدے سے ہوا دار ذکاروں کے بعد ہوتی ہے۔ اس مرض کی دیگر ادویات حسب ذیل ہیں: الیڈ سلف، آریٹکا، سیگلونی نیریا اور ورشٹرم الیبیم۔

انٹیم ٹارٹ (Antim Tart): چھپک کے نتیجہ میں لاحق ہونے والی کھانسی۔
اریلیا ریس موسا (Aralia Racemosa): رات کے دوران پہلی مختصر نیند کے بعد کھانسی کے دورے کے دوران لیٹ جانے سے ابتری ہوتی ہے۔ یہ کھانسی دوران شب لینے پر فوری طور پر آسکتی ہے۔ یہ مزید عمومیت کے ساتھ رات کے پہلے آدھے حصے کی نیند کے بعد آتی ہے۔

بسمتھ (Bismuth): جب معدہ خالی ہو تو کھانسی میں ابتری ہو۔
امونیا آرسینیکم (Ammonia Ars): نونی بلغم کے اخراج کے ساتھ کھانسی ہو۔ بلغم بدبودار ہوتا ہے۔ پیپ دار ہوتا ہے۔ ذائقہ بلغم کا میٹھا ہوتا ہے۔ بلغم سخت اور پیلا ہوتا ہے۔ دم والی کھانسی رات کے وقت ہوتی ہے۔ کھانسی مختصر اور بے قاعدہ ہوتی ہے پھر دم کھونٹنے والی ہوتی ہے۔

عارضہ قلب والی کھانسی

(Cardiac Cough)

ہائیڈرو سائیک ایسڈ (Hydrocyanic Acid): امراض قلب والی کھانسی کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ سب سے پہلے اسے آزمانا چاہئے۔
 ڈیجی ٹالس (Digitalis): شخص میں وقت کے ساتھ کھانسی ہو۔ نبض بے قاعدہ اور وقفہ دار ہوتی ہے۔ چہرہ مروکی والا چہلا پڑا ہو۔
 سپونجیا (Spongia): خشک، بھونکنے والی کھانسی جو کہ گلے میں ذات ہونے کے احساس کے باعث ہو۔ تنجرہ میں سرسراہٹ ہوتی ہے۔
 ناجا (Naja): دم گھٹنے کے احساس کے ساتھ، سانس کا پھول جانا، بھابی خشک کھانسی، دل کی تکلیفات کے باعث، چپکنے والا بلغم اور تھوک ہوتا ہے۔
 اورم میور (Aurum Mur): دل کی کھانسی۔
 اوکزالک ایسڈ (Oxalic Acid): امراض قلب والی کھانسی، معمولی سی تھکاوٹ سے لاحق ہو۔ تنجرہ میں دم گھٹنے کا احساس۔

کالی کھانسی

(Whooping Cough)

پرتوسین (Pertussin): یہ نوسوڑ ہے۔ اسے کالی کھانسی کے علاج کے آغاز میں دینا چاہئے۔ کئی کیسوں میں اس دوا کی ایک ہی خوراک مرض کو رفع کرنے کے لئے کافی ثابت ہو سکتی ہے یا پھر مرض کے دورانیہ کو کم کر دیتی ہے۔
 ڈروسیرا (Drosera): یہ دوا کالی کھانسی کے لئے تقریباً مخصوص دوا ہے۔ یہ 30 طاقت کی دوا دینی چاہئے اور پھر صرف ہر چار روز کے بعد دہرائی چاہئے۔ بعض مصنفین کا خیال ہے کہ موقع کے مطابق اس کی 3x طاقت کے 2 قطرہوں کی خوراک تین تین گھنٹوں کے وقفے کے ساتھ بھی دی جا سکتی ہے۔ بھونکنے والی کھانسی کے متواتر دورے آتے ہیں۔ جو مریض کو اپنے سانس پر قابو پانے کا موقع فراہم نہیں کرتے۔ نتیجتاً تھکتی ہوتی ہے اور جی مٹاتا ہے۔ کھانسی بیٹھی ہوئی آواز والی ہوتی ہے۔ مرنے کی بانگ کی آواز والا شخص اس دوا کا نشان ہے۔ بہت سے سوراخوں سے سیلان خون ہو مثلاً ناک، گلے، تنجرہ وغیرہ سے۔

بیلادونا (Belladonna): کالی کھانسی کے ابتدائی مرحلہ میں کھانسی خشک ہوتی ہے۔ ہر آدمی کھٹے یا کم و بیش وقت میں عود کر آتی ہے چنانچہ بیک وقت تین چار کھانسی کے حملے ہوتے ہیں۔ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ بعد والے مراحل میں ناک سے خون کا سیلان بھی ہو سکتا ہے۔

کالی کارب (Kali Carb): جب ڈرو سرا ناکام ہو جائے تو یہ دوا کالی کھانسی کے لئے مخصوص ہے۔ اس دوا کو تجویز کرنے کے لئے مخصوص علامت یہ ہے کہ آنکھ کے اوپر والے پونے اور آنکھ کی پلکوں کے درمیان تھیلی کی صورت کی سوزش ہوتی ہے۔

ایپیکاک (Ipecac): جب تے کے ساتھ شدید کھانسی ہو تو اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ یہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ بچہ کا چہرہ نیلا پڑ جاتا ہے۔ چھلپے بلغم کا اخراج باقربا ہوتا ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): مرض کے آخری مراحل میں جب ناموافق نتیجہ کا خدشہ ہو۔ ایسے کیسوں میں اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ سخت رنگاری رنگ والا یا چمک دار سرخ اور جھاگ دار بلغم خارج ہوتا ہے۔ آواز بیٹھ جاتی ہے۔ آواز نکھو جاتی ہے اور حلق میں گدگدی ہوتی ہے۔

میفاٹس (Mephites): سخت کھانسی، تھیلی دوروں والی کھانسی کی آواز (کھوں کھوں) کے ساتھ۔ رات کے وقت اور لیٹ جانے پر بتری ہوتی ہے۔ دم گھٹنے کا احساس، بچہ سانس باہر نہیں نکال سکتا۔ بعض اوقات اس کے بعد ہنسنے بھی لگتے ہیں۔ بلغم چھاتی کے اوپر والے حصہ میں کھڑکھڑاتا ہے۔ اس دوا کے استعمال سے بعض اوقات مریض اتر ہو جاتا ہے لیکن حقیقتاً یہ حالت مرض کے دورانیہ کو مختصر کرنے کے لئے ہوتی ہے (کھانسی بہت شدید ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہر حملہ مریض کی زندگی کو ختم کر دے گا۔ نژادی علامات موجود نہیں ہوتیں چنانچہ بہت تھوڑا بلغم خارج ہوتا ہے یا بالکل بھی نہیں ہوتا۔

کورالیم ریب 6 (Corallium Rub 6): کھانسی شدید ہوتی ہے۔ سچے اپنا سانس ڈھیلا پھوڑ دیتے ہیں چنانچہ ان کے چہرے کا رنگ ارغوانی اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ ہوا کے لئے جھپٹتے ہیں اور اس کے بعد تے ہو سکتی ہے۔ ہوا کی تالیوں میں برفانی ٹھنڈک پائی جاتی ہے۔ اعصابی اور چھوٹی بندوق کی آواز والی کھانسی۔ سانس لینے میں ہوا ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے۔ کھانسی سے قبل دم گھٹنا اس دوا کی رہنما کن علامت ہے۔

کیوپرم میٹ (Cuprum Met): سانس میں رکاوٹ پیدا ہو جانے یا سانس بند ہو جانے کے ساتھ کھانسی لاحق ہو۔ اس میں چہرے کا نیلا پڑ جانا اور سقے پانی جاتی ہے۔ انگلیوں کے ناخن بے رنگ ہو جاتے ہیں اور آنکھیں پٹ جاتی ہیں۔ بچہ کھانستا ہے حتیٰ کہ اپنے تنفس کو ڈھیلا پھوڑ دیتا ہے اور بے ہوشی والی حالت میں لیٹ جاتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے کے باعث

کھانسی ہوتی ہے جبکہ ٹھنڈا پانی پینے سے بہتری ہوتی ہے۔ شدید دورے ہوتے ہیں۔ جن میں ٹھنڈے پانی سے اتفاق ہوتا ہے۔ مریض کو انگونھے اور منھیاں بچھنے کے ساتھ کھینچنے لگتے ہیں۔

ایلیم سیپا (Allium Cepa): قے کے ساتھ بچوں میں کھانسی 'بد ہضمی' 'اچھارہ اور بدبودار ہوا' کا اخراج ہوتا ہے۔

کوکس کیکٹائی (Coccus Cacti): کالی کھانسی جس میں صبح کی وقت بہتری ہوتی اور جس کا اختتام رسی دار شفاف بلغم کی قے سے ہوتا ہے۔ یہ بلغم منہ سے تاروں کی شکل میں نکلتا ہے۔ کالی بالی میں بھی تار دار بلغم ہوتا ہے لیکن وہ رنگ میں زرد ہوتا ہے اور اتنا شفاف نہیں ہوتا جتنا کوکس کیکٹائی میں ہوتا ہے۔

سینیگا (Senega): شام ہوتے ہوتے کھانسی آئے جس کے ساتھ انڈے کی سفیدی جیسا سخت اور شفاف بلغم خارج ہوتا ہے۔ مریض سینے پر کھینچنے والا بوجھ محسوس کرتا ہے۔

نیٹرم میور (Natrurn Mur): جب کھانسی (کالی) کے ساتھ آنسو بہتے ہوں۔
نپتھالین (Naphthalin): دھچکوں والی کھانسی 'سانس لینے کے قابل نہ ہو۔ بعض اوقات اتنی شدید ہوتی ہے کہ مریض کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ حملے اچانک آتے ہیں اور دیر تک رہتے ہیں۔ گلے کی کھچاوت بہت نمایاں ہوتی ہے۔ (مستورات میں اضطراری کھانسی)۔
ٹارنٹولا کیوب (Tarentula Cub): کالی کھانسی کے لئے حیرت انگیز دوا ہے۔

مستورات میں اضطراری کھانسی


(Reflex Cough in Females)

سنی شیو اورینس (Seneciog Aurans): حیض کی بندش کے باعث کھانسی ہو۔
سیپا (Sepia): جب کھانسی پیڑ میں سے اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ نمکین بلغم خارج ہو۔
ملی ٹولیم (Millefolium): حیض دب جانے کے باعث یا سیلان خون کے دب جانے کے باعث کھانسی لاحق ہو۔

اکٹیاریس موسا (Actea Racemosa): خشک تھکا دینے والی کھانسی۔ جس میں رات کے وقت بہتری ہو اور جس کے ساتھ اندام نہانی کے اعضاء میں بہت زیادہ حساسیت ہوتی ہے۔
امبرا گریشیا (Ambra Grisea): رچی کمزوری کے ساتھ جب معمولی بذیات بھی کھانسی اور حیض کو بڑھا دیں۔

اپیس میل (Apis Mel): سن بلوغ کو پہنچنے پر بھونکنے والی کھانسی لاحق ہو۔ دائیں جانب کے

بیضہ دان کی حساسیت کے ساتھ اضطرابی کھانسی۔
 وائی برنم اوپولس (Viburnum Opulus): حمل میں کھانسی لاحق ہو۔ جو ۱-قسط حمل کا
 باعث بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دوا ۱-قسط حمل کو روکے گی۔
 کالی یا ٹیکرو میکم (Kali Bich): حمل میں کھانسی۔
 میڈورنیم (Medorrhinum): آتشک کے ساتھ یا آتشک کے باعث کھانسی ہو۔



دل اور خون کی نالیوں کا مرض

(Disease of Heart & Blood Vessels)

شریانوں (خون کی نالیوں) کی پھیلاوٹ

Aneurism (Dilatation of Arteries)

بریٹا کارب (Baryta Carb): بائیں جانب لیٹنے سے دل کی دھڑکن شدید ہو جاتی ہے جو دیر تک رہتی ہے۔ چھوٹے سانس کے ساتھ چھاتی میں بھراؤ ہوتا ہے۔ خصوصاً اوپر چڑھتے وقت سانس لیتے ہوئے چھاتی میں ٹانگے لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ کمر میں تنگیں ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے جیسا کہ دوران خون رک گیا ہو۔ نیچے دی گئی دو ادویات کی تکمیل کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ جس سے شفا یقینی اور مکمل ہوتی ہے۔

کاربو انیمالیس (Carbo Animalis): سینے کا پھیل جانا جس کے باعث آواز نکلو جاتی ہے۔ تیز جھلن دار ٹانگے لگنے جیسے درد چھاتی میں ہوتے ہیں جو کہ چلنے سے اتر ہو جاتے ہیں۔ IM ڈاک کی لیوشن دیجئے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): خون کی نالیاں پھیل جاتی ہیں۔ جس کے باعث گوشت میں کمی ہوتی ہے۔ ہونٹوں میں دھکن ہوتی ہے۔ اچھارے اور قبض کا رجحان ہوتا ہے۔

انجائنا (Angina Pectoris)

ایمل نائٹریٹ (Amyl Nitrate): حادثے میں جبکہ دل کا عمل تیز اور ہنگامہ خیز ہوتا ہے۔ سر کے گرد بٹی بندھی ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ دل میں کھنچاؤ ہوتا ہے اور تنفس میں تکلیف ہوتی ہے۔ چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ کمزوری اور لرزہ بازوؤں اور ٹانگوں میں ہوتا ہے۔ پریشانی اور تشویش ہوتی ہے۔

کیکس (Cactus): دل کے عضوی امراض میں جن کے نتیجے میں سینے کا انجائنا لاحق ہوتا ہے۔ جبکہ دل میں اینٹھن، کھنچاؤ اور اجتماع خون ہوتا ہے۔ دھڑکن بے قاعدہ ہوتی ہے اور

نفاست ہوتی ہے۔

گلوٹائین (Glutamine): جبکہ تمام جسم میں تپکن ہوتی ہے جس کے ساتھ درد کی لہریں دل سے نکلتی ہیں۔ دل کی پھڑپھڑاہٹ کے ساتھ تنفس میں وقت ہوتی ہے۔

کرائٹائیکس (Crataegus): چھاتی کی بائیں جانب میں اچانک اور خوفناک قسم کا درد ہوتا ہے۔ جس کی لہریں دل پر اور بائیں بازو میں جاتی ہیں۔ مایوسی ہوتی ہے اور موت کا خوف ہوتا ہے۔ مدر جگر کے پانچ قطرے پانی میں ملا کر ایک خوراک کے طور پر کھانے کے ساتھ یا کھانے کے فوراً بعد دیئے جائیں۔ دل کے تمام امراض کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔

لیکیسس (Lachesis): اکڑن والے درد جن کے ساتھ غشی ہوتی ہے۔ معمولی پریشانی کے ساتھ دل کی دھڑکن اور تنفس میں دھچکے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دل ایک دھاگے سے باندھ کر ٹکایا گیا ہو چنانچہ ہر دھڑکن اسے توڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ دل کے علاقے میں ٹانگے لگتے ہوں (یعنی ٹانگے لگنے والا درد ہوتا ہے)۔

ناجا (Naja): دل کے علاقے میں شدید درد ہوتا ہے جو گردن کے گڑھے تک پھیل جاتا ہے نیز بائیں کندھے اور بائیں بازو تک جاتا ہے۔ جس کے ساتھ پریشانی اور موت کا خوف ہوتا ہے۔ پھڑپھڑاہٹ اور دل کی دھڑکن ہوتی ہے۔ نبض ست اور بے قاعدہ ہوتی ہے۔

اکونائٹ (Aconite): دل کے لئے مفید دوا ہے جبکہ ذہنی پریشانی، موت کا خوف، دل کا ہوا اور دل کی دھڑکن پائی جائے۔ بائیں بازو میں سن ہو جانے کی کیفیت اور انگلیوں میں جھنجھناہٹ ہوتی ہے۔

آر سینیکم البم (Arsenicum Alb): انجانا کے لئے یہ ایک بہت اچھی دوا ہے۔ شدید اور ناقابل برداشت دل کی تپکن اس دوا کی نمایاں علامات ہیں جبکہ مریض کمر کے بل لیٹا ہو۔ خصوصاً دن کے بارہ بجے کے بعد دل کی چکنائی کی تیزی اور دل کے پردوں میں پانی کا بھر جانا ہے چینی اور استسقاء پائے جاتے ہیں۔

سپائی جیلیا (Spigelia): دل کی دھڑکن اور دل میں تیز قسم کے ٹانگے لگنے کے سے درد، نبض کمزور اور بے قاعدہ ہوتی ہے یا بھرپور اور چھلانگیں لگانے جیسی ہوتی ہے۔ جس میں حرکت سے اضافہ ہو جاتا ہے۔

مگنیشیا فاس (Magnesia Phos): یہ دوا انجانا کے حملوں میں کمی کرتی ہے اور دردوں کو رفع کرتی ہے۔ 6x کو گرم پانی میں ملا کر دیجئے۔

می سی فوگا (Cimicifuga): شدید قسم کے درد ہوں جبکہ دل کا فعل اچانک رک جائے اور مریض بے ہوش ہو جائے۔ نبض کمزور اور باریک ہوتی ہے۔

شریانوں کی دیواروں کی سختی

(Arterio -Sclerosis)

برٹا میور (Baryta Mur): جب خون کی بڑی تالی اور طے ملوث ہوں تو یہ چوٹی کی دوا ہوتی ہے۔ رات کے وقت لیٹے سے شدید درد سر میں ابتری ہوتی ہے۔

آرنیکا ایم (Arnica M): دماغ کی شریانوں کی دیواروں کی سختی لاحق ہو۔ عمر رسیدہ لوگوں کو چکر آئیں۔ سیان خون کا رتخانہ۔

پلمبم (Plumbum): بلند پریشر اور شریانوں کی دیواروں کی سختی 'نبض تار کی طرح ہاریک ہو۔ مزمن ورم گرد۔

اورم میور (Aurum Mur): دل کا بڑھ جانا چھاتی اور سر میں احتجاج خون 'مضبوط دل کی دھڑکن۔ یہ دوا سر کی شریانوں کے ساتھ خاص تعلق رکھتی ہے۔

اورم میٹ (Aurum Met): مزمن گٹھیا کے باعث اٹھانے کا درد لاحق ہوتا ہے۔ جو ایک جوڑے سے دوسرے جوڑے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ حرکت سے اور دل کی دھڑکن کے ساتھ دل ہلتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ کیفیت مریض کو رکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔

ارگوٹن (Argotin): شریانوں کی دیواروں کی سختی کے مرض کے آغاز میں دب قلبی تپان اور دل کی سخت قسم کی آوازیں موجود ہوتی ہیں۔ شریانوں کی دیواروں میں سختی ہوتی ہے اور تنزیل یا تھابی ہوتی ہے۔ نشی دوروں والی اینٹھن۔ خون کی ٹالیوں میں ان کی سختی کے ساتھ ہو۔

سٹروفینٹھس (Strophanthus): بڑھاپے میں شریانوں کی دیواریں سخت ہو جائیں۔ چکنائی میں بگاڑ پیدا ہو جائے اور اس کی طانی میں ٹاکائی ہو۔ استقاء میں اضافے کا رتخانہ۔

ایڈرینالین (Adrenaline): شریانوں کا بلند فشار خون 'بلند فشار خون کے باعث کاتوں میں گر جن ہو۔

آرسینک آئیوڈ (Arsenic Iod): یہ دوا دل کے تمام امراض کے لئے مخصوص ہے۔ دل کی دھڑکن کے ساتھ نبض ست ہوتی ہے۔ مریض کا سانس گرم ہو جاتا ہے۔ میڑھیاں نہیں

چڑھ سکتے۔ دل کے والوؤں (Valves) کے جوڑے کی خرابی 'اذیت ناک درد کے ساتھ 'والوؤں کے جوڑوں کی سکڑن 'کھانا کھانے سے آدھا تھنہ قبل 3x کی خوراک دن میں دو مرتبہ روزانہ دینی چاہئے۔ جس کے ساتھ دیگر نشاندہی کی گئی دوا دیجئے۔ دل کے تمام امراض میں اس دوا کو دیگر نشاندہی کی گئی تمام دواؤں کے ساتھ دینا چاہئے۔

سپاگی جیلیا (Spigelia): دل کی سوزش کی نشاندہی کرنے والی یہ ایک دوسری اہم دوا ہے۔

جو دل کی اندرونی اور بیرونی دونوں قسم کی بھیلیوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ والوؤں کے جوڑ کی خرابی جو کہ شراب نوشی کے باعث ہو۔ آنکھوں کے سامنے چنگاریاں اڑنا اس دوا کی مضبوط علامت ہے۔ دل میں درد ہوتا ہے۔ غنودگی ہوتی ہے، سر میں شور ہوتا ہے اور بڑھی ہوئی اعصابیت ہوتی ہے۔ حلق میں دم گھسنے کا احساس ہوتا ہے۔ سونے کی نااہلیت ہوتی ہے۔

فشار خون — بلند — (Hypertension)

(Blood Pressure - High)

(تیز دیکھنے "شریانوں کی دیواروں کی سختی")

لکیسیس (Lachesis): بلند فشار خون کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ مریض چلتے وقت اترتا ہے۔ مرض میں اضافے کے باعث سو جاتا ہے۔ بے چینی ہوتی ہے۔ پست کپڑوں کو برداشت نہیں کر سکتا انہیں ڈھیلا کرنا چاہتا ہے۔ یہ دوا سب سے پہلے دینی چاہئے اور یہ اکثر کیسوں میں مدد دے گی۔ IM طاقت کی دوا دیکھئے۔

اورم میٹ (Aurum Met): جب غصہ بڑھ جانے یا آزدگی کے باعث بلند فشار خون لاحق ہو۔ بہت زیادہ حساسیت، سر میں گر جن ہو، پتھر آئیں، شدید قسم کا درد سر ہوتا ہے۔ موت کا خوف لاحق ہو، دل کی دھڑکن پائی جائے، ناامیدی اور مایوسی ہوتی ہے۔

اکونائٹ (Aconite): دل کی دھڑکن ہوتی ہے۔ بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ جسم گرم ہوتا ہے۔ دل کے علاقے میں گولی لگتے جیسے درد ہوتے ہیں۔ گھنجھن بہت کے ساتھ بے ہوشی ہوتی ہے۔ نبض بھر پور طاقتور اور سخت ہوتی ہے۔

اسٹیم سیٹی وا (Allium Sativa): پر گوشت مریضوں کے لئے موزوں دوا ہے جو بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ خصوصاً سبزیوں کے علاوہ غذائیں کھاتے ہیں۔ خون کی ٹالیوں کو پھیلائے والی خصوصیات اس مرض میں ہوتی ہیں۔ فشار خون میں تبدیلی پیدا کرنے والی دوا ہے یا خون کے دباؤ کو گرانے والی دوا جو 20 سے 40 قندروں کی خوراک لینے کے بعد عموماً 30 سے 45 منٹ کے اندر عموماً خون کے دباؤ کو گرانا شروع کرتی ہے۔

سٹروفینٹھس (Strophanthus): عمر رسیدہ لوگوں میں دل کی تکالیف کے لئے یہ ایک مفید دوا ہے۔ ایسے مریضوں میں دل کے امراض کا انحصار گردوں کے امراض پر ہوتا ہے۔ دل میں بچان ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ خون کی شریانیں اکڑ جاتی ہیں اور پیشاب کا آزادانہ اخراج ہوتا ہے۔ سکڑاؤ میں اضافہ کرتی ہے اور دل کی تیزی کو مدہم کرتی ہے۔

پلمبم میٹ (Plumbum Met): قبض اور بزدلی کے ساتھ بلند فشار خون۔

نیٹرم میور (Natrum Mur): یہ دوا بلند فشار خون کو گھٹاتی ہے۔ ایسے مریضوں میں جنہیں نمک کی طلب رہتی ہے اور وہ بہت زیادہ غلامند رہتے ہیں۔ غصے کے دب جانے کے باعث۔ 200 طاقت کی دوا یا اونچی طاقت کی دوا دیتے۔

کاربو انیمالس (Carbo Animalis): چاند میں خودی قسم کا درد سر ہونے کے ساتھ بلند فشار خون لاحق ہو۔

جلی میم (Celsmium): بری خیر سننے کے باعث اچانک صدمہ پہنچنے سے بلند فشار خون لاحق ہو۔ IM ذاتی لیوٹن دیتے۔

اگنیٹیا (Ignatia): جذبات کے باعث 'محبت میں ناکامی کے باعث بلند فشار خون لاحق ہوتا ہے۔ نیز یا غم کے باعث۔ 200 ذاتی لیوٹن دیتے۔

گلوٹائین (Glonoine): کالی و سستی 'کام کی طرف رغبت نہیں ہوتی' مخالفت کے باعث اور درد سر کے باعث جو سر میں اجتماع خون کے باعث ہوتا ہے۔ ایجان اور جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ سر اور دل کی طرف خون کا اثر ہوا ہوتا ہے۔ تپکن والے درد ہوتے ہیں۔ دل پھڑپھڑاتا ہے۔ قبض ہوتی ہے جس کے ساتھ خاموش والی ہوا سیر ہوتی ہے۔

برٹا میوری ٹیکم (Baryta Muraticum): عمر رسیدہ لوگوں میں شریانوں کی دیواروں کی سختی اور دماغی تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں۔ پتھر آتے ہیں اور کانوں میں شور ہوتا ہے۔ نبض کا تھکا ہوا جاتا ہے۔ ہریلا ٹھنڈا جسم ہوتا ہے۔ فالج کے ساتھ۔ دل کی ٹالیوں کی پھیلاوت اور درم زرخہ کی تکالیف کے ساتھ خون کی شریانیں موٹی ہو جاتی ہیں۔ یہ کیفیت بوڑھے اشخاص میں ہوتی ہے۔

ورٹرم ورائینڈ (Veratrum Viride): خون سے بھرتے ہوئے کثرت دم والے مریضوں میں جو کہ جھجھکاو ہوتے ہیں۔ تقاضا ہوتی ہے۔ اجتماع خون کی علامات کے ساتھ نبض سخت اور بھرپور ہوتی ہے۔

بیلادونا (Belladonna): شدید قسم کی دل کی دھڑکن 'سر میں پر مشقت تھکن کے ساتھ طویل گونج دار آواز ہوتی ہے۔ معمولی تھکاوٹ سے دل دھڑکنے لگتا ہے۔ سارے جسم میں تپکن ہوتی ہے۔ جلد خون سے سرخ اور گرم ہوتی ہے۔ پریشانی یا خوف ہوتا ہے 'پاس نہیں ہوتی۔ بائیں جانب یا پیچھے کی طرف گرنے کے ساتھ چکر آتے ہیں۔ چھوٹے سے 'شور سے' بچنے سے اور لیٹنے سے اتری ہوتی ہے۔

آرسینک البم (Arsenic Alb): آنکھیں پھول جانے کے ساتھ اور پاؤں سوچ جانے کے ساتھ بے چینی ہوتی ہے۔ تھکن میں وقت ہوتی ہے۔ رات کے وقت لیٹنے پر دم گھٹتا ہے۔

سیڑھیاں چڑھنے سے اجڑی جاتی ہے۔

تھوجا (Thuja): بلند فشار خون لاحق ہو۔ خاص طور سے شریانوں کی کمزور دیواروں کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے۔ ذاتی اور خاندانی تاریخ، خون میں لو تھڑوں کو ظاہر کرتی ہے۔
ایڈرینالین (Adrenaline): شریانوں کا بلند فشار خون، بلند فشار خون کے ساتھ کانوں میں گرجن ہوتی ہے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): یہ دوا ایسے بھجانی اشخاص کی نشاندہی کرتی ہے۔ جو یورک ایسڈ کی تکالیف میں مبتلا ہوں۔ اس کے ساتھ ان کی جلد پر کھٹی رنگ کے بھورے دھبے ہوتے ہیں۔ مٹھائیوں کی طلب ہوتی ہے۔ گیس پریٹ میں گھومتی رہتی ہے۔ جس میں شام 4 بجے سے 8 بجے تک اجڑی ہوتی ہے یا پھر صبح سویرے اجڑی ہوتی ہے۔ حرکت سے اتفاق ہوتا ہے۔

نیٹرم میور (Natrium Mur): نمک کی طلب کے ساتھ گرم دھوپ میں غشی ہوتی ہے۔
چائنا آف (China Off): غنودگی ہوتی ہے۔ بے ہوشی ہوتی ہے۔ دل اچھلتا ہے۔ جو چیز بھی کھائے گیس میں بدل جاتی ہے جو اوپر یا نیچے کو حرکت نہیں کرتی۔ کانوں میں شور ہوتا ہے۔ رطوبات زندگی ضائع ہو جاتی ہیں۔

سپیا (Sepia): ہلکے زردی مائل رنگ کے ساتھ آنکھوں کے نیچے گہرے نلکے، سارے جسم میں چمکن ہوتی ہے۔ ننھی چیزوں کی خواہش، شدید ورزش سے اتفاق ہوتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد معدے کے اوپر والا حصہ بالکل خالی محسوس ہوتا ہے۔ کھٹی رنگ کے دھبے ہوتے ہیں۔ زندگی سے اور اپنے پیاروں سے یک سو جائے۔

کاربو ویج (Carbo Veg): کمزوری ہو اور ہیٹ کے اوپر والے حصہ میں اچھا رہو۔
ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): ایسے اشخاص کے لئے اس دوا کو بطور عمل انگلیز دوا کے استعمال کرنے کے متعلق سوچنا چاہئے، جن کی صحت ضائع ہو رہی ہو۔

کلکیریا فاس (Calcarea Phos): تیزی سے بڑھتے ہوئے نوجوان اشخاص کے لئے جو تھکن کا شکار ہوں۔ اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

وسکم البم (Viscum Alb): نبض ست اور کمزور ہوتی ہے۔ جوڑوں کا درد اور گٹھیا اور اعصابی درد اور انگڑی کا درد ہوتا ہے۔ کانوں میں گنگناہٹ اور کان بند ہو جانے کا احساس، چکر مسلسل آتے ہیں۔ دل پر وزن ہوتا ہے اور دباؤ ہوتا ہے جیسا کہ کوئی دل کو بھینچ رہا ہو۔ مریض لینے کے قابل نہیں ہوتا۔ موسم سرما میں اور ٹھنڈے طوفانی موسم میں اجڑی ہوتی ہے۔

جلسی میم (Gelsemium): دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہوتی ہے۔ دل دھڑکتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دل دھڑکنا بند کر دے گا۔ بشرطیکہ مریض حرکت نہ کرے۔ نبض متواتر نرم اور

کمزور ہوتی ہے۔ دم گھٹتا ہے، پھیپھڑوں کا فالج ہوتا ہے۔

شریانوں میں خون کے لو تھڑوں کا جمننا

(Coronary Thrombosis)

مرکبوریس (Mercurius): دل کی کمزوری جیسا کہ مریض مر رہا ہو۔ مریض دل کی کپکپاہٹ کے ساتھ جاگتا ہے اور مضطرب ہوتا ہے جیسے کہ خوف زدہ ہو۔ دل کی چوٹی پر درد ہوتا ہے جو اوپر کی جانب پھیلتا ہے۔ دل کی ٹالیوں میں دباؤ ہوتا ہے، خوف کے ساتھ دھڑکن ہوتی ہے۔ رات کے وقت اور تھوڑی سی تھکاوٹ کے ساتھ اتری ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ کھانسی ہوتی ہے اور خونی بلغم خارج ہوتا ہے۔

میڈورینم (Medorrhenum): چھاتی میں دباؤ کے باعث سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ دل میں پھڑپھڑاہٹ ہوتی ہے اور دل میں جکین والا درد ہوتا ہے۔ دل کی چوٹی پر حاد جلد جلد ہونے والا دھندلا تیز درد ہوتا ہے۔ حرکت سے اتری ہوتی ہے۔ دل میں جلن ہوتی ہے۔ جو کمر تک اور بائیں بازو تک پھیل جاتی ہے۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): دھڑکن حتیٰ کہ بستر میں بھی ہو۔ مریض رات کے وقت پریشان ہوتا ہے۔ بستر پر کروٹیں بدلتا ہے۔ کھانے کے بعد اتری ہوتی ہے۔ کھانا ہضم ہونے کے دوران اتری ہوتی ہے۔ دل کا فعل دبا ہوا اور غیر واضح ہوتا ہے۔ پیشاب میں البیومن (اندڑوں کی سفیدی کی طرح کا مادہ) خارج ہوتا ہے۔ سینے میں اینٹھن اور کھنچاؤ ہوتا ہے۔ مریض سانس نہیں لے سکتا۔ چھوٹی پسلیوں کے نیچے ٹانگے گٹنے جیسے درد ہوتے ہیں۔

لیلیئم ٹگریری نم (Lillium Tigrinum): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے دل کو کسی ٹکٹے میں جکڑا گیا ہو یا بھینچا گیا ہو۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ سارا خون دل میں چلا گیا ہو۔ جو کہ مڑ کر دوہرا ہونے کا احساس پیدا کرتا ہے۔ سیدھا چلنے کی نااہلیت۔ یہ احساس کہ دل کو شدت کے ساتھ مٹھی میں لیا گیا ہو۔ پھر اچانک چھوڑ دیا گیا ہو۔ دل میں اگلنے بدلنے والی کھنچاؤت، دل میں تقریباً مستقل درد دوڑتا رہتا ہے۔ کھانے سے اتری ہوتی ہے۔ خواہ بہت تھوڑا ہی کھایا گیا ہو۔ متواتر دھڑکن اور تشویش۔

آرنیکا (Arnica): مریض رات کے وقت دہشت کھاتا ہے۔ موت کا خوف اچانک لاحق ہو جائے۔ صدمہ، جسم کے اوپر خراشوں والی دکھن کا احساس ہو۔ چارحیت یا ناگواری، آرنیکا کی خصوصیت ہے۔ جسم ٹھنڈا اور سرگرم ہوتا ہے۔ آرنیکا دل کی ٹالیوں کے امراض کے لئے مفید دوا ہے۔ مریض اکیلا رہنا چاہتا ہے۔ ہر قسم کی چیزوں کا تصور کرتا ہے۔ رات کے وقت دہشت

کھاتا ہے۔ مرنے کا اچانک خوف ہوتا ہے۔ جو رات کے وقت اکثر آتا ہے۔ مریض بے چین ہوتا ہے۔ تھوڑا اور کھچاؤ زیادہ مشقت یا تھکاوٹ سے ہوتا ہے۔ آرنیکا متاثرہ حصوں کو افاقہ دیتی ہے اور شفا یاب کرتی ہے۔

سکیل کورنوتوم (Secale Cornutum): سکیل میں بازوؤں اور ٹانگوں کا سن ہو جانا اور ٹھنڈا پڑ جانا ہوتا ہے۔ انجائنا کا درد اور بلند فشار خون ہوتا ہے۔ سینے میں سوراخ کرنے والے درد ہوتے ہیں۔ سینے میں نرمی پائی جاتی ہے۔

دل کی جھلی کی سوزش — (Endocarditis)

(Inflammation of the Lining Membrane of the Heart)

اکوناٹ این (Aconite N): سینے میں ٹانگے لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ مریض کو پریشانی اور بے چینی ہوتی ہے نیز بخار آتا ہے۔

سپلیا جیلیا (Spelia): دل کے علاقہ میں دھڑکن اور بے چینی کے ساتھ تیز کوئی لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔

لیکسیس (Lachesis): دل کے علاقہ میں ناسوری درد ہوتے ہیں۔
کالمیا لینی فولیا (Kalmia Lat): جوڑوں کے گھٹنیا کے ساتھ جب دل کی بھلی کی سوزش لاحق ہو۔ جگہ بدلنے والے درد ہوتے ہیں۔

گن پائوڈر (Gunpowder): خون کی سمیت میں 3x ٹرائی ٹوریشن دیجئے۔

ناجا (Naja): حاوہ حالت کے بعد والوں کی تکلیف رہنے کے باعث۔

امراض قلب (عمومی)

Heart Diseases--- (In General)

ڈیجی ٹلیس (Digitalis): نبض بھرپور ہوتی ہے۔ بے قاعدہ ہوتی ہے۔ شروع میں بہت سست ہوتی ہے اور ہر تیسری پانچویں اور ساتویں دھڑکن وقفہ دار کمزور ہوتی ہے۔ مریض محسوس کرتی ہے کہ اگر اس نے حرکت کی تو دل کی دھڑکن رک جائے گی۔ دل کے امراض کے باعث استفادہ سانس بھاری ہو۔ جس میں لینے میں اتھری ہوتی ہے۔ خون کی کمی کے ساتھ دل ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ سستی، غشی، تھکاوٹ اور استہدار جہ کی نشاہت ہوتی ہے۔ وبہشت ناک خواب آتے ہیں اور معدے میں ڈوبنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ خوف ہوتا ہے کہ مریض اگر سو گیا تو دم گھٹ جائے گا۔

سنورفین تھس (Storphanthus): یہ دوا دل کے بھیل جانے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ دھڑکن اور خون کی کمی پائی جاتی ہے۔ شراب، تمباکو اور چائے کے باعث دل کی فعالیت میں رکاوٹ پیدا ہو۔ پیچھڑوں کی سوزش کے ہمراہ ضیق النفسی ہوتی ہے نیز / یا پاؤں کی سوزش ہوتی ہے۔ یہ دوا قے، کھانسی، پیچھڑوں سے سیلان خون اور استسقاء کو بھی شفا دیتی ہے۔ بشرطیکہ دل کے امراض کے باعث یا دل کے امراض کے ساتھ۔ دل میں خلی بغیر کھنچاؤ کے ہوتی ہے۔

لاروسیراسس (Laurocerasus): ڈیجی ٹیلیس کے غلط استعمال کے باعث دل کا ٹیل ہو جاتا۔

کولن سونیا (Collinsonia): غشی کے دوروں کے ساتھ دل کے امراض نیز دباؤ تھس میں وقت کے دوروں کے ساتھ، خونی بواسیر بھی ساتھ میں ہوتی ہے۔ جب سیلان خون رک جاتا ہے تو دل کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔

ایپو سائمنم (Apocynum):

امراض قلب کے باعث استسقاء Tricuspid, Regurgitation -

لائیکوپس ویرگ (Lycopus Virg): دھڑکن، نبض ست، اوپر کو چڑھنا مشکل ہو جیسا کہ میٹھیوں وغیرہ پر۔

کیکٹس جی (Cactus G): دل کے کھنچاؤ اور دل کی عام کمزوری نیز تھابت کے ساتھ انجام کا درد ہوتا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے جیسے دل کو کسی آہنی ہاتھ سے بل دے کر ٹک سے ٹک کر کیا جا رہا ہو۔ دل کا سکڑاؤ اور اجتماع خون جس کے ساتھ سر کی طرف خون کا اثر دھام ہوتا ہے نیز بازو اور ٹانگیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ جسم میں چھاتی میں اور دل میں غیر معتدل دوران خون ہوتا ہے۔ دل کی تالیوں میں کھنچاؤ کے ساتھ سکڑاؤ ہوتا ہے۔

بویستا (Bovista): چھاتی میں دباؤ اور دھڑکن کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد یا حیض کے دوران دل بہت بڑا محسوس ہوتا ہے۔ ان تکالیف کے ساتھ دماغ میں گہرا درد سر ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے جیسے سر بہت بڑا اور سوجا ہوا ہے۔

جلمی میم (Gelsemium): دل کے عضلات کی کمزوری جس کے ساتھ یہ احساس ہو کہ دل کی دھڑکن رک جائے گی۔ مریض جب سوئے لگتا ہے تو اس احساس کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے کہ دل کی دھڑکن رک جائے گی۔ مریض کو ضروری حرکت کرتے رہنا پڑتا ہے۔ مبادا دل کی دھڑکن رک جائے۔ نبض متواتر نرم، کمزور اور تقریباً نامعلوم ہوتی ہے۔

گرینڈولیا (Grindelia): دل کی اور پیچھڑوں کی کمزوری، مریض جیسے ہی نیند میں جاتا ہے

اچانک اس احساس کے ساتھ بیدار ہو جاتا ہے کہ جیسے سانس رک گئی ہو۔
میگنولیا (Magnolia): بھیچڑوں کے پھیلنے کی نااہلیت کے ساتھ چھاتی کا دباؤ۔ کھانا کھانے کے بعد بے چینی کا احساس ہوتا ہے۔ جب تیز چلتا ہے یا بائیں جانب لپکتا ہے تو دم گھٹنے کا احساس ہوتا ہے۔ ضیق النفسی، دل میں اینٹھن والے درد ہوتے ہیں۔ انجانا کا درد لاحق ہوتا ہے۔ دل کی ٹالیوں کی بھلیوں کی سوزش ہو، بے ہوشی کا رجحان ہوتا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے دل کی دھڑکن رک گئی ہو۔ غارش کے ساتھ دل میں درد ہوتے ہیں۔ گٹھیا والا دل۔
سکیوٹا وائروسا (Cicuta Vir): دل کا کانپنا اور دھڑکن۔ یہ احساس کہ جیسے دل کی دھڑکن رک گئی ہو۔ بعض اوقات بے ہوشی کا احساس ہوتا ہے۔
لیکیسیس (Lachesis): چٹنے پر دل کا کھنچاؤ لاحق ہو۔ چہرے کا رنگ ارغوانی ہو جاتا ہے۔ جس کے ساتھ استقاء اور جگر کا بڑھنا لاحق ہوتا ہے۔ سونے کے دوران یا سونے کے بعد اتھری ہوتی ہے۔ تکلیف میں اضافے کی وجہ سے مریض نیند سے خوف زدہ ہوتا ہے۔
فاسفورس (Phosphorus): دل کی چکنائی کی تنزی، دل پھیل جاتا ہے۔ بائیں جانب لینے سے دھڑکن میں اتھری ہوتی ہے۔
کراٹاگوس (Crataegus): متوقع دل کے فیل ہو جانے کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ غشی ہو اور مریض دھڑام سے گر جائے۔ فشار خون اور دل کے والوں کے امراض۔ دھڑکن اور دل کے فعل کی تیزی ہوتی ہے۔ انجانا کا درد ہوتا ہے۔
اورم میٹ (Aurum Met): گٹھیا والے دل کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے جبکہ درد ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ کی طرف چلتا پھرتا رہتا ہے اور آخر کار دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ یہ درد دل کے والوں (Valves) پر اثر انداز ہوتا ہے جس کے ساتھ بائیں بازو میں سن ہو جانے کی کیفیت اور جھنجھناہٹ والا درد ہوتا ہے۔ مزمن ورم شہہ رگ۔
آرسینک آئیوڈ (Arsenic Iod): دل کی ٹالیوں کی بھلیوں کی سوزش کے لئے اور دل کی استقامتی حالت کے لئے ادویات میں سے ایک دوا یہ بھی ہے۔ آنکھوں اور پاؤں میں سوجن اور عمومی سوزش بھی ساتھ میں ہو۔ دل بے قاعدہ ہوتا ہے اور نبض وقفہ دار ہوتی ہے۔
سکٹلیریا (Scutellaria): تمباکو نوشی کے باعث دل کمزور ہو جائے۔
فیزولس نانا (Phaseolus Nana): کمزور اور غیر مستحکم دل، نبض وقفہ دار اور کمزور ہوتی ہے۔ جب کوئی دوسری دوا مدت دے تو یہ دوا دل کے فیل ہو جانے میں شفا بخش ثابت ہوتی ہے۔
سیریس بون (Cereus Bon): اذیت دینے والے اور اینٹھن والے درد دل میں ہوتے

ہیں۔
لائکوپوڈیم (Lycopodium): پست فشار خون اور کمزوری کے لئے اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ منہ سے پانی بہتا ہے، اچھارہ ہوتا ہے اور پیٹ میں تکاؤ ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کمزور دل اور کمزور دوران خون اور پست فشار خون ہوتا ہے۔ دل دھڑکتا ہے حتیٰ کہ بستر میں بھی۔ کھانے کے بعد ابتری ہوتی ہے۔

ناجا (Naja): دالہوں کے جوڑوں کا کھنچاؤ جس کے ساتھ انجائنا والا درد ہوتا ہے۔ دل پر وزن محسوس ہوتا ہے۔ انجائنا کے درد گردن کے گڑھے، بائیں کندھے اور بازو تک پھیل جاتے ہیں۔ موت کا خوف لاحق ہوتا ہے۔ پست فشار خون ہوتا ہے۔

کروکس (Crocus): اس احساس کے ساتھ کہ کوئی چیز اچھل کود کر رہی ہے یا اچھلنے والے درد کی صفت کے ساتھ قابو میں نہ رہنے والے قہقہے۔ چھاتی میں اس احساس کے ساتھ کہ جیسے چھاتی میں کوئی چیز خرخر کر رہی ہے اور اچھل کود کر رہی ہے۔ ٹانگے لگتے ہیں اور صدماٹ پہنچتے ہیں۔

مرک وائیو (Merc Viv): دل کی تالیوں کی مھلیوں کے جوڑوں میں سوزش ہوتی ہے۔ زبان سفید ہوتی ہے۔ تنفس بھاری ہوتا ہے جس کے ساتھ رات کے دوران علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

اگنیشیا (Ignatia): فکر مندی کے باعث دل دھڑکتا ہے۔ IM: ایلیویشن دیجئے۔
تھائی رائیڈینم (Thyroidinum): تھائی رائیڈ غدود کے بڑھ جانے کے ساتھ دل کا درد اور دھڑکن ہوتی ہے۔ مریض سیدھا لیٹنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ ہسٹیریا یا مرگی کے دروروں کے ساتھ اعصابیت ہوتی ہے۔ بچنے والے دروروں کے ساتھ دل کا گھٹنیا، مریض لیٹنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ انجائنا والے دروروں کی شدید قسم۔

کاربو ویج (Carbo Veg): بد ہضمی یا جیت کے اوپر والے حصہ میں ہوا کے باعث دل کی تکلیف لاحق ہو۔

تھوجا (Thuja): حفاظتی ٹیکوں کے باعث یا حفاظتی ٹیکوں کی بے اعتدالی کے باعث دل کے امراض لاحق ہوں۔

آئی بیرس (Iberis): معمولی حرکت سے دھڑکن اور عدم تنفسی لاحق ہو۔ نرم اور وقفہ دار نبض، بائیں بازو کے نچلے حصہ میں درد اور بھاری پن ہوتا ہے۔ چکر آتے ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ حلق میں درم گھٹتا ہے۔ اعصابیت ہوتی ہے رات کے وقت یا صبح ہوتے ہوئے علامات میں ابتری واقع ہو جاتی ہے۔

آکزن۔ ملک الیڈ (Oxalic Acid): دھڑکن آواز کے گم ہو جانے کے ساتھ اولتی بدلتی رہتی ہے۔ کچکاہٹ ہوتی ہے، جھٹکے لگتے ہیں۔ ہوش جاتے رہتے ہیں۔ جسم اور بازوؤں اور ٹانگوں، انگلیوں اور ہونٹوں میں سن ہو جانے کی کیفیت ہوتی ہے۔ دل، ریڑھ کی ہڈی اور دماغ کی تخلیقات کے باعث بازوؤں اور ٹانگوں کا فالج، کالمے والے، گولی لگنے جیسے، ٹانگے لگنے جیسے اور پھاڑنے جیسے شدید درد ہوتے ہیں۔ تمام جسم پر دکھن اور خراشیں ہوتی ہیں۔ سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔

ایڈونس ورنیلس (Adonis Vernalis): خون کی ٹالیوں کے والوں کے جوڑوں اور شہ رگ میں خون کا رگ رگ کر چھٹا، شہ رگ کی مزمن سوزش، دھڑکن، منیق انشسی، دل کی ٹالیوں کی مصلیوں میں چکنائی کے باعث سوزش۔

ایڈر۔ نیلیم 200 (Adrenaline 200): دل کا ٹیل ہو جانا۔
کالمیا ایل (Kalmia L): جب گٹھیا کا درد دل میں چلا جائے یا جب گٹھیا کے ہمراہ دل کی تکلیف ہو تو یہ دوا مفید ہوتی ہے۔

کالچیکم (Colchicum): جب کالمیا ایل ناکام ہو جائے تو اس دوا کو آزمایا جاسکتا ہے۔
کون ویلیریا (Convallaria): رحم کے علاقہ میں دکھن کے ساتھ دل کی دھڑکن لاحق ہو۔ متذکرہ بلا علامت کے حوالے سے ڈاکٹر فاش نے دل کے استقاء کے ایک کیس کو شفا یاب کیا تھا۔ 30 ڈالی لیوشن کی دوا کے ساتھ۔

کیکٹس جی، اورم میٹ (Cactus G. Aurum Met): بائیں بازو میں سن ہو جانے اور جھنجھٹاہٹ کے ساتھ دل کے والوں کے امراض میں یہ دوا دی جاتی ہے۔

مرکیوریس سائی ٹینس (Mercurius Cyanatus): دل کے جان لیوا امراض کے باعث بڑی تیزی سے دل کے فیل ہو جانے کے ساتھ، دل کی ٹالیوں کی مصلیوں میں ناسوری سوزش ہوتی ہے۔

لیلیئم ٹیگرینم (Lilium Tigrinum): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے دل کو کسی ٹکچہ میں جکڑا جا رہا ہے یا بھینچا جا رہا ہے۔ جس کے ساتھ خون کا دل میں جانا مڑ کر دوہرا ہونے کے احساس کو پیدا کرتا ہے۔ دل میں درد ہوتا ہے۔

آرنیکا ایم (Arnica M): دل کی شریانوں کی بیماریوں کے لئے جس کے ساتھ جسم ٹھنڈا اور سرگرم ہوتا ہے۔ مریض اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ مریض بد مزاج، چڑچڑا، اداس، خوف زدہ اور جلد ڈر جانے والا ہوتا ہے۔ دوران شب اچانک موت کا خوف لاحق ہو جاتا ہے۔

سیکیل کار (Secale Cor): بازوؤں اور ٹانگوں کے سن ہو جانے اور ٹھنڈا پڑ جانے کے

ساتھ انجانکا والا درد اور بلند فشار خون لاحق ہوتا ہے۔
 میڈورنیم (Medorhenium): چھاتی میں دباؤ کے باعث سانس لینے میں وقت ہو۔ دل کا
 اچھارہ ہوتا ہے۔ معمولی ورزش سے دل کی دھڑکن لاحق ہو جاتی ہے۔ تیز جلد جلد ہونے
 والے اور پوٹھیل درد دل میں ہوتے ہیں۔ دل میں جلن ہوتی ہے۔

دل کا بڑھ جانا (Hypertrophy)

(Enlargement of the Heart)

کر۔ گنگس (Crataegus): ضیق النفسی اور استقاء کے ساتھ دل کے والوں کی قابلیت
 کے باعث دل کا بڑھ جانا لاحق ہو۔

کالمیا لیٹی فوئس (Kalmia Lat): گھنٹھیا کے حملے کے بعد یا گھنٹھیا لاحق ہونے کے ساتھ دل کا
 بڑھ جانا اور دل کے والوں کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ دھڑکن اور ریا دل میں گولی لگنے جیسے درد
 نیچے پیٹ کی طرف جاتے ہیں۔

آرنیکا ایم رھس ٹاکس (Arnica M, Rhus Tox): جب دل کا بڑھ جانا والوں کے
 صدمات کے باعث ہو اور بہت زیادہ تھکاوٹ کے باعث ہو جیسا کہ دوڑ لگانے والے کھلاڑیوں
 میں یا بہت زیادہ تھکنے والے تاجروں میں ہوتی ہے۔ دل بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جس کے
 ساتھ خطرناک قسم کا غاؤ ہوتا ہے۔ ضیق النفسی ہوتی ہے۔ مریض بیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا۔
 دھوکے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ خون کی کمی ہوتی ہے۔

لاروسیرا کس (Laurocerasus): جوڑوں والے والوں میں جب ناکافی رہ جانے کے ساتھ
 دل کا بڑھ جانا لاحق ہوتا ہے۔ مریض سانس کے لئے جھپٹا ہے۔ ناطاقتی ہوتی ہے۔ باندی پر
 چڑھنے سے یا چلنے سے سانس پھول جاتا ہے۔

آئی ہیرس (Iberis): دل کا بڑھ جانا اور دل کا پھیل جانا نرم نبض کے ساتھ دل کا فعل
 شدید اور تیز ہو جاتا ہے۔ معمولی حرکت یا تھکاوٹ سے دل دھڑکنے لگتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں
 ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ گلے میں دم گھٹنے کا احساس ہوتا ہے۔ دل کے فعل کی گھبراہٹ، مدد گچھر
 کے ایک قطرے کی دوا دیتے ہیں۔

گینٹس (Canite N): شدید دل کی دھڑکن لاحق ہو۔ کمر کے بل لیٹنے سے بہتری ہوتی ہے۔
 جوش سے جذبات سے اچانک اٹھنے سے یا جب چل رہا ہو تو علامات میں اضافہ ہو جائے۔ چہرہ
 سرخ ہو جاتا ہے۔ چاند پر درد سر ہوتا ہے۔ شریانوں میں ٹپکن ہوتی ہے۔ نوجوانوں میں دل کا
 بڑھ جانا اس دوا کی مخصوص علامت ہے۔

اکونائٹ اسن (Aconite N): بغیر کسی والو کی بیماری کے دل کا عمومی طور پر بڑھ جاتا۔ جس کے ساتھ انگلیوں کا سن ہو جاتا اور جھنجھناہٹ پائی جاتی ہے۔ (یہ دل کے والو کی بیماریوں (Vulvular Diseases) میں بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔)

اورم میٹ (Aurum Met): یاکیں بازو میں سن ہو جانے کی کیفیت کے ساتھ اور جھنجھناہٹ کے ساتھ دل کے والو کی بیماریوں میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ اورم میٹ میں چربی والا دل بغیر پھیلاؤ کے پایا جاتا ہے۔

نیٹرم میور (Nat Mur): چڑچڑے مریضوں میں جو ہمدردی سے نفرت کرتے ہیں۔ دل کی پھیلاؤ کے ساتھ بلند فشار خون ہوتا ہے۔ ایسے مریض انتہا درجہ کے کم آمیز ہوتے ہیں۔ وہ اپنے غموں اور پریشانیوں کے بارے میں کبھی بات نہیں کریں گے۔ اس حوالہ سے کسی بھی قسم کی ہمدردی انہیں غصہ دلا دیتی ہے۔ خاموشی سے غم سہتے ہیں۔ جلد پیلی 'زرد اور چمکیلی ہوتی ہے۔

شریانوں کی سوزش

(Inflammation of- Arteries)

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): شریانوں کی سوزش۔

وریدوں کی سوزش

Phlebitis--- (Inflammation of Veins)

ہیمامیلس (Hamamelis): حساسیت کے ساتھ سادہ اور حاد سوزش۔ وریدیں سخت ہوتی ہیں۔ نیز گانگہ دار اور پردرد ہوتی ہیں۔

پلساٹیل (Pulsatilla): جب بچے کی پیدائش کے بعد۔ جسم کے اعضاء نیاہٹ مائل ہوتے ہیں۔ درجہ کم ہوتی ہے اور ڈنگ لگتے ہیں۔

ہیپوزائیم (Hippozaenium): جب پیپ پیدا ہو جائے۔

دل کی دھڑکن (Palpitation)

اکونائٹ نیپ (Aconite Nap): دل کی دھڑکن جو اس کی طاقت کو برقرار رکھتی ہے۔

یاکیں کندھے اور سینے میں درد ہوتا ہے۔ پریشانی اور خوف ہوتا ہے۔ انگلیوں سے جھنجھناہٹ

ہوتی ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vom): جب کھانے کے بعد بد ہضمی اور اچھارہ کے باعث ہو۔

وائی پرا (Vipera): وریدوں کی سوزش، متاثرہ بازو کو لٹکانے سے بہتری ہو۔ وریدوں میں بھراؤ، درد اور پھٹن کا احساس ہوتا ہے۔

الیومن (Alumen): دائیں جانب لیٹنے سے دل کی دھڑکن لاحق ہوتی ہے۔ یہ اس دوا کی عجیب اور مخصوص علامت ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): عورتوں یا سنہرے بالوں والے لوگوں میں بد ہضمی کے باعث دل کی دھڑکن لاحق ہو۔ تیزابیت ہوتی ہے اور پاخانہ ڈھیلا ہونے کا رجحان ہوتا ہے۔

کاربو ویج (Carbo Veg): کھانا کھانے کے بعد بہت زیادہ اچھارہ ہونے کے ساتھ دل کی دھڑکن لاحق ہو۔ جس میں ڈکاروں سے بہتری ہوتی ہے۔

ماسکس (Moschus): غشی کے ساتھ اعصابی دھڑکن۔

تھائی رائیڈینم (Thyroidinum): دل کی بے اعتدال قسم کی تیز فعالیت کے ساتھ دھڑکن اور غشی۔

کریٹکس (Crataegus): دل نل ہو جانے کے خدشہ کے ساتھ دل کی دھڑکن، دل کے علاقہ میں اور بائیں کندھے کی ہڈی میں درد ہوتا ہے۔ انتہا درجہ کا چھوٹا اور تیز تنفس۔ نرم اور بے قاعدہ نبض، انگلیاں اور انگوٹھے نیلے پڑ جائیں۔

ڈی جی ٹیلیس (Digitalis): بے قاعدہ اور وقفہ دار نبض کے ساتھ دل کی دھڑکن۔

آر سٹیلیم البم (Ars Alb): دل کی دھڑکن ایسی کہ تمام جسم ہلتا ہے اور سینے کی دیواریں پھولتی ہیں۔ جینٹے سے آگے کو یا پیچھے کو جھٹکنے سے بہتری ہوتی ہے۔

کوکا (Coca): تنفس کا چھوٹا پن، دباؤ، ضیق النفسی، شدید آواز دار دل کی دھڑکن پہاڑی چڑھنے سے لاحق ہو۔

کالمیا لیٹ (Kalmia Lat): دھڑکن یا درد، دل میں ہو۔ درد نیچے کی جانب پیٹ میں تیزی سے جاتے ہیں۔ گٹھنیا کے حملہ کے بعد یا گٹھنیا کے تبادلہ میں دل کا بڑھ جانا اور دل کے والوز کی بیماریاں لاحق ہوں۔

لاروسیراسس (Laurocerasus): والوز کے جوڑوں کے ٹھک ہو جانے کے ساتھ دل کا بڑھ جانا۔ مریض سانس کے لئے ہانپتا ہے۔ قوت دیات کی کمی، بلندی پر چڑھنے سے یا چلنے سے سانس ٹھم ہو جائے۔

لائکوپس ورگ (Lycopus Virg): دھڑکن ہو، نبض ست ہو۔ بلند مقام پر جانے میں

دقت ہو مثلاً میڑھیاں چڑھنا وغیرہ۔

کیٹابس انڈیکا (Cannabis Ind): دل کی دھڑکن مریض کو نیند سے بیدار کر دیتی ہے۔
آئی بیرس (Iberis): دل کا بڑھ جانا اور دل کی پھیلاوٹ۔ نرم نبض کے ساتھ دل کی شدید
 اور تیز فعالیت۔ معمولی حرکت یا تھکاوٹ سے دل اور دھڑکنے لگتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے
 ہوتے ہیں۔ گلے میں دم گھٹنے کا احساس ہوتا ہے۔ دل کے فعل میں حساسیت آ جاتی ہے۔
 مدد پھر کے ایک قطرہ کی خوراک دیجئے۔

اولینڈر (Oleander): تیز نبض مثلی اور تے کے ساتھ دل کی دھڑکن لاحق ہو۔ تمام جسم
 میں درد ہوتا ہے۔

کیکٹس (Cactus): بائیں جانب لیٹنے سے اور حیض کا زمانہ قریب آنے پر شدید دل کی
 دھڑکن میں اتھری ہوتی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ دل کے گرد لوہے کی پٹی ہے۔ اس کے ساتھ
 دم ٹھکتا ہے اور ٹھنڈا پسینہ آتا ہے۔ دل کی چوٹی میں درد ہوتا ہے جو نیچے کی جانب بائیں بازو
 میں مار کرتا ہے۔ غنودگی اور سانس کے چھوٹے پن کے ساتھ نیز اچھارہ کے ساتھ دل کی
 دھڑکن ہوتی ہے۔ نبض نرم، بے قاعدہ اور جلد جلد ہوتی ہے۔

ناجا (Naja): دل کے گرد وزن محسوس ہوتا ہے جس کے ساتھ ٹانگے لگنے جیسا درد ہوتا ہے۔
 جو گردن کے گڑھے، بائیں کندھے اور بازو تک پھیل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ پریشانی اور موت
 کا خوف بھی ہوتا ہے۔ جراثیمی متعدی بیماریوں کے بعد دل کی تکلیف۔

برومیم (Bromium): مثلی اور درد سر اور اعصابی جوش کے ساتھ دل کی دھڑکن۔ کام سے
 اور پڑھنے سے نفرت ہو۔ گھر کے کاموں سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ مریض نا تعلق، تھکا ہوا اور
 اداس اور بے ہمت ہوتا ہے۔

آریکا مونٹ رشاکس (Arnica Mont, Rhustox): زیادہ تھکن جو کہ دوڑ لگانے
 والوں میں ہوتی ہے کے باعث نیز بھاری وزن اٹھانے والے آدمیوں میں زیادہ تھکن کے باعث
 دل کی دھڑکن، بائیں بازو اور کندھے میں سن ہو جانا پایا جاتا ہے۔ دی گئی ترتیب کے مطابق ان
 دواؤں کو استعمال کیا جائے۔

سٹانم (Stannum): معمولی تھکاوٹ کے بعد مثلاً گھریلو کاموں کے متعلق ہدایات دینے سے
 جو تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اس کے باعث دل کی دھڑکن اور پریشانی لاحق ہوتی ہے۔

کلکیریا آرسینیم (Calc Ars): معمولی ساجدہ بھی دل کی دھڑکن کا باعث بن جاتا ہے۔

سٹروفینٹس (Strophanthus): دل کی پھیلاوٹ اور خون کی کمی کے باعث دل کی
 دھڑکن لاحق ہو۔

اور جنٹم نائٹ (Argentum Nit) : دائیں کروٹ لینے پر دل کی دھڑکن ہوتی ہے۔
 اور جنٹم میٹ (Argentum Met) : کمر کے بل لینے پر دل کی دھڑکن ہوتی ہے جس کے
 ساتھ کمر پھڑپھڑاہٹ، پھڑپھڑاہٹ اور کپکپاہٹ کا احساس چھاتی میں اور تمام جسم میں ہوتا ہے۔
 اگنیشیا (Ignatia) : بہت زیادہ متاثر ہونے والے اشخاص میں دل کی اعصابی دھڑکن رات
 کے وقت بستر میں اتھری ہوتی ہے۔ دل کی دھڑکن مریض کو ہلکے رکھتی ہے۔
 لیکسیس (Lachesis) : معمولی سے جوش خصوصاً زندگی میں تبدیلی آنے کے باعث دل کی
 دھڑکن ہوتی ہے۔
 امبرا جی، سٹیفی سگریا (Ambra G. Staphisagria) : موسیقی سننے پر دل کی دھڑکن
 لاحق ہو جاتی ہے۔
 انٹیم ٹارٹ (Antim Tart) : پاخانہ کے دوران دل کی دھڑکن ہو۔
 سلفر، کونیم (Sulphur, Conium) : پاخانہ کے بعد دل کی دھڑکن ہوتی ہے۔
 ڈیجی ٹیلیس، اوپیم (Digitalis, Opium) : غم کے باعث اور خوف کے بعد دل کی دھڑکن
 ہوتی ہے۔
 ڈیجی ٹیلیس، سپیا (Digitalis, Sepia) : مجامعت کے بعد دل کی دھڑکن لاحق ہو۔
 امونیا کارب (Ammonia Carb) : ضیق النفس کے ساتھ دل کی دھڑکن ہوتی ہے لیکن
 اس کے ساتھ دل کا کوئی مرض نہیں ہوتا۔ نملنے سے اتھری ہوتی ہے۔
 نیٹرم میور (Natrium Mur) : جب مریض بستر میں لیٹا ہو یا کھانا کھانے کے بعد دل کی
 دھڑکن لاحق ہو جائے۔ کونین کے غلط استعمال کے بعد دل کی دھڑکن ہوتی ہے۔ جب دل کی
 دھڑکن سارے جسم کو ہلا کر رکھ دے۔ بائیں کروٹ لینے سے اتھری ہوتی ہے۔
 اکتیاریس (Actea Race) : معدے کے گڑھے میں ڈوبنے کے احساس کے ساتھ دل کی
 دھڑکن لاحق ہو اور اس کے ساتھ بہت زیادہ بے چینی اور غنودگی ہو۔
 سپیگلیا (Spigelia) : دل کے علاقہ میں گولی لگنے جیسے اور کانٹے جیسے درد کے ساتھ شدید
 دھڑکن۔ اس کے ساتھ منہ سے گندی بو آتی ہے۔ نبض کمزور اور بے قاعدہ ہوتی ہے۔
 اعصابی درد بازوؤں تک پھیل جاتا ہے۔ گرم پانی کی طلب ہوتی ہے۔ جس سے آفاقہ ہوتا ہے۔
 بیلادونا (Belladonna) : معمولی تھکاوٹ سے دل کی دھڑکن لاحق ہو۔ بھرپور ٹپکون والا درد
 سر۔ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ روشنی اور شور سے بے حد حساسیت ہوتی
 ہے۔
 تھیا (Thea) : دل کی پھڑپھڑاہٹ اور دل کے فعل کی لمحاتی رکاوٹ کے ساتھ دل کی دھڑکن

لاحق ہو۔

مگنیشیا میور (Magnesia Mur): ہستریائی عورتوں میں دل کی دھڑکن جس میں حرکت سے بہتری ہوتی ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): تمباکو نوشی کے باعث 'تمباکو کے مضر اثرات کے باعث اور جنسی کمزوری کے باعث دل کی دھڑکن لاحق ہو۔

ورہٹرم ویر (Veratrum Vir): جب نبض 40 یا اس سے بھی نیچے گر جائے۔ بعض اوقات یہ کلائی میں محسوس نہیں ہو سکتی۔ مریض کی زبان کے وسط میں سرخ رنگ کی دھاری ہوتی ہے۔ یہ دوا دل کی کمزوری والے کیسوں میں استعمال نہیں کرنی چاہئے۔

نبض — (Pulse)

اولینڈر (Oleander): قے اور متلی کے رنجان کے ساتھ نبض تیز ہوتی ہے۔ قے اور متلی نبض کی رفتار کو کم کرتی ہیں۔

اکونائٹ این (Aconite N): نبض تیز اور جلد اور اچھلتی ہوئی ہوتی ہے۔

بیلادونا (Belladonna): نبض اچھلتی ہوئی چلتی ہے۔ چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ بھرپور خون والے مریضوں میں 'چپکن والی نبض'۔

کاربو وِج (Carbo Veg): ناک سے خون بہنے کے ساتھ وقفہ دار نبض۔

میورٹیک ایسڈ (Muriatic Acid): جب نبض ہر تیسری ضرب کے ساتھ وقفہ پیدا کرے۔

ورہٹرم البم (Veratrum Alb): نبض 30 سے 40 ضربات تک گر جاتی ہے لیکن اچانک دوبارہ بلند ہو جاتی ہے اور پھر گر جاتی ہے۔ ٹھنڈے پینے کے ساتھ نبض معدوم ہو جائے۔

ڈیجی ٹالیس (Digitalis): نبض بے قاعدہ اور بہت سست اور کمزور ہوتی ہے۔ ہر تیسری 'پانچویں اور ساتویں ضرب کے ساتھ وقفہ پیدا کرے۔

کیکٹس (Cactus): دم کھٹنے کے ساتھ نبض معدوم ہو۔ گنشیاوی دل کی وقفہ دار نبض۔

آئی بیرس (Iberis): جھٹکے دار نبض 'دل کی ہر ضرب دو سری ضرب میں ٹھستی ہوتی معلوم ہوتی ہے۔ دوہری نبض۔

آرسینک سلف (Arsenic Sulph, Flavum): نبض تیز 'بے قاعدہ' وقفہ دار 'پھوٹی اور کمزور ہوتی ہے۔

وریدیں (پھولی ہوئی) — (Veins)

(Varicose, Including Varicocele)

پلساٹیل (Pulsatilla): یہ دوا حفظ باققدم کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ جب متاثرہ حصے دکھن اور ڈنگ لگتے جیسے درد کے ساتھ نیلے پڑ جائیں۔ وریدوں کے پھول جانے کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔

فارمیکا (Formica): جب کمزوری ہو۔

فلورک ایسڈ (Fluoric Acid): پرانے کیسوں میں خدی قسم کا مرض۔ خصوصاً ایسی مستورات میں جنہوں نے بہت زیادہ نیچے پیدا کئے ہوں۔ وریدوں کی پھلاوٹ اور ناسوری کیفیت خصوصاً ٹانگوں میں۔

پائیروجینیئم (Pyrogenium): وریدوں کی ناسوری کیفیت، ٹانگوں پر ناسور ہوتے ہیں۔ جن سے مواد آزادانہ خارج ہوتا ہے اور انتشار دے گا درد ہوتا ہے۔

آرسینک البم (Arsenic Alb): جلن آگ کی طرح ہو خصوصاً رات کے وقت۔

نکس وامیکا (Nux Vom): بلند معیار زندگی کے باعث حمل کے دوران وریدیں پھول جائیں۔

ہیمامیلس (Hamamelis): ڈنگ لگتے جیسے اور چپنے والے درد (ہیمامیلس کا لوشن بھی وریدوں کی پھلاوٹ کے تمام کیسوں میں بیرونی طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔)

وائپرا (Vipera): متاثرہ حصے کو لٹکائے رکھنے پر ابھری ہوتی ہے۔ ہیماساکہ وہ بہت زیادہ بھراؤ کے باعث پھٹ جائیں گے۔ پھن کا احساس اس دوا کی مخصوص علامت ہے۔

بیلادونا، گلوٹائن (Belladonna, Glononie): خون کی زیادتی والے مریضوں میں وریدوں کی پھلاوٹ کا مرض۔ ان میں خون سر کی طرف اتر دھام کرتا ہے۔

میگنٹس پولس آسٹ (Magnetis Polus Aust): ٹانگوں میں ٹپکن والا درد جبکہ ٹانگوں کو لٹکایا گیا ہو۔ اس کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے کہ گرم پانی متاثرہ حصوں میں نیچے کی طرف دوڑ رہا ہے۔ چلنے سے غشی ہوتی ہے۔

لکسیس (Lachesis): حمل کے دوران ڈنگ کی وریدوں میں سوزش۔

ملی فولیم (Milletolium): وریدوں کی پھلاوٹ میں یہ دوا سب سے زیادہ مفید ہوتی ہے۔ خصوصاً جب شعری نالیاں اٹھتی اور طویل ہو جاتی ہیں۔ خون کے اجتماع کے باعث وریدیں آسانی سے ٹوٹ جائیں۔ زخموں سے بہت جلد اور بہت زیادہ خون بہتا ہے۔ حمل جب پر درد

ہو تو اس کے دوران رگیں پھول جائیں۔ حاملہ عورت میں ٹانگوں کی پھولی ہوئی وریدیں ناسوری ہوتی ہیں اور خون بہتا ہے۔

سلفر (Sulphur): وریدوں میں ناسور ہوتے ہیں۔ جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے خون بہتا ہے۔ ٹانگوں کی وریدوں کی پھیلاوٹ۔ حسب دیگر ادویات صرف جزوی طور پر شفا دیں یا ناکام ہو جائیں تو اس دوا کو عمل انگیز دوا کے طور پر آزمانا چاہئے۔

پرہیز — (Diet)

دل کے امراض میں مچھلی، گوشت، پرندوں کا گوشت یا اس سے بنی ہوئی چیزیں، 'شکر'، تیل، 'جام' مارملیڈ اور مٹھائیوں سے پرہیز کرنا چاہئے۔ نمک کا استعمال بھی کم سے کم کر دینا چاہئے۔



نظام ہضم کے امراض (Diseases of Digestive System)

حصہ اول --- پیٹ

زندہ (چیز پیٹ میں محسوس ہو) — (Alive)

کروکس (Crocus): یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پیٹ میں یا چھاتی میں کوئی زندہ چیز حرکت کر رہی ہو۔

ایناکارڈیم (Anacardium): پیٹے وقت مریض کو یقین ہوتا ہے کہ پی جانے والی چیز معدے میں نہیں جا رہی۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کے اندر موجود ہے جو ہر انگلی جانے والی چیز کو کھاتی جاتا ہے۔ یہ تمام علامات بعض اوقات پارے والے مرہم کے ذریعے انگریزا کے دپ جانے کے باعث لاحق ہوتی ہیں۔

تھو جیا (Thuja): یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی زندہ چیز مریضہ کے پیٹ میں موجود ہے۔ مریضہ بچے کے ہاتھ کی حرکات محسوس کرتی ہے یا اپنی آنکھوں میں کسی جانور کو محسوس کرتی ہے۔

ورم زائدہ — (Appendicitis)

براکیونیا (Bryonia): معمولی حرکت سے ٹانگے لگنے جیسے اور جلن دار دروں میں اضافہ ہو جائے۔ درد والی جانب کے بل لیٹنے سے اور وہانے سے بہتری ہوتی ہے۔ دائیں جانب کے پیٹ کے نچلے حصہ میں نرمی ہوتی ہے۔ مریض اپنی ٹانگیں اوپر کو اٹھائے خاموشی سے لیٹ جاتا ہے تاکہ پیٹ کے عضلات کو سکون ملے۔ چھو جانا نہیں چاہتا اور ہر سانس درد میں بہتری پیدا کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کی بڑی مقدار کی پیاس ہوتی ہے۔ طاقت کی خوراک ہر 4 گھنٹے کے بعد دیتے۔ یہاں تک کہ درد رک جائے۔

سلفر (Sulphur): اس دوا کو علاج کی تکمیل کے لئے بطور عمل انگیزہ استعمال کرنا چاہئے۔

آئرس ٹینکس (Iris Tenax): اینڈکس کا علاج شروع کرنے کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ اندھمی آنت اور پھوٹی آنت کے ملنے کے علاقہ میں خوف زدہ کر دینے والا درد ہو دبانے سے بہت زیادہ نرمی ہوتی ہے۔ معدے کے گڑھے میں موت کی سی حساسیت ہوتی ہے۔

بیلادونا (Belladonna): آئرس ٹینکس کے مماثل علامات اس دوا کی بھی ہوتی ہیں۔ لیکن اسے اس وقت دینا چاہئے جب مذکورہ بالا دوا ناکام ہو جائے۔ اس میں اندھمی آنت اور پھوٹی آنت کے ملنے کے علاقہ میں شدید درد ہوتا ہے۔ ملنے سے اتھری ہوتی ہے۔ معمولی چھو جانا بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ بستر کی چادر بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اس میں قے بھی ہوتی ہے۔ مریض کو نیند آتی ہوتی ہے لیکن سونے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ روشنی اور دیگر بیرونی اثرات سے حساسیت ہوتی ہے۔ کمر کے بل لیٹنے سے جبکہ گھٹنے اوپر کو اٹھا رکھے ہوں بہتری ہوتی ہے۔ اعصابیت ہوتی ہے۔ چمکن والا درد سر میں ہوتا ہے۔ جھکنے سے اتھری ہوتی ہے۔ ڈھیلے کپڑے پہننا پڑتے ہیں۔

ڈائیوسکوریا (Dioscorea): جب درد مستقل ہو تو یہ قابل قدر دوا بن جاتی ہے۔ مریض کبھی بھی مکمل طور پر درد سے نجات نہیں پاتا۔ آنتیں گیس سے بھری ہوتی ہیں۔ جس کے ساتھ دھکڑنے والے 'مروڑنے والے' درد ہوتے ہیں۔ جو پیچھے کی طرف جھکنے سے بہتر ہوتے ہیں۔ یہ دوا گرم پانی میں دی جاسکتی ہے۔

مرکیوریس (Mercurius): جہاں بیرونی علامات حاو ہوں۔ اندرونی یا اسہال والی کیفیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اندھمی اور پھوٹی آنت کے ملنے کے علاقہ میں سخت سوجن، گرمی اور درد ہوتا ہے۔ آنتوں میں خراش کا احساس ہوتا ہے۔ سینے میں اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ورم زائدہ کے علاقہ میں نرم ڈھیلہ محسوس ہوتا ہے۔

کولوسینٹھ (Colocynthis): یہ دوا اونچے درجے کے درد کی نشاندہی کرتی ہے جو کہ کاٹنے والا 'مروڑنے والا' یا اینٹھن والا ہو سکتا ہے۔ ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ پاخانہ لعاب دار ہوتا ہے۔ برہمی سے اتھری ہوتی ہے۔ دبانے سے اور پھکنے سے بہتری ہوتی ہے۔

لکیسیس (Lachesis): یہ ایک قابل قدر دوا ہے۔ تمام ہیئت پر حساسیت ہوتی ہے۔ نیز ٹانگے لگنے جیسا درد سوزش کے باعث ہوتا ہے۔ یہ سوزش کولہوں پر چھیلی جانب اور لیٹنے کی جانب ہوتی ہے۔ مریض کمر کے بل لیٹتا ہے اور اپنے گھٹنے اوپر کو اٹھا لیتا ہے۔ گرمی محسوس کرتا ہے۔ کپڑوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ سرد موسم میں بھی۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): جب حاو حملہ ختم ہو جائے تو اس دوا کی اونچے درجے کی ذاتی یوشن مثلاً 1000 کی دینی چاہئے۔ یہ دوا ہر چندہ دن کے بعد یا سینے کے بعد دینی چاہئے۔

تاکہ حملوں کا اعادہ نہ ہو سکے۔

آرسینک البم (Arsenic Alb): جب مرض کی حالت جراثیمیت کی طرف اشارہ کرے تو یہ دوا ہو سکتی ہے۔ جاڑا، سرخ بخاروں کی علامات، اسہال، بے چینی اور طاقت کا اچانک ڈوب جانا پایا جاتا ہے۔

رہس ٹاکس (Rhus Tox): اندھی آنت اور پھوٹی آنت کے ملنے کے علاقہ پر بہت زیادہ پھیلاؤ والی سوجن ہوتی ہے اور بہت زیادہ درد ہوتا ہے جو مستقل بے چینی کا باعث بنتا ہے۔ یہ دوا جراثیمی حالت کو بھی شفا دیتی ہے۔

اگنیشیا (Ignatia): ورم زائدہ میں خطرناک قسم کا درد جس کے ساتھ آپریشن یعنی جراحی کا خوف ایک اہم دماغی علامت ہے۔ مریض اتنے زیادہ گھٹنے اٹھالیتا ہے کہ تھوڑی تک آ جاتے ہیں۔ جسم گرم اور اکڑا ہوتا ہے۔ مریض حساس ہوتا ہے۔ ہوشیار اور اعصابی ہوتا ہے۔ بیک وقت دماغ اور جسم حاد طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ جکڑنے والے اور ٹانگے گھٹنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ اعصابی مریضوں میں علاج کا آغاز اس دوا سے کیا جاسکتا ہے۔

فیرم فاس، کالی میور، مگنیشیا فاس (Ferrum Phos, Kali Mur, Mag Phos): اندھی آنت اور پھوٹی آنت کے ملنے کے علاقہ کی سوزش کے لئے یہ مفید دوائیں ہیں۔

استسقاء (پیٹ کا) — (Ascites)

(Dropsy of the abdomen)

اپیس مل (Apis Mel): پیاس کے نہ ہونے کے ساتھ استسقاء۔ یہ بخاروں کے بعد لاحق ہو سکتا ہے۔ خصوصاً خارش والے بخاروں کے بعد جلد پھلی ہوتی ہے۔ سوجن ہوتی ہے اور شفاف ہوتی ہے۔ پیشاب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جلد خشک ہوتی ہے۔ گرمی سے علامات میں اضافہ ہوتا ہے اور ٹھنڈ سے بہتری ہوتی ہے۔ 6 یا 12 طاقت کی خوراک دیجئے۔

ایپوسائٹیم کین (Apocynum Can): ٹائیفائڈ یا سرخ بخار کے بعد قبض کے باعث استسقاء لاحق ہو۔ یہ دوا عضوی امراض کے لئے بھی مفید ہے۔ ٹھنڈ سے علامات میں اضافہ ہو۔ نیز ٹھنڈ سے مشروبات سے حساسیت ہوتی ہے۔ ٹھنڈے مشروبات سے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ اپیس میں پیشاب کم ہو جاتا ہے اور جلد خشک ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ پیاس کے ساتھ استسقاء ہوتا ہے لیکن پیشاب میں کمی ہوتی ہے۔

آرسینک البم (Ars Alb): یہ دوا استسقاء کی تمام صورتوں میں سوزوں ہوتی ہے۔ خصوصاً دل، پیچڑوں اور گردوں کی تکلیفات کے باعث لاحق ہونے والے استسقاء میں چیرے پر

سوزش ہوتی ہے نیز آنکھوں کے پونے سوجھتے ہوتے ہیں۔ موی شفاف جلد ہوتی ہے۔ پیاس اور تھکے وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ استسقاء میں خون والا پانی رس رس کر جم جاتا بھی ایک علامت ہے۔

لیک ڈی فلوریٹم (Lac Defloratum): عضلاتی عارضہ قلب کے باعث استسقاء، جگر کی مزمن شکایت کے باعث استسقاء۔ میحوی بخار کے بعد پیشاب کے ذریعہ زیادہ مقدار میں البیومن خارج ہو۔

ڈی جی ٹیلس (Digitalis): یہ دوا امراض قلب میں لاحق ہونے والے استسقاء کی نشاندہی کرتی ہے۔ دل بہت کمزور اور بے قاعدہ ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رکا ہوا ہو اس خواہش کے ساتھ کہ ایک لمبا سانس لے لے۔ پیشاب کم مقدار میں گاڑھا اور البیومن والا ہوتا ہے۔

میوری ائٹک الیڈ (Muriatic Acid): جگر کے سرطان کے باعث استسقاء لاحق ہو۔ ہیلی بوریس (Helleborus): ایسا استسقاء جس کے ساتھ اسال لعاب جیسے ہوتے ہیں اور پیشاب گاڑھا اور کم مقدار میں ہوتا ہے۔

تھلاپی برسا (Thlaspi Bursa): یہ دوا استسقاء میں مفید ہے۔ ہر قطر کے 10 قطروں کی خوراکیں دیجئے۔

یوریا (Urea): گردوں کے استسقاء میں مفید ہے۔ پیشاب میں البیومن نکھار اور شکر آئے جو کہ مخصوص قسم کے گٹھے ہوئے وزن والا ہوتا ہے۔

لیائٹس سپائی کاٹا (Liatris Spicata): جگر اور کلی کے بڑھ جانے کے ساتھ استسقاء نکھار جاتا ہے کہ اس مرض میں مریض دن میں ڈیڑھ گیلن پیشاب نکالتا ہے۔ آدھا اونٹن جڑ لے کر اس دوا کا 1/8 گیلن جو شانہ تیار کیا جائے جسے ایک روز میں پیا جاسکتا ہے یا پھر ہر قطر کے دس قطرے استعمال کئے جائیں۔

ڈولکامارا (Dulcamara): ہیپٹو دہ جانے کے باعث اور پھوڑے پھنسی کے دہ جانے کے باعث نیز عضلہ لگ جانے کے باعث استسقاء۔

ایسے ٹک الیڈ (Acetic Acid): گیس کی تکلیفات کے ساتھ ہیٹ کا استسقاء ڈکار جن میں پانی منہ میں بھرتا ہے اور معدے سے پانی اچھلتا ہے نیز اسال بھی ہوتے ہیں۔

لیکے سس (Lachesis): استسقاء جس کے ساتھ پیشاب گہرے رنگ کا اور البیومن والا ہوتا ہے جلد گہرے رنگ کی یا نیلاہٹ مائل مفید ہوتی ہے۔

ٹیری۔ تہ (Terebinth): گردے میں اجتماع خون کے باعث استسقاء لاحق ہو گردوں کے

علاقہ میں مدہم دکھن والا درد ہوتا ہے اور پیشاب کمرے رنگ کا دھواں دار ہوتا ہے۔
کالچیکم (Colchicum): کمرے رنگ کے پیشاب کے ساتھ استسقاء، خصوصاً یہ دوا گھٹیاوی
 آکایف کی نشاندہی کرتی ہے۔ کھانے کی خوشبو اور کھانا پکنے کی خوشبو کا ناقابل برداشت ہونا اس
 دوا کی خصوصی علامت ہے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): جگر کے امراض کے باعث استسقاء کا لاحق ہونا پیٹ کا
 نصف زیریں حصہ کا ہوا ہوتا ہے، ٹانگوں پر ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔ تلی کے بڑھ جانے کے
 ساتھ استسقاء، جس میں سر پہر کے وقت بخار ہوتا ہے، اس کے ساتھ پیاس نہیں ہوتی، لینے پر
 سانس میں دقت پیدا ہو جاتی ہے۔ پیشاب کم مقدار میں اور کمرے رنگ کا ہوتا ہے، قبض ہوتی
 ہے، دل کا فعل کمزور لیکن باقاعدہ ہوتا ہے۔

پلساتیللا (Pulsatilla): بلوغت کے وقت حیض میں دقت کے باعث یا حیض کے رک جانے
 کے باعث استسقاء لاحق ہو، خصوصاً یہ دوا نرم طبیعت والی، شریف اور آسانی سے بات تسلیم کر
 لینے والی عورتوں کے لئے مناسب ہے۔ کھلی ہوا کی طالب ہوں خواہ سخت سردی ہی کیوں نہ
 ہو۔

نیچے کی جانب کھنچاؤ

(Bearing Down)

لیلیم ٹگ (Lilium Tig): پیٹ کے تمام اعضاء کا نیچے کی جانب کھنچاؤ، معدے سے اعضاء نیچے
 کی جانب کھینچتے ہیں۔

مینگانیم (Manganum): آنتوں کا نیچے کی جانب کھنچاؤ، ذھیلا پھوڑنے کی حالت میں پورا پیٹ
 بو جھل محسوس ہوتا ہے۔ رحم اور امعاء مستقیم کے خروج کے ساتھ، تھک ہوئی، خون کی کمی
 والی مستورات میں۔

درد قونج (Colic)

نکس وامیکا (Nux Vom): بد ہضمی کے باعث لاحق ہونے والے درد قونج کے لئے یہ دوا
 چوتی کی ہے۔ یہ شروع میں گرم پانی میں چھوٹی طاقت میں دی جانی چاہئے۔ درد پیٹ کے کسی بھی
 حصہ میں ہو سکتا ہے۔ درد دکھن دار یا اینٹھن دار ہو سکتے ہیں جن میں کھانا کھانے کے بعد ابتری
 ہوتی ہے اور ان کے ساتھ اچھارہ، قبض اور متلی بھی ہوتی ہے۔ دوران حمل پیٹ میں اینٹھن
 ہو۔

کالو سنٹھس (Colocynthis): قبضہ دار، جکڑاں دار، اینٹھن والا، کھودنے والا اور چاٹو لگنے جیسا درد یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انگلیوں سے جکڑا ہوا ہو۔ جھک کر دوہرا ہونے سے بہتری ہوتی ہے یا پھر پیٹ کی دیوار پر سخت دباؤ ڈالنے سے بہتری ہو۔ موسم گرما کی تکلیفات اور پچیش ہوتی ہے، اچھارہ کے باعث درد قویٰ ہو، غذا ہضم نہ ہونے کے باعث درد قویٰ ہو یا کچے پھلوں کے کھانے سے یا ٹھنڈے لگنے سے یا شدید جذباتی کیفیت مثلاً غصہ کے دورے کے باعث درد قویٰ ہو۔ کالاجن ہوتا۔ سوزش والے درد قویٰ میں یہ دوا کم استعمال ہوتی ہے۔

ورہٹرم الیم (Veratrum Album): یہ دوا پیٹ کے دردوں میں دی جاتی ہے جنہیں جھک کر دہرا ہونے سے اور چلنے سے آرام ملتا ہے۔ درد قویٰ ایسا ہوتا ہے کہ آنتیں مروڑ کھا کر ایک گھرہ کی صورت اختیار کرتی محسوس ہوتی ہیں۔ پیٹ میں اینٹھن ہوتی ہے۔ چہرے پر ٹھنڈا لہجہ آتا ہے۔ آنتیں آپس میں گڈنڈ ہو جانے کے لئے یہ دوا خصوصاً مفید ہے۔ پیٹ میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔

یووشا (Bovista): جھک کر دہرا ہونے سے اور کھانا کھانے کے بعد درد میں افادہ ہوتا ہے، پیشاب سرخ ہوتا ہے۔

کروٹن ٹیگ (Croton Tig): گرفت والا درد ہوتا ہے جس کے ساتھ پانی والے پاخانے باقرا لگ جاتے ہیں۔ پاخانے اس طرح آتے ہیں جیسے گل سے پانی بہ رہا ہو۔ تھار داری کے بعد اور کھانے کے بعد مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

ڈائیوسکوریہ (Dioscorea): ناف کے علاقہ میں درد ہوتا ہے جو کہ مسلسل اور مستقل ہوتا ہے۔ پیچھے کی جانب بھٹکنے سے اور جسم کو اکڑانے سے بہتری ہوتی ہے۔ صفراوی، کھنڈیادی اور اعصابی درد قویٰ، خوراک کا منہ کو آنا اور کھنے یا کڑوے ڈکار ہوتے ہیں۔

کیوپرم میٹ (Cuprum Met): سوزشی درد قویٰ کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔ پیٹ سخت ہوتا ہے۔ درد قویٰ کے شدید دورے ہوتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پیٹ میں ٹختر گھونپا جا رہا ہو۔ ٹھنڈے مشروبات سے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔

کیمومیللا (Chamomilla): دورے والے درد میں یہ دوا مفید ہے۔ اس میں دورے اچانک آتے ہیں اور اچانک چلے جاتے ہیں۔ غصہ کے باعث درد قویٰ لاحق ہوتا ہے۔ گرمی سے بہتری ہوتی ہے۔ ایک دوسری دوا شیغنی سیکریا ہے جو غصہ کے بعد لاحق ہونے والے قویٰ کی نشاندہی کرتی ہے نیز پیٹ کی جراثی کے بعد درد قویٰ کی نشاندہی کرتی ہے۔ اچھارے میں افادہ ڈکاروں سے ہوتا ہے۔

اکونائٹ این (Aconite N): جب رحم اور پیٹ میں اجتماع خون کے احساس کے ساتھ درد

قوی ہو تو یہ دوا دی جاتی ہے اس میں نبض بھرپور اور متواتر ہوتی ہے۔
کوکولس انڈ (Cocculus Ind): اعصابی درد قویج رات کے وقت ابھری ہو اس کے ساتھ
 اچھارہ بھی ہوتا ہے۔ اخراج سے کچھ افادہ نہیں ہوتا، ٹھنڈے مشروبات خصوصاً آب جو (Bear)
 کی طلب ہوتی ہے۔ کڑوا یا دھات کا سا ذائقہ ہوتا ہے، پیٹ میں اینٹھن ہوتی ہے۔
الیومن (Alumen): سیدھے والے درد قویج کا رتجان، یہ رتجان ایسے اشخاص میں ہوتا ہے جو
 سیدھے کا کام کرتے ہیں مثلاً پینٹرز وغیرہ۔

پلمبم (Plumbum): پیٹ کے درد جن کی لہریں کئی سطحوں میں جاتی ہیں۔ پیٹ کی دیواریں
 اندر کودھنی ہوتی ہیں جیسا کہ پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہو، ٹانگوں میں اینٹھن (کڑل) ہوتی ہے
 اور ضدی قسم کی قبض لاحق رہتی ہے لیکن اچھارہ نہیں ہوتا، پیٹ پتھر کی مانند سخت ہوتا ہے۔
 سیدھے والے درد قویج کے لئے یہ خصوصی دوا ہے۔ ناف سے شروع ہو کر درد ریزہ کی ہڈی تک
 جاتا ہے۔ مریض پیچھے کی طرف جھکتا ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): جاڑے کے ساتھ درد قویج جو نفل اور مرغن غذاؤں کے استعمال
 سے لاحق ہوتا ہے۔ پیٹ میں بلند آواز کے ساتھ گڑگڑاہٹ ہوتی ہے۔ اچھارے والا درد قویج
 جو کہ ہسٹریائی اور حاملہ مستورات میں ہوتا ہے، پیشاب متواتر آتا رہتا ہے۔ منگی کے ساتھ
 ٹانگے لگنے جیسے اور اینٹھن والے درد ہوتے ہیں۔

کیڈمیم سلف (Cadmium Sulph): شدید منگی اور تھکے کے ساتھ جلن دار اور کانٹے
 والے درد معدے میں ہوتے ہیں، تھکے سیاہ رنگ کی ہوتی ہے، معمولی سی چیز بھی ہونٹ کو چھو
 جائے تو تھکے آنے لگتی ہے۔

کیوپرم آرس (Cuprum Ars): پیٹ میں اعصابی درد لاحق ہو، جلن دار، اینٹھن والے
 اور قویج کے درد ہوتے ہیں۔

رینن کولس بی (Ranunculus B): پیلوں کے نیچے دائیں جانب ٹانگے لگنے جیسے درد
 ہوتے ہیں، مرانی درد لاحق ہو۔

نیٹرم کارب (Natrium Carb): معدے میں درد ہوتا ہے جس کو کھانے سے آرام ملتا
 ہے۔ یہ درد مریض کو صبح پانچ بجے ہی کھانے کے لئے بستر سے باہر کھینچ لاتا ہے۔

سنا (Senna): درد قویج، خصوصاً بچوں کا درد قویج جب کہ بچہ ہوا سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ دوا
 نقاہت اور آنسوؤں کے قبض کو بھی رفع کرتی ہے۔

مگنیشیا فاس (Magnesia Phos): شدید تشنگی درد جو گرم چیزیں لگانے سے بہتر ہوتا ہے،
 دائیں جانب درد میں ابھری ہوتی ہے اور دہرا ہو کر جھکنے سے بہتری ہوتی ہے، ذکاروں سے اور

گیس خارج کرنے سے اتفاق نہیں ہوتا۔ دن رات مسلسل چکی لگی رہتی ہے۔ ٹانگوں میں اینٹھن ہوتی ہے۔ پتہ کا درد قویٰ، پتہ میں پتھری کے باعث لاحق ہو۔

چیلی ڈونیم (Chelidonium): پیٹ کے بالائی حصہ میں تیز درد ہوتا ہے جس کے ساتھ پریشانی اور دباؤ ہوتا ہے۔ پیٹ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رسیوں سے کس کر باندھا گیا ہو۔ درد دائیں کندھے کے جوڑ تک پھیل جاتا ہے۔ ناف کے علاقہ میں درد ہوتا ہے۔ حرکت کرنے پر موسم کے بدلنے پر اور صبح سویرے دائیں جانب درد میں اتھری ہوتی ہے۔ رکاوٹ والا پرکانہ سوزش پتہ اور پتہ کی پتھری ہوتی ہے۔ پیٹ کے بالائی حصہ میں درد جو کہ آنتوں کے پہچان کے باعث لاحق ہو۔

چائنا آف (China Off): پیٹ کے بالائی حصہ میں درد ہو جس کے ساتھ کھانے کے بعد خواہ معمولی مقدار میں خوراک کھائی جائے پیٹ میں گرانی اور بھراؤ کا احساس ہوتا ہے۔ رطوبت کے ضائع ہو جانے کے باعث بہت زیادہ نفاس ہو جاتی ہے۔ ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ خوراک کا ذائقہ ٹھیک محسوس ہوتا ہے۔ بھوک اور ٹھنڈے پانی کی پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ پیٹ گیس سے بھرا ہوتا ہے۔ بارہ اٹھنٹی آنت کا درد ہوتا ہے۔

بیلادونا (Belladonna): پیٹ بہت زیادہ ٹکا ہوتا ہے۔ معمولی مقدار میں کچھ پینے سے بھی پی جانے والی چیز فوراً باہر آ جاتی ہے۔ معمولی سا چھوٹا بھی شدید درد کا باعث ہوتا ہے۔ آنتوں میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ پیچھے کی جانب ٹھکنے سے آرام ملتا ہے۔

ڈولکامارا (Dulcamara): درد یا پھنسیاں ناف والے علاقہ میں ہوتی ہیں خصوصاً ناف کے سوراخ میں۔

پلائٹینم (Platinum): پیٹ کا درد قویٰ، درد ناف سے پیچھے کمر تک جاتا ہے۔ مریض چپختا ہے اور درد دور کرنے کے لئے ہر ممکن حالت کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

کیسٹوریم (Castoreum): اعصابی درد قویٰ کی ایک قسم، یہ درد خاصاً پھوٹی آنت میں بیٹھا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ درد دبانے سے بہتر ہوتے ہیں مریض کی طاقت اچانک ڈوب جاتی ہے جیسا کہ زندگی کی دور ٹوٹ گئی ہو۔

سٹیفی سیگریا (Staphisagria): یہ دوا غصہ کے باعث ہونے والے درد قویٰ کے لئے مفید ہے۔

سٹانم (Stannum): سخت قسم کے دباؤ سے درد قویٰ میں اتفاق ہو، درد آہستہ آہستہ شروع ہوتے ہیں اور پھر متواتر بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔

گریٹولیا (Gratiola): پیٹ میں شدید کانٹے جیسے درد اور اچھارہ و مگڑا ہٹ جس کے ساتھ پیٹ میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔

اسٹیم سیپا (Allium Cepa): پیٹ کے بائیں جانب کے زیریں حصہ میں شدید کانٹے والا درد جس کے ساتھ متواتر پیشاب کرنے کی خواہش ہوتی ہے جبکہ پیشاب جلتا ہے۔ بچوں میں درد قویٰ جس میں بچے درد سے دوہرے ہو جاتے ہیں نیز بدبودار ہوا خارج ہوتی ہے۔

جیבורاندی (Jaborandi): پیڑوں کے اوپر شدید درد جس میں پیڑوں پر پانی بہانے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ جس سے مریض کو اتفاق محسوس ہوتا ہے۔

کاربوووج (Carbo Veg): معدہ کے بالائی حصہ میں درد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ اچھارہ ہوتا ہے اور ڈکاروں سے کوئی اتفاق نہیں ہوتا۔

الیومینا (Alumina): جیٹر کا درد قویٰ۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): کھانے کے بعد پیٹ کے بالائی حصہ میں درد یا دباؤ ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ پیٹ بہت زیادہ تن جاتا ہے۔ خصوصاً پیٹ کا زیریں

حصہ تن جاتا ہے، زبان پیاس کے بغیر ہی خشک ہوتی ہے۔ بھوک ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ گوشت یا روٹی کھانے سے ابتری ہوتی ہے۔ شام کے 4 بجے سے 8 بجے تک ابتری ہوتی ہے نیز چلنے سے ابتری ہوتی ہے۔ ڈکاروں سے اور ہوا خارج کرنے سے بھی اتفاق ہوتا ہے۔

کافیا (Coffea): بے خوابی کے ساتھ دوران حمل پیٹ میں اینٹھن ہوتی ہے۔

مزمن پیچش

Colitis (Chronic Dysentery)

سلفر (Sulphur): مزمن پاخانوں میں یہ دوا چوٹی کی ہوتی ہے، علاج اسی دوا سے شروع کرنا چاہئے۔ یہ دوا بہت سے کیسوں کو درست کرے گی بغیر کسی دوسری دوا کی امداد کے۔ 200 ڈالنی لیوٹن استعمال کیجئے۔

مگنیشیا کارب (Magnesia Carb): پیٹ میں شدید تھکا کے ساتھ سبز رنگ کا پانی والا مواد پاخانہ میں بہت تیزی کے ساتھ خارج ہوتا ہے جیسا کہ قل سے پانی خارج ہو رہا ہو۔

چائنا آف (China Off): جب پاخانے پھل کھانے کے بعد یا ٹھنڈا پانی پینے کے بعد آئیں۔ پاخانے پیلے رنگ کے پانی والے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اچھارہ ہوتا ہے اور درد بالکل نہیں ہوتا۔ ان میں کھانے کے بعد ابتری ہوتی ہے۔

لیکس (Lachesis): پاخانے لاحق ہوں جن کے ساتھ بدبودار اسہال ہوتے ہیں اور یہ

قبض کے ساتھ اولتے بدلتے رہتے ہیں۔ موسم بہار کے دوران اتھری ہوتی ہے۔
سلی نیئم (Selenium): انتڑیوں کی جھلی کا تپ دق 'سیب' سنگترے یا لیموں کھانے سے پاخانے
 لاحق ہوتے ہیں۔
تھوجا (Thuja): پاخانوں یا امیرسائی پچش کے لئے یہ دوا بہت عمدہ ہے۔ TM طاقت کی خوراک
 دیتے۔

پیٹ کا بڑھ جانا

(Enlargement of Abdomen)

لکے س (Lachesis): جوان لڑکیوں میں پیٹ کا بڑھ جانا۔

اچھارہ — (Flatulence)

(تیز دیکھئے "معدہ" کے ذیل میں "درد معدہ")

چائنا آف (China Off): جب تمام پیٹ میں اچھارہ ہو جائے تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ اچھارہ
 سے اس قدر تکاؤ ہو جاتا ہے کہ پیٹ پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ 'مچھلی' پھل اور شراب سے
 اتھری ہوتی ہے۔

کاربو ویج (Carbo Vegi): جب اچھارہ پیٹ کے بالائی حصہ میں ہو۔ جس کے باعث شخص
 میں دباؤ پیدا ہو جاتا ہے یا پھر سینے میں تیز درد ہوتا ہے۔ پاخانے بے قاعدہ یا پستے ہوتے ہیں۔
 بد ہضمی کے باعث پیٹ ڈھول کی طرح پھول جاتا ہے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): جب اچھارہ پیٹ کے ذریعہ حصہ میں ہو 'شام کے 4 بجے
 سے 8 بجے تک اتھری ہوتی ہے۔ مریض جو چیز بھی کھاتا ہے 'ہوا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک
 لقمہ کھا لینے کے بعد پیٹ میں اچھارہ ہو جاتا ہے نیز پیٹ تن جاتا ہے۔ ہوا اندام نسانی سے خارج
 ہوتی ہے۔

ریفانٹس (Raphanum): جب ہوائی کے ارد گرد موجود ہوتی ہے جو کہ مشکل ہی سے
 خارج ہوتی ہے اور جس کے باعث درد ہوتا ہے۔

کاربولک ایسڈ (Carbolic Acid): اچھارہ کے باعث تکاؤ ہو۔ جس کے باعث متواتر آہیں
 بھرنا اور ڈکار لینا پڑتے ہیں۔

نکس موسکاٹا (Nux Mosch): اچھارے والی گیس کی تکلیف جب کہ ہر چیز ہوا میں تبدیل
 ہو جائے۔

کیمومیلہ (Chamomilla): اچھارہ جس میں افتادہ ڈکاروں سے ہو۔

الیو (Aloe): بدبودار ہوا خارج ہو 'جلن ہو اور بہت زیادہ ہوا خارج ہو 'چھوٹے پاخانے کے ساتھ بہت زیادہ ہوا خارج ہو۔ پاخانے سے پہلے اور پاخانے کے دوران پیٹ میں گڑگڑاہٹ اور انہن ہوتی ہے۔ سخت پاخانہ بغیر کسی دھچکی اطلاع کے یک دم خارج ہوتا ہے۔ پیٹ میں گڑگڑاہٹ اس قدر بلند آواز سے ہوتی ہے کہ کمرے میں موجود ہر شخص اس آواز کو سن سکتا ہے۔ بچوں محسوس ہوتا ہے کہ پیٹ اچھارے کے باعث بہت جائے گا۔

لیک کینٹیم (Lac Can): ہوا اندام نمائی سے خارج ہو۔

سارس پاریلہ (Sarsparilla): مریض جب پیشاب کر رہا ہو تو ہوا خارج ہو جائے۔ پیشاب بلند شور کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔

اولینڈر (Oleander): پاخانے کے ساتھ ہوا بھی خارج ہو۔

کلیکیریا آئیوڈ (Calc lod): ڈکار 'خلی' متعفن 'کڑوے' بساند والے ہوتے ہیں جن کے باعث پیٹ کے بالائی حصہ میں اور سینہ میں دھکن والے درد ہوتے ہیں۔ سانس باہر نکالتے وقت پیٹ کے بالائی حصہ میں سکڑن والا درد ہوتا ہے۔ پیٹ کے بالائی حصہ میں ہوا اکٹھی ہو جاتی ہے چنانچہ چھوٹے سے حساسیت ہوتی ہے۔

فیل ٹوری (Fel Tauri): پیٹ میں غرغراہٹ اور گڑگڑاہٹ والی حرکات ہوتی ہیں۔ بے بو اور بے ذائقہ ڈکار آتے ہیں۔ کھانے کے بعد سونے کا رجحان ہوتا ہے۔

فیوکس ویکس (Fucus Ves): اس دوا سے اچھارہ کم ہو جاتا ہے اور پھر آخر کار ختم ہو جاتا ہے۔ درختوں کے 3 قطروں کی خوراک استعمال کیجئے۔

کیسٹوریم (Castoreum): پیٹ اچھارے سے تن جاتا ہے۔ جائگہ میں کھینچن ہوتی ہے۔ ناف کے قریب کانٹھے جیسا درد ہوتا ہے۔ دباؤ سے بہتری ہوتی ہے۔ سبز رنگ کے مواد والا پاخانہ ہوتا ہے جس سے جلن بھی ہوتی ہے۔ سببی درد قویج ہوتا ہے۔ بچوں میں موسم سرما میں سبز رنگ کے پاخانے ہوتے ہیں۔

ایلیم سیپا (Allium Cepa): بدھنسی ہوتی ہے۔ بچوں میں تپ اور اچھارہ ہوتا ہے۔ بدبودار ہوا خارج ہوتی ہے 'مریض درد سے دہرا ہو جاتا ہے۔ کالی کھانسی ہوتی ہے۔

ہومارس (Homarus): رات کے وقت ہوا خارج ہونے سے مریض بیدار ہو جاتا ہے۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): اچھارہ سے پیٹ میں اس قدر غاؤ ہوتا ہے کہ پٹھنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہوا کے اخراج یا ڈکاروں سے قدرے افتادہ ہوتا ہے۔

کوکولس (Cocculus): ب ہوا خارج نہ ہونے کے باعث پیٹ دھول کی طرح پھول

جائے۔
لائیکوپریسیکم (Lycopersicum): پیٹ میں بہت زیادہ اچھارہ ہوتا ہے خصوصاً صبح 10 بجے سے 11 1/2 بجے کے دوران۔ جس کے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں پانی کی پیاس ہوتی ہے۔
لیکسیس (Lachesis): پیٹ گرم اور حساس ہوتا ہے۔ درد والا اچھارہ اور تکاؤ ہوتا ہے۔ دباؤ برداشت نہیں ہو سکتا۔ متواتر ہوا کا اخراج ہوتا ہے۔ ذکاروں سے اتفاق ہوتا ہے۔
پلساٹیلہ (Pulsatilla): پیٹ میں سخت جسم کا تکاؤ ہوتا ہے۔ درد قویٰ کے ساتھ اکثر تھکے اور اسل لائق ہوتے ہیں۔ کھنچاؤ (انقباض) ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ پتھر مٹانے تک پھیل گیا ہو۔ مرغن غذاؤں کے کھانے سے اور فطری غذاؤں نیز پھلوں کے کھانے سے برے اثرات کا مرتب ہوتا ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vomica): شراب کافی اور بیشک دلی زندگی کے بد اثرات۔ ہوا کا دباؤ اوپر کی جانب ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ تنفس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ سینے میں دباؤ ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے معدہ میں پتھر ہوں۔ قبض ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ پاخانہ کی لا حاصل کوشش ہوتی ہے۔

ہرنیا — (Hernia)

(Inguinal or Umbilical)

کلیکریا کارب (Calcarea Carb): یہ چوٹی کی دوا ہے۔ علاج اسی دوا سے شروع کرنا چاہئے۔ یہ دوا بہت زیادہ تعداد میں مریضوں کو شفا دیتی ہے۔ یہ دوا ہرنیا میں استعمال کی جاتی ہے جب کہ ہرنیا کی چوٹی نہ پھنی جا سکے۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): دائیں جانب کا ہرنیا آنتوں کے الجھاؤ والا ہرنیا ہر پندرہ روز کے بعد 1000 طاقت کی دوا دیجئے۔ پیٹ میں گڑبڑاہٹ کے ساتھ پیٹ کا تکاؤ موجود ہوتا ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vom): بائیں جانب کا ہرنیا۔ ہر پندرہ روز کے بعد 1000 طاقت کی دوا دیجئے۔ جب لائیکوپوڈیم ناکام ہو جائے تو یہ دوا دائیں جانب کے ہرنیا کو بھی شفا دیتی ہے۔

کوکولس (Cocculus): جب لائیکوپوڈیم اور نکس وامیکا ناکام ہو جائیں تو یہ دوا 30 طاقت کے ساتھ دیجئے۔

اورم میٹ (Aurum Met): بچوں میں ہرنیا۔ جب درج بالا ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دوا دی جائے۔

لیکسیس (Lachesis): الجھاؤ والی اور دلدلی آنتوں والا ہرنیا۔

پلمبم (Plumbum): آنتوں کے الجھاؤ والا ہرنیا۔ یہ ہرنیا خواہ ران کا ہو، چانگھ کا ہو یا ناف کا ہو۔

سٹیفنی سگریا (Staphisagria): مثانہ کا ہرنیا۔

سیلیسیا (Silicia): چانگھ کے غدود کی سوزش اور سوجن۔ چھوٹے سے درد ہوتا ہے۔ درد والا چانگھ کا ہرنیا۔

ایسکولس ہپوکاسٹیم (Aesculus Hippocastanum): چانگھ کا ہرنیا، دائیں چانگھ کے علاقہ میں کانٹے والا درد۔

آنتیں (رکاوٹ)

Intestines (Obstruction)

بیلادونا (Belladonna): آنتوں میں رکاوٹ کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ علاج اسی دوا سے شروع کیا جائے۔

اوپیم (Opium): چھوٹی آنت میں پاخانہ کے باعث تشنجی رکاوٹ ہوتی ہے۔ پیٹ سخت ہوتا ہے۔ پھولا ہوا ہوتا ہے۔ نیز ذہول کی طرح بچا ہے۔ قہج کے درد کے دوران پاخانہ کرنے کی اور سخت پاخانہ خارج کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔

پلمبم (Plumbum): آنتیں سخت پاخانہ سے بھری ہوتی ہیں۔ تشنجی دورے واضح طور پر محسوس کئے جاسکتے ہیں اور دیکھے جاسکتے ہیں۔

کاسٹیکم (Causticum): رکے ہوئے سخت پاخانہ کے ساتھ اچھا رہتا ہوتا ہے۔

لکسیس (Lachesis): پیٹ ذہول کی طرح بچا ہے۔ حساس ہوتا ہے اور پُر درد ہوتا ہے۔ کر کے گرد کوئی چیز برداشت نہیں ہوتی۔

آنتوں کی تکلیف

(Intussusception of Bowels)

اکونائٹ این (Aconite N): جج کے ساتھ اچانک درد ہوتا ہے۔ بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے۔ امعاء مستقیم سے خون اور بلغم خارج ہوتی ہے۔ امعاء مستقیم غبارے کی طرح پھول جاتی ہے۔ پاخانے کا ٹکڑا آنت کے بالائی حصہ میں اٹک جاتا ہے۔ سرخ لعاب کی طرح کا مواد امعاء مستقیم سے نکلتا ہے۔ ہر چندہ سخت کے بعد 30 طاقت کا ڈائی لیوشن دیجئے۔ بڑی طاقت

کی خوراک بھی کام کرتی ہے مثلاً 1000 طاقت کا ڈائی لیوشن۔
پلمبم (Plumbum): قہقہہ درد اور پاخانے کی قے ہوتی ہے۔ ناف کی جگہ میں کھینچاؤ کا احساس ہوتا ہے جیسے کسی رسی کے ذریعے کھینچا جا رہا ہو۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ پیٹ کو اندر کی جانب کھینچا جا رہا ہے۔ اس احساس کے وقت یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پیٹ اور کمر ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے ہوں۔

اوپیم (Opium): شدید درد قویخ اور مروڑوں کے ساتھ۔
وریمٹرم ایلیم (Veratrum Alb): بہت تیزی ہوتی ہے۔ جھک کر دوہرا ہونے اور پیٹ کو دبانے سے بہتری ہوتی ہے۔ بہت زیادہ اذیت ہوتی ہے۔

ناف — (Navel)

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): اچھارے کے باعث ناف کا باہر نکل آنا۔
نکس موسکٹا (Nux Moxch): نوزائیدہ بچوں کی ناف کی سوزش۔
ایبروٹانم (Abrotanum): چھوٹے بچوں کی ناف سے خون آلود مواد رستا ہے۔
ہایوسکیموس (Hyoscyamus): چھوٹے بچوں کی ناف سے پیشاب کا رستہ۔
گالک فاس (Galc Phos): چھوٹے بچوں کی ناف سے خون آلود مواد رستا ہے۔
ڈائیوسکوریہ (Dioscorea): درد ناف سے شروع ہو کر پھیل جاتا ہے۔
الیومینا (Alumina): ناف کی سکڑن۔

رکاوٹ (Obstruction)

نکس وامیکا (Nux Vom): بڑی آنت کے زیریں حصہ میں درد کے ساتھ رکاوٹ ہوتی ہے۔ درد والی جانب لیٹ کر دبانے سے تکلیف میں آفاق ہوتا ہے۔ مریض پاخانہ یا ہوا خارج کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔
ریٹاکس (Rhus Tox): ٹھنڈے مشروبات کے علاوہ ہر چیز قے ہو جاتی ہے۔ زبان پالش کی ہوئی ہوتی ہے۔ نیز زبان کی نوک تین اطراف سے سرخ ہوتی ہے۔ بے چینی ہوتی ہے۔ مریض اپنی حالت مسلسل تبدیل کرتے رہتا چاہتا ہے۔ مریض جس جانب جس کروٹ لیٹتا ہے اسی جانب درد شروع ہو جاتا ہے اور وہ جانب سن ہو جاتی ہے۔
اوپیم (Opium): آنتوں میں رکاوٹ ہوتی ہے۔

لبیلہ (Pancreas)

آئرس ویر (Iris Ver): لبیلہ کے علاقہ میں درد اور تکلیف ہوتی ہے جس کے ساتھ ٹھسے پانی کی تفتے ہوتی ہے اور چکنا تھوک ہوتا ہے۔ پانی والے اسال لاحق ہوتے ہیں جو غیر منظم چکناکی پر مشتمل ہوتے ہیں۔

آئیوڈین (Iodine): یہ دوا تھوک کے حدود پر عمل کرتی ہے۔ جب کہ تھوک پانی والا باافراط ہوتا ہے۔ پانی والے مواد کی یا کھٹے مواد کی شدید بافراط تفتے ہوتی ہے۔ نرم پانی والے افراط کے ساتھ اسال لاحق ہوتے ہیں۔ چکناکی والے جھاگ دار پاخانے ہوتے ہیں۔ خوب کھانے کے باوجود جسم پر گوشت نہیں ہوتا۔

فاسفورس (Phosphorus): کئی اعضاء خصوصاً دل، جگر یا گردوں میں چربی کا بگاڑ لاحق ہو جاتا ہے۔ غیر منظم خوراک کے ٹکڑوں والا پاخانہ ہوتا ہے۔ خوراک کے ٹکڑے ساگودانہ کی طرح کے ہوتے ہیں۔ پاخانہ تیل آلود دکھائی دیتا ہے۔ لبیلہ کی چربی کا بگاڑ واقع ہو جاتا ہے۔

بیلادونا (Belladonna): لبیلہ کا نزلہ، لبیلہ کا سوزشی سیلان خون۔

سوزش غشائے مصلیٰ (Peritonitis)

اکونائٹ این (Aconite N): جب ٹھنڈ لگ جانے کے باعث ہو۔ معدے کی جھلی (پیریٹونیم) میں درد کے ساتھ بخار ہو جاتا ہے۔

فیرم فاس (Ferrum Phos): ٹھنڈ لگ جانے کے باعث ہونے والی معدے کی جھلی کی سوزش کے لئے یہ ایک دوسری دوا ہے۔

برائی اونیا (Bryonia): تمام جسم پر جلن دار حدت کے ساتھ بخار ہوتا ہے۔ بہت زیادہ مقدار میں پانی کی بہت زیادہ پیاس ہوتی ہے۔ دبائے اور حرکت کرنے سے پیٹ کے درد میں اتری ہو جاتی ہے۔

بیلادونا (Belladonna): پیٹ سو جا ہوتا ہے اور ذہول کی طرح سے تپا ہوتا ہے۔ چھوٹے سے حساسیت ہوتی ہے۔ معمولی سے ہلانے سے شور سے اور روشنی سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابکیاں آتی ہیں اور تفتے ہوتی ہیں۔

مرکیوریس سول (Mercurius Sol): جب پیپ آنا شروع ہو جائے اور اخراج کے ساتھ پیٹ ذہول کی طرح سے بجھنے لگے۔ مریض کو بلا کی سردی لگتی ہے اور پسینے آتے ہیں۔ جاڑے اور بخار کے ساتھ اسال لاحق ہوتے ہیں۔

لیکیسیس (Lachesis): معدے کی جھلی کی سوزش ہو جبکہ معمولی سا چھوئے جانا بھی برداشت

نہ ہو۔

رشاکس (Rhus Tox): ٹائیفائیڈ کے رجحان کے ساتھ معدے کی جھلی کی سوزش ہوتی ہے۔
تیز بخار ہوتا ہے۔ زبان خشک ہوتی ہے۔ زبان کی نوک سرخ ہوتی ہے۔ پیٹ میں سوجن ہوتی
ہے۔ ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ دودھ پینے کی خواہش ہوتی ہے۔
ورعترم البم (Veratrum Album): جب مریض مروگی کی تصویر بن جائے تب اس دوا کی
نشانہ ہی کی جاتی ہے۔ ٹھنڈک انتہا درجہ کی ہوتی ہے۔ کمزوری بھی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔
قے اور جلاب لاحق ہوتے ہیں۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں اینشٹن ہوتی ہے۔

تپ دق (Tuberculosis)

فاسفورس (Phosphorus): ماساریتی غدودوں کا تپ دق۔

تاسور (Ulceration)

اورینتھو گیلیم (Ornithogalum): معدہ کے زیریں حصہ اور اندھی آنت دونوں میں تاسور
اور سرطان ہو جاتا ہے۔ جس کے ساتھ معدہ میں بہت زیادہ تھکا ہوتا ہے۔ ذکار آتے ہیں۔
بدبودار ہوا خارج ہوتی ہے۔ اذیت ناک درد ہوتا ہے۔ کپڑے ضرور ہی ڈھیلے کرنے پڑتے
ہیں۔ معدہ یا بارہ انگلی آنت کا تاسور۔

ایسٹک ایسڈ (Acetic Acid): معدہ کا تاسور، گرم اور دکھن والے ذکار ہوتے ہیں۔ خون کی
قے ہوتی ہے اور خوراک ساری قے ہو جاتی ہے۔ کترنے والے درد ہوتے ہیں۔ معدہ میں تھکا
ہوتا ہے۔ معدہ میں اور پیٹ میں جلن ہوتی ہے۔ جس میں معدہ کے بل لینے سے اتفاق ہوتا
ہے۔ اچھارہ ہوتا ہے اور استسقاء لاحق ہوتا ہے۔ خالص خون کے اسال لاحق ہوتے ہیں۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): آنتوں یا معدہ کا تاسور۔ جس کے ساتھ خون کی قے ہوتی
ہے۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً درد شروع ہو جاتا ہے۔

کالی بائیکرام (Kali Bich): مزمن اسال کے ساتھ آنتوں کا تاسور۔

مرک کار (Merc Cor): بڑی آنت کا تاسور جس کے ساتھ خونی پاخانے ہوتے ہیں۔

ٹیر۔ بستمہ (Terebinth): سیلان خون کے ساتھ آنتوں کا تاسور۔

نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid): ٹائیفائیڈ بخار میں تاسوری کیفیت۔

فاسفورس، آرسنک البم (Phosphorus, Arsenic Alb): جلن دار درد کے ساتھ

معدے کا تاسور، دی گئی ترتیب کے ساتھ آزمائیں۔

یوفوربیم (Euphorbium): معدہ میں ناسور جو کہ دھکتے ہوئے کوئلہ کی طرح جلتا ہے۔
 فاسفورس اور آرمیک الیم کے ٹکام ہو جانے کے ساتھ جلن دار درد ہوتا ہے۔
لائیکوپوڈیم (Lycopodium): چند لقمے خوراک کھانے پر ہی پیٹ کے سراسر بھرے ہونے
 کا احساس ہوتا ہے۔ 4 بجے سے 8 بجے تک مرض میں افادہ ہوتا ہے۔ IM طاقت کی خوراک
 استعمال کیجئے۔

لیکیسیس (Lachesis): معدہ کا ناسور جب کہ مریض جاگتے پر بہتری محسوس کرے۔ مریض
 کسی قسم کا انتہائی برداشت نہیں کرتا۔ اپنے کپڑے ڈھیلے کرنا چاہتا ہے۔ سورج کی گرمی بھی
 برداشت نہیں کر سکتا۔

پلساٹیل (Pulsatilla): ایسے مریضوں میں معدے کا ناسور جو چکنائی برداشت نہ کر سکیں۔ کھلی
 ہوا میں بہتری ہوتی ہے۔

تھوجا (Thuja): حفاظتی ٹیکوں میں بے اعتدالی کرنے والے مریضوں میں معدے کا ناسور۔
گریفائٹس (Grphites): معدہ اور بارہ انگلی آنت کے ناسوروں میں اس دوا کی بہت زیادہ
 اہمیت ہے۔ معدہ کے درد میں گرم مشروبات یا گرم خوراک سے اور لینے سے کمی ہوتی ہے۔
نیٹرم فاس (Natrum Phos): معدہ کا ناسور کھانا کھانے کے بعد صرف ایک ہی مقام پر درد
 ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ بہت زیادہ تیزابیت ہوتی ہے اور تیزاب منہ کی جانب چڑھتا ہے۔
میدورنیم (Medorrhinum): غذا کھانے کے 2 گھنٹے بعد ہونے والے درد کے ساتھ بارہ
 انگلی آنت کا ناسور بہت زیادہ بڑھا ہوا اچھارہ ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ سمندر کے کنارے بہتر ہو جاتا
 ہے۔ IM طاقت کی خوراک دیجئے۔

ایسکولس ہیپ (Aesculus Hip): معدہ میں اجتماع خون اور ناسور ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ
 کھنے مواد والی قے کا رجحان ہوتا ہے۔ کھٹے ذکار آتے ہیں۔ معدہ میں مسلسل تکلیف اور جلن
 ہوتی ہے۔

یورینیم نائٹریکم (Uranium Nitricum): پائیلورک اور معدہ کے ناسور کے لئے یہ دوا مفید
 ہوتی ہے۔ پیٹم کی قے ہوتی ہے جو کہ خون اور پیس ہوئی کافی کے ملے جلے مواد کی ہوتی ہے۔
 پاخانہ تارکول کی طرح کا اور گہرے رنگ کا ہوتا ہے۔

حصہ دوم — معدہ

تیزابیت (Acidity)

(دیکھئے ”درد معدہ“ اور ”ڈکار“)

بھوک بڑھی ہوئی یا پیٹوں والی

Appetite (Increased or Ravenous)

سنا (Cina): بڑھی ہوئی بھوک جس کا باعث پیٹ میں کیڑوں کا موجود ہوتا ہو۔ بچے کھانے سے آرام محسوس کرتا ہے۔

لیک (Lac Can): مریض بہت بھوکا ہوتا ہے۔ اتنا کھانا نہیں کھا سکتا کہ مطمئن ہو جائے۔

فلورک ایسڈ (Fluoric Acid): بڑھی ہوئی بھوک، مریض متواتر بھوکا رہتا ہے۔ اسے ٹھنڈے پانی کی طلب رہتی ہے۔ معدہ میں یہ احساس رہتا ہے کہ سب کچھ ہضم ہو چکا ہے۔ بیش کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہے۔ جس سے کچھ آرام محسوس ہوتا ہے لیکن یہ آرام زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا جلد ہی وہ دوبارہ بھوکا ہو جاتا ہے۔

ایبس کین (Abies Can): کالٹے والی (کترنے والی) بھوک، ضرورت سے زیادہ کھانے کا رجحان۔

گریٹیولا (Gratiola): کھانا کھانے کے بعد بھوک لگے، معدہ خالی ہونے کے احساس کے ساتھ۔

لیکسیس (Lachesis): معدہ میں درد کے ساتھ بڑھی ہوئی بھوک۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): پیٹوں والی بھوک لگتی ہے۔ لیکن جیسے ہی کھانا شروع کرتا ہے تو چند لمحوں کے بعد بھوک ختم ہو جاتی ہے اور مریض شکم سیر ہو جاتا ہے۔

پٹرولیم (Petroleum): اسہال کے ساتھ بڑھی ہوئی بھوک۔

آئیوڈین (Iodine): کتوں والی (کبھی) بھوک کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ ہر تین یا چار گھنٹوں کے بعد اگر مریض کھانا نہ کھائے تو یوں لگتا ہے کہ بے ہوش ہو جائے گا۔ وہ دو کھانوں کے درمیان بھی کھاتا ہے۔ پھر بھی اس کی بھوک دور نہیں ہوتی۔ 3x طاقت کی خوراک دیجئے۔

ایومینا سلی کیٹ، ایومینا فاس (Alumina Silicate, Alumina Phos): کھانے کی

رغبت (شوق) کے بغیر ہی بڑھی ہوئی بھوک۔ کھانا کھانے کے بعد بھی مریض بھوکا ہوتا ہے۔
پیٹوں والی بھوک۔

ایبروٹانم (Abrotanum): دودھ میں اچلی ہوئی روئی کی طلب ہوتی ہے۔ جس سے اس کی
کترنے والی بھوک مٹی ہے۔ دودھ سے بیزاری ہوتی ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): کھانے کی خواہش کے بغیر جوع الکلب اکتوں جیسی بھوک۔
ارجنٹم میٹلیکیم (Argentum Metallicum): مکمل اور بھرپور کھانا کھانے کے بعد بھی
مریض بھوکا ہوتا ہے۔

آرم ٹرائی قلم (Anum Triphyllum): ناشتہ کرنے کے بعد پیٹ خالی ہونے کا احساس۔
اینٹھن تھیرم (Anantherum): غیر صحت مندات بھوک، مریض رات کو جاگ جائے۔ ٹیپ
والے (یا پیسے) کیڑے پیٹ میں ہوتے ہیں۔

ہائیڈراستس (Hydrastis): غذا سے سخت نفرت کے ساتھ بھوک ہوتی ہے۔ اس دوا میں
یہ علامات بنیادی ہے۔ خوراک جذب نہیں ہوتی ہے۔

سلفر (Sulphur): کھانے کے عمومی وقت سے ایک گھنٹہ قبل ہی پیٹ خالی ہونے کا احساس
ہوتا ہے۔ خصوصاً دن کے 11 بجے۔ اگر مریض کو غذا نہ دی جائے تو مریض کمزور ہو جاتا ہے اور
متلی ہونے لگتی ہے۔ ہاتھوں کی پتیلیوں اور پاؤں کے ٹکڑوں میں جلن ہوتی ہے۔ نیز سر میں
بھی درد ہوتا ہے۔

نکس دامیکا (Nux Vom): شراب (آب جو) کے استعمال کے بعد بھوک لگتی ہے۔ مزمن
چپش میں بھوک لگتی ہے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): جوع الکلب سے مریض جاگ جائے۔
کلیسریا کارب، فیرم میٹ، آئیوڈیم (Calcarea Carb, Ferrum Met, Iodium):
بڑی ہوئی بھوک جو کہ کھانے کی خواہش نہ رہنے کے ساتھ اولتی بدلتی رہے۔ سوکھا مسان میں
اچھا (خوب) کھانے کے باوجود جسم پر گوشت نہیں ہوتا۔

مرک کار (Merc Cor): معدہ کے سرطان میں بھوک کا گلتا۔
کافیا (Colfea): کلیت میں کھانا کھانے کے ساتھ۔

آرسنک البم (Ars Alb): کھانا ہی پڑے حالانکہ مریض جانتا ہے کہ جاڑا خود کر آئے گا۔
ہائیوسکیمس (Hyoscamus): کھانے کی خواہش کے حملہ سے پہلے جوع الکلب۔

یوپیٹوریم پرف (Eup Perl): کوئین کے استعمال کے بعد میعاد ہی بخار میں بھوک لگے۔
زنک میٹ (Zincum Met): بازوؤں اور ہاتھوں میں کمزوری کے احساس کے ساتھ بھوک۔

آرسنک البم (Ars Alb): کھانا ہی پڑے حالانکہ مریض جانتا ہے کہ جاڑا خود کر آئے گا۔
ہائیوسکیمس (Hyoscamus): کھانے کی خواہش کے حملہ سے پہلے جوع الکلب۔

یوپیٹوریم پرف (Eup Perl): کوئین کے استعمال کے بعد میعاد ہی بخار میں بھوک لگے۔
زنک میٹ (Zincum Met): بازوؤں اور ہاتھوں میں کمزوری کے احساس کے ساتھ بھوک۔

یوپیٹوریم پرف (Eup Perl): کوئین کے استعمال کے بعد میعاد ہی بخار میں بھوک لگے۔
زنک میٹ (Zincum Met): بازوؤں اور ہاتھوں میں کمزوری کے احساس کے ساتھ بھوک۔

نٹرم کارب (Natrium Carb): معدہ کے گڑھے میں خالی پن کا احساس۔ دوپہر سے پہلے ہوتا ہے اور بھوک لگتی ہے۔

ایلیئم سیٹروا (Allium Sat): بہت زیادہ کھانے کی عادت 'چیڑ'۔

وریرٹرم ایلم (Veratrum Alb): دوران حمل بھوک 'متواتر پیشاب کرنے کے ساتھ'۔

اولیم جیک (Oleum Jac): سوکڑے والے بچوں میں بھوک۔

انیشیا (Ignatia): سگریٹ نوشی کی عادت کے ساتھ۔

کینابیس انڈیکا (Cannabis Ind): ایسی بھوک جو کھانا کھانے سے بھی کم نہ ہو۔

مگنیشیا کارب (Magnesia Carb): بچے دودھ پینے سے انکار کر دیں اگر دودھ نہیں تو دودھ

ہونے لگے۔ پاخانہ سبز ہوتا ہے۔ تحض میں دھن ہوتی ہے۔

بھوک 'کھو جائے' (Appetite- Lost)

نکس دامیکا (Nux Vom): ذائقہ گڑوا ہوتا ہے۔ زبان پر پیچھے سے پیلے رنگ کا طبع ہوتا ہے۔ بنیادی وجہ بد ہضمی ہوتی ہے۔

چائنا (China): بھوک نہیں ہوتی لیکن دسب کھایا جائے تو بھوک لوٹ آتی ہے۔

انیشیا (Ignatia): غذا 'مشروبات یا سگریٹ نوشی کی خواہش مکمل طور پر جاتی رہتی ہے حالانکہ ان چیزوں سے نفرت نہیں ہوتی یا ان کا ذائقہ برا نہیں لگتا۔

فیرم فاس (Ferrum Phos): بھوک مدھم ہو جاتی ہے یا بالکل جاتی رہتی ہے۔ غذا کی

رغبت (شوق) نہیں ہو سکتی۔ غذا 'دودھ' گوشت وغیرہ سے بے زاری ہوتی ہے۔ پیٹ پھولا

ہوتا ہے۔ جگر اور کلی بڑھ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ اچھارہ ہوتا ہے۔ مٹکی ہوتی ہے اور قے ہوتی ہے۔

ہومارس (Homarus): بھوک کھو جاتی ہے 'ساتھ میں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ پیسے

مریضہ میں ملنے جلنے کی طاقت نہ رہی ہو۔ صبح کو جاگنے کے بعد 'گلا دکھتا ہے'۔

لیک ویک ڈیفیل (Lac Vase Defl): بہت زیادہ مقدار میں پانی کی بہت زیادہ پیاس کے

ساتھ بھوک کا جاتے رہتا۔

ایبلس این (Ables Ni): صبح کے وقت بھوک مکمل طور پر کھو جاتی ہے۔ جبکہ دوپہر کے وقت

اور رات غذا کی بہت زیادہ طلب ہوتی ہے۔

جنٹیانالٹ (Gentiana Lut): بھوک کا عمومی طور پر جاتے رہنا یا عادی بیماری کے بعد بھوک

کا جاتے رہنا۔ مدر ٹکچریا 3x طاقت کی خوراک کھانے سے آدھا تختہ قبل دیکھئے۔

پرونس لیس (Prunus S): چند لٹھے لینے کے بعد پیٹ بھر جائے جیسے بہت زیادہ کھلیا ہو۔
 اس علامت کے لئے لائیکو پوڈیم کو بھی آزمائیں۔
 کلکیریا آرسینیکم (Calcarea Ars): غذا کی خواہش نہیں رہتی لیکن ٹھنڈے پانی کی پیاس
 ہوتی ہے۔
 مرکوریس (Mercurius): بچے دودھ پینے سے انکار کر دیتے ہیں۔

کینسر (Cancer)

اور تھوگالم (Ornithogalum): معدہ کے زیریں حصہ اور اندھی آنت دونوں کا سرطان۔ یہ
 دوا درختچہ کی صورت میں استعمال کرنی چاہئے اور چائے کے چمچ بھریانی میں ایک قطرہ ڈال کر
 دینا چاہئے۔ اس دوا سے مریض کالے رنگ کا لعاب دار مادہ نکلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس
 سے بہت زیادہ افادہ ہوتا ہے۔ اگر پہلی خوراک عمل نہ کرے تو دوسری خوراک 48 گھنٹوں کے
 بعد دی جاسکتی ہے۔

کاربووٹیج (Carbo Veg): پیٹ کے بالائی حصہ میں جلن اور اچھارہ کے ساتھ۔
 کوڈوراٹو (Condurango): معدہ کا سرطان، معدہ کے زیریں حصہ میں سخت گاتھ دار
 سوجن ہوتی ہے۔

آرسنک ایلیم (Arsenic Alb): جلن اور بے چینی کے ساتھ۔ تھوڑے تھوڑے پانی کی
 پیاس ہوتی ہے اور گرم چیزیں لگانے سے افادہ ہوتا ہے۔

چیلیدونیم (Chelidonicum): معدہ کا سرطان۔ IM یا CM خوراک دیجئے۔
 فاسفورس (Phosphorus): پس پی ہوئی کافی جیسے مواد کی ترقی کے ساتھ۔ خصوصاً جب
 ناسوری کیفیت میں تبدیلی ہو۔ اونچی طاقت کی خوراک مثلاً IM یا CM دیجئے۔

ڈکار (Erucations)

(نیز دیکھئے "درد معدہ" اور "پیٹ" کے ذیل میں "اچھارہ")

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): بلند آواز والے، باافراط اور بغیر درد کے ڈکار ہوتے ہیں۔
 کاربووٹیج (Carbo Veg): معدہ میں تازہ ہوتا ہے۔ ڈکار آتے ہیں۔ جن کے ساتھ خوراک
 کا ذائقہ ہوتا ہے۔ دل کی جلن کے بغیر۔
 کاربو انیمس (Carbo An): کاربووٹیج کے بعد دی جائے۔ جب اچھارہ کھانے کی ٹہلی کے منہ
 تک آجائے اور دباؤ اور دم گھٹنے کا باعث بنے۔

کاربولک ایسڈ (Carbolic Acid): اعصابی بد ہضمی کے ساتھ ڈکار آتے ہیں۔
 ابیس نائنگ (Abies Nig): پیٹ کے بالائی حصہ میں اسٹے ہوئے انڈے کی طرح سخت ڈھیلا
 ہوتا ہے۔ جس میں درد کے احساس کے ساتھ ڈکار آتے ہیں۔

نکس موسکاٹا (Nux Mosch): اعصابی مریضوں میں اچھا رہ۔
 سلفر (Sulphur): خوراک کے ٹکڑوں والے ڈکار آتے ہیں۔ جو بہت کھٹے ہوتے ہیں۔

اوسیم (Osmium): مولی کے ڈکار۔
 سلفیورک ایسڈ (Sulphuric Acid): دل خراب ہونے کے ساتھ ڈکار آتے ہیں۔ جن
 سے مریض دانت دباتا ہے۔

انٹیم کروڈ (Antim Crud): جو کچھ کھایا ہوتا ہے۔ اس کے ذائقہ والے ڈکار آتے ہیں۔
 منگنی ہوتی ہے اور تے کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔
 بسمتھم (Bismuthum): ہر مرتبہ کھانا کھانے کے بعد متلی ہوتی ہے۔ پانی پیسے ہی معدہ تک
 پہنچتا ہے تے ہو جاتا ہے۔ مواد منہ کی طرف شدت کے ساتھ اٹھتا ہے اور متعفن ہو آتی ہے۔
 پیٹ میں گڑگڑاہٹ ہوتی ہے۔ پیٹ میں جلن ہوتی ہے۔ تے آتی ہے اور اسل لاجق ہوتے
 ہیں۔ معدے کا سرطان۔

ایپی کاکووانہ (Ipecacuanha): متلی ہوتی ہے۔ خالی ابکائیاں آتی ہیں۔ سوڑ کا گوشت کھانے
 کے بد اثرات۔ مشروب اور غیر منضعم غذا کی تے ہوتی ہے۔ اسل کے ساتھ تے لاجق ہو۔
 خون کی تے ہوتی ہے۔

ہائیڈراسٹس (Hydrastis): کھٹے مواد (مائع) والے ڈکار معدہ کا سرطان دودھ کے علاوہ ہر
 چیز تے ہو جاتی ہے۔ روئی یا سبزیاں تیزابیت کا باعث ہوتی ہیں۔ مزمن پیٹ کا نزل۔

فیرم آئیوڈینم (Ferrum Iodatum): غذا اوپر کی جانب دھکا کھاتی محسوس ہوتی ہے۔
 کیوپرم میٹ (Cuprum Met): پانی پیتے وقت سنائی دی جانے والی آواز آتی ہے۔

برائی اونیا (Bryonia): کڑوے ذائقہ والے ڈکار آتے ہیں۔

ہائیڈروسائنگ ایسڈ (Hydrocynic Acid): پانی اس طرح سے لڑھکتا ہے جیسے خالی پیسے
 میں ہو۔

آرسینکیم ایلبم (Arsenicum Alb): تیزابی (خراش دار) اور کڑوے ڈکاروں کے لئے یہ دوا
 ہوتی ہے۔

سورینم (Phorinum): سڑے انڈوں جیسے ذائقہ والے ڈکار ہوں۔

ایٹھوزا (Aethusa): کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ کے بعد غذا معدے سے ڈکاروں کے ساتھ

اور کو آتی ہے۔ قے اس تکلیف کو کم کرتی ہے۔ بہت زیادہ پریشانی اور درد ہوتا ہے۔
پلساٹیل (Pulsatilla): جو کچھ کھایا ہو اس کے ذائقہ کے ساتھ متواتر ذکار آتے ہیں۔ گریس
والے ذکار۔

کیموسیل (Chamomilla): بطور عمل انگیز دوا کے اسے گرم پانی میں ملا کر دیا جاسکتا ہے۔
بشرطیکہ نشاندہی کی گئی دوائیں اثر کرنے میں ناکام ہو جائیں۔

لاروسیراس (Laurocerasus): کڑوے باراموں جیسے ذائقے والے ذکار آتے ہیں۔ مانع
معدہ میں آواز کے ساتھ لڑھکتا ہے۔

غذا کا زہر (Food Poisoning)

نکس و امیکا (Nux Vom): خوراک کے زہر کے لئے یہ دوا چوٹی کی ہے۔ قے ہوتی ہے۔
معدہ میں درد ہوتا ہے۔ اسہال لاحق ہوتے ہیں۔

آرسنک الیم (Arsenic Alb): آئس کریم یا زیادہ پکے ہوئے پھل کھانے کے بعد۔
ہیشیا، کیوپرم (Baptisia, Cuprum): دیہاتی یا زہریلا کھانا کھانے سے 'علامت کے مطابق
دوا کا انتخاب کیجئے۔

کاربووج (Carbo Veg): خراب اور سزا ہوا گوشت کھانے سے۔
ہائیوسائیمس (Hyoscyamus): کھانے کا زہر لاحق ہونے کے دوران (جھٹکے لگیں) دورے
پڑیں۔

نیرم میور (Natrium Mur): شہد کھانے کے برے اثرات۔
پلساٹیل (Pulsatilla): مرغین غذا کھانے کے بعد یا چاکلیٹ کھانے کے بعد۔
ارجنٹم نائٹریکیم (Argentum Nitricum): مکمل بے ہوشی لاحق ہو۔ حواس باقی نہ رہیں
اور جھٹکے لگیں۔ سیاہ رنگ کی قے ہوتی ہے۔

درد معدہ (Gastralgia)

(نیز دیکھئے "ذکار")

نکس و امیکا (Nux Vom): معدے کی اتھری کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ کھانے کی
خواہش باقی نہیں رہتی۔ کھانے کے بعد درد ہوتا ہے۔ بد ہضمی اس دوا کی بنیادی علامت ہے۔
معدہ کے بالائی حصہ سے درد شروع ہو کر اس کی لہریں کئی سمتوں کو جاتی ہیں جس کے ساتھ
تھپتی قے ہوتی ہے۔ اعصابی درد شکم ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹہ کے بعد بے چینی

شروع ہو جاتی ہے۔ جب تکلیف شراب نوشی کے باعث لاحق ہو۔
 کاربوویج (Carbo Veg): ست اور نامکمل ہاضمہ، معدہ اور انتڑیوں میں وزن ہوتا ہے۔
 قش ہوئی ہے اور معدہ خالی ہونے کا احساس رہتا ہے۔ کھانا کھانے سے بھی یہ احساس دور نہیں
 ہوتا لیکن چند لمحے کھانے کے بعد پیٹ بھرا ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ معدہ سینہ اور پیٹ میں
 شدید جلن ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ اینڈیشن والے درد ہوتے ہیں۔ جو مریض کو دہرا ہونے پر
 مجبور کر دیتے ہیں۔ معدہ میں گرانی ہوتی ہے۔ ڈکار تیزابی، کھٹے اور بدبودار ہوتے ہیں۔ معدہ
 میں با پیٹ کے بالائی حصہ میں اچھارہ ہوتا ہے۔

آرس ویر (Aris Ver): بڑھی ہوئی تیزابیت کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔ کھٹے اور کڑوے
 ڈکار آتے ہیں اور تے ہوتی ہے۔ جس کے باعث مریض دانٹوں کو دبا لیتا ہے۔
 روبینیا (Robinia): جب آرس ویر ناکام ہو جائے تو یہ دوا بڑھی ہوئی تیزابیت کے لئے
 آزمائی چاہئے۔

پٹیلیانی (Ptelia T): درد سر کے ساتھ صفرا ہوتا ہے۔ مزمن سوزش معدہ، معدہ میں
 مستقل گھٹنے کا احساس نیز مستقل حدت اور جلن ہو۔ قبض ہوتی ہے اور سہ پہر کے وقت بخار
 ہو جاتا ہے۔ جگر سوج جاتا ہے۔ دبانے سے دکھن ہوتی ہے۔ مدھم اور مسلسل درد رہتا ہے۔
 جگر میں اجتماع خون ہوتا ہے۔ مزمن ورم جگر۔

چائنا (China): جب کہ سارے پیٹ میں ہی اچھارہ ہو اور پردرد تناؤ موجود ہو۔ صرف
 ڈکاروں سے ایک لمحے کے لئے افاقہ ہوتا ہے۔ کھٹے یا کڑوے ڈکار آتے ہیں یا بدبودار ہوا خارج
 ہوتی ہے۔ ہاضمہ ست ہوتا ہے۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے پر ابتری ہو جاتی ہے۔ پیلے رنگ
 کے اسمال لاحق ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت اور کھانا کھانے کے بعد ابتری ہو جانا اس دوا کی
 اہم و کلیدی علامت ہے۔ اس دوا میں جلن کے ساتھ بدبودار ڈکار نہیں آتے اور یہی علامت
 اسے کاربوویج سے ممتاز کرتی ہے۔ اس دوائی ایک اور اہم علامت یہ ہے کہ اس میں کھانا ہضم
 نہیں ہوتا لیکن لمبے عرصہ کے لئے معدہ میں پڑا رہتا ہے۔ جس کے باعث ڈکار آتے رہتے ہیں
 اور پھر آخر کار غیر ہضم غذا آتے ہو جاتی ہے۔

انٹیم گروڈ (Antim Grud): اسمال، لیس دار، کھٹے اور بدبودار ہوتے ہیں۔ بچہ ہر بار جب
 بھی اسے دودھ پلایا جائے یا کھانا کھلایا جائے تے کر دیتا ہے۔ زبان پر کافی موٹا سفید طبع ہوتا
 ہے۔ بچوں کے پیٹ کی مزمن خرابی، مسلسل متلی ہوتی رہتی ہے۔ معدہ میں ڈھیلا ہوتا ہے۔
 تناؤ اور تھکاوٹ ہوتی ہے۔

لائیکو پوڈیم (Lycopodium): جب پیٹ کے زیریں حصہ میں اچھارہ ہو تو اس دوا کی

نشانہ کی جاتی ہے۔ کھانے کی خواہش (ہموک) بہت شدید ہوتی ہے لیکن چند لمحے کھانے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پیٹ بھرا ہوا ہو چنانچہ مریض کو کھانا چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ پلساٹیلہ اور اناکارڈیم کی طرح سے نہیں ہوتا کہ کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد طبیعت خراب ہو جیسا کہ ان دو ادویات میں ہوتا ہے۔ لائیکو پوڈیم میں کھانے کے فوراً بعد ہی طبیعت بکڑ جاتی ہے۔ ٹکس موسکاتا میں بھی طبیعت کھانے کے فوراً بعد خراب ہوتی ہے لیکن اس میں کمر کے قریب دباؤ کی برداشت نہیں رہتی ہر وقت نہیں جیسا کہ ٹکس میں ہوتا ہے۔ اس دوا کی ایک اور اہم علامت مٹھائیاں کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ خصوصاً یہ دوا تیزابی بد ہضمی کی کیفیت کے لئے بہت مفید ہے کیونکہ اس کا ذائقہ کھانا ہوتا ہے۔ کھنے ڈکار آتے ہیں اور تے ہوتی ہے۔ جب بھی تے آتی ہے تو یہ کھنی ہوتی ہی۔ معدہ کے گڑھے میں پردرد سوجن ہوتی ہے۔ گیس والے ڈکاروں سے کوئی افادہ نہیں ہوتا۔ پیشاب میں سرخ ریت خارج ہوتی ہے۔ نوزائیدہ بچوں میں درد قویخ ہو۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): منہ خشک ہوتا ہے۔ صبح جاگنے پر منہ کا ذائقہ متعفن ہوتا ہے اور یہ احساس ہوتا ہے کہ غذا سینے میں بھری ہوئی ہے۔ یہ اس دوا کی بنیادی علامات ہیں۔ زبان پر مونے، کھردرے اور سفید کائے پڑے ہوتے ہیں۔ تیزابیت ہوتی ہے اور دل کی جلن ہوتی ہے۔ غذا کا ذائقہ کڑوا، کھٹا یا بدبودار ہوتا ہے۔ منہ میں بھرنے والے پانی اور ڈکاروں کا ذائقہ کھائی ہوئی غذا والا ہوتا ہے۔ پیاس نہیں ہوتی۔ صرف منہ کو گیلیا کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ برا ذائقہ پلساٹیلہ کی خصوصی علامت ہے۔ یہ دوا مرغن غذاؤں، سور کا گوشت، پیمبری یا مشکل غذاؤں (مٹی جلی غذا) کے کھانے سے لائق ہونے والی بد ہضمی میں خاص طور سے مفید ہوتی ہے۔ مریض کو ٹھنڈ لگتی ہے لیکن گرمی سے مرض میں ابتری واقع ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت ابتری ہوتی ہے۔ ٹکس دامیکا کے برعکس جس میں ابتری صبح کے وقت ہوتی ہے۔

ڈوری فورہ (Doryphora): معدہ اور دیگر اعضاء میں جلن ہوتی ہے۔

اناکارڈیم (Anacardium): کھانے کے بعد بہت زیادہ افادہ ہو جاتا ہے اور یہی اس دوا کی رہنما کن علامت ہے۔ کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد ڈوبنے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اور معدہ میں بھرم درد ہوتا ہے جو کہ دیرھ تک پھیل جاتا ہے۔ بے ذائقہ ڈکار آتے ہیں۔ کبھی کبھی کھنے بھی ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد ابتری ہوتی ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): خوراک منہ کو آتی ہے۔ ٹھنڈی غذا کی طلب ہوتی ہے جو کہ معدے میں جا کر جیسے ہی گرم ہوتی ہے۔ تے ہو جاتی ہے۔ مٹی کے بغیر خون تھوکتا بھی اس دوا میں عام ہے۔ معدہ میں خالی پن اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے جبکہ سلفر اور سیپیا میں ایسی

کیفیت نہیں ہوتی۔ یہ کیفیت بڑھ کر آنتوں تک چلی جاتی ہے۔ بعض اوقات جلن کندھے کی ہڈیوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ مزمن بد ہضمی میں تے کا آئل۔ یہ دوا توڑ پھوڑ اور اختصار کے غل کے ساتھ خصوصی تعلق رکھتی ہے لہذا یہ دوا سرطانوں، غیر میعادى امراض اور گوشت کو کاٹنے والے امراض وغیرہ کی ادویات میں سے ایک ہے۔ جلن دار کھڑے والے اور محدود جگہوں پر ہونے والے وغیرہ کی ادویات میں سے ایک ہے۔ جلن دار کھڑے والے اور محدود جگہوں پر ہونے والے درد اس دوا میں بنیادی ہیں۔ گوشت تیزی کے ساتھ شرم ہوتا چلا جاتا ہے اور خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔

شائلم (Stannum) درد معدہ مریض کو چمچل قدمی پر مجبور کر دیتا ہے۔ تاکہ کچھ آرام حاصل کر سکے لیکن کمزوری اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ جلد ہی مریض کو آرام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ سخت دباؤ سے دردوں کو افادہ ہوتا ہے۔

جمنیانا سی۔ کیو (Gentiana C.O) معدہ پر دباؤ پڑتا ہے۔ جیسا کہ پاخانہ کی حاجت ہو۔ اس کے ساتھ تے کا رجحان بھی ہوتا ہے۔

اکوناٹ نیپ (Aconite Nap) معدہ میں اور معدہ کے گڑھے میں دباؤ ہوتا ہے جیسا کہ وہیں سخت پتھر پڑا ہو۔

ایسکولس سپ (Acsculus) معدہ میں بہت زیادہ جلن والی تکلیف ہوتی ہے۔ دباؤ ہوتا ہے جیسا کہ معدہ کے گڑھے میں پتھر پڑا ہو۔ ہوا کے خالی ڈکار آتے ہیں۔

گریفٹائٹس (Graphites) درد معدہ کھانے سے رفع ہو۔ معدہ کے بالائی حصہ میں ہونے والے شدید درد کو دور کرنے کے لئے مریض کھانا کھانے میں غلٹ کرتا ہے۔ خصوصاً شام کا کھانا کھانے میں اور رات کا کھانا کھانے میں۔

آرسنک ایلیم (Arsenic Alb) معدہ کی خرابی کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ پریشان کر دینے والی بد ہضمی اور حاد سوزش ہوتی ہے۔ جیت درد اور اسہال لاحق ہوتے ہیں۔ جلن دار درد جس کے ساتھ متلی اور تے ہوتی ہے۔ یہ بنیادی علامت ہے۔ معدہ حساس ہو جاتا ہے اور دکھتا ہے۔ مریض کو بہت زیادہ نفاست ہوتی ہے۔ پھل یا آکس کریم کھانے سے معدہ میں ٹھنڈ لگ جاتی ہے۔

ارجنٹم نائٹریکیم (Argentum Nitricum) بہت زیادہ اچھارہ ہو جاتا ہے۔ جس میں افادہ ڈکاروں سے ہوتا ہے۔ معدہ کے گڑھے میں کھڑے والا اور ناموری کیفیت والا درد ہوتا ہے۔ اس درد کی لہریں معدہ کے گڑھے سے شروع ہو کر ہر جانب پھیل جاتی ہیں۔ خصوصاً نازک اندام اور اعصابی مستورات میں درد معدہ۔ اس دوا کی نشاندہی ایسی صورت میں بھی کی جاسکتی

ہے جب کہ درد معدہ کا باعث جذبات ہوں، ٹینڈ کھو جانا ہو یا حیض کی تکلیف ہو۔ معدہ میں ایک ڈھیلا موجود ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ بلغم کی قے ہوتی ہے جو کہ رسی دار ہو سکتا ہے۔ شکر کھانے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ حالانکہ مٹھائیاں تکلیف کو بڑھا دیتی ہیں اور اسہال وغیرہ لاحق کرتی ہیں۔ معدہ کا ناسور کھانے کے بعد درد میں ابتری ہو جاتی ہے۔ نیز دباؤ سے بھی ابتری ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ خون، بلغم وغیرہ کی قے ہوتی ہے۔ مزمن درد معدہ، نوذائیدہ بچوں میں قوبح کا درد۔

پٹروسلینیم (Petroselinum): معدے اور آنتوں کی تکلیفات کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔
کالچیکم (Colchicum): معدہ میں برقی ٹھنڈک ہوتی ہے۔
ہیپومانس (Hippomanes): معدہ میں برقی ٹھنڈک ہو۔ چھٹی یا تیسویں طاقت کی خوراک دیجئے۔

گرے شیولا (Gratiola): معدہ میں تیزابیت گھٹیا کے ساتھ۔
نیٹرم سلف (Natrium Sulph): نمی کے باعث عمومی صفراوی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

نیٹرم کارب (Natrium Carb): دودھ پینے سے اسہال لاحق ہو جائیں۔ دل کی دھڑکن لاحق ہو۔ معدہ میں درد ہو جو کھانے سے رفع ہوتا ہے۔ درد مریض کو صبح سویرے کھانے کے لئے بستر سے نکال لیتا ہے۔

نیٹرم فاس (Natrium Phos): جیسے ہوئے دودھ کی قے کے ساتھ اچھا رہتا ہے۔ زیادہ تیزابیت ہوتی ہے۔ مٹھائیوں کی بو کھٹی محسوس ہوتی ہے۔ معدہ کی حالت تیزابی ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ تیزابی (خراش دار) مائع کی قے ہوتی ہے اور متلی ہوتی ہے۔ کھٹے ذکار آتے ہیں۔ سر کے کی طرح کا کھٹا مواد قے میں نکلتا ہے۔ کھٹے مواد کے منہ کی طرف چڑھنے کے ساتھ معدہ میں ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔

لیک ویک ڈیفیل (Lac Vace Defl): معدوی سوزش، مزمن اسہال اور قے۔

فاسفورس، فیرم میٹ، آرسنک البم، ایسکولس ہپ (Ferrum Met, Phosphorus, Aesculus Hip, Arsenic Alb):

اور مریض ذکار لینے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ چند لمحوں کے بعد ہی غذا کی کھائی ہوئی اشیائے ہو جاتی ہیں۔ دل جلتا ہے اور معدہ میں مستقل جلن رہتی ہے۔ معدہ کی سوزشی کیفیت۔

انٹیم کروڈ (Antim Crud): دماغی علامات کے ساتھ معدہ کی خرابی، مرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ قے اور / یا متلی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد غذا منہ کی طرف چڑھتی ہے۔ 200 طاقت

کی یا IM طاقت کی خوراک دیجئے۔

ملٹن تھرس (Nyctanthes): متلی اور تے کے ساتھ معدہ میں جلن ہو۔

کینڈیم سلف (Cadmium Sulph): آنتوں کی سوزش، معدہ میں جلن ہوتی ہے۔ پیٹ سوچ جاتا ہے اور ذہول کی طرح تن جاتا ہے۔ بھالے لگنے جیسے، کاٹنے جیسے اور تھجڑ لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ پانی لورس میں درد ہوتا ہے۔ خون والے پیشاب کے ساتھ خون والے اسہال لاحق ہوتے ہیں۔

برائی اونیا (Bryonia): معدوی بخاروں، نزلے اور جاڑے کے ساتھ معدے کی خرابی لاحق ہو۔ ٹھنڈ اور جاڑے کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے۔

کروٹیلس ہور (Crotalus Hor): یہ صفرا کی حیران کن دوا ہے۔ درد سر کے ساتھ کالے رنگ کے صفراوی مواد کی بڑی مقدار میں تے ہوتی ہے۔

پٹرولیم (Petroleum): حمل والا درد معدہ، جب کبھی معدہ خالی ہو تو درد لاحق ہو جائے۔ مسلسل کھانے سے افادہ ہوتا ہے۔

ایسڈ سیل سیلک (Acid Salicylic): معدہ کی تیزابیت۔

ویلرینہ آف (Velariana Off): معدہ کی اعصابی خرابی۔

سلفیورک ایسڈ (Sulphuric Acid): جب ہائیڈروکلورک ایسڈ کا استعمال اعتدال سے بڑھ جائے۔

الیومن (Alumen): ضدی قسم کی قبض کے ساتھ، درد معدہ لاحق ہو۔ متلی، تے اور مواد کا منہ کی جانب چڑھنا وغیرہ لاحق ہو۔ IM یا OM طاقت کی دوا دیجئے۔

معدہ کے ناسور (Gastric Ulcers)

(دیکھئے ”پیٹ“ کے ذیل میں ”ناسوری کیفیت“)

کلیجے کی جلن

Heartburn (Pyrosis)

ایپیک (Ipec): متلی یا تے اور بے تحاشہ اچھارہ کے ساتھ دل کی جلن (کلیجے کی جلن) لاحق ہو۔ یہ دوا حمل میں بھی موزوں ہوتی ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vomica): اچھارے اور بہت زیادہ تیزابیت کے ساتھ دل کی جلن ہو لیکن اس کے ساتھ متلی یا تے نہیں ہوتی۔ کریم والی پشیم کا طبع زبان پر ہوتا ہے۔ عمومی طور پر

معدہ خراب رہتا ہے۔ جب اپیکاک نامکام ہو جائے تو یہ دوا کامیاب ہوتی ہے۔ اسے اپیکاک کے تادلے میں بھی دیا جاسکتا ہے۔

م۔ گلکیریا کارب (Calcarea Carb): معدہ میں جلن کا احساس ہوتا ہے۔ خراش دار (تیزابی) ڈکار ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ڈکاروں کا ذائقہ کھٹا اور بعض اوقات کھاری ہوتا ہے۔ معدہ کے اوپر دباؤ کا احساس ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ غذا اور بلغم والی قے ہوتی ہے۔

سٹیفنی سیکریا (Staphysagria): سگریٹ نوشی کے باعث دل جلتا ہے۔
آرسنک ایلیم (Arsenic Alb): گندا، کڑوا یا کھٹا ذائقہ ہوتا ہے۔ خوراک کی ٹالی میں اور حلق میں گرم جلن کا احساس ہوتا ہے۔ کھٹے، خراش دار مائع والے ڈکار آتے ہیں۔ خون آلود پتلے بلغم کی قے آتی ہے اور ڈکار آتے ہیں۔ معدہ میں درد اور سخت پریشانی کے ساتھ بازو اور ٹانگیں کپکپاتی اور ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ بے قاعدہ اور متواتر نبض ہوتی ہے۔

ہچکی (Hiccough)

م۔ نکس وامیکا (Nux Vomica): بد چھٹی، قے اور اسال کے ساتھ ہچکی لاحق ہو۔
انیشیا (Ignatia): جب کھانے اور سگریٹ نوشی کے باعث ہچکی میں اضافہ ہو جائے۔ جس کے ساتھ معدہ کا بالائی حصہ خالی ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ تمباکو چبانے سے تکلیف دہ ہچکی لاحق ہو۔ خاموش غم، صدمہ یا مایوسی کے باعث بھی ہچکی لاحق ہو سکتی ہے۔ کھانے اور پینے کے بعد ہچکی لاحق ہو۔

رٹانیا (Ratanhia): کھانے کے بعد جلد ہی شدید قسم کی ہچکی لاحق ہو۔ خصوصاً جب طویل عرصہ سے غذا نہ کھائی ہو۔ معدہ میں ہوا بھری ہونے یا چیٹ میں ہوا ہونے کے بعد جس سے چیٹ تن جاتا ہے، ہچکی کا حملہ ہو۔

سٹا (Cina): شدید ہچکی لاحق ہو۔ جب رٹانیا نامکام ہو جائے تو اسے آزمایا جاسکتا ہے۔

م۔ کوکولس انڈ (Cocculus Ind): پردہ شکم کے کھینچی دردوں کے ساتھ ہچکی۔

ہائیوسائیمس (Hyoscyamus): چیٹ کی جاتی کے بعد لاحق ہونے والی ہچکی۔

ٹیوکریم (Teucrium): دودھ پلانے کے بعد جھٹکوں والی ہچکی۔

م۔ چائنا آف (China Off): کونین کے غلط استعمال کے بعد ہچکی لاحق ہو۔ ہچکی جس کے باعث درد سر لاحق ہو۔

امین میور (Ammon Mur): بھرپور کھانا کھانے کے بعد معدہ میں خالی پن کے ساتھ کترن کا احساس نیز سینہ میں ٹانگے لگنے کے احساس کے ساتھ ہچکی لاحق ہو۔

رہن کو لس بی (Ranunculus B): شراب نوشی کے بعد بھگی لاحق ہو۔ شرابیوں کی بھگی متواتر دکاڑوں کے ساتھ شدید بھگی لاحق ہو نیز جھٹکے لگیں۔

نیٹرم میور (Natrium Mur): شدید بھگی کے لئے دوا ہے۔ خواہ مزمن ہو یا حاد۔ خصوصاً زیادہ مقدار میں کونین استعمال کرنے کے باعث بھگی لاحق ہو۔

سائیکلے من (Cyclamen): حمل کے دوران بھگی لاحق ہو۔ جس کے ساتھ صبح کے وقت تے آتی ہے یا غمیں آتی۔ کھانے کے بعد بھگی لگے۔

سٹرامونیم (Stramonium): گرم مشروبات پینے کے بعد تھوک بننے کے ساتھ بہت شدید قسم کی بھگی لاحق ہو۔

وریٹرم ایلیم (Veratrum Alb): گرم مشروبات کے بعد بھگی لاحق ہو۔

آرسنک ایلیم (Arsenic Alb): ٹھنڈے مشروبات پینے کے بعد بھگی لگے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): ٹھنڈے مشروب یا سگریٹ پینے کے بعد بھگی لاحق ہو۔

کاجوچٹم ایلیمڈ سلف (Acid Sulph, Cajuputum): معمولی اشتعال سے بھگی لاحق ہو جاتے۔ زبان سوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ خوراک کی ٹالی میں تکلیف ہوتی ہے۔

وریٹرم ویر (Veratrum Vir): مسلسل بھگی رہے۔ کھانے کی ٹالی کے بالائی سرے میں تھنپی دورے ہونے کے ساتھ درد ہو۔

اشتها (Hunger)

(دیکھئے ”بھوک“ بڑھی ہوئی یا کھو جائے“)

بڑھی ہوئی تیزابیت (Hyper-Acidity)

(دیکھئے ”درد معدہ“)

کم تیزابیت (ہائیڈروکلورک ایلیمڈ کی کمی)

(Hypo-Acidity)

(Deficiency of Hydrochloric Acid)

سٹرائی کینیٹیم نائٹ (Strychninum Nit): کم تیزابیت کے لئے یہ ایک چوٹی کی دوا ہے۔ یہ دوا معدے کے رس اور تیزاب کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔

کاربوووج (Carbo Veg): تیزابیت کے نہ ہونے یا کم ہونے کے لئے یہ چوئی کی دوا ہے۔
 ہائیڈروسیانک ایسڈ (Hydrocyanic Acid): مشروب حلق اور معدہ میں لڑھکتا چلا جاتا ہے۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ کا فقدان جب معدہ خالی ہو تو درد معدہ لاحق ہو جائے۔

متلی (Nausea) (دیکھئے ”قے“)

ناسوری کیفیت (Ulceration)
 (دیکھئے ”پیٹ“ کے ذیل میں ”ناسوری کیفیت“)

قے (Vomiting)

ایپیکاکوانہ (Ipecacuanha): یہ دوا متلی اور قے کے لئے چوئی کی ہے۔ منہ تر رہتا ہے۔
 تھوگ زیادہ ہوتا ہے۔ غذا ’صفرا‘ خون یا بلغم کی قے ہوتی ہے۔ پتلی ہوتی ہے۔ زبان صاف ہوتی ہے۔ مریض غش کھا کر گر جاتا ہے۔ معدہ میں تھوگر لگتے جیسے درد ہوتے ہیں۔ متلی ’قے‘ سے بھی ختم نہیں ہوتی۔ حیض سے قبل دل کی جلن ہوتی ہے اور قے آتی ہے۔
 اینٹیم کروڈ (Antim Crud): زبان پر سفید طبع کے ساتھ قے ہونا اس دوا کی بنیادی علامت ہے۔ مریض جیسے ہی کچھ کھاتا ہے یا پیتا ہے قے ہو جاتا ہے۔ بدترین قسم کی قے جسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔

ایٹھوزا (Aethusa): بچوں کی قے کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ بچہ کچھ کھانے یا دودھ پلانے جانے کے بعد فوراً ہی قے کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور یہ اس دوا کی کلیدی علامت ہے۔ بچہ تھکاوٹ کے باعث پیچھے کو گر جاتا ہے۔ قے جسے ہوئے سہرے رنگ کے مواد والی ہوتی ہے۔ مریض قے کے فوراً بعد بھوک محسوس کرتا ہے۔

نکس و امیکا (Nux Vom): تنفس میں دقت کے ساتھ معدہ کے ہلاکی علاقہ میں وزن کا احساس ہوتا ہے۔ ایکائیوں کے ساتھ متلی ہوتی ہے۔ پاخانے کی حاجت کے ساتھ جو کہ بہت کم مقدار میں ہوتا ہے ’قونچی‘ درد لاحق ہو۔ ٹھنڈ لگتی ہے ’کپکپاہٹ‘ ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): بد ہضمی کی مزمین قے میں یہ دوا بہت مفید ہے۔ ٹھنڈے پانی کی بہت زیادہ پیاس ہوتی ہے کیونکہ ٹھنڈا پانی قے میں اتفاق پیدا کرتا ہے لیکن جیسے ہی معدہ میں پہنچ کر گرم ہوتا ہے قے ہو جاتی ہے۔ معدہ کے ناسور اور سرطان میں خون والی قے کے لئے

بھی یہ دوا مفید ہے۔

آئرس ویر (Iris Ver): بے انتہا کھنے مواد کی قے ہوتی ہے۔ یہ مواد اتنا کھتا ہوتا ہے کہ مریض دانت بھیج لیتا ہے۔ یہ قے حلق کو چھیل کر رکھ دیتی ہے۔ رسی دار تھوک ہوتا ہے۔
کروٹیلس ہو ری ڈس (Crotalus Horridus): قے اور اسہال لاحق ہوں۔ جن کے ساتھ مٹلی اور پیشاب کی تکلیف لاحق ہو۔ نیران کے ہمراہ اذیت ناک درد بھی ہوتا ہے۔ بہت زیادہ مقدار میں سیاہ صفرا والی قے ہوتی ہے۔

ہائوسکیمس (Hyoscyamus): کھانا کھانے کے بعد قے لاحق ہو۔ جو کھانا کھایا ہوتا ہے، بے ہو جاتا ہے۔ اس میں جھٹکے بھی ہو سکتے ہیں اور اینٹھن بھی۔
گالچیکم (Golchicum): کچی ہوئی غذا کی بو سے خصوصاً پھلی، انڈوں اور پکنائی والے گوشت سے مٹلی اور قے ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ دوسرے کمرے یا باورچی خانہ میں موجود غذا کی بو سے بھی مریض کو مٹلی ہونے لگتی ہے۔

لاروسیراس (Laurocerasus): کرم چولہے کے قریب آنے سے مٹلی ہو۔
یوجینیا جمبوس (Eugenia Jambos): سگریٹ نوشی سے مٹلی میں بہتری ہو۔
سینٹونیریا (Sanguinaria): معدہ میں جلن کے ساتھ مٹلی ہوتی ہے۔ تیز روشنی سے اینٹھن والا درد ہوتا ہے۔

سٹرامونیم (Stramonium): قے ہوتی ہے حتیٰ کہ نگہ سے سر اٹھانے پر بھی قے ہو جائے۔ تیز روشنی کے باعث قے ہوتی ہے۔

سٹروفینٹھس (Strophanthus): معدہ اور خوراک کی نالی میں جلن ہوتی ہے اور قے ہوتی ہے۔ اسہال لاحق ہو جاتے ہیں۔ دل کمزور ہو جاتا ہے۔ نیز دیگر دل کی تکالیف ہوتی ہیں۔
 استثناء خصوصاً پاؤں کا۔

نکٹنٹھس (Nyctanthus): معدہ میں جلن کے ساتھ مٹلی اور قے ہوتی ہے۔
کالکیریا میور (Calcarea Mur): خمدی قسم کی قے لاحق ہو۔

ایسڈ کاربولک (Acid Carbollic): شرابیوں کی قے، پیسٹ کے بالائی حصہ میں وزن کے ساتھ عام قسم کی قے ہو۔ معدہ میں جلن ہوتی ہے۔

ٹیبیکم (Tabacum): تمباکو کے غلط استعمال کے باعث قے ہو۔
کیرکیورینا پیپو (Cucurbita Pepo): قے اور مٹلی۔ شدید قسم کی۔۔۔ دوران حمل کھانے کے بعد۔

سائیکلے من (Cyclamen): صبح کے وقت متواتر قے ہو۔ اپجارہ ہوتا ہے۔ معدہ میں درد

ہوتا ہے۔

مزیریم (Mezerium): تے یا مٹلی جو کھانے کے بعد غائب ہو جائے۔ شراب کی (اند کہ پانی کی) تے جس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔

سپیا (Sepia): کھانے کے بعد مٹلی غائب ہو جائے۔ صبح کے وقت ابھری ہوتی ہے۔ حیض کے بعد تے ہونے لگے اور دل میں جلن ہو۔

کوکیلوس (Cocculus): معدہ کی بھائے دماغی تکلیف کے باعث تے ہو۔ درد شقیقہ یا دماغ کی رسولی کے باعث تے لاحق ہو۔ غذا کے خیال سے یا دوسرے کمرے سے یا باورچی خانہ سے آنے والی غذا کی بو سے مریض کو مٹلی ہونے لگتی ہے۔ بلند آواز سے بولنے کے باعث تے لاحق ہو یا کھانسی ہو جائے۔ مٹلی سر یا منہ میں محسوس ہوتی ہے۔

روٹا (Ruta): مٹلی امعاء مستقیم میں محسوس ہوتی ہے۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): معدہ میں ناسور کے باعث خون کی تے ہو۔

ڈائسکوریا (Dioscorea): مٹلی کانوں میں محسوس ہو۔

آرسنک البم (Arsenic Alb): حیض کے دنوں میں تے ہوتی ہے اور دل جلتا ہے۔

کریوزوٹ (Kreosote): جب تے یا ابکیائیاں معدہ کی کمزوری کے باعث ہوں۔ غیر منضغ غذا جسے کھائے ہوئے کچھ گھنٹے گزر جائیں تے ہو جاتی ہے۔ یا پھر تے کی وجہ پاخانہ کی بو یا کسی دوسری گندمی شے کی بو ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے ایک یا دو گھنٹے کے بعد غذا کی تے ہو جاتی ہے اور اس کے بعد مسلسل مٹلی ہوتی رہتی ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد معدہ میں جلن دار درد ہوتا ہے۔ اگر چھوٹی طاقت کی خوراک ناکام ہو جائے تو 200 طاقت کی خوراک آزمائی جائے۔

وےسپا (Vespa): گرم چوبے کے قریب جانے سے یا گرم کمرے میں جانے سے تے ہوتی ہے اور غش آتا ہے۔ غصہ یا جوش کے باعث بھی تے کا دردہ پڑ سکتا ہے۔

لوبیلیا انفلیٹا (Lobelia Infl): بہت زیادہ پسینہ آنے اور تھوک آنے کے ساتھ تے لاحق ہو۔

تھیرائیڈین (Theridion): بہ شور کے باعث مٹلی ہو۔

والبریانہ (Valeriana): ماں اگر فصد میں ہو اور بچے کو دودھ پلا دے تو دودھ پلاتے ہی بچہ اٹھیاں کرنے لگ جاتا ہے۔

کیمومیلا (Chamomilla): انیون اور مارفین کے استعمال کے بعد تے اور تکلیف دو قسم کی مٹلی اور ابکیائیاں لاحق ہو جائیں۔

اگنیشیا (Ignatia): تے۔۔۔ افادہ ہوتا ہے ناقابل ہضم اشیاء کھانے سے اور اضافہ ہو جاتا ہے قہل ہضم یا زود ہضم اشیاء مثلاً دودھ وغیرہ کے استعمال سے۔ کچی گو بھی کھڑا ہوا پیاز اور آلو تے کو روک دیتے ہیں۔

کروشن ٹنگ (Croton Tig): بصارت کھو جانے کے ساتھ تے اور بڑھی ہوئی مٹلی لاحق ہوتی ہے۔ چکر آتے ہیں۔ شراب نوشی کے بعد ابتری ہو جائے۔

کیڈیم سلف (Cadmium Sulph): معدہ جواب دے جائے۔ کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی اور ہر چیز تے ہو جاتی ہے۔ مریض خاموش رہنا چاہتا ہے اور آرام سے مرجانا پسند کرتا ہے۔ وہ بلایا جاتا یا بولنا پسند نہیں کرتا۔ سیاہ رنگ کی تے ہوتی ہے۔ جلن دار اور کانٹے والا درد معدہ میں ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ شدید قسم کی مٹلی اور تے ہوتی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی سے معمولی چیز بھی جیسے ہی ہونٹوں کو چھوتی ہے تے ہونے لگتی ہے۔

بوریکس (Borax): مسلسل تے ہوتی رہے۔ کھٹے مواد کی تے ہوتی ہے۔ ہر مرتبہ کھانا کھانے کے بعد تھکاؤ والا اچھارہ ہو جاتا ہے۔

ایسڈ سلفیورک (Acid Sulphuric): کھٹی اور تیزابی تے لاحق ہو۔ بچے کو مکمل طور پر صاف کرنے کے باوجود اس سے کھٹی بو آتی ہے۔

فیرم میٹ (Ferrum Met): تے کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ اس میں صرف غذا کی تے ہوتی ہے۔ کھانے یا پینے کے بعد۔

پلمبم (Plumbum): پاخانے کا مادہ (یعنی پاخانہ) تے ہوتا ہے۔

کروٹالس ایچ (Crotalus H): سیاہ رنگ کی تے لاحق ہوتی ہے۔

آرنیکا ایم (Arnica M): منہ کڑوا ہونے کے ساتھ نیز عام کھٹاس کے ساتھ سیاہ روشنائی جیسے رنگ کے ماوے کی تے لاحق ہو۔

پانی منہ میں بھرتا (Waterbrash)

مرک سول (Mer Sol): متواتر نگٹنے کے ساتھ منہ میں پانی کا بھرتا اس کے ساتھ مٹلی بھی ہوتی ہے۔

لکیسیس (Lachesis): منہ میں خراش دار (تیزابی) پانی بھرتا ہے۔ جو منہ میں دکھن پیدا کرتا ہے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): دوران حمل، اینٹھن کے ساتھ یا اینٹھن کے بغیر منہ میں پانی کا بھرتا۔ مٹلی کے ساتھ یا مٹلی کے بغیر۔ بد ہضمی میں یہ کیفیت ہو۔

نکس دامیکا (Nux Vomica): دل کی جلن کے ساتھ منہ میں پانی کا بھر آنا، درد قویخ کے ساتھ، بد ہضمی کے ساتھ، کھانے کے بعد۔

گنیشیا میور (Magnesia Mur): درد سر کے ساتھ منہ میں پانی کا بھر آنا، دودھ کو ہضم کرنے کی ناقابلیت جس کے باعث پیٹ میں درد ہو جائے۔ بدبودار ڈکار آتے ہیں۔ معدہ خراب ہو جاتا ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): حیض سے قبل اور حیض کے دوران منہ میں پانی کا بھر آنا لاحق ہو۔ رات کے وقت۔

پٹرولیم (Petroleum): منگی کے ساتھ منہ میں پانی کا بھر آنا۔ صبح کے وقت۔

کاربوناٹس (Carbo An): نمکین پانی کا منہ میں بھر آنا، جو منہ سے باہر پینے لگتا ہے۔

کیورارے (Curare): رحم کے ناسور میں منہ میں پانی کا بھر آنا لاحق ہو۔

سیلیسیا (Silicea): جاڑے کے ساتھ منہ میں پانی کا بھر آنا۔

سپیا (Sepia): شراب نوشی کے بعد منہ میں پانی کا بھر آنا۔

برائی اونیا (Bryonia): تیزابی پانی کا منہ میں بھر آنا، بے ذائقہ پانی منہ میں بھرے، ابکائیوں کے ساتھ۔

چیلیدونیم (Chelidonium): کڑوے ذائقے والا پانی منہ میں بھرے۔

حصہ سوم۔ جگر اور تلی

جگر کے امراض

(Ailments of Liver)

چیلیدونیم (Chelidonium): جب جگر کی لو، دائیں لو (یعنی دایاں پہلو) متاثر ہو۔ مریض دائیں پہلو (یعنی جگر کی دائیں لو) میں درد محسوس کرتا ہے۔ جو پھوٹنے پر نرم محسوس ہوتا ہے۔ یہ دوا برقان کے لئے مخصوص ہے اور چھٹی طاقت کی خوراک دینی چاہئے۔ یہ دوا جگر کے علاقہ والے درد کو بھی دور کرتی ہے جو کہ پھیل کر دائیں کندھے کی ہڈی اور چھاتی نیز معدہ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ دوا جگر کے امراض کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ دوا جگر سے پتلا اور زیادہ مقدار میں صفراوی مادہ خارج کرنے کا باعث بنتی ہے۔ یہ جگر کی پتھری نکالتی ہے اور مزید پتھری بننے سے روکتی ہے۔ اس میں درد تیز اور بھالے لگنے جیسے ہوتے ہیں۔ گرم مشروبات کے باعث تے لاحق ہوتی ہے۔

کارڈوس ایم (Cardus M): یہ جگر کے لئے عمدہ دوا ہے۔ جب کہ جگر کے بائیں پہلو میں سوزش ہو یا پھر وہ متاثر ہو۔ یہ دوا مدر ٹیچر کے پانچ سے دس قطروں کی صورت میں دینی چاہئے۔ یہ جگر کے سرطان کے دردوں کو رفع کرتی ہے۔ مدہم درد سر کے ساتھ یرقان ہوتا ہے۔ قے اور متلی ہوتی ہے۔ پیشاب کارنگ سنہری پھیلا ہوتا ہے۔ جگر کے داغ اس کی مخصوص علامت ہے۔

مائی ری کاسیری فیرا (Myrica Cerifera): یہ ایک اہم دوا ہے۔ گو یہ دوا بہت کم استعمال کی گئی ہے۔ یہ دوا نزلاوی یرقان میں مفید ہے۔ مدہم درد سر ہوتا ہے۔ صبح کے وقت ابتری ہوتی ہے۔ آنکھیں میلی، کمندی اور پیلاہٹ مائل رنگت والی ہوتی ہیں۔ زبان پر زرد طبع ہوتا ہے۔ مریض کمزور ہو جاتا ہے اور عضلات میں دکن، بازوؤں اور ٹانگوں میں درد کی شکایت کرتا ہے۔ جس کے ساتھ نبض ست ہوتی ہے اور گرے رنگ کا پیشاب ہوتا ہے۔ دائیں جانب میں پسلیوں کے نیچے درد ہوتا ہے۔ بھوک نہیں ہوتی۔ تیزابیوں کی خواہش ہوتی ہے۔ ناآسودہ نیند، یعنی نیند سے بےاشت حاصل نہیں ہوتی۔

نکس وامیکا (Nux Vomica): شراب نوشی کے بعد (یعنی شراب کے بد اثرات کے بعد) جگر کی تکالیف لاحق ہو جاتی ہیں۔ بہت زیادہ مصالحوں والی غذا، کونین یا مسبات کے استعمال سے جگر کی تکالیف لاحق ہوں۔ جگر کی خرابی ہو سکتا ہے کہ درد قویج بھی موجود ہو۔ مرغن غذاؤں کے استعمال سے یرقان لاحق ہو۔ نظام ہضم آسانی کے ساتھ خراب ہو جائے۔ پیاس بالکل نہیں ہوتی۔ غصہ کے دورے کے بعد یرقان لاحق ہو۔ مریض عموماً چڑچڑا اور صبح کے وقت غصیلا ہوتا ہے۔ جگر میں ناموزوں صفرا کے بننے کے باعث دل شکستگی اور یرقان لاحق ہو۔

کالی آئیوڈائیڈ (Kali Iodide): آشک کے تیسرے درجہ میں جگر کا بڑھ جانا لاحق ہو۔ ریفٹس (Raphnus): جگر میں ٹانگے لگتے جیسے درد ہوتے ہیں۔ ابکائیاں آئیں اور قے ہو۔ کھانے کی خواہش نہیں رہتی۔ پیٹ تپتا ہوا، ذھول کی طرح سے بچنے والا اور سخت ہوتا ہے۔ ناف کے قریب جکڑن ہوتی ہے۔

وائپرا (Vipera): جگر کے بڑھ جانے میں شدید درد لاحق ہو۔ جس کے ساتھ یرقان اور بخار ہوتا ہے۔ درد جگر سے پھیل کر کندھوں اور کولہوں تک چلا جاتا ہے۔ خون والے پانچلے آتے ہیں۔

تھیرائیڈین (Theridion): جگر کی سوزش (یعنی پھوڑا) جگر کے علاقہ میں شدید قسم کا جلن دار درد ہوتا ہے۔ ابکائیاں آتی ہے اور صفراوی قے ہوتی ہے۔

لکیسیس (Lachesis): جگر میں جلن دار اور حاد درد ہوتا ہے۔ جو معدہ تک پھیل جاتا ہے۔

جگر میں سوزش ہوتی ہے اور جگر نرم ہو جاتا ہے۔ جگر کا پھوڑا، جگر کی پتھری ہوتی ہے۔ پیٹ سخت اور تھکا ہوا ہوتا ہے۔ دباؤ برداشت نہیں ہو سکتا۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): جگر کو چھونے سے حساسیت ہوتی ہے اور جگر میں تھکاو کا احساس ہوتا ہے۔ درد مدہم اور دکھن والے ہوتے ہیں۔ بھائے اس کے کہ تیز اور بھالے لگتے جیسے ہوں جیسا کہ پیلیڈونیم میں ہوتا ہے۔ تھوڑی مقدار میں کھانے سے معدہ میں بھراؤ کا احساس ہوتا ہے۔

سلفر (Sulphur): یہ ایک عمل انگیز دوا ہے اور علاج کی تکمیل کے لئے استعمال ہونی چاہئے۔ یہ صفرا کے بہاؤ میں اضافہ کرتی ہے۔ جگر میں درد اور دکھن زیادہ ہوتا ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): جگر کی چربی کا بگاڑ لاحق ہو۔ جس کے ساتھ نمایاں قسم کی دکھن اور پر قان ہوتا ہے۔ پاخانے بھورے مائل سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ یہ دوا جگر کے جان لیوا قسم کے امراض میں مفید ہے۔

پتیلیائی (Ptelia T): جگر کے علاقہ میں دکھن اور بھاری پن ہوتا ہے۔ بائیں کرویٹ لیشے سے تکلیف میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس کے باعث کھچاؤ کا احساس ہوتا ہے۔

اورم آرس (Aurum Ars): جگر کی لاغری جو کہ پیٹ کے تھکاو کے ساتھ ہو یا پیٹ کے تھکاو کے بغیر ہو۔ پیٹ کی جلد میں خارش ہوتی ہے۔

نٹرم سلف (Natrum Sulph): بہت زیادہ بڑھا ہوا جگر، گھٹیا دی طبیعت، جگر کے علاقہ میں دکھن ہوتی ہے۔ منہ میں برا ذائقہ ہوتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرو میں درد ہوتا ہے۔

مرک سلف (Merc Sulph): پیٹ پر ڈھیلا ہونے کے ساتھ جگر کا بڑھ جانا، بخار ہوتا ہے۔ جگر میں درد ہوتا ہے۔ پاخانے سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں۔ قبض ہوتی ہے۔ ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ جسم میں جلن کا احساس ہوتا ہے۔

ٹیریکس کم (Taraxacum): جگر کے علاقہ میں درد اور دکھن ہوتی ہے نیز صفراوی اسہال ہوتے ہیں۔ زبان نقش دار ہوتی ہے اور منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد چاڑا ہوتا ہے۔ جگر بڑھا ہوا اور سخت ہوتا ہے۔ تلی اور جگر کے علاقہ میں درد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ انگلیوں کے پورے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔

سلیشیا (Silicea): چھوٹے بچوں کے جگر کے لئے۔ پاخانہ کرنے میں دقت ہوتی ہے اور اکثر بچے چلاتے یا روتے ہیں۔ سر پر پھیند ہوتا ہے۔ پہلے 200 طاقت کی اور پھر 1000 طاقت کی خوراک دیجئے۔

چینو نٹھرس (Chionanthus): جگر کا بڑھ جانا اور جگر میں رکاوٹ پیدا ہو جانا۔ قبض ہوتی ہے۔ مٹی کے رنگ کا پانخانہ ہوتا ہے۔ مزمن پر کان ہوتا ہے۔

آرسنک البم (Ars Alb): کونین کے استعمال کے باعث بخار کے دب جانے کے باعث جگر میں درد ہو اور جگر بڑھ جائے۔ 1x طاقت کی ایک ہی خوراک دن میں ایک مرتبہ دیجئے۔ خوراک کھانا کھانے کے بعد دی جائے۔

آرسنک سلف 'ربرم' 200 (Arsenic Sulph, Rubrum 200): بخار کے ساتھ پتہ کی پتھری اور درد قویج ہو۔

مرک آئیوڈ (Merc lod): پتہ پر ڈھیلا ہونے کے ساتھ جگر کا بڑھ جانا۔ رانگی کے تیل کی طرح کا پیشاب ہوتا ہے۔ بہت ہی زیادہ درد ہوتا ہے (دن میں ایک ہی خوراک دیجئے)۔

فیرم آئیوڈ (Ferrum lod): بخار کی بغیر جگر اور تلی کا بڑھ جانا۔

فیرم آرس (Ferrum Ars): بخار کے ساتھ جگر اور تلی کا بڑھ جانا۔

کلیریا آرس (Calcarea Ars): بچوں کے جگر کا مرض (200 طاقت کی یا اونچی طاقت کی دوا استعمال کیجئے)۔

اوپیم (Opium): ست جگر جس کے ساتھ قبض ہو۔

چائنا آف (China Off): جگر کے علاقہ میں درد ہوتا ہے جیسا کہ کھال کے نیچے ماسوری کیفیت ہو۔ چھوٹے سے اتھری ہوتی ہے۔ جلد کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے 'پتہ کی پتھری کے باعث قویج ہو' جگر سو جا ہوا سخت ہوتا ہے۔

پوڈوقالسم (Podophyllum): یہ دوا سن یا مزمن طور پر اجتماع خون والے جگر کی نشاندہی کرتی ہے۔ جب کہ اس سال موجود ہوں 'جگر سو جا ہوا اور حساس ہو۔

برائی اونیا (Bryonia): جگر سو جا ہوا 'اجتماع خون والا اور سوزشی ہوتا ہے' جگر کے علاقہ میں درد ہوتا ہے جس میں حرکت سے اتھری ہوتی ہے اور درد والی جانب کوٹ لے کر لیٹنے سے بہتری ہوتی ہے۔

پتہ کی سوزش (بغیر پتھری کے)

(Cholecystitis "Non- Calculus")

(پتھری والی سوزش کے لئے دیکھئے "پتہ کی پتھری")

چیلیڈونیم (Chelidonium): دائیں کندھے میں مسلسل درد رہتا ہے۔ صبح کے وقت مٹلی ہو جس کے ساتھ صفراوی تے ہوتے ہیں۔ پیٹ کے بالائی حصہ میں درد ہوتا ہے جو کھانے سے

عارضی طور پر دور ہو جاتا ہے۔ پیٹ پھولا ہوتا ہے، سخت اور مٹی کے رنگ کے پاخانہ کے ساتھ قبض ہوتی ہے اور یہ قبض اس سال کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے۔ مقعد کی خارش، پیشاب گمرے پیلے رنگ کا اور جھاگ دار ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد بہتری ہوتی ہے اور صبح کے وقت نھلی ہوا میں اور دائیں کروٹ لیٹنے سے بہتری ہوتی ہے۔

کارڈوس میور (Carduus Mur): جگر اور صفراء کی نالیوں پر انتہائی عمل ہوتا ہے، بائیں جانب پسلیوں کے نیچے درد ہوتا ہے۔ الرجی کا اورم، زخروہ والا دم، چکر آئیں اور پیچھے کی جانب گرے۔ سخت گانٹھ لگ جانے کے ساتھ قبض ہو، پاخانہ بڑی مشکل سے خارج ہو یا پھر اس سال چھدار شراب کی طرح کے۔

پوڈوفائلیم (Podophyllum): پیٹ کے بالائی حصہ میں درد ہو جس کے ساتھ غاؤ ہوتا ہے اور پیٹ کی اندرونی جانب خلاء کا احساس ہوتا ہے، بہت زیادہ مقدار میں پانی کی پیاس کے ساتھ تیزابی غذا کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ اس سال پر درد، سبز رنگ والے پانی کی طرح کے، بہت افراط کے ساتھ، متعفن ہوتے ہیں، پانی کی تیز دھار (جیسے کسی بھری ہوئی ٹھک سے تیز دھار کے ساتھ پانی خارج ہو) والے اس سال ہوتے ہیں۔ اس سال کا تباہ قبض سے ہوتا ہے جیسا کہ پیلیڈونیم میں ہوتا ہے۔

چوئینتھس ویر (Chionanthus): لبلبہ کے امراض کے ساتھ جگر کی تکلیفات، جن کے ساتھ بہت زیادہ پیاس لگتی ہے۔ صفراوی رنگ اور گلوکوز کے ساتھ بہت زیادہ افراط کے ساتھ گمرے رنگ کا پیشاب ہوتا ہے۔ یہ قان اور قبض کے ساتھ جگر کے علاقہ میں بھاری پن اور درد ہوتا ہے۔

لیپ ٹینڈرا (Leptandra): لمبریا کے بعد جگر کی تکلیف لاحق ہوں، جگر بڑھ جائے، دل کی دھڑکن سے تکلیف ہو، غنودگی کے ساتھ چکر آتے ہیں، سامنے سے ہتھوڑے لگنے جیسا درد ہوتا ہے۔ گمرے رنگ کے خون پر مشتمل یا افراط اس سال لاحق ہوں، خونی بوا سیر لاحق ہو، امعاء مستقیم کا خروج۔

مائی ریکاسیری فرا (Myrica Cerifera): وزن کے مسلسل کم ہوتے رہنے کے ساتھ یہ قان لاحق ہو، دمہ ہوتا ہے اور نمایاں کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ درد سر گینٹیوں میں اور سامنے کی حصہ میں۔ بدترین مٹی کے ساتھ کڑوا ذائقہ ہوتا ہے، مہاگنی کے گمرے رنگ والا پیشاب آتا ہے، صفراوی نمکوں کے باعث جلد میں خارش ہوتی ہے، تیزابی غذا کی شدید خواہش ہوتی ہے، کھانے کے بعد مٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور چلنے سے اتفاق ہوتا ہے۔

کولسٹرین (Cholesterin): یہ دوا بچے کی مزمن سوزش کے لئے استعمال ہوتی ہے، جس

کے ساتھ اجتماع خون والی جگر کی سوزش ہو جو کہ سرطان سے قبل یا سرطان والی کیفیت میں ہوتی ہے۔ جگر کے علاقہ میں جلن دار درد ہوتا ہے جو کہ دائیں کندھے تک پھیل جاتا ہے۔ بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے اور طاقت جاتی رہتی ہے جس کے ساتھ خون کی کمی بھی لاحق ہوتی ہے۔

پتے کی پتھری — (Gall- Stone)

چیلیڈونیم (Chelidonium): یہ تمام قسم کی پتے کی پتھریوں کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ اگر لمبے عرصہ کے لئے اس دوا کو استعمال کیا جائے تو یہ پتھریوں کو پتے سے نکال دیتی ہے اور ان کے بننے کے عمل کو روک دیتی ہے۔

کولسٹرین (Cholesterin): اس دوا کو پتے کی پتھری والے قوتلج میں آزمانا چاہئے۔ یہ دوا اجتماع خون کو رفع کرتی ہے اور بخار کا علاج کرتی ہے جو کہ پتے کی خرابی کے باعث ہوتا ہے۔
نوٹ: زیتون کا تیل پتے کی پتھری کے لئے ”علاج“ ثابت ہو چکا ہے۔ یہ روزانہ آدھا پینٹ (ایک پینٹ گیلن کا آٹھواں حصہ ہوتا ہے) کھانا چاہئے۔ تیل پینے کے فوری بعد لیموں کا شربت پینا چاہئے۔ تین یا چار منٹوں کے بعد پھر تیل پیس اور اس کے بعد پھر اسی طرح لیموں کے رس کا شربت پیس، اسی طرح سے یہ عمل مسلسل جاری رکھیں یہاں تک کہ آدھا پینٹ زیتون کا تیل اور لیموں کے رس کا شربت ختم ہو جائے۔ لیموں کا رس تیل کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے اور تکلیف کو روکتا ہے۔ کما جاتا ہے کہ اس علاج سے پتھری ایک ہی دن میں خارج ہو جاتی ہے لیکن بعض مرتبہ یہ علاج دو سے تین روز تک دہرانا پڑ سکتا ہے۔
بربرس وگلبریس (Berberis Vul): پتے کی پتھری کا درد قوتلج۔

چیونانٹھس ورجینیکا (Chionanthus Virginica): صفراوی درد قوتلج، پتے کی پتھری کا درد قوتلج یہ صفرا کو مانع میں تبدیل کرتی ہے، پتھری بننے کے عمل کو روکتی ہے اور پتے پہلے سے بنی ہوئی پتھریاں ہوتی ہیں انہیں نکالتی ہے۔ اس مرض میں لمبیا والی جگہوں پر جگر میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ قبض ہوتی ہے، پاخانے مٹی کے رنگ کے ہوتے ہیں، جلد پیلی ہوتی ہے۔ پیشاب قریب قریب سیاہ ہوتا ہے۔

کارڈوس میریانس (Cardus Marianus): جگر اور کلی کا بڑھ جانا لاحق ہو، پتے سوج جاتا ہے، پتے کی پتھری والا قوتلج کا درد ہوتا ہے، صفراوی بخار ہوتا ہے۔ پاخانہ سخت ہوتا ہے، دقت سے ہوتا ہے اور گانٹھ دار ہوتا ہے۔ قبض، اسہال کے ساتھ بدل جاتی ہے۔

کلکیریا کارب (Calcareia Carb): پتے کی پتھری کا درد قوتلج۔ عیث میں چکناچی بڑھ جاتی

ہے۔ معمولی دباؤ سے حساسیت ہوتی ہے۔ جگر کے علاقہ میں درد ہوتا ہے۔ چانگھ اور میزٹرک خورد میں سوجن اور درد ہوتا ہے۔

ہائیڈرا سٹس (Hydrastis): پتے کی پتھری کا درد قویٰ، عضلاتی طاقت میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ ہاضمہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور ضدی قسم کی قبض لاحق ہو جاتی ہے۔ جگر ناکارہ ہو جاتا ہے۔

چائنا (China): جگر کے علاقہ میں درد ہو جیسا کہ جلد کے ناسور میں ہوتا ہے، پھوٹنے سے ابتری ہوتی ہے۔ جلد اور آنکھیں زرد ہو جاتی ہیں، پتے کی پتھری کے باعث درد قویٰ ہوتا ہے۔ جگر سوجا ہوا اور سخت ہوتا ہے۔ یہ دوا پتے میں پتھری بننے کے عمل کو روکتی ہے۔

مینگانیم (Manganum): یہ دوا پتھریوں کو صحت مند صفرا میں تحلیل کر دیتی ہے۔ پتے کی پتھری والا درد قویٰ ہوتا ہے، یہ قان لاحق ہو جاتا ہے، یہ دوا جگر میں اجتماع خون اور رسولیوں کا علاج کرتی ہے۔

ناترم سلف (Natrium Sul): بد ہضمی کے بعد پتے کی پتھری والا درد قویٰ لاحق ہوتا ہے۔ پتے کے علاقہ میں درد ہوتا ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کے قطرے خارج ہوتے رہتے ہیں، دائیں جانب درد ہوتا ہے جو بعد میں پھیل کر چھاتی تک چلا جاتا ہے۔

بچوں کا ریکان (Icterus)۔

(جلد کی رنگت زرد ہو جاتی ہے، نو زائیدہ بچوں کا عام مرض ہے)

چیلیڈونیم (Chelidonium): علاج اسی دوا سے شروع کیجئے اور اگر اس دوا سے خاطر خواہ افادہ نہ ہو (اس کا انحصار بچے کی کیفیت پر ہے) تو پھر دیگر دی گئی ادویات آزمائی جائیں جو کہ درج ذیل ہیں:

نکس وامیکا (Nux Vomica): پاخانہ سست اور بند بندہ ہوتا ہے۔ بچے چڑچڑا اور رونے والا ہوتا ہے۔

کولن سونیا (Collinsonia): نمایاں طور پر رنگ زرد ہوتا ہے، پاخانہ ڈھیلوں کی صورت میں اور تھے ہوئے دبی کی طرح کا ہوتا ہے۔

مرکوریس سول (Mercurius Sol): اگر ریکان کے ساتھ ہو، ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں اور تمام اخراجات اور پیشاب وغیرہ گہرے رنگ کے ہوتے ہیں۔

چیونانٹھس (Chionanthus): جب پیشاب میں بہت زیادہ صفرا ملا ہوا ہو اور زردی بہت زیادہ نمایاں ہو اور پیشاب چمک دار ہو۔

یرقان — (Jaundice)

سلفر (Sulphur): یرقان کا علاج ہمیشہ اسی دوا سے شروع کیا جائے اسے علاج کی جھمیل کے لئے ذہن میں (یعنی فکر میں) رہنا چاہئے۔ 200 طاقت ڈائی لیوشن استعمال کیجئے۔
چیلیدونیم (Chelidonium): سلفر کے ایک دن کے استعمال کے بعد اس دوا کو دیا جائے یہ یرقان کے لئے مخصوص دوا ہے اور عموماً پچھنی طاقت ڈائی لیوشن کی صورت میں دی جاتی ہے۔ آنکھ کی جھلی زرد ہو جاتی ہے۔ جلد پیلی ہو جاتی ہے۔ ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ زبان کا رنگ گہرا سرخ ہو جاتا ہے۔ جگر دہانے پر نرم ہوتا ہے۔ بھورا سرخ پیشاب ہوتا ہے اور ہلکا میلا پاخانہ کا رنگ ہوتا ہے۔

مائی ریکاسیری فرا (Myrica Cerifera): یہ نزلادی یرقان کے لئے ایک اہم دوا ہے۔ سر میں مدہم درد ہوتا ہے جس میں صبح کے وقت اتھری ہوتی ہے۔ آنکھیں گندی غلیظ اور پیلے رنگ کی ہوتی ہیں۔ زبان پر زرد رنگ کا طبع ہوتا ہے۔ مریض کمزور ہو جاتا ہے اور عضلات (پٹھوں) میں دھکن، بازوؤں اور ٹانگوں میں درد کی شکایت کرتا ہے جس کے ساتھ نبض بھی سست ہوتی ہے اور پیشاب گہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ پسلیوں کے نیچے دائیں جانب درد ہوتا ہے، بھوک نہیں رہتی، تیزابی غذا کی خواہش ہوتی ہے۔ نیند سکون بخش نہیں ہوتی۔

ہائیڈراستس (Hydrastis): نزلادی یرقان کے ساتھ میں تیز ٹانگے لگنے جیسے درد ہوتے ہیں اور لیس دار بلغمی مواد خارج ہوتا ہے۔ حثلی ہوتی ہے اور تے ہوتی ہے۔ جگر ٹاکارہ ہو جاتا ہے۔ زبان سوخ جاتی ہے اور اس پر دانتوں کے نشانات نظر آتے ہیں، ساتھ میں زبان پر سفید یا ہلکا طبع بھی ہوتا ہے۔

چیرونٹھس (Chionanthus): نزلادی یرقان جس کے ساتھ گڑبڑا ہٹ بھی ہو، یہ والا یرقان ہر موسم گرما میں عود کر آتا ہے۔ دھکن ہوتی ہے اور بکڑن ہوتی ہے، زبان اور آنکھیں زرد ہوتی ہیں، پیشاب میں صفرا اور شکر کی آمیزش ہوتی ہے۔ حیض کے دب جانے کے باعث یرقان لاحق ہو، منی کے رنگ والے پاخانہ کے ساتھ قبض لاحق ہوتی ہے۔

مرکیورس سول (Mercurius Soli): یرقان کے لئے یہ ایک رہنما کن دوا ہے۔ نبض تیز ہوتی ہے۔ آنکھ کی پتلی پر زرد دھاری ہوتی ہے، زبان ہلکی سی طبع شدہ ہوتی ہے، قبض لاحق ہوتی ہے۔ زرد اور خشک پاخانہ آتا ہے یا پھر پاخانہ گہرے زرد رنگ کا ڈھیلا ہوتا ہے۔ پیٹ افراط کے ساتھ آتا ہے جس سے افاقہ ہوتا ہے۔ رطوبات زیادہ خارج ہوتی ہیں، خصوصاً تھوک۔ زبان ڈھیلی ہوتی ہے، دھات کا سا ذائقہ ہوتا ہے۔ جگر کے علاقہ کے اوپر حساسیت ہوتی ہے، ڈنک لگنے جیسے اور ٹانگے لگنے جیسے دردوں کے ہمراہ جگر والا علاقہ سو جا ہوا اور سخت ہوتا ہے۔

ہے۔ پوڈوفائلم (Podophyllum): جگر کے علاقہ میں تیز اور کاٹنے والے دردوں کے ساتھ بھراؤ اور دھکن ہوتی ہے۔ گاڑھے صفرا اور خون کی تے لاحق ہوتی ہے۔ سڑے ہوئے انڈوں کے ذائقہ والے ذکار آتے ہیں۔ قبض، اسال کے ساتھ اولتی بدلتی رہتی ہے۔

ڈی جی ٹیلیس (Digitalis): دل کے کمزور عضلات کے باعث یرقان لاحق ہو، جگر بڑا اور سخت ہو جانے کے ساتھ، ست اور وقفہ دار نبض ہوتی ہے۔ گہرے رنگ کا کم مقدار میں پیشاب آتا ہے، یہ دل کی تکلیف کے ساتھ یرقان کی دوا ہے۔

نکس دامیکا (Nux Vom): یواسیر اور قبض کے رجحان کے ساتھ، گندا، پھپھوندی جیسا یا کڑوا ذائقہ، غذا سے نفرت ہوتی ہے، جگر کے علاقہ میں ٹپکن والا درد ہوتا ہے، غشی کے دورے ہوتے ہیں۔

پٹیلانی (Ptella T): جگر میں اجتماع خون کے ساتھ یرقان لاحق ہو، منہ خشک ہونے کے ساتھ معدہ میں بکڑن ہوتی ہے۔

کیمومیلا (Chamomilla): غصہ یا اور کسی غیر ضروری جو شیلے پن کے باعث یرقان کا دورہ پڑ جائے۔ جگر میں اجتماع خون ہو جاتا ہے۔ کھانے کی خواہش جاتی رہتی ہے، مٹلی ہوتی ہے، گندا اور چکناہٹ والا ذائقہ منہ میں ہوتا ہے۔ چٹکیاں بھرنے جیسے اور مروڑنے والے درد ہیٹ میں ہوتے ہیں۔

یرقان (مملک)

(Jaundice Malignant)

فاسفورس (Phosphorus): مرض کے مملک پن کے ابتدائی مرحلہ میں ہی صرف اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ جگر بڑا ہو جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے، جگر کا حلو ناکارہ پن، جگر کی شکاف دار سوزش لاحق ہو، مملک یرقان۔

لکس (Lachesis): ایسے اشخاص میں یرقان کی نشاندہی اس دوا سے ہوتی ہے جن میں خون کی کمی پائی جاتی ہے اور جو اعصابی اور حساس ہوتے ہیں۔ سونے کے بعد، گرم مشروبات پینے کے بعد اور گرم کمرے میں اتھری ہو جاتی ہے۔ پیشاب بھاگ دار ہوتا ہے، گہرے رنگ کا اور تقریباً کالا ہوتا ہے۔ سارے جسم میں جلن اور خارش ہوتی ہے۔ تمام وریدوں کے ساتھ ساتھ نیلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔

آرسنک البم (Arsenic Alb): مملک یرقان کے آخری مراحل میں اس دوا کو استعمال کیا

جاتا ہے۔ بخار ہو سکتا ہے جس کے ساتھ بے چینی ہوتی ہے اور چھوٹے چھوٹے دقنوں سے تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس ہوتی ہے۔

تلی کے امراض

(Ailments of Spleen)

سینو تھس (Ceanothus): تلی کے بڑھ جانے کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ یہ مدر کچھر کے قطروں کی صورت میں عموماً استعمال ہوتی ہے۔ تلی کے علاقہ میں گھرے درد ہوتے ہیں گھرے ٹانگے لگنے جیسے درد ہوتے ہیں، مرطوب موسم میں ابھری ہوتی ہے، جاڑا لگتا ہے اور بخار ہوتا ہے۔ تلی تھرتی ہوئی اور اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

چائنا (China): تلی کے بڑھ جانے کے لئے یہ ایک دوسری بہترین دوا ہے جبکہ تلی میں اجتماع خون ہوتا ہے۔ نیز تلی سوچی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں ٹانگے لگنے جیسے درد ہوتے ہیں اور اس کی وجہ شدید بخار ہوتے ہیں۔

ارانیادیا ڈیما (Aranea Diadema): طیریا کے مزمن اثرات کے باعث تلی کا بڑا ہو جانا۔ کالی، سستی اور جاڑا لگنا اس دوا کی مفید علامات ہیں۔

کپسکیم (Capsicum): تلی کی حساسیت، سوجن اور بڑا ہو جانے کے لئے مفید دوا ہے۔ سکینم ایسڈ (Succinum Acid): یہ دوا تلی کی حالت اور اس کے فعل میں بہتری پیدا کرتی ہے۔

براکی اوینا (Bryonia): تلی میں عمومی اجتماع خون اور سوزش کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے، اس میں ٹانگے لگنے اور پھاڑنے والے درد ہوتے ہیں۔ ان دردوں میں حرکت سے ابھری ہوتی ہے اور آرام سے بہتری ہوتی ہے۔

لکیس (Lachesis): سیلان خون کے رجحان کے ساتھ تلی کی سوزش، کسے ہوئے بند یا کسے ہوئے کپڑے برداشت نہیں ہوتے، تلی کے علاقہ میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔

حصہ چہارم۔۔۔ امعائے مستقیم اور پاخانہ

سرطان (Cancer)

الومینا (Alumina): پاخانہ کے بعد درد کے ساتھ امعائے مستقیم میں ناگوری اگکھ ہوتا ہے یعنی سرطان پیدا ہوتا ہے۔ عموماً مریضوں کو قبض رہتا ہے۔

روٹا (Ruta): پاخانہ کے بعد بہت گھنٹوں تک امعاء مستقیم میں درد کے ساتھ امعاء مستقیم کا سرطان۔

ایسڈ نائٹ (Acid Nit): جب ایو مٹا ناکام ہو جائے تو اس دوا کو آزمایا جاسکتا ہے۔
سکرینم (Sclrrhinum): یہ دوا عمل انگیز دوا کے طور پر استعمال کرنی چاہئے جبکہ مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں۔

ہیضہ — (Cholera)

کیمفرا (Camphora): جب ہیضہ ابتدائی مراحل میں ہو تو اس دوا کے مدد نگہکار کا ایک ہی قطرہ ہیضہ کو روکنے اور اسے دور کرنے کے لئے بہترین دوا بن جاتا ہے جبکہ تھے اور اسال دونوں موجود ہوں۔ نقاہت، ٹھنڈ اور اچانک پسینے آتے ہوں جن کے باعث لاغری ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ہیضہ کے ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے۔ مریض اختہ درجے کا ٹھنڈا ہوتا ہے اور خارج ہونے والے مادے کم ہو جاتے ہیں (پیشاب وغیرہ) چہرے پر خشکی اور نیلاہٹ ہوتی ہے تھے کرنے کی اور پاخانہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رہتی گرمی سے بہتری ہوتی ہے 'معدے اور غذا کی ٹالی میں جلن ہوتی ہے' پیینہ نہیں آتا لیکن ناختم ہونے والی پیاس بہت زیادہ ہوتی ہے۔

وریٹرم ایلیم (Veratrum Alb): ہیضہ کا دوسرا مرحلہ جبکہ اسال اور تھے لاحق ہو چکے ہوں 'ہیٹ میں پاخانہ کرنے کے بعد درد ہوتا ہے۔ پاخانے کے بعد بہت زیادہ نقاہت ہو جاتی ہے۔ جسم پر ٹھنڈے پسینے آتے ہیں اور جسم کی سطح ٹھنڈی ہوتی ہے 'اندرونی طور پر جلن کا احساس ہوتا ہے۔ وریٹرم میں معدے کا درد ضروری علامت ہے۔ مادے بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتے ہیں (پیشاب پاخانہ وغیرہ)

کیپورم میٹ (Cuprum Met): انگلیوں اور انگوٹھوں میں تشنگی کیفیت اور شدید قسم کی اینٹھن کا شروع ہو جانا اس دوا کی نمایاں علامت ہے۔ جسم کی سطح پر ٹھنڈک پائی جاتی ہے 'جلد پر نیلاہٹ ہوتی ہے' منہ خشک ہوتا ہے اور پیاس لگتی ہے۔ ہیٹ کے بالائی حصہ میں شدید قسم کے درد ہوتے ہیں اور مریض بار بار تھے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں بھی تھے اور پاخانے وریٹرم ہی کی طرح بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس میں ٹھنڈا پیینہ نہیں ہوتا۔

ایٹھوزا سی (Aethusa C): پھوٹے بچوں کا ہیضہ جو کہ بہت ہی اچانک لاحق ہو جاتا ہے۔ بچہ جیسے ہی دودھ پیتا ہے تھے کر دیتا ہے اور اس کے بعد بہت زیادہ نقاہت ہو جاتی ہے 'دودھ کا کچھ حصہ دہی کی صورت میں اور کچھ حصہ پتکے مائع کی صورت میں خارج ہوتا ہے۔ پیلاہٹری مائل پیلا پاخانہ ہوتا ہے۔

آرسینک البم (Arsenic Alb): پھوٹے بچوں کے بیضہ کے لئے۔ تھوڑا کے ٹاکم ہو جانے کے بعد یہ ایک عمدہ دوا ہوتی ہے۔ اس میں غیر منظم پاخانے ہوتے ہیں اور بہت تیزی سے کمزوری ہوتی ہے۔ بڑوں کے بیضہ کے لئے بھی یہ دوا اور عظم کی طرح استعمال ہوتی ہے سوائے اس کے کہ اس میں بے چینی زیادہ ہوتی ہے اور پسینہ کم ہوتا ہے۔ اس میں پھوٹے وقفوں کے ساتھ پانی کی تھوڑی تھوڑی مقدار کی پیاس ہوتی ہے۔ شدید قسم کی قے اور پاخانے ہوتے ہیں ' بدبودار پیلے یا بھورے رنگ کے پاخانے باافراط ہوتے ہیں۔

کاربووٹیج (Carbo Veg): یہ دوا مرض کے آخری مرحلہ کے دوران استعمال کی جاتی ہے۔ جبکہ مریض خاموش لیٹ جاتا ہے۔ نقاہت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، 'تحض محض اور نبض کمزور ہوتی ہے۔ نیز نبض تیز اور دھلگے کی طرح کی ہوتی ہے، 'قے یا اسہال نہیں ہوتے، 'درد اور تشنج بھی نہیں ہوتا، بیماری جسم کو چھوڑ چکی ہوتی ہے لیکن کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بہت زیادہ رطوبات خارج ہو جانے کے نتیجہ میں مریض غیر مزاحمتی مرحلہ میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔

ہائیڈروسیانک ایسڈ (Hydrocyanic Acid): یہ دوا مرض کے اس مرحلہ کی نشاندہی کرتی ہے جبکہ مریض نقاہت کے باعث ڈھیر ہو چکا ہوتا ہے جس کے ساتھ مادوں کا اخراج بھی اچانک رک جاتا ہے۔ کاربووٹیج کے برعکس اس میں غشی کے دورے پڑتے ہیں اور تشنجی دورے بھی ہوتے ہیں۔

الیٹریم (Elatium): بچوں کا بیضہ۔ پاخانے زخون کے قیل کے سے، 'سبز رنگ کے اور پانی کی طرح کے ہوتے ہیں، 'یک دم اور زور کے ساتھ خارج ہوتے ہیں۔

لیکسیس (Lachesis): جلن کے ساتھ بیضہ لاحق ہوتا ہے جو تھوڑی سی تھکاوٹ سے عود کر آتا ہے۔

سیکیل کور (Secale Cor): یہ آخری مرحلہ کی دوا ہے جب مریض کی خواہش ٹھنڈا رہنے کی ہوتی ہے، 'تقریباً مریض کی نبض کھو چکی ہوتی ہے اور مریض ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن اسے کپڑا اوڑھنے سے نفرت ہوتی ہے۔

جیٹ روفا (Jatropha): بیضہ لاحق ہو، 'رسی دار قے ہوتی ہے، 'مادہ البیومن والا ہوتا ہے، 'عظیم نقاہت ہوتی ہے، 'قے اور پاخانے آتے ہیں اور پاخانہ چاولوں کی جچھے (اے) ہوئے چاولوں سے نکلنے والا پانی کی طرح ہوتا ہے۔ اینٹھن ہوتی ہے اور ٹھنڈک ہوتی ہے، 'یہ پیسے کی ٹھل تصویر ہوتی ہے۔

قبض — (Constipation)

نکس و امیکا (Nux Vomica): ایسے مریضوں کے لئے جو پتکے ہوتے ہیں بہت زیادہ چڑھے اور شور سے اور ہوا کے بھونکوں سے بہت حساس ہوتے ہیں۔ آنتوں میں صرف سخت قسم کے جلاب لینے سے ہی حرکت ہوتی ہے۔ بہت زیادہ کھپاؤ کے ساتھ آنتوں میں درد ہوتا ہے۔ یہ تکلیف تمباکو، شراب اور کافی کے حد اعتدال سے بڑھے ہوئے استعمال کے باعث لاحق ہو سکتی ہے۔ پیٹ میں پاخانہ کرنے کی بے نتیجہ خواہش کے ساتھ قبض ہو، سستی والی عادات کے باعث یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ 200 یا 1000 طاقت کی دوا دیجئے۔

برائی اونیا (Bryonia): بہت زیادہ پیاس کے ساتھ خشک پاخانہ ہوتا ہے جیسا کہ جلا ہوا ہو۔ اپینڈیکس کے ساتھ قبض لاحق ہونا، گرم موسم میں قبض ہونا۔ پاخانہ سخت، لمبا اور آنتوں (بلغم) کے بغیر ہوتا ہے۔

الیومینا (Alumina): آنتوں کی خشکی اور آنتوں کی حرکت نہ ہونے کے باعث قبض لاحق ہو۔ نہ تو پاخانہ کرنے کی خواہش ہوتی ہے اور نہ قابلیت ہی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ پاخانہ بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے چنانچہ مریض کلوزٹ کو سختی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے۔ پاخانہ سخت ہوتا ہے۔ گانٹھ دار ہوتا ہے یا نرم ہوتا ہے جو کہ اعضاء کے ساتھ جکڑنے والا ہوتا ہے۔ پاخانہ کرنے کی خواہش بہت تھوڑی ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی۔ امعاء مستقیم مکمل طور پر جمود کا شکار ہوتی ہے۔ چنانچہ نرم پاخانہ بھی بہت زیادہ مشکل کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ پاخانہ سخت اور گرہ دار ہوتا ہے جیسا کہ بھیڑ بکری کی میٹگیاں ہوتی ہیں اور منہ خشک ہوتا ہے اور زبان میں پیچان ہوتا ہے۔ اسی علامت سے اس دوا کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ ذہنی دباؤ ہوتا ہے اور کھانے کی خواہش نہیں رہتی۔ دوران حمل قبض لاحق ہو۔

سپیا (Sepia): عورتوں میں قبض، اس میں شدید قسم کا درد پیڑوں میں ہوتا ہے جو پھیل کر امعاء مستقیم میں چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ پاخانہ کرنے کی بے نتیجہ خواہش ہوتی ہے۔

اناکارڈیم (Anacardium): جب پاخانہ کرنے کی بے نتیجہ خواہش امعاء مستقیم میں محسوس ہو۔ پاخانہ کرنے کے بعد امعاء مستقیم پر دباؤ کا احساس ہوتا ہے۔ نکس و امیکا میں دباؤ پیٹ میں محسوس ہوتا ہے۔

اوپیم (Opium): امعاء مستقیم کی غیر فعالیت کے باعث قبض لاحق ہو، پاخانہ کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ جب پاخانہ ہوتا ہے تو یہ سخت قسم کے خشک، سیاہ گیندوں کی طرح ہوتا ہے۔ آنتوں میں فعالیت نہیں ہوتی اسی طرح سے خشکی ہوتی ہے، منہ اور معدہ میں خشکی ہوتی ہے، کئی دنوں تک پاخانہ نہ کرنے کے باعث مریض سکون محسوس نہیں کرتا۔ پاخانہ کرنے کی

کوئی حاجت نہیں ہوتی۔

پلمبم (Plumbum): یہ مزمن قبض کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ یہ بھی اوچم والے قبض کی طرح کا مرض ہوتا ہے لیکن اس میں آنتوں میں کچھ فعالیت ہوتی ہے۔ اس میں پاخانہ کی حاجت تو ہوتی ہے لیکن پاخانہ بہت ہی مشکل سے خارج ہوتا ہے۔ اس میں عضلات کی فعالیت جاتی رہتی ہے اور آنتوں کے غدودوں سے رطوبت بہت کم خارج ہوتی ہے۔ پاخانہ سخت ڈھیلوں والا ہوتا ہے۔ جس کے باعث شکاف پیدا ہو جاتے ہیں۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): سب سے زیادہ شدید قسم کی قبض۔ پاخانہ کرنے کی لامحالہ حاجت معدہ میں تیزابیت اور جلن ہوتی ہے جو ڈکاروں سے بہتر ہوتی ہے۔

سلفر (Sulphur): قبض۔ پاخانہ سخت ہوتا ہے۔ گاتھ دار ہوتا ہے۔ خشک ہوتا ہے جیسا کہ جلا ہوا ہو۔ لمبا اور پردر ہوتا ہے۔ پچہ پاخانہ کرنے سے ڈرتا ہے کیونکہ اس سے درد بہت زیادہ ہوتا ہے۔

گریٹیولا (Gratiola): سرطان والی قبض، امعاء مستقیم میں کھچاؤ ہوتا ہے۔

کاربو انیمیلس (Carbo An): قبض لاحق ہو جس میں مریض خیال کرتا ہے کہ پاخانہ ہو گا لیکن صرف ہوا خارج ہوتی ہے۔

سلینیم (Selenium): قبض لاحق ہو۔ سخت انخلاء جسے صرف بیرونی امداد سے دور کیا جاسکے۔ پاخانہ کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ پاخانہ بہت بڑا ہونے کے باعث کہیں مقعد کو نہ پھاڑ دے۔ پاخانہ میں بالوں کی طرح سے دھاگے سے ہوتے ہیں۔

سفل (Syphil): برسوں کی ضدی قسم کی قبض، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے امعاء مستقیم کو رسیوں سے باندھا گیا ہو۔ جب انہما استعمال کیا جاتا ہے تو نالی میں دردزہ کی طرح سے اذیت ہوتی ہے۔

نایٹرم میور (Natrium Mur): جب پاخانہ سخت اور مڑاڑا ہوتا ہے۔ امعاء مستقیم خشک ہوتی ہے۔ پاخانہ خارج کرنے میں بہت سخت ہوتا ہے جس کے باعث خون بہہ لگتا ہے۔ امعاء مستقیم میں پاخانے کے بعد خشکی اور دکھن پیدا ہوتی ہے۔

گریفائٹنس (Graphites): پاخانہ کی حاجت کے نہ ہونے کے ساتھ قبض لاحق ہو۔ کئی دنوں سے پاخانہ نہیں آتا جبکہ چہرہ پر پھنسیاں اٹھ آتی ہیں۔ سیلان خون اور شکافوں کے ساتھ قبض لاحق ہو، جن میں جلن ہوتی ہے۔ یہ تنگ ہوتے ہیں اور ان میں ناقابل برداشت خارش ہوتی ہے۔ پاخانہ کے بعد مقعد میں دکھن ہوتی ہے۔ گریفائٹنس کی عمومی طبیعت، اداسی اور موٹاپے کی ہوتی ہے۔ ان علامات کو دیکھ کر اس دوا کے لئے فیصلہ آسانی سے کیا جاسکتا ہے۔

پاخانے پر آنوں کا ملح ہوتا ہے۔ یہ دوا ایسی مستورات کے لئے خصوصاً موزوں ہوتی ہے جو قدرتی طور پر ہونے والی پاخانے کی حاجت کی پروا نہیں کرتیں اور پاخانہ کے لئے جلتے میں دیر کر دیتی ہیں۔ مریض بہت زیادہ حساس اعصابی ہوتے ہیں اور ان کے اندر ارتکاز توجہ میں وقت پائی جاتی ہے۔ صبح جاگنے میں بھی دقت ہوتی ہے۔

پلائینا (Platina): مسافروں اور مہاجروں کی قبض کی نشاندہی اس دوا سے ہوتی ہے۔ جبکہ طرز رہائش میں تبدیلی پیدا ہو جانے کے باعث تکلیف لاحق ہوتی ہے۔ حاجت متواتر ہوتی رہتی ہے۔ کم مقدار میں اور خشک پاخانہ آتا ہے۔ جب عکس دامیکا ناکام ہو جائے تو مسک کی زہر خورانی کے بعد قبض لاحق ہونے پر یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔

ورینٹرم البم (Veratrum Alb): آنوں کا مکمل ضعف۔ فضلہ، امعاء مستقیم میں کافی زیادہ مقدار میں جمع ہو جاتا ہے۔ مریض زور پر زور لگاتا رہتا ہے۔ اکثر مریض کو پیٹے پھوٹ جاتے ہیں لیکن آخر کار اپنی اس کوشش کو ترک کر دیتا ہے چنانچہ فضلہ مصنوعی ذرائع سے خارج کرنا پڑتا ہے۔

سٹانم ایم (Stannum M): آرام کے دنوں کے بعد آنے والے دنوں میں قبض ہو جاتی ہے۔

پوڈوفائلم (Podophyllum): امعاء مستقیم یا مقعد کے خروج کے ساتھ مزمن قبض لاحق ہو۔

لیک ویک ڈیفیل (Lac Vace Defl): ایسی قبض جس میں امعاء مستقیم مفلوج دکھائی دے۔ دیر تک زور لگانے کے باوجود پاخانہ اندر کی طرف اٹکا رہتا ہے۔

مگنیشیا کارب (Magnesia Carb): ایسے بچوں کی قبض جو مرھائے ہوئے اور بیمار ہوتے ہیں۔ یہ بچے غذا یا دودھ کو انکار کر دیتے ہیں کیونکہ غذا کھانے سے یا دودھ پینے سے ان کے معدہ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ انہیں اسال لاحق ہو جاتے ہیں۔ سوکڑے کے ساتھ سبز رنگ کے پاخانے لاحق ہوں۔

کاسٹیکم (Causticum): کھڑے ہو کر پاخانہ کرنے کی قابلیت زیادہ بہتر ہوتی ہے۔

میڈورینم (Medorrhinum): پیچھے کی طرف جھک کر پاخانہ کرنا چاہے۔

مگنیشیا میور (Magnesia Mur): پاخانے سے پہلے درد کے ساتھ حاجت ہوتی ہے۔ پاخانہ کرنے کے بعد مقعد میں جلن ہوتی ہے۔ امعاء مستقیم کا ضعف اور مثانے کا ضعف۔ آگے کو جھکنے سے ہی اور پیٹ کے عضلات کو دبانے سے ہی صرف پیشاب خارج کر سکے۔ دانت نکالنے کے دوران بچوں کو قبض لاحق ہو۔ اچھارہ ہوتا ہے۔ پاخانہ لمبا، بڑا، سخت اور گرہ دار ہوتا ہے۔

لیکن درد کا باعث نہیں بنتا۔

ایسٹریاز آر (Asterias R): خدی قسم کی قبض، بارہ سے پندرہ دنوں کے بعد پاخانہ ہوتا ہے۔

ایومین (Alumen): کئی دنوں تک پاخانہ کرنے کی خواہش نہیں ہوتی۔ خدی قسم کی قبض جس کے ساتھ متلی، تے، ابکیاں وغیرہ ہوتی ہیں۔

ہائیڈراستس (Hydrastis): یہ دوا 1x طاقت کے 3 قطروں کی ایک خوراک دن میں تین مرتبہ روزانہ قبض کے لئے دی جاتی ہے۔

امبرا گریسیا (Ambra Grisea): بوڑھے لوگوں میں پرانی قبض۔ خصوصاً اس وقت پاخانہ خارج نہیں ہوتا جب کوئی دوسرا شخص ان کے قریب ہوتا ہے۔

سنٹی کیولا (Sanicula): قبض لاحق ہو، پاخانہ بڑا اور سخت ہوتا ہے۔ خارج کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ زور لگانے کے بعد ٹکڑوں کی صورت میں خارج ہوتا ہے۔ جبکہ ایک حصہ انکا رہتا ہے۔ نئے مصنوعی طریقہ سے نکالنا پڑتا ہے۔ کئی اچھے لمبا پاخانہ جسے خارج کرنے میں بہت زیادہ کوشش درکار نہیں ہوتی۔

سیلیشیا (Silicea): انتہائی بدبودار پاخانے جو اکثر سخت ہوتے ہیں اور مشکل سے خارج ہوتے ہیں۔ گندی بدبودار ہوا خارج ہوتی ہے۔ پیٹ سخت اور سوجا ہوا ہوتا ہے۔

ٹیرنٹولا ایچ (Tarentula H): پرانا قبض جس کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے چنانچہ مریض کروٹیں بدلتا رہتا ہے اور بل کھاتا رہتا ہے تاکہ تکلیف میں کچھ افادہ ہو۔

اسہال (Diarrhoea)

نکس وامیکا (Nux Vom): یہ دوا عادیوں میں ایسے اسہال کے لئے دینی چاہئے جو بے تحاشا کھانے کے باعث لاحق ہوئے ہوں۔ 1x طاقت کی خوراک دیجئے۔

ایلو (Aloe): جب مریض اپنے پاخانے پر قابو نہ پاسکے اور اسے بیت الخلاء کی طرف بھاگنا پڑے۔ اس وقت اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ پاخانہ ٹنگے سے ٹنگے والے پانی کی طرح بہتا ہے۔ کانٹے والا اور اینٹھن والا درد پیٹ میں ناف کے گرد ہوتا ہے۔ کھانے اور پینے سے اجڑی ہوتی ہے۔ جب پیشاب کرے تو پاخانے کی بھی حاجت ہو جائے۔

ارگوٹن (Ergotin): جب امعاءً مستقیم حساسیت کھو بیٹھیں۔ یہاں تک کہ مریض کو پیشگی خبر نہیں ہوتی اور وہ کبھی صاف نہیں رہ سکتا۔ 2x طاقت کی خوراک دیجئے۔

ہائیوسکیمس (Hyoscyamus): پیشاب کرتے ہوئے بے اختیاران پاخانہ خارج ہو جائے۔

پاخانے کا اخراج درد کے بغیر ہوتا ہے۔

آرس البلم (Ars Alb): یہ دوا ایسے کیسوں میں مفید ہے۔ جن میں بہت زیادہ بے چینی، اذیت اور ناقابل برداشت درد ہو۔ چھوٹے وقفوں کے ساتھ تھوڑے تھوڑے پانی کی بہت زیادہ پیاس ہوتی ہے۔ پاخانے کی مقدار جو خارج ہوتی ہے، بہت تھوڑی ہوتی ہے جبکہ نگاہت اور کمزوری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس مقدار سے کوئی بھی مناسبت نہیں رکھتی۔ سرد چیزوں کے ساتھ معدے کو ٹھنڈ لگ جانے کے باعث اس سال لاحق ہوں۔ لمبیا والے اس سال۔

وریشم البلم (Veratrum Alb): باافراط پاخانے آتے ہیں۔ بے چینی ہوتی ہے۔ پانی کی بڑی مقدار کی بہت زیادہ پیاس ہوتی ہے۔ پاخانے کے بعد بہت زیادہ نگاہت ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈا چھینٹ آتا ہے۔ ٹھنڈ لگتی ہے اور جسم پر عموماً نیلا بیٹ ہوتی ہے۔

ایسٹک ایسڈ (Acetic Acid): دق میں اس سال لاحق ہوں۔ پتکے خون والے یا خالص خون کے اس سال لاحق ہوتے ہیں۔ بواسیر سے افراط کے ساتھ خون سے۔ مزمن اس سال۔

الیومینا (Alumina): ایک ایک دن کے وقفے سے اس سال لاحق ہوں۔

فلورک ایسڈ (Fluoric Acid): ایک ایک دن کے وقفے سے اس سال لاحق ہوتے ہیں اور ہر مرتبہ آخری ٹھنڈوں میں آتے ہیں۔

برائی اونیا، اگنیشیا، کولو سنٹھ، سیسینی گیگیا (Igantia, Colocynth, Staphisagria, Bryonia): بد مزاجی کے بعد اس سال لاحق ہوں۔

کروٹن ٹیگ (Croton Tig): اس سال تین اہم علامات کے ساتھ لاحق ہوں۔ (1) پاخانے درد اور پانی والے ہوتے ہیں۔ (2) پاخانہ اچانک تیزی کے ساتھ خارج ہوتا ہے اور (3) مشروبیت یا غذا سے اضافہ ہوتا ہے۔ نرم اور پتلا پاخانہ ایک ہی لمبے میں زور سے یا پچپکاری کی طرح سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس میں سٹے اور سٹکی ہوتی ہے۔ گرم پانی پینے سے اتفاق ہوتا ہے۔ ہر حرکت اخراج کا باعث بن جاتی ہے۔

فالٹی ٹوالا (Phytolacca): دانت نکالنے کے دوران اس سال لاحق ہوں۔ جس کے ساتھ مسوڑھے اور دانت کاٹنے کی نہ رکنے والی خواہش ہوتی ہے۔

ٹیرنٹولا ایچ (Tarentula H): سردھوتے ہی فوراً پاخانہ آ جاتا ہے۔

پٹرولیم (Petroleum): دن کے دوران اس سال لاحق ہو جاتے ہیں۔ دوران شب بہتری ہوتی ہے جب کہ کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ اس سال ایک ہی وقت مقررہ پر لاحق ہوتے ہیں۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): شکر اور مٹھی گولیاں ٹافیاں کھانے کے باعث اس سال لاحق ہوں۔ جذبات کے باعث اعصابی اس سال لاحق ہوں۔

مرک ڈل سس (Merc Dulcis): سبز اسمال بچوں کو لاحق ہوں۔ اور جھنم ٹائٹ اور اپیکاک کا بھی مطالعہ کیجئے۔

نکس موسکاتا (Nux Mosch): دوران فعل اسمال لاحق ہوں۔

اولینڈر (Oleander): بے اختیارات یاخانہ خارج ہونے کے ساتھ اسمال لاحق ہوں۔ معدہ کی تکالیف۔ ہاضمہ مفلوج ہو جاتا ہے اور غذا مکمل طور پر غیر منضم خارج ہو جاتی ہے۔ پاخانہ ہوا کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔

تھوچا (Thuja): پیٹ میں گزراہٹ کے ساتھ صبح کے وقت کے اسمال جیسا کہ ہوا بند شیشی سے پانی گر رہا ہو۔

ٹرومبیدیئم (Trombidium): یہ اسمال کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔ جب کہ اسمال میں کھانے اور پینے سے اضافہ ہو جائے۔ پاخانہ سے پہلے پاخانہ کے دوران اور پاخانہ کے بعد اینٹھن والے درد ہوتے ہیں۔ اس میں تکپش بھی لاحق ہوتے ہیں۔

ڈیجیٹلس (Digitalis): یرقان کے دوران اسمال لاحق ہوں۔ سفید چاک کے رنگ والے راکھ کے رنگ والے اور پکنے پاخانے ہوتے ہیں۔

سنی کیولا (Sanicula): اکثر غذا کھاتے ہی پاخانہ آ جاتا ہے۔ ہر کھانے کے فوراً بعد میز سے اٹھ کر پاخانے کے لئے جانا پڑے۔ پاخانہ نکل جانے سے بچنے کے لئے ٹانگوں کو ایک دوسری کے ساتھ ملا کر دبانا پڑے۔ معدہ کو بند کرنے والے عضلات پر قابو نہیں رہتا۔ اکثر دوڑتے ہوئے کھڑے کھڑے اور رات کے وقت پاخانہ کیڑوں ہی میں نکل جاتا ہے۔

الستونیا کون (Alstonia Con): کھانے کے فوراً بعد غیر منضم غذا کے اسمال لاحق ہوتے ہیں۔ کھانا حتم کرتے ہی دستروان چھوڑنا پڑے۔ ہلکا بخار بھی ساتھ میں ہو سکتا ہے۔

مرک کار (Merc Cor): زور کے ساتھ خود بخود جھٹکے سے پاخانہ خارج ہو۔

گواچیکم (Guaiaicum): اسمال لاحق ہوتے ہیں۔ غذا غیر منضم خارج ہوتی ہے۔ صبح سویرے لاحق ہونے والے اسمال خون کی کمی واقع ہوتی ہے۔ گرم مزاج مریضوں میں نیز گھٹیاوی مریضوں میں۔

ارجنٹم میٹ (Argentum Met): ذہنی تکان کے باعث اسمال لاحق ہوں۔

چپارو امارگوسو (Chaparro Amargoso): اسمال اور تکپش لاحق ہو۔ مزمن یا حاد۔ جب کہ تمام دیگر ادویات ناکام ہو جائیں۔

گرافائٹس (Graphites): بصورے مائع کے ساتھ ملے پٹے غیر منضم اجزائے غذا والے پاخانے نیز ناقابل برداشت بدبو بھی ساتھ میں ہوتی ہے۔

بیسنزوئیک ایسڈ (Benzoic Acid): بے انتہا گندی بو والے پاخانے جو سارے گھر کو بدبودار بنادیں۔ سفید صابن کے جھاگ جیسے پاخانے ہوتے ہیں۔ متعفن اور خون والے پاخانے بچوں کے اسہال۔

کونیم (Conium): ٹھنڈے پاخانوں والے اسہال لاحق ہوں۔

ڈلکامارا (Dulcamara): خصوصاً پہاڑوں پر رہنے والوں کے اسہال جب اسہال ٹھنڈے کے باعث لاحق ہوں۔

سفی لینم (Syphilinum): ایسے اسہال جو ہمیشہ پہاڑوں پر چلے جانے سے ٹھیک ہو جائیں۔
سورینم (Psorinum): سڑے ہوئے انڈوں والی بو کے حامل اسہال۔ بہت ہی گندی بو والے اسہال ذکار بھی سڑے ہوئے انڈوں کی بو والے ہوتے ہیں۔

آئرس ویٹر (Iris Ver): جب پاخانے پانی والے ہوتے ہوں اور مقعد کو جلا دیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ مقعد کو آگ پر رکھ دیا گیا ہو۔ منہ اور کھانے والے نالی کی جلن کے ساتھ متلی ہوتی ہے۔

سیلیشیا (Silicea): دودھ پینے سے اسہال لاحق ہوں۔ ٹھنڈے لگ جانے کے باعث اسہال کا لاحق ہونا۔ پاخانے پانی والے ہوتے ہیں۔ لیس دار، سبزی مائل یا پیلے پاخانے ہوتے ہیں۔
سپٹی کے ای من (Septicaemin): خانہ بدوشی والی زندگی اکیمپنگ میں یہ دوا اسہالوں کے لئے جادو کا اثر رکھتی ہے۔

روڈوڈنڈرون (Rhododendron): سرد مرطوب موسم میں لاحق ہونے والے اسہال یہ اسہال طوفان بارشوں کے ساتھ ہی عود کر آتے ہیں۔

آرنیکا (Arnica): دوران خواب غیر ارادی طور پر پاخانہ خطا ہو جائے۔

کیمفر (Camphora): مرض کے آغاز میں ہی مریض بے جان ہو جاتا ہے۔

گریٹیولا (Gratiola): موسم گرما کے اسہال اسہال زرد رنگ کے ہوتے ہیں اور بہت زور سے یک دم خارج ہوتے ہیں۔ پانی والے اسہال ہوتے ہیں اور اس طرح سے بہتے ہیں جیسے عل سے پانی بہتا ہے۔ حد اعتدال سے زیادہ پانی پی لینے کے باعث لاحق ہونے والے اسہال۔ پیٹ میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ میگزینرک غدود میں سوجن ہوتی ہے۔

لیائٹریس سپائی کاٹا (Liatris Spicata): مزمن اسہال خانہ بدوشی والی زندگی میں ٹھنڈے لگ جانے کے باعث اسہال لاحق ہوں۔

گنیشیا کارب (Magnesia Carb): زرد رو اور بیمار بچوں میں اسہال ان بچوں کو دودھ پینے یا غذا کھانے کے بعد اسہال لاحق ہوتے ہیں۔ یہ بچے غذا کھانے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ

اس سے انہیں معدہ میں درد شروع ہو جاتا ہے اور سبز رنگ کے پاخانے لاحق ہو جاتے ہیں۔ سوکڑا لاحق ہو۔ پاخانے سبز رنگ کے جھاگ دار ہوتے ہیں جیسا کہ بوہڑ کے اوپر جمی ہوئی کائی ہوتی ہے۔

سلفر (Sulphur): صبح کے وقت کے اسہال، عموماً یہ اسہال اس وقت لاحق ہو جاتے ہیں جب مریض اٹھنے کے متعلق سوچنا شروع کرتا ہے۔ آدھی رات اور صبح کے دوران لاحق ہونے والے اسہال، پاخانہ بدبو دار ہوتا ہے اور یہ بدبو مریض کا پیچھا پاخانہ کرنے کے بعد بھی کرتی رہتی ہے جیسا کہ پاخانہ اس کے کپڑوں اور جسم کو لگا ہوا ہے۔ اس دوا کو قمل انگیز دوا کے طور پر بھی استعمال کرنا چاہئے۔

پوڈوفالیم (Podophyllum): خانہ بدوشی والی زندگی کے اسہال، ناخالص پانی پینے کے باعث لاحق ہوں۔ پاخانے خوفناک قسم کی بدبو کے حامل ہوتے ہیں۔ صبح سویرے ہی پاخانہ آ جاتا ہے۔ پاخانے، پانی والے، لیس دار، زرد یا غیر منظم، یک دم زور کے ساتھ خارج ہونے والے ہوتے ہیں۔ قدرتی پاخانہ دن میں کافی دیر کے بعد خارج ہوتا ہے۔ پاخانے درد کے بغیر خارج ہوتے ہیں۔ یہ دوا بچوں کے ضدی قسم کے اسہال میں خصوصاً مفید ہوتی ہے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): اسہال لاحق ہوں۔ پانی جیسے پتے اور بغیر کسی تکلیف کے پاخانے آتے ہیں۔ پاخانے کے بعد مریض بہتری محسوس کرتا ہے۔ مقعد کو بند کرنے والے عضلات کمزور ہو جاتے ہیں چنانچہ فضلہ غیر ارادی طور پر خارج ہو جاتا ہے۔ افراط کے ساتھ اور لمبے مسلسل اسہال ہوتے ہیں۔ جن کے باعث کمزوری ہو جاتی ہے۔

نٹرم کارب (Natrium Carb): دودھ پینے سے اسہال لاحق ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ذہن کی دھڑکن بھی ہوتی ہے۔

لیتھیم کارب (Lithium Carb): کوکا پینے یا چاکلیٹ کھانے کے باعث اسہال لاحق ہوں۔ سکس کس کین (Cistus Can): مزمن اسہال جن کے ساتھ غدد اور پیٹ میں سوجن ہو جاتی ہے۔ تپ دق ہو سکتی ہے یا پھر تپ دق نہیں ہوتی۔

اوپیم (Opium): خوف میں اسہال لاحق ہوں جبکہ کوئی شکل ذہن میں متواتر ظاہر ہو کر خوف کا باعث بنے۔ خوشی کے باعث اسہال لاحق ہوں۔

ورٹرم الیم (Veratrum Alb): ٹھنڈے پینے آنے کے ساتھ خوف میں اسہال لاحق ہوتے ہیں۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): جب اسہال بہت زیادہ خوشی کے بعد لاحق ہوں جبکہ کوئی تصور چل رہا ہو۔ بچوں میں سبز اسہال جبکہ ماں بہت زیادہ شکر استعمال کرے۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): جب پاخانے سبزی مائل، زرد اور نیچے ہوں۔ رات کے وقت بہتری ہوتی ہے۔ (ادویہ) انیون کھانے والوں میں اسال۔

جیٹ روفا (Jatropha): اسال اور قے لاحق ہوتے ہیں۔ دھڑکن بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور پنڈلیوں میں اینٹھن ہوتی ہے۔ قے اور پاخانہ ایک ہی وقت میں لاحق ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایشیائی پیضہ میں ہوتا ہے۔

یوفوربیا کورولاٹا (Euphorbia Corollata): اسال اور قے لاحق ہوں۔ سارے جسم پر ٹھنڈا پسینہ ہوتا ہے۔ دماغ کی عجیب حالت ہوتی ہے۔ مریض مریخا جانا چاہتا ہے۔

چائنا (China): پتے پانی والے بغیر درد کے پاخانے، پیٹ میں گڑبڑا ہٹ ہوتی ہے۔ پیاس بہت زیادہ ہوتی ہے اور سارے جسم پر پسینہ آتا ہے۔ غذا کھانے کے بعد بہتری ہوتی ہے۔ خصوصاً پھل کھانے کے بعد اور رات کے وقت یا صبح سویرے بہتری ہوتی ہے۔

ریوم (Rheum): پاخانے کھٹے ہوتے ہیں اور سارے جسم میں کھٹاس اس دوا کی نمایاں علامت ہے۔ پاخانے جھاگ دار سبز ہوتے ہیں جیسا کہ جوہڑ کی کائی ہوتی ہے۔ یہ دوا خصوصاً بچوں کے لئے موزوں ہے۔ جن میں اوپر دی گئی علامات موجود ہوں۔

کلیکریا فاس (Calcarea Phos): بچوں میں کھٹے اور غیر منضغ پاخانے۔ خصوصاً دانت نکالنے کے عرصہ کے دوران جب بچوں کو پاخانے لگ جائیں۔ آواز کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ خارج ہونے والے پاخانے۔ یہ پاخانے پانی والے سبزی مائل اور غیر منضغ غذا والے ہوتے ہیں۔

بوریکس (Borax): پیشاب کرنے بیٹھے تو پیشاب سے پہلے پاخانہ آ جائے۔ ناشتے کے بعد اسال لاحق ہوں۔

سٹرانٹیا (Strontia): رات کے وقت بہت زیادہ بکلت کے ساتھ اسال لاحق ہوں مریض ابھی بیت الخلاء سے بمشکل باہر نکلتا ہے کہ دوبارہ حاجت ہو جاتی ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): مزمن اسال کے لئے۔ اس میں سبز رنگ کے بلغم والے پاخانے ہوتے ہیں۔ جن میں صبح کے وقت بہتری ہوتی ہے۔ یہ پاخانے اکثر غیر منضغ غذا والے اور بغیر درد کے ہوتے ہیں۔ پاخانوں میں سفید رنگ کے اجزاء، چاول یا تکوں کی طرح کے خارج ہوتے ہیں۔ پاخانوں کے بعد بھی مقعد کھلا رہتا ہے۔

کیسٹوریم (Castoreum): گرمیوں میں بچوں کو سبز پاخانے لاحق ہوں۔ تو یہ دوا دی جائے۔ اعصابی درد قوی لاحق ہو۔

کولوسینٹھ (Colocynth): شدید درد قوی کے ساتھ اسال لاحق ہوں۔ دبانے سے بہتری

ہوتی ہے۔ جذباتی جوش کے باعث تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ تشنگی درد قویخ کے ساتھ صغراوی مادے خارج ہوتے ہیں۔

فیرم میٹ (Ferrum Met): مریض مشکل ہی سے کھانا ختم کرنے کا انتظار کر سکتا ہے۔ کھانے کے دوران ہی عادت ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت کھانے اور پینے دونوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پاخانے غیر منظم غذا کے ہوتے ہیں اور اکثر رات کو لاحق ہوتے ہیں۔ مزمن کیسوں میں اخراج بغیر کسی درد کے ہوتا ہے۔

گمبوجیا (Gambogia): بوڑھے لوگوں میں اسہال، پاخانہ کرنے کی عادت اعتدال سے زیادہ ہوتی ہے اور پاخانہ بڑے زور کے ساتھ یک دم خارج ہوتا ہے۔ جس کے بعد مریض سکون محسوس کرتا ہے۔

نیٹرم سلف (Natrium Sulph): سبزیاں، پھل، پیسٹری، سرد غذا اور سرد مشروبات کے باعث لاحق ہونے والے اسہال۔ یہ دوا صبح کو لاحق ہونے والے اسہال کی نشاندہی کرتی ہے۔ بستر سے اٹھنے کے بعد تھوڑی سی حرکت کرنے سے ہی اسہال لاحق ہو جاتے ہیں۔ یہ اسہال سلفر سے مختلف ہوتے ہیں۔ جس میں اسہال مریض کو بستر سے نکلنے کے معمول والے وقت سے بہت پہلے ہی بستر سے نکال دیتے ہیں۔ آنتوں میں گڑگڑاہٹ ہوتی ہے اور پھر اچانک تیزی کے ساتھ اور آواز کے ساتھ پاخانہ بڑے زور سے خارج ہو جاتا ہے۔

ایلٹریم (Elaterium): زیتون کے تیل جیسے سبز پاخانوں میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ پاخانے باقراط اور یک دم زور کے ساتھ خارج ہوتے ہیں۔

ایبروٹنم (Abrotanum): اسہال اچانک بند ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہوا سیر اور حاد گھٹیا لاحق ہو جاتا ہے۔ اسہال اور قبض اول بدل کر لاحق ہوتے ہیں۔

خصوصاً بچوں میں اسہال کے لئے

کیمومیلا (Chamomilla): جب کہ بچہ درد کے باعث جاگ جائے اور پاخانہ بھی ساتھ ہی خطا ہو جائے۔ بچہ ہر وقت اٹھائے جانے کو پسند کرتا ہے۔ پاخانے سبز ہوتے ہیں۔ پانی والے، میلے ہوئے جیسا کہ کترے ہوئے ایتڑے ہوتے ہیں۔ نیز کھنی بو والے ہوتے ہیں۔ دانت نکالنے کے عرصہ کے دوران بچہ درد سے چلاتا ہے۔ غذا کھانے اور پینے سے انکار کر دیتا ہے۔ نیز کھلونوں کو بھی منع کر دیتا ہے۔

گنیشیا کارب (Magnesia Carb): ہر تین بنتوں کے بعد اسہال لاحق ہو جاتی ہے۔ پاخانے سبز، جھاگ دار ہوتے ہیں جیسا کہ میوڑوں والے جوہڑ کی کالی ہوتی ہے۔ دودھ غیر منظم ہی

پاخانے کے راستے خارج ہو جاتا ہے۔ اسال کانٹے والے درروں سے شروع ہوتے ہیں۔ بچے کے پورے جسم سے کھٹی بو آتی ہے۔

ریویم (Rheum): دانت بہت مشکل سے نکلتے ہیں۔ بچے بے چین رہتا ہے۔ چڑچڑاہوتا ہے۔ زرد رنج، زرد چہرے والا ہوتا ہے۔ اس کے تمام جسم سے کھٹی بو آتی ہے۔ حتیٰ کہ اسے دھلانے اور نہلانے کے بعد بھی بچے سے کھٹی بو آتی رہتی ہے۔ کھوپڑی پر مسلسل اور باقراط پسینہ آتا رہتا ہے۔

فائی ٹولا کا (Phytolacca): دانت نکالنے کے عرصہ کے دوران اسال لاحق ہوتے ہیں۔ جن میں مسوڑھوں اور دانتوں کو کانٹے کی نہ رکنے والی خواہش ہوتی ہے۔

ایسٹک ایسڈ (Acetic Acid): بچوں کے مزمن اسال، جس کے ساتھ بہت زیادہ خون میں کمی لاحق ہوتی ہے۔

ایلیم سیپیا (Allium Cepa): بد ہنسی، تے اور اچھارہ ہوتا ہے۔ بچہ بہت بدبودار ہوا خارج کرتا ہے۔

میڈورینیم (Medorrhinum): مہتری مائل زرد پاخانوں اور انتہائی گندی بو کے ساتھ بچوں کو لاحق ہونے والے اسال، پاخانے بلا ارادہ خارج ہو جاتے ہیں۔ پاخانے پانی والے، چھپے، وہی کی طرح کے جھہ ہوئے اور سڑے ہوئے انڈوں کی بو والے ہوتے ہیں۔ خون اور چھپ باقراط خارج ہوتی ہے۔

گمی گٹی (Gummi Gutti): ناف کے قریب کانٹے والے درد ہوتے ہیں۔ اچانک پاخانہ خارج ہونے پر بچہ چیختا ہے اور خوف زدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد خوری طور پر تھوڑی دیر کے لئے بچہ کو سکون ہو جاتا ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے بھی صورتحال دوبارہ پیش آ جاتی ہے۔

اکونائٹ نیپ (Aconite Nap): جب بچہ کو پانی والے اسال لاحق ہوں تو یہ دوا دہی جائے۔ بچہ روتا چلاتا اور بہت زیادہ شہابی ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو کانٹا ہے اور بے خوابی میں جھٹکا رہتا ہے۔

ایپس ایم (Apis M): بچوں اور نوزائیدہ بچوں میں بحیب قسم کے پاخانوں کے لئے خصوصاً یہ دوا مفید ہوتی ہے۔ خون، یلغم اور خوراک کے ملے جلے پاخانے ہوتے ہیں جن کی شکل نمائش کی چٹنی جیسی ہوتی ہے۔

پیش (Dysentery)

سلفر (Sulphur): یہ دوا 200 طاقت میں عمل انگیز دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ حاد یا

مزمن کیسوں میں علاج اسی دوا سے شروع کرنا چاہئے۔ بہت سے کیسوں میں اس دوا کی ایک خوراک ہی مطلوبہ اثرات ظاہر کر دیتی ہے۔ اسے تین یا چار دنوں کے بعد دہرایا جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ پہلی خوراک سے کچھ اچھے نتائج ظاہر ہوں۔

مرک کار (Merc Cor): یہ پچیش کے لئے چونی کی دوا ہے۔ اس میں مروڑوں کے ساتھ خون والے پاخانے کی علامات ہوتی ہیں۔ اس میں مروڑا متنازعہ کے شدید ہوتے ہیں۔ جو کہ شدید پرورد ہوتے ہیں۔ پاخانے بلغم کے چھوڑوں کے ساتھ کم مقدار میں خارج ہوتے ہیں۔ خون افراط کے ساتھ یا کم مقدار میں ہو سکتا ہے۔ یہ دوا خونی پچیش کی نشاندہی کرتی ہے۔ مقعد میں جلن بھی ہو سکتی ہے۔ مروڑا پاخانہ سے پہلے اور بعد میں ہوتے ہیں۔

مرک سال (Merc Sol): یہ اس پچیش کی نشاندہی کرتی ہے جس میں خون نہیں ہوتا لیکن اس میں بلغم ہوتا ہے۔ یہ مرک کار کی نسبت کم شدت والے پچیش کی دوا ہے۔
تھوجا (Thuja): یہ دوا امیسیلی پچیش کے لئے عمدہ ہے جبکہ سلفر اور دیگر نشاندہی کی گئی ادویات ناکام ہو جائیں۔

کاربولک ایسڈ (Carbolic Acid): نماریاں غلبت اور ٹھنڈے سینے کے ساتھ بلغم والے پچیش۔

پیپارو امارگوسو (Chaparro Amargoso): حاد یا مزمن پچیش یا اسہال جب کہ بقیہ تمام ادویات ناکام ہو جائیں۔

کولوشنتھ (Colocynth): پاخانہ سے قبل مروڑوں کے ساتھ پچیش لاحق ہونے میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ دہرا ہونے اور دبانے سے درد کم ہو جاتا ہے۔

ٹرومبیدیئم (Trombidium): جب کھانے اور پینے کے بعد پچیش میں اتھری ہو جائے۔ پاخانہ سے قبل دوران اور بعد میں اینٹھن والے درد ہوتے ہیں۔

کالچیکم (Colchicum): سفید بلغم خارج ہونے اور مروڑوں کے ساتھ موسم خزاں کے پچیش۔ خونی پاخانے جو نیچے مواد کے ساتھ ملے جلتے ہوں۔

سناپیریس (Cinabaris): پچیش جو ہر رات اتھرو ہو جائیں۔ خون والے اور بلغم والے پاخانے بہت زیادہ زور لگاتا پڑتا ہے۔ سبز رنگ کے پاخانوں والے اسہال رات کے وقت اتھری ہوتی ہے۔ پاخانہ کرنے کے دوران مقعد باہر نکل آئے۔

سٹریپٹوکوکین 200 (Streptococcin 200): جراثیمی قسم کے خونی پچیش کے لئے اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ خون خارج ہوتا ہے اور حرارت جسمانی بہت زیادہ ہوتی ہے نیز زہریلا پن بھی ہوتا ہے۔

سٹیفنی لو کو کیمن 200 (Staphylococcin 200): خون اور پیپ کے اخراج کے ساتھ لاحق ہونے والے پچش کے مزمین کیسوں کے لئے اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔
 سہمی سائی من (Septicaemin): خانہ بدوشی کی زندگی کے پچش کے لئے یہ دوا جادو کا اثر رکھتی ہے۔ یہ خانہ بدوشی کی زندگی گزارنے والوں کے اسہال میں بھی مفید ہوتی ہے۔
 ٹیرہینٹینا (Terebinthina): خون آنے اور آنٹوں کی ناسوری کیفیت کے ساتھ آنٹوں اور قولون کی سوزش لاحق ہو۔

گروتالیس ہور (Grotalus Hor): زہر کی اصل والے پچش لاحق ہوں۔ گمرے رنگ کے مائع اور خون کے بہت زیادہ اخراج کے ساتھ یا بے اختیارانہ پاخانہ خطا ہو جانے کے ساتھ 'عظیم نقابت اور بے ہوشی ہوتی ہے۔ پچش کم مقدار میں 'گمرا سرخ' خون کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔

کیس کیریل (Cascarilla): بلغم میں لٹھڑے ہوئے گردہ دار پاخانے آتے ہیں۔ جن کے ساتھ درد قولنج اور جلن ہوتی ہے۔ خون کی ٹالیوں کے امراض کے باعث آنٹوں سے سیلان خون پیلے و سرخ رنگ کا متواتر ہوتا رہتا ہے۔ یہ آنٹوں سے خارج ہونے والا یا بواسیر والا سیلان خون نہیں ہوتا۔

لپٹنڈرا (Leptandra): پاخانے کالے، گاڑھے، تار کی طرح کے اور متعفن ہوتے ہیں۔ خونی بلغم آتا ہے۔ یہ احساس رہتا ہے کہ کوئی چیز مقعد سے خارج ہو رہی ہے۔
 نکس وامیکا (Nux Vom): پاخانے کی متواتر حاجت ہوتی ہے لیکن جیسے ہی آنٹوں میں حرکت ہوتی ہے 'حاجت رک جاتی ہے۔ پاخانہ کرنے کی بے نتیجہ خواہش۔
 ایلو ایس (Aloe S): خون اور بلغم والے پاخانے کے بعد پیٹ کے نچلے حصہ میں جکڑن والے درد ہوتے ہیں۔ بلغم لعاب دار خارج ہوتا ہے اور غیر معمولی زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے۔

روڈوڈنڈرون (Rhododendron): طوفان باد و باران یا ٹھنڈے مرطوب موسم سے پہلے یا دوران پچش لاحق ہوتے ہیں۔

بد ہضمی (Dyspepsia)

نکس وامیکا (Nux Vom): ناقابل ہضم غذا کے باعث بد ہضمی لاحق ہوتی ہے۔ اینٹھن والے یا سبج والے درد ہوتے ہیں۔ اچھارہ ہوتا ہے۔ قے لاحق ہوتی ہے اور قبض ہوتی ہے۔
 شرایوں کی بد ہضمی 'غذا ہضم ہو جانے کے بعد بہتری ہوتی ہے۔ اسہال اور قے کے لئے اس

دوا کو سلفر کے ساتھ بدل کر دیا جائے۔

کاربو ووج (Carbo Veg): بہت زیادہ اچھارہ ہوتا ہے۔ ہوا کے ڈکار آتے ہیں۔ سینے میں کانٹے والے درد ہوتے ہیں۔ تیزابیت ہوتی ہے اور ڈھیلے پاخانے آتے ہیں۔

ابیس کین (Abies Can): گوشت، اچار اور دیگر خراب غذاؤں کی طلب ہوتی ہے۔ کترن والے درد ہوتے ہیں۔ پیٹ کے بالائی حصہ میں بھوک اور غشی کا احساس ہوتا ہے۔

شائم (Stannum): اعصابی بد ہضمی میں یہ دوا دی جاتی ہے جبکہ متلی اور تے کھانا پکانے کی بو سے لاحق ہو۔

کاربولک ایسڈ (Carbolic Acid): اعصابی بد ہضمی لاحق ہو جاتی ہے۔ شرایوں میں انتہا درجے کا درد اس دوا کی علامت ہے۔

روبینیا (Robinia): تیزابیت، معدہ میں درد، کھٹی تے وغیرہ کے ساتھ بد ہضمی لاحق ہو۔
سلی سلک ایسڈ (Salicylic Acid): سڑی ہوئی بو والے ڈکاروں کے ساتھ بد ہضمی لاحق ہو۔ اچھارہ اعتدال سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ معدہ میں تیزابیت ہوتی ہے۔ متلی میں طلق میں ٹھن ہوتی ہے اور منہ میں پانی بھرتا رہتا ہے۔

امگ ڈیلز پرسیکا (Amygdalus Persica): اسہال اور تے لاحق ہوں۔
ایٹیم سٹی وا (Allium Sat): پھرڑے پر گوشت اشخاص میں بد ہضمی، خوراک میں معمولی سی بے قاعدگی کے باعث آنتوں میں مچھن ہوتی ہے۔

کاسٹیکم (Causticum): اعصابی بد ہضمی، بے چین کر دینے والا اچھارہ ہوتا ہے جس کے باعث دل پھڑپھڑاتا ہے۔ زندگی سے مایوسی ہوتی ہے۔

کلی کارب (Kali Carb): ایک عجیب قسم کی علامت کے ساتھ بد ہضمی لاحق ہو۔ وہ علامت یہ ہے کہ جیسے ہی دروازے کو بند کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے جیسے درخت کے بالائی حصہ میں دروازے کو بند کیا گیا ہے اور اگر جسم کو چھو لیا جائے تو اسے بھی مریض برداشت نہیں کر سکتا۔
مگنیشیا میور (Magnesia Mur): بد ہضمی لاحق ہوتی ہے۔ پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے۔ دانت ٹکانے کے عرصہ کے دوران بچوں میں قبض لاحق ہوتی ہے۔

لپٹنڈرا (Laptendra): صفرا والی تے لاحق ہوتی ہے۔ سیاہ پاخانے آتے ہیں۔ پیشانی میں بدہم درد ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پیشانی کے گرد ایک پٹی کس کر باندھی گئی ہو۔

مرک سول (Merc Sol): پتلی اور ڈھیلے زبان ہوتی ہے۔ سانس بدبودار ہوتا ہے۔ ہلکے پاخانے آتے ہیں۔ کم حوصلگی ہوتی ہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): بے ہلکم قسم کی بھوک ہوتی ہے۔ زبان پر سفید طمع ہوتا ہے۔ دل میں جلن ہوتی ہے۔ منہ میں پانی بھرتا رہتا ہے۔ دودھ ناموافق ہوتا ہے۔ پیٹ کے بالائی حصہ میں سوجن ہوتی ہے۔ کسے ہوئے کپڑے ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ پیٹ بڑا ہوا اور سخت ہوتا ہے۔ سفید رنگ کے بدبودار پاخانے آتے ہیں۔

سینگوئی نیریا (Sanguinaria): زبان پر پیلا یا سفید طمع ہوتا ہے۔ ناقابل ہضم چیزوں کی خواہش ہوتی ہے۔ تیز مصالحوں والی غذا کا شوق ہوتا ہے۔ بدبودار ذکار آتے ہیں۔ منگی، تھکے سے بھی دور نہیں ہوتی۔ منہ میں تھوک آتا رہتا ہے۔ درد سر کے ساتھ کڑوی تھکے آتی ہے۔ معدہ میں جلن دار دباؤ یا خالی پن کا احساس ہوتا ہے۔ پیٹ کے بالائی حصہ میں دکھن ہوتی ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): مریض غذا کھانے سے بد ہضمی لاحق ہو۔ بلغم میں انتشار ہوتا ہے۔ زبان پر گاڑھا، چکنا اور سفید طمع ہوتا ہے۔ چھوٹی تھکے کے ساتھ منگی ہوتی ہے۔ دل میں جلن ہوتی ہے۔ درد نہیں ہوتا۔ پیٹ میں تھکاؤ کا احساس ہوتا ہے۔ کپڑے ڈھیلے کرنے پڑتے ہیں۔ پاخانے ڈھیلے یا باقاعدہ ہوتے ہیں۔

انٹیم گروڈ (Antim Crud): زبان دودھ کی طرح سفید ہوتی ہے۔ ہوا کے ذکار آتے ہیں اور متعفن غذا کے ذائقے والے ذکار آتے ہیں۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): منہ میں پانی بھرتا رہتا ہے۔ زبان پر سفید طمع ہوتا ہے۔ آنکھوں میں تھکاؤ کے ساتھ اچھارہ ہوتا ہے۔ مریض کپڑوں کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتا۔ قبض ہوتی ہے۔ پیشاب میں پتھریاں ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ غنودگی رات کے کھانے کے بعد ہوتی ہے۔

اناکارڈیم (Anacardium): علامات کھانے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں اور دو گھنٹے کے بعد واپس چلی جاتی ہیں۔ (یہ دوا نکس وامیکا کے برعکس ہے۔ جس میں کھانا ہضم ہو جانے کے بعد بہتری ہوتی ہے۔)

ابیس ناگرا (Abies Nig): بد ہضمی اس احساس کے ساتھ لاحق ہوتی ہے کہ جیسے مریض نے کوئی ناقابل ہضم مادہ نگل لیا ہو جو کہ معدہ کے دل والے سوراخ میں پھنس گیا ہو۔ اس میں کم جو صلگی بھی ہوتی ہے۔ نیز سراتی حالت بھی ہوتی ہے اور قبض کے باعث بد ہضمی واقع ہوتی ہے۔ سگریٹ نوشی یا چائے نوشی کے باعث بد ہضمی لاحق ہو۔ جس میں بعض اوقات جھنجھڑوں سے خون آتا ہے اور بعض اوقات نہیں آتا۔

نکس موسکاٹا (Nux Mosch): کھانا کھانے کے بعد تیز اہیت منہ کو آتی ہے۔ کانٹے والے درد ہوتے ہیں۔

متعفن پاخانے (بدبودار پاخانے)

Fetid Stools (Offensive Stools)

(نیز دیکھئے "اسال")

پودوفیلوم (Podophyllum): گلے سڑے گوشت کی طرح کے بدبودار پاخانے لاحق ہوتے ہیں۔ بچوں میں وہائی ہیضہ کے دوران اسال لاحق ہوں۔ گرم موسم میں اتھری ہوتی ہے۔ پاخانے کھٹے ہوتے ہیں۔ جن کے ساتھ اچھارہ ہوتا ہے۔ حلق میں گھٹن ہوتی ہے اور بچوں میں حد اعتدال سے بڑھی ہوئی پیاس ہوتی ہے۔

لیکسیس (Lachesis): نیم جانی لاحق ہو۔ دوران نیند اتھری ہوتی ہے۔ **ریوم (Rheum):** دانت نکالنے کے عرصہ کے دوران بدبودار پاخانے آتے ہیں۔ جو کھٹی بو والے ہوتے ہیں۔ بچوں میں درد قویج کے ساتھ۔ جبکہ جسم سے بھی کھٹی بو آتی ہے۔ بچے بچپن کے ساتھ مروڑوں کے باعث چلاتے ہیں۔

بیسنزونک ایسڈ (Benzoic Acid): بچوں میں پیشاب کی طرح کے بدبودار اسال۔

بپٹیشیا (Baptisia): ٹائیفائیڈ بخار میں گندی بو والے پاخانے ہوتے ہیں۔

سورینم (Psorinum): کانوں سے مواد خارج ہونے کے ساتھ بدبودار پاخانے لاحق ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت انگیزما اور اوتھالیا میں پیدا ہوتی ہے۔ بچوں میں خراب ہو جانے والے انڈوں کی طرح کے پاخانے ان کے پہلے یا دوسرے موسم گرما میں لاحق ہوتے ہیں۔

ایسافوئیڈا (Asafoetida): بہت زیادہ پریشان کن بدبو والے پانی کی طرح کے پاخانے لاحق ہوتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے اور متعفن ہوا خارج ہوتی ہے۔

آرسینک ایلیم (Arsenic Alb): گیسٹر و' ملیشیا میں نیم جانی ہوتی ہے۔ آنتوں کے نزلہ میں نیز قیہ خون کے مرض میں نیم جانی لاحق ہو۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): نوزائیدہ بچوں کے ہیضہ میں کھٹے پاخانے ہوتے ہیں۔ دانت نکالنے کے عرصہ کے دوران بھی کھٹے پاخانے لاحق ہوتے ہیں۔

گرافائٹس (Graphites): مقعد میں جلن کے ساتھ کھٹے پاخانے لاحق ہوں۔

ایپس ایم (Apis M): ہائیزرو سیفلائنڈ میں اسے استعمال کریں۔

چیرے (Fissure)

(مقعد پر ناسور)

گریفائٹس (Graphites): ایسے اشخاص میں جو ایگزیرما سے حساس ہوتے ہیں۔ مقعد میں انتہا درجے کی دکن ہوتی ہے اور پاخانے بلغم سے لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مروڑ یا کھچاؤ نہیں ہوتا۔

سینگلوئی نیریا ٹائٹ (Sanguinaria Nit): بھان 'خارش اور جلن مقعد میں ہوتی ہے۔
پائونیا (Paeonia): چیرے جن سے بہت زیادہ مواد رستا ہے۔ مقعد میں بدبو دار رطوبت اور دکن ہوتی ہے۔ ہر وقت مقعد سکڑا رہتا ہے۔ پاخانہ کرنے کے کئی گھنٹے بعد تک مقعد میں جلن اور کنٹن ہوتی رہتی ہے۔ ساری رات چلنا پڑتا ہے۔

سیلیسیا (Silicea): مقعد کو بند کرنے والے عضلات میں بھان ہوتا ہے اور جزوی طور پر خارج ہونے والا پاخانہ دوبارہ واپس پھسل جاتا ہے۔ پاخانہ کرنے کے آدھے گھنٹے بعد بہت زیادہ درد شروع ہو جاتا ہے اور کئی گھنٹوں تک باقی رہتا ہے۔

ایسڈ نائٹرک (Acid Nitric): اس احساس کے ساتھ کہ جیسے مقعد میں لکڑی کی چکریں یا تیلیاں پھنسی ہوئی ہوں، مقعد میں چیرے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ مروڑ اور بھن ہوتی ہے۔ نیز اعضاء سے مسلسل متعفن قسم کا مادہ رستا رہتا ہے۔ جلن دار کچا پن اور سکڑاؤ ہوتا ہے۔

راتانیا (Ratanhia): کانٹے والے اور بھالے لگنے جیسے درروں کے ساتھ جو کہ امعاء مستقیم میں ہوتے ہیں، چیرے لاحق ہوں۔ اچانک ٹانگے لگنے جیسے درروں کے ساتھ مقعد میں شکنی ہوتی ہے۔ مقعد میں کھچاؤ ہوتا ہے۔ جس کے باعث پاخانہ کرنے کے گھنٹوں بعد تک درد اور جلن ہوتی ہے۔

الومینا (Alumina): چیرے لاحق ہوں۔ قبض اور بہت زیادہ کھچاؤ کے ساتھ باغی جھلی مونی ہو جاتی ہے اور سوچ جاتی ہے۔

پلاٹینا (Platina): مقعد میں چیرے ہوتے ہیں۔ جن میں ریٹگن اور خارش ہر شام کے وقت ہوتی ہے۔

تھو جا (Thuja): بو اسیر لاحق ہو۔ پاخانہ کرنے کے دوران شدید درد ہوتا ہے۔ مریض جب چلتا ہے تو شدید جلن ہوتی ہے۔ پھوٹنے سے حساسیت ہوتی ہے۔

بربرس ولی (Berberis Vul): مقعد میں جلن کے احساس کے ساتھ اور گاڑھی پیلے رنگ کی بےپ خارج ہونے کے ساتھ اندرونی اندھا پھوڑا ہوتا ہے۔

لکیسیس (Lachesis): چیرے میں ہتھوڑے لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔

پھوڑا (ناسور) (Fistula)

نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid): اس مرض کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ ہر ہفتہ 200 طاقت کی خوراک دینی چاہئے۔ زیریں آنت میں دکھن اور جلن والے درد ہوتے ہیں۔ پھوڑے سے پتلا سبزی مائل مادہ آزادانہ طور پر بہہ کر خارج ہوتا ہے۔

سیلیشیا (Silicea): جب ناسور (پھوڑے) سے متعفن قسم کا پانی والا مادہ خارج ہو۔
بربرس ول (Berb-Vul): ناسور مقعد میں ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ صفراوی علامات ہوتی ہیں اور اعضاء میں خارش ہوتی ہے۔

لیکیسیس (Lachesis): ناسور میں درد ہوتا ہے جیسا کہ ہتھوڑیوں سے مارا جا رہا ہو۔
ایسڈ فلوور (Acid Flour): ایسا ناسور جس کے ساتھ آنکھوں سے پانی بہتا ہے اور دانٹوں سے مواد خارج ہوتا ہے۔

بیسلیٹیم (Bacillinum): آنکھی اور پارے کی ہسٹری والا ناسور۔ یہ دوا عمل انگیز کے طور پر بھی دی جاسکتی ہے۔ بشرطیکہ اچھی منتخب شدہ ادویات افادہ دینے میں ناکام ہو جائیں۔
کلکیریا، سلفر (Sulphur, Calcareia): مقعد کے ناسور میں بغیر درد کے ابھار ہوتا ہے۔
نچلے مواد والی پیپ خارج ہوتی ہے۔

کاسٹیکم (Causticum): ناسور اور لمبی یواسیر۔ امعاء مستقیم میں دکھن اور جلن ہوتی ہے۔
ہائیڈرائسٹس (Hydrastis): مقعد میں ناسور۔ ہمدی قسم کی قبض ہوتی ہے۔ امعاء مستقیم میں جلن اور سکڑاؤ ہوتا ہے۔ سیلان خون اور غشی ہوتی ہے۔

سلفر (Sulphur): مقعد سے اوپر کی جانب بھالے لگنے جیسے درد پھیلتے ہیں۔ خصوصاً پاخانہ کرنے کے بعد۔ اندھا ناسور ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ درد نہیں ہوتا۔ پیلاہٹ مائل سبز مادہ خارج ہوتا ہے۔ حلق میں خارش ہونے کے ساتھ کھانے کی خواہش بہت تھوڑی رہ جاتی ہے۔
ناک کا زلہ لاحق ہوتا ہے۔ پیشاب میں یوریا خارج ہوتا ہے۔ نیز پیشاب میں فاسفیٹ اور انگریزائٹ خارج ہوتے ہیں۔

کلکیریا فاس (Calcareia Phos): خنازیری مریضوں میں چھاتی کی علامات کے ساتھ اولتا پرتا ہوا یا پھر ایسے اشخاص میں جنہیں موسم کی تبدیلی کے وقت جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔
کیلن ڈولا لوشن (Calendula Lotion): ایک اونس پانی میں ایک ڈرام دوا ملا کر بیرونی طور پر لگایا جائے۔

جریان خون (Haemorrhage)

ہیمامیلس (Hamamelis): جب خون گرمے رنگ کا ہو اور پاخانہ کرتے ہوئے بغیر درد کے خارج ہو۔

فاسفورس (Phosphorus): جب خون ہوا خارج کرنے کے دوران خارج ہو۔

لیکیسیس (Lachesis): جب خون دوران حیض خارج ہو۔

امونیا کارب (Ammonia Carb): پاخانہ کے بعد جریان خون ہوتا ہے۔

سینگوئی نیریا (Sanguinaria): آنتوں سے خون بہتا ہے جو کہ خون نکالنے کے لئے جو نکلیں لگانے کے باعث لاحق ہوتا ہے۔

ٹائٹریک ایسڈ، میورٹیک ایسڈ (Nitric Acid, Muriatic Acid): یہ دونوں ادویات مقعد سے سیلان خون کے لئے چوٹی کی ادویات ہیں جبکہ سیلان خون بغیر کسی وجہ کے لاحق ہو۔

کروکس (Crocus): جب خون سیاہ لیس دار لو تھڑوں والا ہوتا ہے۔ یہ لو تھڑے سیلان خون کے دوران سوراخ سے کالے تاروں کی صورت میں نکلے ہوتے ہیں۔

ٹیرینتھینا (Terebinthina): مقعد سے جریان خون لاحق ہو اور بواسیر میں سیلان خون لاحق ہو۔ پیشاب میں الیومن اور خون خارج ہوتا ہے۔ پیشاب شدید قسم کی متعفن بو والا ہوتا ہے۔ آنتوں میں ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔

ایسٹک ایسڈ (Acetic Acid): خون والے پاخانے خارج ہوتے ہیں یا خالص خون خارج ہوتا ہے۔ جو کہ پتلا ہوتا ہے۔ بواسیر سے خون با افراط خارج ہو۔

بواسیری جریان خون (Piles)

(Haemorrhoids)

ٹکس وامایکا، سلفر (Sulphur, Nux Vom): خون والی یا بغیر خون کی بواسیر کے لئے یہ دوا میں چوٹی کی ہیں جبکہ جلن دار درد ہوتا ہے اور پاخانہ کرنے کی لاماصل خواہش کے ساتھ قبض ہوتی ہے۔ تین ماہ تک کے لئے ہر ماہ سلفر کی 1000 طاقت والی خوراک دیجئے۔ لیکن اس دوا کے استعمال سے دو دن پہلے اور دو دن بعد کوئی دوسری دوا نہ دی جائے۔ ٹکس وامایکا 30 طاقت کی دیگر ایام میں روزانہ تین مرتبہ دی جاسکتی ہے۔

ہیمامیلس (Hamamelis): بغیر درد کے سیلان خون ہوتا ہے۔ جس کے بعد نقاہت ہو جاتی ہے جو کہ خون ضائع ہونے پر لاحق ہونے والی ہر قسم کی نقاہت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ خون

گہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس میں خون کی کمی لاحق ہوتی ہے۔ سانس کم ہو جاتا ہے اور کمزوری ہوتی ہے حالانکہ بھوک خوب لگتی ہے۔

میو کوٹا (Mucuna): سیلان خون والے یو اسیر میں اس دوا کے مد نظرچر کی ایک خوراک ایک قطرہ کی دی جاتی ہے۔ دن میں دو یا تین خوراکیں دی جائیں تو دو تین دن میں بیماری رفع ہو جاتی ہے۔

فائیکس ریل (Ficus Rel): اگر میو کوٹا ناکام ہو جائے تو یہ ایک دوسری دوا ہے جسے آزما یا جا سکتا ہے۔

ایسٹک ایسڈ (Acetic Acid): حیض والے خون کے بند ہو جانے کے بعد آنتوں سے افراط کے ساتھ خون جاری ہو جاتا ہے۔

نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid): جس یو اسیر میں خون بہنا بند ہو جائے لیکن امعاء مستقیم میں تیز چہتے والے دردوں کے ساتھ یو اسیر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): یو اسیر کے سسے باہر کو نکل آتے ہیں۔ چلنے میں درد ہوتا ہے۔ ٹیٹھے پر بہتری ہوتی ہے۔ پانخانہ کرنے کے دوران با افراط سیلان خون کے ساتھ درد ہوتا ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): ہر پانخانہ کے بعد خون کی ایک چھوٹی دھار بہہ نکلتی ہے۔

کالی کارب (Kali Carb): یو اسیر لاحق ہو۔ جس میں درد ہوتا ہے اور جلن ہوتی ہے جیسا کہ آگ لگی ہوئی ہو اور خون بہتات کے ساتھ بہتا ہے۔ اندر کی جانب بہت زیادہ تباہ اور سوجن ہوتی ہے۔ مقعد کا تا سورا لاحق ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی میں ٹیٹھے سے یا ٹھنڈی چیزیں لگانے سے عارضی طور پر جلن ختم ہو جاتی ہے۔

ایلو (Aloe): جب خون عل سے بننے والے پانی کی طرح خارج ہو۔ یو اسیر کے سسے انگور کے ٹکے کی طرح باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے بہتری ہوتی ہے۔ ہوا فضلے کے ساتھ خارج ہوتی ہے۔ شدید قسم کی خارش اور مقعد میں جلن ہوتی ہے۔ اس وجہ سے مریض مسلسل مقعد میں انگلی ڈالے رکھتا ہے۔ مرہم لگانے سے جلن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

میورٹیک ایسڈ (Mur Acid): یو اسیر کے سسے انگور کے ٹکے کی طرح ہوتے ہیں۔ جو بیگنی رنگ کے ہوتے ہیں اور پھونکنے سے ان میں جلن ہوتی ہے۔ بچوں کی یو اسیر یو اسیر کے سسے باہر نکل آتے ہیں۔ جن کا رنگ سرفی مائل ہوتا ہے۔

سینگوئی نیریا (Sanguinaria): آنتوں سے خون مسلسل بہتا ہے۔ یہ خون پانی کی طرح کا ہوتا ہے۔

اگنیشیا (Ignatia): اندھی بو اسیر جس میں درد ہوتا ہے۔ خواہ مریض بیٹھا ہو یا کھڑا ہو۔ چلنے سے درد میں کمی ہوتی ہے۔ امعاء مستقیم میں دبانے والا تیز درد ہوتا ہے۔

لکیسیس (Lachesis): ایسی بو اسیر جس میں ہتھوڑے نلکے جیسے دردوں کے ساتھ سوزش ہوتی ہے۔

الیومینا (Alumina): بو اسیر شام کے وقت ابتر ہوتی ہے اور رات کے آرام کے بعد اس میں بہتری ہو جاتی ہے۔ مقعد سے خون کے نو تھوڑے خارج ہوتے ہیں۔ فسلہ سخت اور گرمہ دار ہوتا ہے۔ جیسا کہ بھیڑ کی میٹلیاں ہوتی ہیں۔ جس کے ساتھ مقعد سے خون خارج ہونے کے بعد کانٹے والا درد ہوتا ہے۔

ایسکولس ہیپ (Aesculus Hip): پر درد اندھی یا مقعد سے باہر نکلی ہوئی بو اسیر جس کا رنگ شینگنی ہوتا ہے۔ جس میں درد جلن اور خارش کے ساتھ بہت زیادہ بہتری ہوتی ہے اور کدڑی کی پچرس یا تیلیاں امعاء مستقیم میں پھنسی ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ سیلان خون کم ہوتا ہے۔ سخت اور خشک پاخانے خارج ہوتے ہیں۔ جو وقت کے ساتھ خارج ہوتے ہیں۔ جس کے بعد امعاء مستقیم کے باہر نکلنے کا احساس ہوتا ہے۔ کمر اور کولوں میں درد ہوتا ہے۔ خون جاری ہونے سے افادہ ہوتا ہے۔

اپیس (Apis): تیز ڈنگ نلکے جیسے دردوں کے ساتھ جن میں ٹھنڈی چیزیں لگانے سے افادہ ہوتا ہے۔

آرس البم (Ars Alb): جلن دار درد اور بے چینی میں گرم چیزیں لگانے سے افادہ ہوتا ہے۔

کاسٹیکم (Causticum): ناقابل برداشت درد والی بو اسیر جب مریض پلتا ہے تو بہتری ہوتی ہے۔

ڈائیوسکوریا (Dioscorea): بو اسیر انگوڑ کے پتھوں کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ جس کے ساتھ جگر تک بندش پھیل جاتی ہے۔

پائسونیا (Paeonia): جریان خون کے ساتھ ناسور مقعد اور بو اسیر کے ارد گرد کے حصے شینگنی رنگ کے ہوتے ہیں۔ جو بھوسی سے ڈسکے ہوتے ہیں۔ مقعد کے اندر ناسور ہوتا ہے۔ بس میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ ساری بلغمی جھلی ناسوروں اور خشکافوں سے پر ہوتی ہے۔ کانٹے والے درد ہوتے ہیں نیز مقعد میں خارش ہوتی ہے۔ جو مقعد کو کھرچنے پر آمادہ کرتی ہے۔

پوڈوفیلیم (Podophyllum): زچگی کے بعد مقعد کے خروج کے ساتھ بو اسیر لاحق ہوتی ہے۔ جگر میں اجتماع خون ہوتا ہے نیز قبض ہوتی ہے۔

لپٹنڈرا (Leptendra): امعاء مستقیم کے خروج کے ساتھ بیرونی بواسیر لاحق ہوتی ہے۔
خونی بواسیر۔

رشاکس (Rhus Tox): اندھی بواسیر جو ہر پاخانے کے بعد باہر کو نکل آتی ہے۔ اس کے ساتھ کمر میں درد ہوتا ہے اور امعاء مستقیم میں باہر کی جانب دباؤ ہوتا ہے۔

کیکٹس جی (Cactus G): سیلان خون والی بواسیر، دریدوں کے ڈھیلے پڑ جانے کے باعث جن سے زیادہ مقدار میں خون بہتا ہے۔ رسولیاں بن جاتی ہیں۔

کولن سونیا (Collinsonia): جریان خون والی بواسیر جس میں کمر درد اور خندہ کی قسم کی قبض ہوتی ہے۔ امعاء مستقیم کا خروج ہوتا ہے۔ بواسیر سے خون بہتا ہے یا اندھی بواسیر اور بواسیر کے مسوں کا خروج، قبض اور اسہال اول بدل کر لاحق ہوتے ہیں۔

سلیگ (Slagi): مقعد میں بہت زیادہ خارش، دکھن اور گھٹنوں کی پھیشوں میں درد کے ساتھ بواسیر لاحق ہو۔

امونیا کارب (Ammonia Carb): دیر تک رہنے والے دردوں کے ساتھ، پاخانے کے بعد بواسیر کے سے مقعد سے باہر نکل آئیں۔ مریض چل نہیں سکتا۔ بواسیر پاخانے کو آزاد کرنے کے لئے بھی مقعد سے خروج کرتی ہے۔ مقعد میں جلن اور خارش ہوتی ہے جو کہ سونے سے رک جاتی ہے۔ حیض کے وقت بواسیر میں اتھری ہو جاتی ہے۔

کیپسکیم (Capsicum): بواسیر لاحق ہو۔ مقعد میں دکھن کے احساس کے ساتھ جلن، سوجن، خارش اور جھکن ہوتی ہے۔ بواسیر خون والی یا اندھی ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ باغلم خارج ہوتا ہے۔ فریہ لوگ آسانی سے تھک جاتے ہیں۔

کاربو ویج (Carbo Veg): بواسیر کے نیلے رنگ کے سے باہر کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان سے پیپ بہتی ہے۔ جو بدبودار ہوتی ہے۔ امعاء مستقیم میں سوجن اور جلن ہوتی ہے۔ امعاء مستقیم سے مواد رستارہتا ہے۔ اچھارہ ہوتا ہے۔ سر میں اجتماع خون ہوتا ہے اور ناک سے سیلان خون ہوتا ہے۔ جس کا باعث امیرانہ طرز زندگی ہوتا ہے۔

مرک سول (Merc Sol): اسہال اور پیش کے ساتھ جریان خون لاحق ہو۔

جلی میم (Gelsemium): فالج سے جریان خون ہوتا ہے۔

ہائپرکیم (Hypericum): خصوصاً یہ دوا خونی بواسیر کے لئے ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ درد اور نرمی ہوتی ہے۔

امعائے مستقیم کی سوزش

(Inflammation of Rectum)

اگنیشیا (Ignatia): سکڑن والے گولی گئے جیسے اور تنگی والے درد ہوتے ہیں۔
 کپسکیم (Capsicum): جب مروڑا حق ہوں۔ جلن دار اور شدید قسم کے درد ہوتے ہیں۔
 فاسفورس (Phosphorus): بھالے گئے جیسے اور گولی گئے جیسے درد ہوتے ہیں۔ جن کے ساتھ مقعد میں جلن ہوتی ہے۔
 ایلو پوڈوفیلوم (Podophyllum, Aloe): حاد کیسوں میں۔
 کالجیکم (Colchicum): بہت زیادہ بلغم کے ساتھ ابتدائی حاد کیسوں میں۔
 نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): مزمن کیسوں میں جبکہ تنگی کا رجحان پایا جاتا ہو۔

بدبودار (پاخانے) (Offensive)

(دیکھئے "متعفن پاخانے")

امعائے مستقیم میں درد

(Pain in Rectum)

روٹا (Ruta): پاخانے کے بعد درد ہوتا ہے۔ جو کئی گھنٹوں تک جاری رہتا ہے۔ 1x طاقت کی خوراک دیجئے۔
 رٹانٹیا (Ratanhia): مقعد میں جلن دار درد ہوتا ہے۔ جو پاخانے کے گھنٹوں بعد تک رہتا ہے۔ جس کا باعث چیرے ہوتے ہیں۔
 رٹاکس (Rhus Tox): پیشاب کرنے کے دوران مقعد میں درد ہوتا ہے۔
 میورٹیک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ (Nit Acid, Mur Acid): امعائے مستقیم میں جلن دار درد ہوتا ہے۔
 ایلو ایس، سلفر (Sulphur, Aloe S): اسہال کے دوران اور ہوا خارج کرنے کے بعد درد ہوتا ہے۔
 کپسکیم (Capsicum): پچپش کے دوران درد ہوتا ہے۔
 کاسٹیکم (Causticum): مریض جب چل رہا ہو تو امعائے مستقیم میں درد ہوتا ہے۔

اگنیشیا (Ignatia): تیز قسم کے دور امعائے مستقیم میں ہوتے ہیں اور اوپر کی جانب مار کرتے ہیں۔

بواسیر (Piles)

(دیکھئے ”بواسیری جریان خون“)

امعائے مستقیم کی رسولی (Polypus)

(نیز دیکھئے ”متفرق“ کے ذیل میں ”رسولی... امعائے مستقیم“)

ٹیو کریم (Teucrium): امعائے مستقیم میں گومز ہوتا ہے۔

Proctitis

(دیکھئے ”امعائے مستقیم کی سوزش“)

امعائے مستقیم کا خروج

(Prolapsus of Rectum)

ایلو ایس (Aloe S): اسال، سیلان خون اور مروڑوں کے ساتھ امعائے مستقیم کا خروج۔
پوڈوفیلوم (Podophyllum): ہر پاخانے یا اچانک ہچکچ کے بعد امعائے مستقیم کا خروج لاحق ہو۔ اسال کے ساتھ جینٹلین آتی ہیں۔ خصوصاً صبح کے وقت۔
گمبوجیا (Gambogia): سبز یا پیلے اسال کے ساتھ، جلن دار درد کے ساتھ یا سخت لیکن ناکافی پاخانہ کے ساتھ اور شدید قسم کی پاخانہ کی حاجت کے ساتھ، امعائے مستقیم کا خروج لاحق ہوتا ہے۔

میورٹیک الیمڈ (Munatic Acid): امعائے مستقیم کا خروج لاحق ہو جبکہ مریض پیشاب کر رہا ہو۔ ساتھ میں بواسیر بھی ہوتی ہے۔

روٹا (Ruta): زچگی میں یا زچگی کے بعد پاخانہ کرنے کی معمولی سی کوشش کے ساتھ امعائے مستقیم کا خروج لاحق ہو جاتا ہے۔

بیلادونا (Belladonna): امعائے مستقیم کے خروج کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ ہیٹ میں ڈھول کی طرح سے ٹکاؤ ہوتا ہے اور اسال کے بعد امعائے مستقیم کا خروج لاحق ہو جاتا ہے۔
اگنیشیا (Ignatia): نمایاں قسم کا امعائے مستقیم کا خروج۔

ایسکولس ہیپوکاسٹینم (Aesculus Hippocastanum): پاخانہ کرنے کے بعد امعاء مستقیم کا خروج لاحق ہو۔ بہت زیادہ بڑی بواسیر کے سے امعاء مستقیم میں رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں۔ جلن دار قسم کا جریان خون ہوتا ہے۔ درد ایسا ہوتا ہے جیسے کہ چاقو چلایا جا رہا ہو۔

تشنجی دورے (Spasms)

کالی بانیکریم (Kali Bichi): مجامعت کے بعد پیشاب والی نالی میں درد کے ساتھ امعاء مستقیم میں تشنجی دورے ہوتے ہیں۔

نکس موسکاٹا (Nux Mosch): نرم پاخانہ خارج کرنے میں دقت ہوتی ہے جس کے ساتھ منہ خشک ہوتا ہے۔ ہر وقت غنودگی طاری رہتی ہے۔ غشی آسانی کے ساتھ طاری ہو جاتی ہے۔
چائنا (China): خونی بواسیر کے رجحان والے مریضوں میں نرم پاخانہ خارج کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مواد بہت زیادہ دیر تک رستا رہتا ہے۔ مریض زرد اور کمزور ہوتا ہے۔ اچھارے کے ساتھ تھوہوتا ہے۔ بہت زیادہ ایکائیاں آتی ہیں۔ سکون کے بغیر ہوا خارج ہوتی ہے۔

سارساپیرلا (Sarsaparilla): پاخانے کے ساتھ خون خارج ہوتا ہے۔ متواتر پیشاب آتا رہتا ہے۔ یادداشت جاتی رہتی ہے۔ پیشاب البیوسن کے ساتھ گاڑھا اور دھندلا ہوتا ہے۔
سلیشیا (Silicea): دباؤ اور پاخانہ کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ صرف بلغم یا دوسرا سخت پاخانہ خارج ہوتا ہے۔ جو کہ بہت دقت سے خارج ہوتا ہے۔

گھٹن (تنگی) (Stricture)

تھائیوسینامینم (Thiosinaminum): امعاء مستقیم میں گھٹن ہوتی ہے۔
نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): سرطانی یا عام گھٹن (تنگی)۔
ہائیڈراسٹس (Hydrastis): سرطانی گھٹن میں اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 1x طاقت کی خوراک دیجئے۔

روٹا (Ruta): جب ہائیڈراسٹس نامم ہو جائے تو یہ دوا آزمائی جاسکتی ہے۔

مرور (پاخانہ کرتے وقت زور لگانا)

Tenesmus (Straining at Stool)

مرک کور (Merc Cor): مسلسل مرور ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔
ایلو ایس (Aloe S): پاخانہ کرنے کی ایسی خواہش کے ساتھ جس پر قابو نہ پایا جاسکے 'مرور'۔

لاحق ہوتے ہیں۔

بیلارڈونا (Bell): پاخانہ کرنے کی بے نتیجہ حاجت یا بہت پاخانہ ہونے کے ساتھ مروڑ لاقح ہوں۔

آگنیشیا (Ignatia): پاخانہ نہیں ہوتا مگر مروڑ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ امعاء مستقیم مقعد سے خارج ہوتی ہے۔

نکس و امیکا (Nux Vom): متواتر لا حاصل پاخانہ کرنے کی حاجت۔

پوڈوفالیم (Podophyllum): پاخانہ کرنے کے لئے زور لگانے پر آسانی سے امعاء مستقیم باہر نکل آتی ہے۔

سلفر (Sulphur): مسلسل امعاء مستقیم پر نیچے کی جانب دباؤ پڑتا رہتا ہے۔ پاخانہ ڈھیلے ہوتے ہیں۔ پیپ دار خون والے یا قبض والے پاخانے ہوتے ہیں۔ پاخانہ کرنے سے پہلے اور بعد میں زور لگتا رہتا ہے۔

پیٹ کے کیڑے (Worms)

سنا (Cina): کول دھاکے جیسے اور نیپ جیسے پیٹ کے کیڑوں کے لئے یہ دوا چوٹی کی ہے۔ اس میں مریض دانت پیستا رہتا ہے۔ 1x طاقت کی دوا دینی چاہئے۔ مریض بے چین رہتا ہے اور مسلسل ناک مسلتا رہتا ہے۔ بھوک جاتی رہتی ہے یا بھوک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ پیٹ کے کیڑوں کے باعث لگنے والے تشنجی جھکوں کو بھی روک دیتی ہے۔ جن میں اوپچی طاقت کی خوراکیں دی جانی چاہئیں مثلاً 200 یا 1000 طاقت کی خوراکیں۔

اینٹھیرم (Anantherum): نیپ جیسے کیڑوں کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ اس میں بھوک غیر صحت مند ہوتی ہے۔ مریض رات کو جاگ جاتا ہے۔

ابروتانم (Abrotanum): یہ دوا پیٹ کے کیڑوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔

چینو پوڈیم، تھائی مول (Chenopodium, Thymol): خصوصاً یہ دوا آنکھوں کی طرح کے کیڑوں کے مرض کے لئے ہوتی ہے۔

کوسو (Kousso): نیپ والے کیڑوں کو یہ دوا نکالنے کے لئے بہت عمدہ ہے۔

فلکس ماس (Flix Mas): نیپ کی طرح کے کیڑوں کو نکالنے کے لئے یہ بہت کار آمد دوا ہے۔ خصوصاً جب ان کے ساتھ قبض بھی لاحق ہو۔

سینٹونائن (Santonine): جب سنا ٹاکم ہو جائے تو اس دوا کو آزمایا جاسکتا ہے۔ سنا اور سینٹونائن دونوں ادویات زیادہ تر کیسوں کا علاج کرتی ہیں۔ اس دوا کو 2x کی طاقت میں دو گھنٹوں

کے وقتوں کے ساتھ دن میں چھ مرتبہ چند روز تک دینا چاہئے۔
کیلڈیئم (Caladium): یہ ایسے کیزوں کے لئے مفید دوا ہے۔ جو سیون پر چلتے پھرتے ہیں اور چھوٹی لڑکیوں کی اندام نسائی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ان لڑکیوں میں جلق کارخانہ پایا جاتا ہے۔

ٹیوکریم (Teucrium): پن کی طرح کے پیٹ کے کیزوں کے لئے جبکہ امعاء مستقیم میں بہت زیادہ بیجان ہوتا ہے۔ مدر ٹیچریا 6x طاقت کی خوراک دیجئے۔

سٹاپس نائیگرا (Sinapis Nigra): پن جیسے کیزوں کے لئے یہ ایک دوسری دوا ہے۔ جب ٹیوکریم ناکام ہو جائے تو اس دوا کو آزمایا جاسکتا ہے۔

سپائی جیلیا (Spigelia): بھیگاپن اور جھٹکے لاحق ہوتے ہیں۔ جس کے ساتھ چہرہ زردی مائل ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے گرد نیلے حلقے ہوتے ہیں۔ ناف کے قریب درد قویج کے ساتھ غشی والی متلی محسوس ہوتی ہے اور یہ سب کچھ پیٹ کے کیزوں کے باعث ہوتا ہے۔ اس دوا کا ٹیچر رومال پر ڈال کر مریض کو سٹکھانے سے پیٹ کے کیزوں کے باعث لاحق ہونے والے جھٹکے ختم ہو جاتے ہیں۔

سٹانم (Stannum): اس دوا کا استعمال پیٹ کے کیزوں کے لئے خصوصی طور پر کیا جاتا ہے جو کہ جلاب کے ذریعے کیزوں کو آسانی سے باہر نکال دیتی ہے۔ مریض کا چہرہ زرد اور دھنسا ہوا ہوتا ہے اور آنکھوں کے گرد نیلے حلقے ہوتے ہیں۔ طبیعت میں سستی ہوتی ہے۔ عموماً بے ہوش ہوتی ہے۔ سانس متعفن ہوتا ہے اور معمولی بخار ہوتا ہے۔ مریض معدے کے بل لیٹنے کو ترجیح دیتا ہے۔

کلکیریا کارب (Calarea Carb): خنازیری مزاج کے بچوں کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ ایسے بچے زرد اور مونے ہوتے ہیں۔ ان کا سر گرم ہوتا ہے اور رات کے وقت پسینے آتے ہیں۔

کیوپرم آکسی ڈینم نائیگرم (Cuprum Oxydatum Nigrum): کہا جاتا ہے کہ یہ دوا تمام اقسام کے کیزوں کے لئے عمدہ دوا ہے۔ چھوٹی طاقت والی خوراکیوں میں دینی چاہئے مثلاً 6x اسے عکس وامیکا 30 کے ساتھ بدلا جاسکتا ہے۔ جو کہ دن میں چار پانچ مرتبہ دی جاتی ہے اور چار سے چھ ہفتوں تک یہ دوا دی جاتی ہے۔

نیٹرم فاس (Natrium Phos): آنٹوں میں پائے جانے والے لمبے بگول یا دھانگے کی طرح کے کیزے مریض ناک کو مسلتا ہے اور گٹھیا کارخانہ ہوتا ہے۔

ٹیرہبستھ (Terebinth): مقعد میں جلن اور ریٹگن ہوتی ہے جیسا کہ کیزے مقعد سے باہر

ریج کر نکل رہے ہوں۔ یہ دوا گول اور ٹیپ جیسے کیڑوں کو خارج کرتی ہے۔
ٹیلوریم (Tellurium): یہ دوا دھلگے جیسے کیڑوں کو نکالتی ہے۔
سلفر (Sulphur): ٹیپ جیسے کیڑوں کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ یہ دوا قابل لحاظ طویل عرصہ
 تک دینی چاہئے۔
سکیرینم (Scirrhinum): جب سنا اور ٹیو کریم ناکام ہو جائیں تو یہ دوا کیڑوں کو نکالتے میں مدد
 دیتی ہے۔



نظام بول کے امراض

(Diseases of Urinary System)

گِرْدے، مثانہ اور پیشاب

(Kidneys, Bladder and Urine)

پیشاب کی جراثیمیت (Bacillus- Coli)

تھوجا (Thuja): پیشاب کی جراثیمی وبا کے لئے یہ ایک مخصوص دوا ہے۔ ہر ہفتے ۱ ایم طاقت کی دوا دی جائے پھر اس دور اپنے کو پوہا کر ایک مہینے تک لے جائیں۔ بشرطیکہ بہتری ہو رہی ہو۔

فارمیکا روفا (Formica Rufa): پیشاب کی جراثیمی وبا (infection) کے لئے یہ دوا بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ رات کے وقت پیشاب بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے جو کہ گندنا ہوتا ہے اور اس کی بو بہت گندمی ہوتی ہے۔

بی (ای) کولی 30 (B (E) Coli 30): پیشاب کے صاف و پائی کیسوں میں استعمال ہوتی ہے۔ میتھیلین بلیو (Methylene Blue): بخار، پیٹ کے دھول جیسے تناؤ اور ہڈیاں والے کیسوں میں یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔ جن میں پیشاب میں پیپ آتی ہے۔ گردوں کی سوزش لاحق ہوتی ہے۔ پیشاب ہزرنگ کا ہوتا ہے۔

اکی ناسیا (Echinacea): جب وپائی مرض خون کی دھار کو متاثر کرے۔ پیشاب میں البیومن ہوتا ہے اور پیشاب متواتر آتا ہے۔

گردوں کی سوزش

(Brights Disease)

(Inflammation of Kidneys-Nephritis)

اکونائٹ این (Aconite N): جب مرطوب زمین پر بیٹھنے یا لیٹنے کے باعث ٹھنڈ لگ جانے یا اچانک پویموں کے دب جانے کے باعث یہ مرض لاحق ہو۔ اس کے بعد بے چینی، پیاس، درد سر اور پیشاب کا اچانک دب جانا لاحق ہوتے ہیں۔

ایپس مل (Apis Mel): گردوں کی سوزش کے حادثہ کیسوں میں یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔ ان کیسوں میں پیاس بالکل نہیں رہتی۔ استسقاء میں یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔ چہرے پر اور بازوؤں اور ٹانگوں پر استسقاءی سوجن ہوتی ہے۔ سر، کمر، ٹانگوں، بازوؤں اور گردوں میں درد ہوتا ہے۔ پیشاب متواتر لیکن کم مقدار میں آتا ہے۔ پیشاب میں البیومن بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ دم گھٹنے کا احساس ہوتا ہے اور تنفس میں دقت ہوتی ہے۔ دہاؤ کے ساتھ سانس پھول جاتا ہے۔ تمام علامات میں گرمی سے افادہ ہوتا ہے اور سردی سے کمی واقع ہوتی ہے۔ چھوٹی طاقت کی خوراکیں دی جائیں کیونکہ چھوٹی طاقت کی خوراکیں بہترین عمل کرتی ہیں۔

ہیلے بوریس (Helleborus): گردوں کی سوزش کے باعث استسقاء لاحق ہو۔ پیشاب کم مقدار میں اور گہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ پیشاب میں زہریلا مادہ ہوتا ہے جس کے ساتھ بے ہوشی لاحق ہوتی ہے۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوتی ہیں اور روشنی سے حساسیت نہیں ہوتی۔ تشنگی جھکے جھکے ہوتی ہے۔ جسم سے پیشاب کی تیز بو آتی ہے۔ دماغ کے اندر رطوبات خارج ہوتی ہیں۔ یہی اس دوا کی رہنما کن علامت ہے۔

آرسینک البم (Arsenic Alb): یہ دوا گردوں کی سوزش کے تمام امراض کا احاطہ کرتی ہے لیکن زیادہ تر بعد والے مراحل کی نشاندہی کرتی ہے۔ جبکہ پانی والے اسہال لاحق ہو جاتے ہیں۔ اس میں جلد پیلی ہوتی ہے اور موی نمود لئے ہوتی ہے۔ پیشاب، بھلیوں اور البیومن سے پر ہوتا ہے۔ چھوٹے وقفوں میں پانی کی تھوڑی مقدار کی پیاس ہوتی ہے۔ گرمی کی خواہش ہوتی ہے۔ بے چینی ہوتی ہے۔ چہرہ پھولا ہوتا ہے۔ سخت اذیت ہوتی ہے۔ موت کا خوف ہوتا ہے۔ تشنگی جھکے جھکے ہوتی ہے۔

کینابیس سیٹی وا (Cannabis Sativa): پیپ اور طعم کے باعث پیشاب کی بندش لاحق ہو جاتی ہے۔ پیشاب گدلا اور سرخی مائل ہوتا ہے۔ پیشاب کا اخراج قطرہ قطرہ ہوتا ہے۔ پیشاب

کی ٹالی میں تانکے سے لگتے ہیں اور جلن ہوتی ہے۔
کالی کلور (Kali Chlor): گردوں کی شدید قسم کی سوزش لاحق ہوتی ہے جس کے ساتھ پیشاب کم مقدار میں گہرے رنگ کا 'الیومن والا' بھلیوں والا خارج ہوتا ہے۔
گھلیہ یا سلف (Calcareia Sulph): خون کی کمی لاحق ہو۔ جس کے ساتھ بڑھی ہوئی نقامت اور کمزوری ہوتی ہے۔ پیشاب میں پیپ ہوتی ہے۔ پیشاب کرنے کے دوران جلن ہوتی ہے۔ پیٹ میں بہت زیادہ تناؤ ہوتا ہے۔ زلادی درد سر ہوتا ہے۔

مرکبوریس کار (Mercurius Cor): یہ دوا بڑے سفید گردے کی نشاندہی کرتی ہے۔
 'الیومن والا' بھلیوں کے ساتھ کم مقدار میں سرخ پیشاب خارج ہوتا ہے۔ حمل والی گردوں کی سوزش 'پیپ والی گردوں کی سوزش' حمل کے پانچویں سے ساتویں مہینے میں پاؤں سوج جاتے ہیں۔

پیکرک ایسڈ (Picric Acid): پیشاب میں سرخ بھسکوں کا اخراج ہوتا ہے۔ پیشاب بہت زیادہ اندھی لکین کا حامل ہوتا ہے۔ پیشاب میں دانے دار مادے کا اخراج ہوتا ہے اور پکٹائی کی اتھری واقع ہو جاتی ہے۔ گردوں کی سوزش لاحق ہوتی ہے جس کے ساتھ شدید قسم کی کمزوری ہوتی ہے۔ پیشاب گہرے رنگ کا خون آلود اور کم مقدار میں ہوتا ہے۔ رات کے وقت پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): پیشاب میں خون کے سرخ بھسکے خارج ہوتے ہیں۔ پیشاب گدلا اور بھورے رنگ کا ہوتا ہے۔ پیشاب کی تلپٹ سرخ ہوتی ہے نیز اس میں خون ہوتا ہے۔

کنٹھرس (Cantharis): پیشاب میں زہر کا توہم ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ مسلسل اذیت کا احساس ہوتا ہے۔ بے چینی کے ساتھ پیشاب کا دب جانا لاحق ہوتا ہے۔ چہرہ سرخ ہوتا ہے اور آنکھیں چمک دار ہوتی ہیں۔ پیشاب کرنے کی حاجت ہوتی ہے لیکن کچھ بھی خارج نہیں ہوتا۔ مثانہ میں پیشاب بالکل قہیں ہوتا۔ سرخ بخار یا خناق کے بعد استقاء لاحق ہوتا ہے۔ پیشاب پرورد ہوتا ہے۔ ایک وقت میں صرف چند قطرے ہی خارج ہوتے ہیں۔ پیشاب بہت گرم اور خون آلود ہوتا ہے۔

ٹیر-بہستہ (Terebinth): گردوں میں اجتماع خون کے ابتدائی مراحل میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ پیشاب کی ٹالی کے ساتھ ساتھ اور کمر میں درد کے ہمراہ پیشاب خون آلود ہوتا ہے۔

پلمبم (Plumbum): گردوں کی دانوں والی اتھری لاحق ہوتی ہے۔ گھٹیاوی گردے 'چہرہ پیلا' پھولا ہوا اور بھاری تاثرات والا ہوتا ہے۔ قبض لاحق ہوتی ہے۔ پیشاب میں 'الیومن والا' خارج

ہوتا ہے، گردے میں کھنچاؤ ہوتا ہے۔

ڈیجی ٹلیس (Digitalis): گردوں کی دانے والی اہتری جس کے ساتھ دل کی دھڑکن لاحق ہوتی ہے۔ نبض ست ہوتی ہے۔

بیسنزوٹک الیڈ (Benazolic Acid): درد گردہ جو کہ تیز اور شدید ہوتا ہے، درد کی لہریں کمر سے گزر جاتی ہیں نیز چھاتی تک چلی جاتی ہیں۔ پیشاب گہرے رنگ کا اور امونیا کی تیز بو والا ہوتا ہے، پیشاب کی بو انتہا درجے کی چھینے والی یا ناک میں ٹکس جانے والی ہوتی ہے۔ گنٹھیا کے ساتھ گردوں کی سوزش اس دوا کی رہنما کن علامت ہے۔

مرکیورئیس سالٹی ٹیٹ (Mercurius Cynati): پہلے اور دوسرے مرحلہ میں یہ دوا عمدہ ہوتی ہے۔ پیشاب کم مقدار میں گہرے رنگ کا اور البیومن سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ گردوں کی نالیوں میں درد ہوتا ہے۔

ایپو سائٹم (Apocynum): کم مقدار میں پیشاب اور پیاس کے ساتھ استسقاءی حالت، ایشی میں پیاس نہیں ہوتی جس کے ساتھ اس دوا کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ حمل والی گردوں کی سوزش میں سکتے اور آئینی ہتھکوں کی نشاندہی اس دوا سے ہوتی ہے۔

وکی کیریا (Vesicaria): درد گردہ، گردوں میں اعصابی درد، پیشاب کی نالی میں جلن اور مثانہ میں کیچان کے ساتھ پیشاب قطرہ قطرہ خارج ہوتا ہے۔ مریض رات کے دوران 30 مرتبہ پیشاب کرتا ہے۔ سوزاک لاحق ہوتا ہے۔ پیشاب کی پتھخت میں ایشی کا براہہ ہوتا ہے۔ پیشاب میں کثیر مقدار میں یوریا خارج ہونے کا علاج بھی اسی دوا سے کیا جاتا ہے۔ پیشاب بہت زیادہ خارج ہوتا ہے۔ پیشاب پر درد ہوتا ہے جس میں پیپ البیومن اور خون ہوتا ہے۔ یہ کیفیت استسقاء میں ہوتی ہے۔

کالچیکم (Colchicum): پیشاب میں البیومن ہوتا ہے جو کہ کالا ہو جاتا ہے۔ استسقاءی سو جن کے ساتھ پیشاب کا کم مقدار میں خارج ہونا، گردوں کی سوزش کی حاد صورت۔

سولی ڈیگو (Solidago): گردوں میں نرمی واقع ہو جاتی ہے۔ معمولی سا پھوٹے سے گردے نرم ہوتے ہیں۔ جس کے ساتھ درد گردوں سے چیٹ تک پھیل جاتا ہے۔ نیز مثانے اور نالیوں تک درد چلا جاتا ہے، پیشاب سرخ بھورے رنگ کا، کم مقدار میں، گاڑھا، ناپید قسم کا ہوتا ہے جو بڑی مشکل سے خارج ہوتا ہے۔ نیز پیشاب میں البیومن، بلغم اور فاسفیٹ ہوتا ہے 1x یا 3x کی خوراک دیجئے۔

لائیکو پوڈیم (Lycopodium): جب گردوں کی سوزش اور استسقاء کے ساتھ پیشاب نہیں سرخ ریت خارج ہو۔

ایسڈ ٹائٹرک (Acid Nitric): کان کی تکلیف کے ساتھ گردوں کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ چنانچہ کان سے زردی مائل سفید مادہ خارج ہوتا ہے۔ پیشاب کی بوتھوڑے کے پیشاب والی ہوتی ہے۔

آرسینک بروم (Arsenic Bron): جب شوگر کے ساتھ ایسوسن پیشاب میں خارج ہو۔ جب پیچہم ناکام ہو جائے تو یہ دوا دینی چاہئے۔

گردوں کی پتھری

(Stone in the Urinary Tract)

(Calculus- Renal, Gravel)

بربرس ول (Berberis Vul): گردوں والے درد قویج کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ خصوصاً جب درد بائیں جانب ہوتا ہے اور گردوں سے پیشاب کی ٹالی تک پھیل جاتا ہے۔ یہ درد پیشاب کی حاجت کے ساتھ لاحق ہوتا ہے۔ انہی علامات کے ساتھ یہ دوا دائیں جانب کے درد کا علاج بھی کرتی ہے۔

اوئیم کین (Oelimum Can): اذیت ناک اور مروڑنے والا درد لاحق ہوتا ہے۔ جس کے باعث مریض چلاتا ہے اور بلبلاتا ہے۔ اینٹ کے برادے کے ساتھ پیشاب سرخ ہوتا ہے یا پیشاب کی تلخیت سفید ہوتی ہے۔ پیشاب گدلا سرخ اور خون آلود ہوتا ہے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): مزمن کیسوں میں یہ دوا دی جاتی ہے جبکہ حاد درد ہو چکا ہو۔ حاد میں اچھارہ ہوتا ہے۔ خصوصاً پیشاب میں سرخ بریت کے ساتھ دائیں جانب۔ یہ دوا 30 طاقت کی دینی چاہئے اور دن میں دو مرتبہ سے زیادہ نہیں دینی چاہئے۔ یہ دوا صبح شام تقریباً تین ماہ تک دی جائے۔

چائنا سلف (China Sulph): جب پیشاب میں اینٹ کا برادہ یا زرد مادہ خارج ہو۔ سارسپاریلا (Sarsaparilla): پیشاب کی سفید تلخیت کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ پیشاب کرنے کے فوراً بعد پیشاب گدلا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ منی والا پانی ہوتا ہے۔ پیشاب کے آخر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ پیشاب کم مقدار والا پیچھا اور بھلیوں والا ہوتا ہے۔ مثلاً میں افسوس ہوتی ہے۔

پیریرالی (Paniera B): جب دیگر ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دوا مدر نچر کو گرم پانی میں ملا کر پانچ قطرہ کی خوراک کی صورت میں دی جاسکتی ہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): گردوں والا درد قویج جبکہ گردوں کی پتھری بننے کا باعث یو رک الیڈ ہوتا ہے۔

ارٹیکا یورینس (Urtica Urens): گردے میں پتھری ہوتی ہے 'پیشاب گاڑھا ہوتا ہے' یہ دوا گردوں سے نکلر اور پتھری کو خارج کرتی ہے۔

نٹرم فاس (Natrium Phos): یہ دوا پتھری بننے کے عمل کو روکتی ہے اور چونے کے اجزاء (ایگزالیٹ) کو تحلیل کرتی ہے اور انہیں جگر کو سخت کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ دوا 1x طاقت کی خوراکیوں کی صورت میں دن میں چار مرتبہ دی جانی چاہئے۔

ٹیرہینٹینا (Terebinthina): گردوں کے علاقہ میں شدید کھینچنے والا درد ہوتا ہے 'پیشاب میں شدید جلن اور کنٹن ہوتی ہے' پیشاب کی نالی میں جلن ہوتی ہے۔ پیشاب میں خون اور ایلیوسن ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دوا پتھری بننے کے عمل کو روکتی ہے اور گردوں کی پتھری کو تحلیل کرتی ہے۔ ایسے کیس میں اس دوا کی IM ذاتی لیوشن دی جاسکتی ہے۔ پیشاب سرخ 'بھورا' سیاہ یا دھوئیں کے رنگ کا ہوتا ہے۔

بیلادونا (Belladonna): گردوں کے علاقہ میں پیشاب کی نالی کے ساتھ ساتھ گولی ٹگنے جیسے درد ہوتے ہیں جو کہ پتھری کے راستہ بنانے کے باعث لاحق ہوتے ہیں۔

ڈائیوسکوریہ (Dioscorea): مریض خشک اور اینٹھن والے دردوں کے ساتھ لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت گردوں کی پتھری خارج ہونے سے لاحق ہوتی ہے۔ ٹانف کے قریب ورا کے ساتھ پیشاب کی نالی میں کھینچ لاحق ہوتی ہے۔ جس میں دبانے سے اتفاق ہوتا ہے۔

کنٹھارس (Cantharis): 'گردے' مثانے اور پیشاب کی نالی کی سوزش۔ گردے میں تیز پھارنے والا اور جھپن والا درد ہوتا ہے 'پیشاب خارج ہوتے ہیں وقت ہوتی ہے۔ قطرہ قطرہ خون خارج ہوتا ہے۔

ہائیڈریٹکلیا آریویرس (Hydrangea Arbores): یہ دوا گردے کی پتھری کو توڑ دیتی ہے۔ خون آلود پیشاب قطرہ قطرہ خارج ہوتا ہے۔ پیشاب میں سفید نمک خارج ہوتا ہے۔

ملی فولیم (Millefolium): مثانہ میں پتھری ہوتی ہے جس سے پیشاب میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ پیشاب خون آلود ہوتا ہے۔

کاسٹیکم (Causticum): اذیت ناک درد ہوتا ہے جس کی لہریں گردے سے خسیوں تک جاتی ہیں 'حملہ اس وقت ہوتا ہے جب مریض سو رہا ہوتا ہے' پیشاب قلعروں میں خارج ہوتا ہے۔

ورم مثانہ — (Cystitis)

(نیز دیکھئے "پیشاب آنا")

اکونائٹ نیپ (Aconite Nap): تیز بخار اور گرم اور خشک جلد کے ساتھ حاد کیسوں میں یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔ پیاس ہوتی ہے۔ خوف لاحق ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ مثانہ میں مسلسل جلن دار درد ہوتا ہے۔ پیشاب تکلیف دہ اور بدقت ہوتا ہے۔ بے چلا اٹھتے ہیں اور اعضاء مخصوص کو ہاتھ سے ہلکے لیتے ہیں۔

اپیس ایم (Apis M): مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ تواتر کے ساتھ اس دوا نے کئی کیسوں میں اچھا علاج کیا ہے۔ اس میں پیشاب کم مقدار میں آگدا اور خون آلود ہوتا ہے۔

کینتھرس (Cantharis): مثانہ میں ناقابل برداشت جلن دار درد ہوتا ہے۔ پیشاب کی ٹالی اور سیون کے ساتھ ساتھ تشنگی درد ہوتا ہے جو خضیوں تک پھیل جاتا ہے۔ جو کہ اوپر کو چڑھے ہوتے ہیں۔ شند (سرؤکرا) میں جلن ہوتی ہے۔ سوراخ سرخ ہوتا ہے، پیشاب کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ پیشاب قطروں کی صورت میں خارج ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ بے انتہا جلن اور کھینچن ہوتی ہے۔ جو کہ پیشاب کرنے سے پہلے، پیشاب کرنے کے دوران اور پیشاب کرنے کے بعد لاحق ہوتی ہے۔ پیشاب کم مقدار میں خون آلود ہوتا ہے لیکن پانی پینے سے یا پانی کو دیکھنے سے تمام علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے، حاد قسم کے متعدی کیس۔

ڈلکامارا (Dulcamara): مرطوب موسم میں ٹھنڈ لگ جانے کے باعث مثانے کا زلہ لاحق ہو۔ پیشاب کرنے کی مسلسل خواہش ہوتی ہے، جو کہ ہیٹ میں گہرائی میں محسوس ہوتی ہے، جس کے ساتھ مثانے کے علاقے اور پیشاب کی ٹالی کی جانب نیچے کو دباؤ کا ناخوشگوار احساس ہوتا ہے۔ پیشاب غیر ارادی طور پر خارج ہو جاتا ہے، پیشاب کم مقدار میں متعفن، آلود، تیل والا ہوتا ہے، ہو کہ تحت لعاب دار، سفید یا سرخ رنگ کے بلغم سے ملے چلے مواد کا حامل ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ خون بھی خارج ہوتا ہے۔ پیشاب دودھ کی طرح متعفن یا بلغمی پیپ والا، سرخی مائل، جلن دار ہوتا ہے۔ قطرہ قطرہ خارج ہوتا ہے۔ پیشاب کا تلچھٹ لیس دار ہوتا ہے، ٹی بوڑھے آدمیوں کو ورم مثانہ بری طرح لاحق ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کے خضیے بہت زیادہ بڑے نہیں ہوتے، اس دوا سے ان میں بہت زیادہ آرام حاصل ہوتا ہے۔

تیربی (Terebinth): بہت گہرے رنگ کا خون والا پیشاب خارج ہوتا ہے جو کہ ٹیس دار، گاڑھے کچھڑ کے طرح کے تلچھٹ کا حامل ہوتا ہے۔

ایکوئی زیٹم (Equisetum): بہت گہرے رنگ والا کم مقدار میں پیشاب خارج ہوتا ہے جو کہ متواتر خارج ہوتا ہے، اس کے ساتھ درد ہوتا ہے اور تلچھٹ میں بلغم پایا جاتا ہے۔

بربرس و لگرس (Berbers Vuli) کاڑھے بلغم اور چمکدار سرخ مواد کے حامل تھنٹ کے ساتھ پیشاب خارج ہو۔

کوپا یوا (Copaiva) : مزمن ورم مثانہ، خصوصاً عورتوں میں لاحق ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ استقاء میں پیشاب کی بندش ہو جاتی ہے، مسلسل بے نتیجہ پیشاب کرنے کی خواہش رہتی ہے۔

تیرتا یا حرکت کرتا گردہ

(Floating or Moving Kidney)

کلکیریا آئیوڈ (Calcarea iod) : یہ دوا سب سے پہلے استعمال ہونی چاہئے۔

سیپیا (Sepia) : اگر کلکیریا آئیوڈ ناکام ہو جائے تو یہ دوا آزمائی جاسکتی ہے۔

گردوں میں رکاوٹ کے باعث پیشاب کا اجتماع

(Hydronephrosis)

(A Collection of Urine in the pelvis of the
Kidney from Obstructed Outflow)

پلمبم، آرسینک الیم (Plumbum, Ars Alb) : پلمبم چوئی کی دوا ہے۔ اگر یہ دوا ناکام ہو جائے تو آرسینک الیم آزمائیں۔

ورم گردہ — (Nephritis)

(دیکھئے "گردوں کی سوزش")

یوریمیا — (Uremia)

(دیکھئے "گردوں کی سوزش")

اخون میں کسی نقصان دہ مادے کی رکاوٹ ہوتی ہے جو عموماً گردے خارج کر دیتے ہیں جس کے باعث پیشاب میں بندش ہو جاتی ہے۔ تشخیصی جھٹکے لگتے ہیں اور سکتے و غیرہ ہوتا ہے۔
بیلادونا (Belladonna) : پُر خون اور صحت مند مریضوں میں حاد یوریمیا لاحق ہو جبکہ گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور پیشاب گہرے رنگ کا اور گدلا ہو جاتا ہے۔ عضلات میں پھڑکن ہوتی ہے جس کے ساتھ شدید تشنجی جھٹکے لگتے ہیں۔

ہلی بوریس (Helleborus): بے ہوشی کے ساتھ یوریمیا لاحق ہوتا ہے۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں اور روشنی سے بے حس ہوتی ہے۔ تشنگی جھٹکے لگتے ہیں، جسم سے پیشاب کی تیز بدبو آتی ہے۔

کینتھرس (Cantharis): اذیت کے احساس کے ساتھ یوریمیا کا توہم ہوتا ہے۔ بے چینی کے ساتھ پیشاب کی بندش لاحق ہو جاتی ہے۔ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ آنکھیں جھٹکے لگتی ہیں، پیشاب کرنے کی حاجت ہوتی ہے لیکن کچھ بھی خارج نہیں ہوتا، مثلاً میں پیشاب نہیں ہوتا۔

کیپورم آرس (Cuprum Ars): اسہال، پیسہ جو نوزائیدہ بچوں میں ہو یا بدہشی کے ساتھ یوریمیا کی حاد صورت ہو سکتا ہے کہ مریض کو شوگر ہو جس میں پیشاب اچانک، کم مقدار والا گہرا سرخ نیز لہسن کی تیز بدبو والا ہو جاتا ہے۔

ارٹیکا یورٹیس (Urtica Urens): پیشاب کی بندش کے ساتھ یوریمیا لاحق ہوتا ہے جس کے ساتھ جسم سے پیشاب کی بہت زیادہ بو آتی ہے۔ اس دوا کے بدبو تلخ کے پانچ قطروں کی خوراکیں گرم پانی میں ملا کر دی جائیں۔

پلمبم (Plumbum): یوریمیا کا سکتہ لاحق ہوتا ہے جس کے ساتھ ناف پر کھنچاؤ کا احساس ہوتا ہے، پیشاب میں بندش واقع ہو جاتی ہے۔ مثلاً میں پیشاب نہیں ہوتا، چہرہ سرخ کی طرح زرد ہو جاتا ہے۔ تنفس سخت ہو جاتا ہے۔ IM طاقت کی ایک ہی خوراک دیجئے۔

ٹیری (Terebinth): تشنگی، دوروں اور جیزوں کے مل جانے کے ساتھ یوریمیا لاحق ہوتا ہے۔ یہ کیفیت ہر چندہ منٹ کے بعد وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ شدید قسم کے تشنگی جھٹکے لگتے ہیں۔ جس کے باعث پیٹ کی خطرناک قسم کی اکڑن پیدا ہو جاتی ہے۔

پیشاب آنا — (Urination)

جلن دار — (Burning)

کینتھرس (Cantharis): پیشاب میں جلن ہوتی ہے جو کہ استاگیوں کے ساتھ صرف قطرہ قطرہ خارج ہوتا ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد جلن ہوتی ہے۔

سٹیفیس سیکریا (Staphisagria): پیشاب کی ٹالی میں جلن ہوتی ہے جبکہ پیشاب نہیں کر رہا ہوتا، پیشاب کرتے ہوئے جلن رک جاتی ہے۔

نایٹرم کارب (Natrium Carb): پیشاب کرنے کے بعد جلن ہوتی ہے۔

مرک سول (Merc Sol): ہر گھنٹے کے بعد دن اور رات میں پیشاب ہونے کے ساتھ، جب

پیشاب کرنا شروع کرے تو جلن ہوتی ہے۔
 بیلادونا (Belladonna): مسلسل پیشاب کرنے کی حاجت کے ساتھ مثانہ میں بہت زیادہ
 تیزجان ہوتا ہے۔ پیشاب کی تمام طویل ٹالی کے ساتھ ساتھ جلن ہوتی ہے، بٹنے سے حساسیت
 ہوتی ہے۔

سلفر (Sulphur): بلا ارادہ پیشاب خطا ہو جانے کے ساتھ پیشاب میں جلن لاحق ہوتی ہے۔
 ٹیری۔ تسمہ (Terebinth): پیشاب کی بندش کے ساتھ جلن لاحق ہو، پیشاب کرنے کے
 دوران جلن ہوتی ہے، پیشاب کم مقدار میں خون آلود ہوتا ہے۔
 پلساٹیلہ (Pulsatilla): پیشاب کرنے سے پہلے جلن ہوتی ہے۔
 کلیمس (Clematis): جب پیشاب کا آخری قطرہ شدید قسم کا تیزجان اور جلن پیدا کر دے۔

خواہش (پیشاب کرنے کی)

(Desire)

لیلیئم ٹیگ (Lilium Tig): کم مقدار میں خارج ہونے والے پیشاب کے ساتھ پیشاب کرنے
 کی مسلسل خواہش ہوتی ہے۔ اگر پیشاب نہ کیا جائے تو پیشاب کا اجتماع سینے میں محسوس ہوتا
 ہے۔

ایکوئی زیٹم (Equisetum): مسلسل پیشاب ہوتا ہے۔ مثانے میں درد ہوتا ہے جیسا کہ وہ
 بہت زیادہ بھرا ہوا ہو، پیشاب کرنے سے بھی اتفاق نہیں ہوتا۔ پیشاب کم مقدار میں ہوتا ہے
 جس میں بہت زیادہ بلغم ہوتا ہے، یہ دوا بوڑھے لوگوں میں مثانے کے بھجان کے لئے حیران کن
 دوا ہے۔ مسلسل پیشاب کی تنگ کرنے والی خواہش، اس دوا کی بنیادی علامت ہے جبکہ پیشاب
 کرنے کے بعد بہت تھوڑا سا سکون ملتا ہے یا بالکل سکون نہیں ملتا، مثانہ کی مزمن سوزش کے
 لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ پیشاب کرنے کی عظیم خواہش ہوتی ہے لیکن بہت تھوڑی مقدار میں
 پیشاب خارج ہوتا ہے۔

سلفر (Sulphur): چلتے پانی کو دیکھ کر پیشاب کرنے کی نہ رکنے والی خواہش۔ TM طاقت کی
 خوراک دیجئے۔

پیٹروسی لینم (Petroselinum): پیشاب کرنے کی فوری خواہش اگر تیزی کے ساتھ پیشاب
 کرنے نہ جائے تو پیشاب خطا ہو سکتا ہے۔

ارجنٹم میٹ (Argentum Met): پاخانہ کرنے کی اور پیشاب کرنے کی فوری خواہش۔
 کونیم (Conium): پیشاب کی ٹالی میں اعصابی درد کے ساتھ پیشاب کرنے کی مسلسل خواہش

ہوتی ہے۔

نٹرم میور (Natrur Mur): پیشاب کرنے کی عظیم خواہش جس کے ساتھ کم مقدار میں پیشاب خارج ہوتا ہے۔

تھوجا (Thuja): پیشاب کرنے کی متواتر اور فوری خواہش، پیشاب کی دھار کم زور ہوتی ہے۔ یہ احساس رہتا ہے کہ پیشاب کا ایک قطرہ پیشاب کی نالی میں پیشاب کرنے کے بعد انکار ہو گیا ہے۔ مندرجہ بالا علامات کے ساتھ چکر بھی آتے ہیں۔

لائی سین (Lyssin): چلتے پانی کو دیکھ کر پیشاب کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔

کینتھرس (Cantharis): اگر لائی سین تکام ہو جائے تو اس دوا کو آزمانا چاہئے۔

ابستھیم (Absinthium): پیشاب کرنے کی مسلسل خواہش ہوتی ہے۔ پیشاب گرمے مانے رنگ کا ہوتا ہے، پیشاب کی بو بہت تیز ہوتی ہے جیسا کہ گھوڑے کے پیشاب کی ہوتی ہے۔

سٹیفی سیکریا (Staphisagria): نوجوان شادی شدہ مستورات میں پیشاب کی مسلسل حاجت ہوتی ہے۔

ارنگ اقی (Eryng Aqi): پیشاب کرنے کی مسلسل خواہش رہتی ہے۔ جو کہ دن رات میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد ہوتی ہے۔ پیشاب کرنے کا دوران اور پیشاب خارج ہونے کے بعد جلن ہوتی ہے۔

وقت — (Difficult) Dysuria

کینتھرس (Cantharis): درد کے ساتھ پیشاب خارج ہوتا ہے اور جلن ہوتی ہے یا گرمی محسوس ہوتی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ خارج ہوتا ہے۔

کوپا یوا (Copaiva): مسلسل لا حاصل خواہش، پیشاب کی نالی میں کھنچاؤ ہوتا ہے۔ پیشاب کا اخراج قطروں کی صورت میں ہوتا ہے۔ مستورات کے لئے یہ خصوصی دوا ہے۔ مثانے کی مزمن سوزش لاحق ہو۔

اگنیشیا (Ignatia): ہسٹریائی کیسوں میں پیشاب کی بندش لاحق ہو جاتی ہے۔

ایپس مل (Apis Mel): مریض جب پیشاب کرتا ہے تو جلن اور دکھن ہوتی ہے، پیشاب کرنے کی متواتر خواہش رہتی ہے۔ پیشاب صرف چند قطروں کی صورت میں خارج ہوتا ہے۔ پیشاب کم مقدار میں اور بہت زیادہ رنگ دار ہوتا ہے۔

کلیمٹس (Clematis): جب پیشاب کے بہاؤ میں اچانک پیشاب کی نالی میں لاحق ہونے والے کچھ دوروں کے باعث خلل واقع ہو جائے۔ پیشاب کے بہاؤ میں کمی اور زیادتی ہوتی

رہتی ہے۔ پیشاب میں بلغم ہوتا ہے لیکن پیپ نہیں ہوتی، سوزش، خچاؤ کا آغاز ہوتا ہے۔
کونیم (Conium): پیشاب اچانک رک جاتا ہے اور اس کا بہاؤ چند لمحات تک شروع نہیں ہوتا۔

گیمفر (Camphor): حاد کیس میں جبکہ زہریلے مادے جذب کے باعث پیشاب کی بندش کی وجہ سے پیشاب میں دقت واقع ہوتی ہے، چھوٹی طاقت کی دوا کہیں۔

ٹیری۔تسمہ (Terebinth): وجہ مفاصل جیسے درد کے ساتھ پیشاب کرنے میں دقت ہوتی ہے۔

مگنیشیا میور (Magnesia Mur): پیشاب صرف ریت، غلٹات کو دینے ہی سے خارج ہو سکتا ہے۔

سرساپاریلا (Sarsaparilla): پیشاب خارج ہونے کے بعد زیادہ درد لاحق ہو جاتا ہے۔ صرف گھڑے ہو کر ہی پیشاب خارج کر سکے۔ پیٹھ میں پیشاب صرف قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے۔ 1M طاقت کی خد، ایک ہر چند روز کے بعد دیا جاتا ہے۔

کیٹابیس انڈیکا (Cannabis Ind): پیشاب کرنے سے پہلے پیشاب کرنے کے دوران اور پیشاب کرنے کے بعد جلن ہوتی ہے یا پیشاب گرم لگتا ہے۔ دوا تہ ہوتی ہے اور مریض زور لگاتا ہے لیکن ایک قطرہ بھی خارج نہیں ہو سکتا۔

چیمافیلہ امبلٹا (Chimaphila Umbellata): پیشاب گرم ہے اور جلن ہوتی ہے۔ بعض اوقات بڑے پلے کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ جبکہ بعض اوقات دھاگے کی طرح کی دھار ہوتی ہے اور آخر میں قطرہ قطرہ خارج ہوتا ہے۔

پرونس سپائی ٹوسا (Prunus Spinosa): پیشاب خارج ہونے سے پہلے لمبے عرصے تک اعضاء کو دیا پڑتا ہے، پیشاب خشک تک آتا ہوا محسوس ہوتا ہے لیکن دوا پس ہو جاتا ہے اور پیشاب کی غلی میں درد کا باعث بنتا ہے۔

ہیپیر سلف (Hepar Sulph): پیشاب رکا ہوا ہوتا ہے۔ پیشاب خارج کرنے سے پہلے انتظار کرنا پڑتا ہے اور پھر پیشاب کا بہاؤ بہت سست ہوتا ہے۔ پیشاب یہ حساس رہتا ہے کہ کچھ پیشاب پیچھے مٹانے میں رہ جاتا ہے۔

نیٹرم میور (Natrium Mur): دوسرے لوگوں کی موجودگی میں پیشاب خارج نہ ہو سکے۔ لوگوں کی عمومی گزرگاہ میں پیشاب خارج نہیں ہو سکتا۔

میورٹیکم ایسیڈم (Muriaticum Acidum): آنسوؤں کو حرکت دینے پر پیشاب خارج نہیں ہو سکتا۔

نکس وامیکا (Nux Vomica): یہ دوا پیشاب کی تشغیی بندش کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ مریض کو پیشاب کرنے کے لئے زور لگانا پڑتا ہے۔ مروڑ ہوتے ہیں اور حاجت ہوتی ہے۔ مثانہ بھرا ہوتا ہے اور پیشاب ٹپکتا رہتا ہے۔ اس کے باوجود جب مریض زور لگاتا ہے تو پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے۔ (پیشاب رکا ہوا ہوتا ہے۔)

امبرا گریسیا (Ambra Grisea): دیگر لوگوں کی موجودگی میں پیشاب خارج نہیں ہو سکتا۔ سرخ پچھت کے ساتھ خون آلود پیشاب۔

الیومینا سیلی کیٹ (Alumina Silicate): مثانہ کی فالجی کمزوری، پیشاب کرنے کی لا حاصل حاجت۔ پیشاب کی ٹالی سے باغم اور پیپ خارج ہوتی ہے۔ پیشاب کرتے ہوئے جلن ہوتی ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد مثانہ میں بے اطمینانی کا احساس ہوتا ہے۔

مرک سلف (Merc Sulph): پیشاب خارج ہونے میں دقت ہوتی ہے جو کہ پتلی دھار میں خارج ہوتا ہے۔ بعض اوقات پیشاب کی دو دھاریں بن جاتی ہیں اور جلن ہوتی ہے نیز بعض اوقات مثانہ خالی ہونے میں طویل وقت صرف ہوتا ہے۔ بعض اوقات پیشاب کے آخر میں خون کے چند قطرے خارج ہوتے ہیں۔

چیرا (Paireira): زچگی کے بعد یا زچگی سے دو ہفتہ قبل سے یہ حالت ہوتی ہے کہ مریض کو پیشاب خارج کرنے کے لئے گھٹنوں کے بل بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ صرف گھٹنوں کے بل بیٹھنے سے ہی پیشاب خارج ہوتا ہے۔ پیشاب کرنے کے لئے چاروں ہاتھوں پاؤں کو زمین پر ٹیکنا پڑتا ہے۔

بوریکس (Borax): بچہ پیشاب کرنے سے پہلے چلاتا ہے۔ (باغی جھلی کی سوزش کے باعث) پیشاب آگ کی طرح جلتا ہوا گرم ہوتا ہے۔

الیومینا (Alumina): معائے مستقیم اور مثانہ کی فالجی حالت کے باعث پیشاب اور پاخانہ سستی کے ساتھ خارج ہو۔ پیشاب خارج ہونے کی نااہلیت کے ساتھ مریض کو پیشاب کے بہاؤ کے آغاز سے بہت عرصہ پہلے پیشاب کے لئے بیٹھنا پڑتا ہے۔ پھر پیشاب کی دھار بہت سستی سے بہتی ہے۔ پیشاب کے بہاؤ میں جلدی نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات پیشاب میں بندش ہو جاتی ہے۔ اور غیر ارادی طور پر ٹپکتا رہتا ہے۔ مریض جب پاخانہ کے لئے زور لگا رہا ہوتا ہے تو پیشاب خارج ہو جاتا ہے یا اس طرح سے زور لگائے بغیر پیشاب خارج نہیں ہو سکتا۔

بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جانا — Enuresis

(Involuntary Urination- Wetting the Bed)

کاسٹیکم (Causticum) رات کے پہلے حصہ کے دوران بے ہوشی میں بستر میں پیشاب نکل جاتا ہے۔ جب کہ ٹاک برہہ رہتی ہوتی ہے۔ دوران شب بستر میں پیشاب نکل جائے جبکہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ کھانسی کے دوران، ہنسنے کے دوران یا جھجکنے کے دوران پیشاب نکل جاتا ہے۔ ٹھنڈ سے اتھری ہوتی ہے۔ مثانے کا فالج لاحق ہوتا ہے۔ جس کا اثر اخراج والے عضلات پر ہوتا ہے۔ جس کے نتیجے میں پیشاب کی بندش لاحق ہوتی ہے اور مقصد کو بند کرنے والے عضلات متاثر ہوتے ہیں۔ جس کے باعث پیشاب بلا ارادہ خارج ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی احساس نہیں رہتا کہ پیشاب کی دھار خارج ہو رہی ہے۔

جلمی میم (Gelsemium) بستر کو گھیر کر اپنے والے مریضوں میں درد سر لاحق ہوتا ہے۔ جب کاسٹیکم ناکام ہو جائے تو یہ دوا بستر گھیرنے کے مرض کو شفا دیتی ہے۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla) رات کے پہلے حصہ میں پیشاب خطا ہو جاتا ہے۔ خصوصاً گرم مزاج مریضوں میں۔ کھانسی کے دوران غیر ارادی طور پر پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے مریض شریف السبع اور بدلتے ہوئے مزاج والے ہوتے ہیں۔ کھلی ہوا میں جانے کی طلب ہوتی ہے۔ یہ مریض چکنائی کو پسند نہیں کرتے۔ چڑچڑے اور روکے ہوتے ہیں۔ چچک کے بعد بستر گھیر کر دینے کا مرض ہوتا ہے۔

سپیا (Sepia) زرد رو، بیمار قسم کی لڑکیوں میں غیر ارادی طور پر پیشاب کا خطا ہو جانا۔ خصوصاً نیند کے آغاز میں ہی بستر پر پیشاب نکل جانے کے مرض کے لئے اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مریض جیسے ہی بستر پر جاتی ہے۔ جاڑے سے پیشاب نکل جاتا ہے اور بستر گھیرا ہو جاتا ہے یا پھر بستر پر جانے کے دو گھنٹے کے اندر اندر پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔

رشتاکس (Rhus Tox) مریض جب خاموش بیٹھا ہو تو پیشاب خطا ہو جائے۔ جب مریض چل رہا ہوتا ہے تو پیشاب کو روکنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔

براہیونیا (Bryonia) مریض جب حرکت کرتا ہے تو پیشاب ٹپکتا ہے۔ چلتے ہوئے پیشاب برہہ نکلتا ہے اور صرف خاموش رہنے سے ہی افادہ ہوتا ہے۔

ہائیوسکیمس (Hyoscyamus) چلتے ہوئے پانی کی آواز سننے پر بلا ارادہ پیشاب خطا ہو جاتا ہے۔ ٹائیفائیڈ کے بعد۔ تشنگی جھٹکوں کے دوران بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جائے۔

میشنزوئیک ایسڈ (Benzoic Acid) سونے کے دوران غیر ارادی طور پر پیشاب خارج ہو

جاتا ہے۔ بستر اتنی زیادہ مرتبہ گیلیا ہوتا ہے کہ صفائی کے قابل نہیں رہتا۔ بستر سے بہت زیادہ پیشاب کی بدبو آتی ہے۔ پیشاب کی کثافت اضافی نچلے درجہ کی ہوتی ہے۔
الیومینا (Alumina): مٹانے کے فلج کے باعث پیشاب بلا ارادہ ٹپکتا رہتا ہے۔ پیشاب رک جاتا ہے اور پھر ٹپکنے لگتا ہے۔

کریوزوٹ (Kreosote): رات کے پہلے حصہ کے دوران بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔ اس وقت جاننا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بچہ گہری نیند میں چلا جاتا ہے۔ مریض خواب دیکھتا ہے کہ وہ بڑے مناسب انداز میں پیشاب کر رہا ہے۔

ایکونی زینٹم (Equisetum): بلا ارادہ پیشاب نکل جانے اور پیشاب رک جانے کے لئے یہ ایک دوا ہے۔ جب مریض بغیر کسی قابل قسم وجہ کے صرف عاداتاً بستر پر پیشاب کر کے اسے گیلیا کر دے۔

اینن تھیرم (Anantherum): چلنے یا سونے کے دوران غیر ارادی طور پر پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔

آر-سینک الیم (Arsenic Alb): دوران حمل یا زچگی کے دوران غیر ارادی طور پر پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔

اکونائٹ این (Aconite N): پیاس اور خوف کے ساتھ غیر ارادی طور پر پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔

کلیکیریا سلف (Calcareia Sul): رات کے وقت بلا ارادہ بستر پر پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔
 ٹھنڈ میں بہتری محسوس کرتا ہے۔ پہلے 30 طاقت کی دوا دیجئے اور پھر 200 طاقت کی دوا دیجئے۔
سلفر (Sulphur): زرد رو دہلے پتے بچوں میں جن کا پیٹ بڑا ہوتا ہے اور جو شکر اور مصالحہ دار غذاؤں کے شوقین ہوتے ہیں۔ دھوئے جانے سے نفرت کرتے ہیں۔ پیشاب کرنے کی مسلسل خواہش رہتی ہے۔ چند قطرے بلا ارادہ خارج ہو جاتے ہیں۔ غل سے بستے ہوئے پانی کو دیکھ کر پیشاب کرنے کی نہ رکنے والی خواہش ہوتی ہے۔

سورینٹم (Psorinum): جب دیگر اچھی منتخب شدہ ادویات ناکام ہو جائیں تو اس دوا کو عمل انگیز کے طور پر استعمال کیا جائے۔ ایکڑیمیا یا پھوڑے چھنسی کے دب جانے کے بعد یا شدید قسم کی حاد بیماری کے بعد بستر پر پیشاب نکل جانے کی عادت لاحق ہو جاتی ہے۔ مریض کو باڑا لگتا ہے اور دھوئے جانے سے ڈرتا ہے۔ پورے چاند کے دوران پیشاب سے بستر گیلیا کر دے۔

میڈورینٹم (Medorrhinum): رات کے وقت بستر میں پیشاب نکل جاتا ہے۔ بہت زیادہ مقدار میں تیزبو والا پیشاب یا کم مقدار میں پیشاب یا گہرے رنگوں والا پیشاب یا باقراط زرد پیشاب تیز

ہو کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ حیض کے دوران اتری ہوتی ہے۔ پیشاب ٹپکتا رہتا ہے۔ مثانے میں بچہ درد موز ہوتے ہیں۔ پیشاب کے آخر میں شدید درد ہوتا ہے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): سونے کے دوران بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔ دوران شب پیشاب بہت زیادہ آتا ہے جبکہ دن کے دوران پیشاب کی مقدار معمول کے مطابق ہوتی ہے۔ شکر اور گرم مشروبات کی طلب ہوتی ہے۔

سینا (Cina): پیشاب بافراط اور غیر ارادی طور پر خارج ہوتا ہے جس کے ساتھ جیت کے کیزوں کی علامات بھی ہوتی ہیں۔

سائیکوٹم (Sycotum): بد مزاج بچوں میں اندھیرے کے ڈر کے ساتھ نیز تھالی کے ڈر کے ساتھ پیشاب کا خطا ہو جانا عام ہے جیسی ہوتی ہے۔ چہرے کے عضلات میں پھڑکن ہوتی ہے۔ آنکھوں کے پونے پھٹکتے ہیں۔ جلد چکنی ہوتی ہے۔ پیشاب از تپ دن والی شباہت ہوتی ہے۔ اعضاء قائل کے گرد نچلے درجے کی سوزش ہوتی ہے۔ خصوصاً مستورات میں۔

فیرم میٹ (Ferrum Met): حرکت کے دوران بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔ نیز جب مریض کھیل رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں پیشاب ٹپکتا رہتا ہے اور کیزوں کو گیلارکتا ہے۔ آرام کے وقت یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔

لیک کینیٹم (Lac Caninum): دوران شب پیشاب سے بستر گیلارہو جاتا ہے۔ خواب میں پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔ جس سے مریض بیدار ہو جاتا ہے۔

کالکیریا کارب (Calcarea Carb): دن کے دوران پیشاب کرنے کی مسلسل حاجت رہتی ہے اور رات کے دوران پیشاب سے بستر گیلارہو جاتا ہے۔ آسانی کے ساتھ پیسے آتے ہیں۔ بھوک کم ہو جاتی ہے۔ یہ دوا مضبوط قسم کے چھٹیلے بچوں کے لئے استعمال ہوتی ہے جو مشروبات زیادہ استعمال کرتے ہیں۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): بلا ارادہ پیشاب نکل جاتا ہے۔ خصوصاً کھائے ہوئے یا حرکت کرتے ہوئے۔

سیکونڈا ویروسا (Cicuta Virosa): مریض جب اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے پھر آ جاتا ہے۔ چیزیں آنکھوں کے سامنے گھومتی ہیں چنانچہ دوبارہ لیٹ جانا پڑتا ہے۔ آنکھوں کی پتلیوں کے سکڑاؤ کے ساتھ آنکھیں اندر کودھنسی ہوتی ہیں۔ مثانے کا فالج لاحق ہوتا ہے چنانچہ پیشاب غیر ارادی طور پر خارج ہو جاتا ہے۔

میگ نیٹس پولس آسٹریلیس (Magnetis Polus Australis): قفل انگیز دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ مریض ہر آدھے گھنٹہ کے بعد مثانہ خالی کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ سب سے

پہلے چند قطرے بلا ارادہ خارج ہوتے ہیں پھر بتدریج پیٹ کے دباؤ کو استعمال کرنے سے مزید پیشاب خارج ہوتا ہے۔ رات کے دوران بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔ جاگنے پر خارج ہوتا ہوا پیشاب رک جاتا ہے۔

متواتر (پیشاب آنا) (Frequent)

(نیز دیکھئے "بافراط پیشاب آنا")

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): متواتر اور بافراط پیشاب خارج ہو۔ بد ہضمی کے باعث متواتر پیشاب خارج ہوتا ہے۔ 200 طاقت کی دوا دیتے۔

نکس وامیکا (Nux Vomica): بد ہضمی کے باعث متواتر پیشاب آتا ہے۔ 200 طاقت کی دوا دیتے۔

وسکی کیریا (Vesicaria): درد گردہ اور درم مثانہ کے باعث رات کے دوران تقریباً 30 مرتبہ پیشاب خارج ہوتا ہے۔ یہ دوا پیشاب کی زیادتی، استسقاء، پردرد پیشاب، پیپ، البیومن اور پیشاب میں خون آنے کا علاج کرتی ہے۔

مائی گیلی (Mygale): پیشاب کا بہاؤ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ پیشاب کی ٹالی میں ڈنک لگنے کے ساتھ پیشاب گرم لگتا ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): متواتر پیشاب خارج ہوتا ہے۔ معمولی سی ہرانگیخستگی سے پیشاب کھینچنے لگتا ہے۔ مریض کو ذہن میں ہر وقت مسلسل اس کیفیت کو رکھنا پڑتا ہے ورنہ پیشاب نکل جائے گا۔

کاسٹیکم (Causticum): رات کو پیشاب متواتر آتا ہے۔ پیشاب کی حاجت ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ پیشاب کرنے کے قابل ہو بہا وقت صرف ہو جاتا ہے۔

اگنیشیا (Ignatia): کافی پینے کے بعد متواتر پیشاب آتا ہے۔ ہسٹریا میں متواتر پیشاب آئے۔ سبل سیرو لانا (Sabal Serrulata): رات کے وقت پیشاب کرنے کی مستقل خواہش رہتی ہے۔ درم مثانہ لاحق ہوتا ہے۔ پیشاب میں دقت ہوتی ہے۔ سستی ہوتی ہے۔ بے پرواہی ہوتی ہے۔ لاحق ہوتی ہے۔ ہمدردی کو پسند نہیں کرتا۔ خصلوں کی تکلیف لاحق ہوتی ہے۔ درخت پر دھبے یا چھوٹی طاقت کی خوراکیں دیتے۔

میوریک ایسڈ (Muriatic Acid): پیشاب بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے دن میں بھی اور رات میں بھی۔ جب ہوا خارج ہوتی ہے تو پیشاب نکل جاتا ہے۔

لیڈم پی (Ledum P): متواتر پیشاب خارج ہوتا ہے۔ پیشاب کی مقدار بڑھ جاتی ہے یا کم ہو

جاتی ہے۔ پیشاب کی دھار بہاؤ کے دوران اکثر رک جاتی ہے۔ خارش ہوتی ہے۔ سرخی ہوتی ہے اور پیپ خارج ہوتی ہے۔

مرکبوریس سول (Mercurius Sol): پیشاب پیپے گئے مائع کی نسبت بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے، بہت زیادہ تواتر کے ساتھ اور بہت زیادہ افراط کے ساتھ پیشاب خارج ہوتا ہے۔

الیومینا (Alumina): متواتر پیشاب خارج ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ زور لگانے کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ مریض کو پاخانے پر زور لگانا پڑتا ہے تاکہ پیشاب خارج ہو۔ پیشاب کی ٹالی سے ہلکے پیلے رنگ کی پیپ خارج ہونے کے ساتھ جلن ہوتی ہے۔

ارنجیم (Aryngium): دن اور رات میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد متواتر پیشاب خارج ہوتا ہے۔ جلانے والا پیشاب خارج ہوتا ہے۔ پیشاب کرنے کے دوران اور بعض اوقات پیشاب کرنے کے بعد جلن ہوتی ہے۔ تکلیف مستقل ہوتی رہتی ہے۔ قطرہ قطرہ پیشاب نکلتا رہتا ہے۔

چیلکی ڈونیم (Chelidonium): سفیدی مائل اور بھاگ دار پیشاب استاد رہے کی افراط کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔

پیشاب میں خون آنا (Haematuria)

(Blood in Urine)

تیرہنہ (Terebinth): پیشاب میں خون ہوتا ہے۔ یہ چوٹی کی دوا ہے۔ کافی کے برادے کی طرح کی تلچٹ ہوتی ہے۔ جلن ہوتی ہے اور بہت زیادہ درد کے ساتھ پیشاب قطرہ قطرہ نکلتا ہے۔ پیشاب میں الیومن ہوتا ہے اور بخش کی بو ہوتی ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): پیشاب میں خون آتا ہے خصوصاً درم گردہ والے مرض میں۔ گردوں اور جگر کے علاقہ میں درد ہوتا ہے۔ پیشاب گدلا ہوتا ہے۔ جس میں سرخ تلچٹ ہوتی ہے۔

چائنا سلف (China Sulf): درد یا بے چینی کے بغیر پیشاب میں خون آتا ہے۔

ہیمامیلس (Hamamelis): گردوں کے مدہم درد کے ساتھ پیشاب میں خون آتا ہے۔

آرنیکا ایم (Arnica M): میکانیکی زخموں کے باعث پیشاب میں خون آتا ہے۔

تھلاسپی بی (Thlaspi B): گہرے رنگ کا خون اور گاڑھا پیشاب آتا ہے۔

اوسی مم کین (Ocimum Can): خون آلود پیشاب جس کے ساتھ سرخ تلچٹ ہوتی

ہے۔
پلساٹیل (Pulsatilla): گہرے رنگ کا خون آلود پیشاب آتا ہے۔ جس کے ساتھ سوزاک کا دب جانا بھی لاحق ہوتا ہے۔

نیٹرم فاس (Natrium Phos): رات کے وقت پیشاب متواتر آتا ہے۔ لیٹنے آنے کے دوران رات کے وقت سونے کے دوران غیر ارادی طور پر پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔ پیشاب شروع ہونے کے لئے انتظار کرنا پڑتا ہے۔

سٹیفی سگریا (Staphisagria): پیشاب کرنے کی متواتر اور پردرد حاجت ہوتی ہے۔ جو کہ نئی شادی شدہ اعصابی مستورات میں اختنا و رعبے کی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔

الفالفا کیو (Alfalfa Q): متواتر اور حد اعتدال سے زیادہ پیشاب آتا ہے۔ جس کے ساتھ مریض کا وزن اور گوشت کم ہو جاتا ہے۔ بھوک جاتی رہتی ہے۔ نفاہت ہوتی ہے۔

پیشاب کی بندش Incontinence

(Retention- Suppression)

آرنیکا (Arnica): چونوں کے بعد یا تھکاوٹ کے بعد پیشاب دب جاتا ہے۔
اکونائٹ این (Aconite N): ٹھنڈے موسم میں خصوصاً بچوں میں جو کہ بے چین ہوتے ہیں اور درد سے چلاتے ہیں، پیشاب کی بندش ہو جاتی ہے۔

اوپیم (Opium): بچوں میں پیشاب کی بندش جبکہ پیشاب کی بندش کا باعث خوف یا دایا سے جذباتی لگاؤ ہوتا ہے۔ مثلاً بھرا رہتا ہے۔ مقعد کو بند کرنے والے عضلات میں کھنچاؤ کے باعث یا فندس کے فالج کے باعث پیشاب کی بندش لاحق ہوتی ہے۔

کینتھارس (Cantharis): سوزاک کے دب جانے میں درد کے ساتھ پیشاب خارج ہوتا ہے۔ پیشاب جلن کے ساتھ قطرہ قطرہ خارج ہوتا ہے۔

اپیس مل (Apis Mel): ٹھنڈ لگ جانے کے بعد یا بخار کے بعد پیشاب دب جاتا ہے۔ مریض ہونگھتا رہتا ہے۔ نمائیاں سوجن کے ساتھ سکتہ لاحق ہوتا ہے۔ دودھ پینے والوں بچوں میں پیشاب کی بندش 1x یا 1M طاقت کی دوا دیتے ہیں۔

ہائوسکیمس (Hyoscyamus): پیشاب کی بندش لاحق ہوتی ہے۔ مثلاً پھول جاتا ہے۔ پیشاب کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ زور لگانا پڑتا ہے۔

ٹیری ستم (Terebinth): پیشاب قطرہ قطرہ خارج ہوتا ہے۔ مٹانے کے مردوڑ لاحق ہوتے ہیں۔ پیشاب کم مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ جس کا رنگ چمکیلا ہوتا ہے یا پیشاب میں خون ملا

ہوتا ہے۔ جلن دار اور کانٹے والے درد مثانہ میں ہوتے ہیں۔ سوزا کی کیفیت ہوتی ہے۔
 لاروسیرا سس (Laurocerasus): جزدی فلج میں پیشاب کا دب جانا لاحق ہوتا ہے۔
 پیشاب کی دھار پکی ہوتی ہے۔ بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔
 آرسینک البم (Ars Alb): اس دوا کی علامت امپس ایم کی مماثل ہوتی ہیں لیکن آرسینک
 کے مریض انتہا درجے کے بے چین ہوتے ہیں۔ انہیں غنودگی یا بے ہوشی نہیں ہوتی۔
 پیٹروسلینیم (Petroselinum): بچوں میں اوپر نیچے اچھلنے کے بعد پیشاب رک جاتا ہے۔ جس
 سے درد ہوتا ہے اور بچے چلاتے ہیں۔ بچہ پیشاب خارج کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔
 کیناٹس انڈیکا (Cannabis Ind): پیشاب کرنے سے پہلے پیشاب کرنے کے دوران یا
 پیشاب کرنے کے بعد جلن ہوتی ہے۔ پیشاب ٹپکتا رہتا ہے۔ پیشاب کی حاجت ہوتی ہے اور
 مریض پیشاب کے لئے زور لگاتا ہے لیکن ایک قطرہ بھی خارج نہیں ہو سکتا۔
 روٹا (Ruta): رات کے وقت پیشاب کی بندش لاحق ہو یا دن کے دوران پیشاب متواتر آتا
 ہے اور اگر مریض پیشاب کرنے کے لئے نہ بیٹھے تو مثانہ مفلوج ہوتا دکھائی دے۔ جس کے
 ساتھ پیشاب کے اخراج کی قابلیت ہوتی ہے جبکہ وہ خود موقع فراہم کرے۔
 پلمبم ایم (Plumbum M): ایک ایسی خاتون کو اس دوا سے شفا ملی جس کا پیشاب دو روز سے
 بند تھا اور ساتھ میں بے ہوشی بھی تھی۔ کیتھیز (پیشاب خارج کرنے والا آلہ) نے مثانہ میں
 پیشاب ظاہر نہیں کیا تھا۔ مریض میں اس مرض سے کئی دن پہلے ذہنی علامات پائی جاتی تھیں۔
 سوچ میں سستی تھی اور تصور میں بھی سستی تھی۔
 وریٹرم البم (Veratrum Alb): ہیضہ میں پیشاب کی بندش لاحق ہو۔
 ہائیڈروکلورک ایسڈ (Hydr Acid): گردن توڑ بخار میں پیشاب کی بندش لاحق ہو۔
 ہیلی بوریس (Helleborus): پیشاب کا دب جانا (خون کے زہریلے مادے) کی صورت
 اختیار کر جاتا ہے۔ آنکھوں کی پتلیوں پھیل جانے کے ساتھ مکمل بے ہوشی لاحق ہوتی ہے۔
 روشنی کا احساس باقی نہیں رہتا۔ یوریمیا کے نشانی جیسے لگتے ہیں۔ جسم سے پیشاب کی بو آتی
 ہے۔

پیشاب خطا ہو جانا Involuntary

(دیکھئے ”بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جانا“)

پر درد (پیشاب آت) — (Painful)

اکونائٹ این (Aconite N): اچانک جاڑا لگ جانے کے باعث مٹانے میں جلدی دار درد ہوتا ہے۔ تیز کانٹے والے درد حدت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پیشاب چمکیلا سرخ ہوتا ہے۔ جس میں خون ہوتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت زور لگتا ہے۔

کینٹھرس (Cantharis): خون آلود پیشاب کے چند قطرے خارج ہوتے ہیں اور مریض دوہرا ہو جاتا ہے اور درد سے چلاتا ہے اور کمرے میں اذیت کے ساتھ ناچتا ہے۔

پرونس سپائی نوسا (Prunus Spinosa): محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب حقد تک آچکا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے جس کے باعث پیشاب کی تالی میں درد ہوتا ہے۔ پیشاب خارج ہونے سے پہلے دیر تک دبانا پڑتا ہے۔

پیٹروسلینیم (Petroselinum): درد کے باعث مریض کپکپاتا ہے اور اذیت کے ساتھ کمرے میں ناچتا ہے۔

اپیس ایم (Apis M): خبیثے کی تکلیف میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ مریض اذیت کے ساتھ کمرے میں ناچتا ہے۔

ایسڈ نائٹرک (Acid Nitric): گوشت خور پھوڑا، پیشاب کے آلات پر اس پھوڑے کی نمود ہوتی ہے جو کہ پر درد ہوتا ہے اور اس سے پیشاب کرنے کے دوران اور مجامعت کے دوران خون آسانی کے ساتھ بہتا ہے۔

نکس موسکاٹا (Nux Mosch): بھرپور کھانا کھانے کے بعد پیشاب کرنے کے دوران درد ہوتا ہے۔

کینابیس سیٹیوا (Cannabis Sativa): پیشاب کرنے سے پہلے اور پیشاب کرنے کے دوران درد ہوتا ہے۔ یہ گوشت خور پھوڑے کے باعث ہو سکتا ہے۔ اس کی نمود پیشاب کی تالی کے پچھلے لب پر ہوتی ہے اس سے خون آسانی کے ساتھ بہتا ہے۔

کینابیس انڈیکا (Cannabis Indica): پیشاب کرنے کے دوران اور پیشاب کرنے کے بعد درد ہوتا ہے۔

سرساپاریلا (Sarsaparilla): پیشاب درد کے ساتھ ہوتا ہے۔ پیشاب شروع ہونے سے پہلے بچہ چلاتا ہے۔

بافراط پیشاب آنا (Polyuria)

(احتمال سے زیادہ۔۔۔ دیکھئے ”نویابیس“)

نکس واسیکا (Nux Vomica): جب مرض بد ہضمی کے باعث لاحق ہو۔ پیشاب دوران شب متعدد مرتبہ خارج ہوتا ہے۔ 200 طاقت کی خوراک دیجئے۔

یورینیم نائٹ (Uranium Nit): بد ہضمی میں بافراط پیشاب خارج ہوتا ہے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پئے جانے والے مائع کی نسبت بہت زیادہ مقدار میں پیشاب خارج ہوتا ہے۔

چائنا (China): ہیٹ کے کیڑوں کے باعث بافراط پیشاب خارج ہوتا ہے۔ ورم زرخہ میں پیشاب کا بہت زیادہ خارج ہوتا ہے۔

فائی ٹولاکا (Phytolacca): حیض کے دوران بکثرت پیشاب خارج ہو۔

اگنیشیا (Ignatia): اعصابی درد سر کے دوران پیشاب بہت زیادہ خارج ہوتا ہے۔

سٹرامونیم (Stramonium): گلا خشک ہونے کے ساتھ بافراط پیشاب خارج ہو۔

ایکونی زیم (Equisetum): صاف اور ہلکا پیشاب بہت زیادہ خارج ہوتا ہے۔

وسیکی کیریا (Vesicaria): جب یورینیم نائٹ ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جاتی ہے۔

سینی کیولا (Sanicula): زرد یا بے رنگ پیشاب بافراط خارج ہوتا ہے۔ کثافت اضافی 1000

ہوتی ہے۔ مریض تھکا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ذائقہ برا ہوتا ہے اور بھوک نہیں لگتی بہت زیادہ

مقدار میں پانی کی بہت زیادہ پیاس ہوتی ہے۔

میوریکس (Murex): دن کے دوران اور رات کے دوران پیشاب کرنے کی متواتر خواہش

رہتی ہے۔ جس کے ساتھ بے رنگ پیشاب خارج ہوتا ہے۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): شوگر کے ساتھ یا شوگر کے بغیر پیشاب متواتر آنے کے

لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔

میڈورینم (Medorrhinum): بافراط پیشاب آنے کے مرض کو اس دوا سے شفا ہوتی ہے

جب دیگر ادویات ناکام ہو جاتی ہیں۔

پیشاب میں رکاوٹ (Stricture)

کلیٹس (Clematis): زخم کی ریش کے جم جانے کے باعث اسٹیفی ہیمہ چھتے کے عمل کے

نہ ہونے کے باعث معرض وجود میں آ جاتا ہے۔ سوزش والے ٹیغم کی ابتدائی صورت پیدا ہو

جاتی ہے۔

سیلیسیا (Silicea): عضو قاسل کی پوت کے باعث کھنچاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور وقفوں میں پیپ بنانے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔
 گرافٹائٹس (Graphites): پیشاب کا براؤ اچانک رک جاتا ہے پھر رنگ دار بلغم کے لیے دھاکے رستے ہیں۔
 اویئم (Opium): برے طریقہ سے بنائی گئی شراب پینے کے بعد کھینچی دورے ہوتے ہیں جیسے کہ شرابیوں میں ہوتے ہیں۔
 سٹرامونیم (Stramonium): راستہ تنگ ہونے کے باعث پیشاب خارج نہیں ہو سکتا۔
 پیشاب کی بندش لاحق ہو جاتی ہے۔

پیشاب میں البیومن

(Urine- Albuminous)

اپیس مل (Apis Mel): پیشاب میں البیومن خارج ہونے کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ دوران حمل، سرخ بخاروں میں اور کھال اترنے کے مرض کے دوران۔
 یوپاتوریم پرف (Eupatorium Perf): استسقاء کے ساتھ پیشاب میں البیومن خارج ہوتا ہے۔
 ہلی بوریس (Helleborus): پیشاب کم مقدار میں ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ البیومن خارج ہوتا ہے۔ نیز استسقاء سو جن سارے جسم میں ہوتی ہے۔
 گلوٹائین (Glutamine): گردوں کی ٹالیوں کی سوزش جس کے ساتھ درد سر لاحق ہو جو کہ دھوپ میں چلنے سے لاحق ہوتا ہے۔ بازوؤں اور ہاتھوں میں من ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ شدید ہتھکنڈا کے ساتھ اولٹا بدلتا رہتا ہے۔ البیومن والا پیشاب زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ رات کے دوران متواتر الٹنا پڑتا ہے۔
 کالی کلور (Kali Chlor): درم گردہ پیشاب میں خون خارج ہو۔ پیشاب میں البیومن اور بھلیاں ہوتی ہیں۔ پیشاب کثرت کے ساتھ آتا ہے۔
 چیمافیلہ امیلاٹا (Chimaphila Umbellata): پیشاب میں البیومن خارج ہوتا ہے۔ عرصہ دراز سے لاحق سوزاک کے باعث پیشاب میں خون خارج ہوتا ہے۔ پیشاب کم مقدار میں گہرے رنگ کا، متعفن، گاڑھا خارج ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ بلغم کی کٹھکت باقراط ہوتی ہے۔
 فیرم آیوڈ (Ferum Iod): شرابیوں میں سو جن کے ساتھ البیومن والا پیشاب خارج ہو۔

دودھ یا چھت کے ساتھ اور میٹھی بو کے ساتھ پیشاب خارج ہو۔
مرک سول (Merc Sol): کم مقدار میں پیشاب البیومن والا خارج ہوتا ہے اور پیاس نہیں رہتی۔ مریض ٹھنڈے مشروبات پسند کرتا ہے لیکن یہ ٹھنڈے مشروبات نقصان دہ ہوتے ہیں۔ چہرہ اتکا سوجا ہوا ہوتا ہے جیسا کہ غبارہ ہو۔
انونی مینم (Enonyminum): 1x ٹرائی ٹوریشن کے دو دانے آدھا گلاس پانی میں حل کر کے ہر گھنٹے کے بعد ایک چمچ محلول دیا جائے۔ یہ دوا پیشاب میں البیومن کے ساتھ استحقاق کا طبع کرتی ہے۔
کالچیکم (Colchicum): ٹائیفائڈ کے دوران یا ٹائیفائڈ کے بعد پیشاب میں البیومن خارج ہوتا ہے۔
ایسڈ فاس (Acid Phos): ٹائیفائڈ کے دوران یا ٹائیفائڈ کے بعد پیشاب میں البیومن ہوتا ہے۔
ٹیرینتھ (Terebinthi): سرخ بخاروں کے بعد پیشاب میں خون 'البیومن' اور پسند آھلیاں ہوتی ہیں۔ پیشاب شدید بو والا، کمرے رنگ والا، دھندلا اور غبار والا ہوتا ہے۔
میڈورینم (Medorrhinum): بلوریں مھلیوں کے ساتھ البیومن والا پیشاب خارج ہوتا ہے۔ بلب مریض موی جلد والا ہوتا ہے۔ پاؤں اور کھٹنوں میں سوجن ہوتی ہے اور ٹکوقاں میں نرمی ہوتی ہے۔
مرکیورئیس کار (Mercurius Cor): ابتدائی حمل میں البیومن والا پیشاب خارج ہو۔
فاسفورس (Phosphorus): حمل کے آخر زمانہ میں البیومن والا پیشاب خارج ہوتا ہے۔
لیک ڈیفیل (Lac Defl): میعاد بخار کے بعد بہت زیادہ البیومن والا پیشاب خارج ہوتا ہے۔

کھار (پیشاب میں)

Alkaline

بپتیشیا (Baptisia): ٹائیفس میں کھار والا پیشاب خارج ہوتا ہے۔
کینتھارس (Cantharis): مثانے کے نزلہ میں۔
نیٹرم میور (Natrium Mur): پیشاب کی سرخ چھت کے ساتھ۔

سیاہ (پیشاب) (Black)

کالچیکم (Colchicum): سرخ بخار کے بعد سیاہ روشنائی کی طرح کا پیشاب خارج ہو۔ استفادہ اور ورم گردہ میں۔

لیکیسی (Lachesis): پیشاب تقریباً سیاہ 'گہرا سرخ' سو جن کے ساتھ 'سرخ' بخار کے بعد ہوتا ہے۔

ٹیربنتھ (Terebinth): پس ہوئی کافی کی تلحٹ کے ساتھ جگر کی تکلیف میں۔
ایسڈ کاربولک (Acid Carbolie): پیشاب گہرے رنگ کا 'سیاہ یا سیاہی مائل' ہوتا ہے۔
 زنجبلی سبز یا گھاس جیسا سبز پیشاب خارج ہوتا ہے۔

خون (پیشاب میں) (Blood)

(دیکھئے "گردوں کی سوزش")

بھورا (پیشاب) (Brown)

ہائپرکیم (Hypericum): سر میں چوت لگنے کے باعث 'گردن' توڑ بخار میں 'پیشاب' بھر شراب کی طرح ہوتا ہے۔

آرسینک البم (Ars Albi): ٹائفیس میں گاڑھی بیک کی طرح کا پیشاب ہوتا ہے۔
سپیا (Sepia): گہری آمیزش والا پیشاب۔

لپٹنڈرا (Leptendra): جگر میں کھنچاؤ کے ساتھ۔
بنزوائک ایسڈ (Benzoic Acid): مٹانے کے نزلہ میں پیشاب بہت زیادہ رنگین ہوتا ہے۔ پیشاب بدبودار ہوتا ہے جیسے گھوڑے کے پیشاب کی بو ہوتی ہے۔ پیشاب گاڑھا اور گہرے رنگ کا ہوتا ہے۔

ہیلی بوریس (Helleborus): پس ہوئی کافی کی طرح نکلتی ہے۔
ایپس مل (Apis Mell): پیشاب پس ہوئی کافی کی طرح کا ہوتا ہے۔

جھلیاں (پیشاب میں) (Casts)

کینتھریس (Cauntharis): نالی کی طرح کی جھلیاں ہوتی ہیں۔ پیشاب کی نالی میں چھتھروں کی طرح کی جھلیاں ہوتی ہیں۔

فاسفورس (Phosphorus): چربیلی یا موسی جھلیاں پیشاب میں خارج ہوں۔

مرک کار (Merc Cor): بہت زیادہ مقدار میں تلی کے اندر دانے دار چربی بھلیاں ہوتی ہیں۔ ان بھلیوں کی سطح پر لعاب دار غلیے ہوتے ہیں۔ نیز دانے دار چربی کی اتھری والی حالت ہوتی ہے۔
نیری (Terebinth): تلی کی طرح کی بھلیاں ہوتی ہیں۔ آپیشاب میں الیومن ہوتا ہے۔

ٹھنڈا (پیشاب) Cold

نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): جبکہ پیشاب پھونکنے سے ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے۔ پیشاب جب خارج ہو رہا ہو تو اس وقت بھی مریض کو ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے۔

پیشاب میں چکنتائی (Fatty)

مرکوریس کار (Mercuricus Cor): چربی کے ذرات پیشاب میں خارج ہوتے ہیں۔

سبز (رنگ کا پیشاب) Greenish

کاربولک ایسڈ (Carbolic Acid): پیشاب سبزی مائل اور دھندلا ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ مقعد سے بلا ارادہ بلغم خارج ہو جاتا ہے جبکہ مریض پیشاب کر رہا ہوتا ہے۔ مقعد سے خارج ہونے والا بلغم گھاس کے رنگ کا سبز ہوتا ہے۔
چیلی ڈونیم (Chelidonium): جب بگڑ میں کھنچاؤ لاحق ہو۔

انڈی کین (پیشاب میں) Indican

انڈول (Indol): پیشاب میں انڈی کین کی موجودگی۔

دودھیا (سفید پیشاب)

Milky (White)

آئیوڈیم (Iodium): دودھیا پیشاب خارج ہوتا ہے یا خراش دار مگدلا پیشاب خارج ہوتا ہے یا پٹلاہٹ مائل سبز اور جسم کو کھلانے والا پیشاب خارج ہوتا ہے۔
لیلیئم ٹگرینم (Lillium Tigrinum): صبح کے وقت دودھیا پیشاب خارج ہوتا ہے۔ صاف اور سفید پیشاب خارج ہو۔ اچلتے ہوئے تیل کی طرح کا پیشاب خارج ہو۔ سو جن بہت زیادہ ہو۔

ہے۔ پیشاب میں فاسفیٹ ہوتا ہے۔ پیشاب باافراط ہوتا ہے۔ پیشاب کی تلچھٹ سفید یا سرخ ہوتی ہے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos) جیسے کہ پیشاب میں چاک ملا یا گھیا ہو۔ پیشاب ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پانی اور چاک ملا یا گھیا ہو یا مکھن اگلی لسی کی طرح کا پیشاب خارج ہوتا ہے۔

فاسفورس (Phosphorus) شے ہوئے دودھ کی طرح کا پیشاب جس کے ساتھ اینٹ کے برادے کی تلچھٹ ہوتی ہے اور اس پر بھلی ہوتی ہے۔

کولوسنتھ (Colocynth) صحت دودھ کی طرح کا پیشاب شوگر میں۔

سپونگیا (Spongia) فاستری مائل سفید پیشاب۔

ایپس مل (Apis Mel) دماغ کی مھلیوں میں پانی بھر جانے کے حاد مرض میں یا نوزائیدہ بچوں کے گردن توڑ بخار میں دودھ یا پیشاب خارج ہوتا ہے۔ سرخ پاؤ والے پھوڑے پھٹیوں کے بعد۔

اورم میٹ (Aurum Met) لسی کی طرح کا پیشاب۔

اگیریکس (Agaricus) سر پہر کے وقت دودھ یا پیشاب خارج ہو۔

بلغم (پیشاب میں) Mucus

مرک کار (Merc Cor) دھاکے ملا پیشاب بعد میں گاڑھا اور دھندلا ہو جاتا ہے۔ پیشاب میں مچھلیوں کی طرح کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔

پیرا (Pareira) گاڑھا لیس دار پیشاب خارج ہوتا ہے۔

چیمافیل (Chimaphila) رسی دار گاڑھا پیشاب جس کے ساتھ ڈاکی سوریا میں باافراط تلچھٹ ہوتی ہے۔ تلچھٹ ہانسی پیپ والی ہوتی ہے۔

ایسڈ بینزوائک (Acid Benzoic) پیشاب میں فاسفیٹ ملے ہوتے ہیں اور تلچھٹ میں بھی فاسفیٹ ہوتے ہیں۔ (مثانے کا نزلہ) خیسے بڑے ہو جاتے ہیں۔

بو — Odour

(دیکھئے ”پیشاب“ کے ذیل میں ”بو“)

چکنا (پیشاب) Oily

ہیمپر سلف لائیکو پوڈیم (Hepar Sulph, Lycopodium) گر لیس والی مھلیوں والا۔

کوکا (Coca): پھچڑوں کی دق میں بڑا پیشاب ہوتا ہے اس میں تیل والی مہلی ہوتی ہے۔
 کلکیریا کرب (Calcareo Carb): بچوں میں پیشاب تیل کی طرح کا ہوتا ہے۔
 سمبل (Sumbul): پیشاب میں تیل والا جالا ہوتا ہے۔

آگزلیٹ (پیشاب میں)

Oxlate of Lime

ایگزالک الیڈ (Oxalic Acid): پیشاب میں آگزلیٹ ہونے کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔
 کاسٹیکم (Causticum): پیشاب میں آگزلیٹ یا افراط موجود ہوتا ہے۔
 ٹیری مسم (Terebinth): پیشاب میں آگزلیٹ کی موجودگی البیومن کے ساتھ ہوتی ہے۔

فاسفیٹ (پیشاب میں) (Phosphates)

ریفانوس (Raphanus): پیشاب میں امونیم اور میگنیشیم فاسفیٹ بڑھ جاتے ہیں۔
 ایسڈ فاس (Acid Phos): پیشاب نمیلا ہوتا ہے جس میں فاسفیٹ بھرے ہوتے ہیں۔
 ٹائیفاؤڈ میں یا ورم گردہ کے امراض میں یہ کیفیت ہوتی ہے۔
 مگنیشیا فاس (Magnesia Phos): پیشاب میں فاسفیٹ کی کمی یا زیادتی لاحق ہو جاتی ہے۔
 ایسڈ نائٹرک (Acid Nitric): پیشاب میں خون آتا ہے اور البیومن خارج ہوتا ہے۔
 پیشاب فاسفیٹ والا ہوتا ہے۔ خارج ہوتے وقت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس کی بو گھوڑے کے پیشاب جیسی ہوتی ہے۔

پیپ (پیشاب میں) (Pus)

(دیکھئے "گردوں کی سوزش")

سرخ (پیشاب) — (Red)

بووشتا (Bovista): برب پیشاب سرخ ہو۔

کم مقدار (پیشاب) (Scanty)

ہیلی بورس (Helleborus): سارے جسم میں استسقاء سوجن اور پیشاب میں البیومن کے ساتھ پیشاب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ سرخ بخار کے بعد۔

اپیس ایم (Apis M): پیٹ کے استسقاء میں۔
 کروکس سیٹیوا (Crocus Sat): دماغ کی مہلیوں کی تکلیف میں (رواقی تکلیفات)۔
 اکنائٹ این (Aconite N): دماغ میں پیشاب گہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ تشنہ میں پیشاب
 میں کمی واقع ہوتی ہے۔
 سٹرامونیم (Stramonium): ہڈیاں میں پیشاب کم ہو جاتا ہے۔
 آر جینٹیم ٹائٹ (Argentum Nit): رحم کے خروں میں۔
 ڈیجی ٹالس (Digitalis): دل کے استسقاء میں۔
 کیلیڈیم (Caladium): شام کے وقت نامردی میں۔
 مرک سول (Merc Sol): پیشاب کی دھار کمزور ہوتی ہے۔
 لیکسیس (Lachesis): سرخ بخاروں کے بعد سوجن کے ساتھ۔
 بپٹسیا (Baptisia): ٹائفیس میں۔
 کالکیریا آرس (Calcarea Ars): پیشاب کم ہو جاتا ہے۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہے۔
 پیشاب میں الیومن اور جھلیاں ہوتی ہیں۔ مٹی کی ٹالیوں میں درد ہوتا ہے۔ تھکاوٹ اور پانی
 پینے کے بعد۔

تھچٹ (Sedements) —

سیپیا (Sepia): تھچٹ میں اینٹ کا برادہ ہوتا ہے۔ گردن توڑ بخار میں پیشاب کی تھچٹ
 میں سرخ سفوف ہوتا ہے۔ زردی مائل چمکا مواد تھچٹ میں ہوتا ہے۔ سفید چپکے والی جھلی
 ہوتی ہے۔
 لائیکو پوڈیم (Lycopodium): پیشاب کی تھچٹ میں سرخ ریت ہوتی ہے۔ یہ کیفیت گردہ
 کے درد قوی میں یا کسی دوسری وجہ سے ہوتی ہے۔
 ٹیرنٹولا ایچ (Terentula H): فالجی کیفیت میں پیشاب کی تھچٹ میں اینٹ کا برادہ ہوتا
 ہے۔
 میفائٹس (Mephites): دماغ میں پیشاب کی تھچٹ میں اینٹ کا برادہ ہوتا ہے۔
 کاسٹیکم (Causticum): ورم زرخرہ کے مرض میں اینٹ کا برادہ پیشاب کی تھچٹ میں ہوتا
 ہے۔
 ایسکولس ہیپ (Aesculus Hip): اینٹ کا برادہ جس کا رنگ گہرا بھورا ہوتا ہے۔
 اپیس مل (Apis Mel): پس ہوئی کالی کی طرح کا اینٹ کا برادہ۔

سر ساپاریلا (Sarsaparilla) پیشاب میں سفید ریت ہوتی ہے۔
سلیسیم (Selenium) مٹی کی طرح کی سفیدی مائل تلچٹ چاندی کی طرح کی سفید تلچٹ۔
بربرس وول (Berberis Vul) گاڑھا سرفی مائل یا مساکنی جیسے رنگ والا برادہ تلچٹ میں ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ لعاب دار مادہ خیرتا رہتا ہے۔ گردوں کے علاقہ میں درد ہوتا ہے۔ جو پھیل کر پیشاب کی ٹالی اور مثانہ تک چلا جاتا ہے۔
نیٹرم میور (Natrium Mur) گاڑھا کچھڑ والا پیشاب ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ تلچٹ ہوتی ہے اور گندی بو ہوتی ہے۔ مریض کا ناک نقش بھرا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے اور پیشابی میں درد ہوتا ہے۔
کوپائیوا (Copiva) تلچٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ درم تر خرہ اور مثانے کے نزلہ میں۔
فاسفورس (Phosphorus) پیشاب بدبودار ہوتا ہے جس میں سرخ اور بھوری تلچٹ ہوتی ہے۔ طوفان اور شور کے باعث اعصابی قسم کی تکلیف ہوتی ہے۔ مریض جلدی سے چونک جاتا ہے۔ مریض کی شبابہت خاستری ہوتی ہے۔
کینتھرس (Cantharis) گردوں کے علاقہ میں دکھن ہوتی ہے اور لائے والا درد ہوتا ہے۔ جو پیشاب کی ٹالی اور مثانہ تک پھیل جاتا ہے۔ پیشاب کم خارج ہوتا ہے۔ جس کا رنگ گاڑھا ہوتا ہے۔ تلچٹ سرفی مائل انت کے برادے والی ہوتی ہے۔
اورم میٹ (Aurum Met) پیشاب گاڑھا ہوتا ہے جو کہ دھندلا اور بہت زیادہ بدبو والا ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ لمبیو آتا ہے۔
لیڈم پی (Ledum P) پیشاب میں سرخ ریت ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کی ٹالی میں جلن ہوتی ہے۔

بو — (Smell)

سپیا (Sepia) بدبودار اور کھٹا پیشاب خارج ہوتا ہے۔ بدبو ایسی ہوتی ہے کہ کمرے میں برداشت نہیں ہو سکتی۔
نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid) پیشاب کی بو ایسی ہوتی ہے جیسے کہ گھوڑے کے پیشاب کی ہوتی ہے۔ بو بہت تیز ہوتی ہے۔ گرمی سے ابتری ہو جاتی ہے۔
لیکیسیس (Lachesis) معدوی اور اعصابی بخار میں امونیا والی بو ہوتی ہے۔
کوکا (Coca) امونیا والی بو سوزاک کے رک جانے میں۔
ابسینٹیم (Absinthium) پیشاب کی بو بہت تیز ہوتی ہے جیسے کہ گھوڑے کے پیشاب کی

ہوتی ہے۔ پیشاب کا رنگ سنگترے کے رنگ کی طرح ہوتا ہے۔ پیشاب کرنے کی مسلسل خواہش ہوتی ہے۔

موسکس (Moschus): پیشاب میں امونیا کی بو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی علامت موجود نہیں ہوتی۔

کاجوپٹام (Cajuputam): پیشاب کی بو ایسی ہوتی ہے۔ بھسی بلی کے پیشاب کی ہوتی ہے۔ اچھارے والا درد قویٰ ہوتا ہے۔

بپٹیشیا (Baptisia): سڑے ہوئے انڈوں کی بو پیشاب میں ہوتی ہے۔ ٹائیفائیڈ بخار میں پیشاب متعفن بو والا ہوتا ہے۔

بنیزوئک ایسڈ (Benzoic Acid): پیشاب بہت ہی زیادہ تیز بو کے ساتھ خارج ہوتا ہے جو کہ گھوڑے کے پیشاب کی طرح کی ہوتی ہے۔ بدبو دار متعفن پیشاب بہت ہی گہرے رنگ والا۔

بیرٹامیور (Baryta Mur): غدود کی سوجن میں بدبو دار پیشاب خارج ہوتا ہے۔

بوریکس (Borax): چبسنے والی بو کے ساتھ گرم پیشاب خارج ہو۔

اوسیم (Osmium): ہفت کی طرح بو پیشاب میں ہوتی ہے۔

انڈیکو (Indigo): شدید گندی بدبو والا پیشاب خارج ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر گھڑے رہنے کے بعد۔

فیرم آیوڈ (Ferrum Iod): میٹھی بو والا پیشاب خارج ہوتا ہے۔

کثافت اضافی (Specific Gravity)

یورینیم نائٹ (Uranium Nit): پیشاب کی کثافت اضافی اونچے درجے کی ہوتی ہے جو کہ 1040 سے 1044 تک ہوتی ہے۔

نیر-بستہ (Terebinth): پیشاب کی کثافت اضافی 'ورم گردہ کے مرض میں 1018 ہوتی ہے۔ پلمبم (Plumbum): کثافت اضافی کم ہوتی ہے مثلاً 1002 نیز جب کثافت اضافی 1016 اور 1017 ہو۔

برپچی گلوٹس (Brachyglottis): یہ دوا حسب ذیل کثافت اضافی کے لئے دی جاتی ہے۔ 1004، 1008، 1020، 1023، 1024 اور 1034۔

آرنیکا ایم (Arnica M): کثافت اضافی اونچے درجے کی ہوتی ہے۔

سنی گیولا (Sanicula): باافراط پیشاب آنے کے ساتھ کثافت اضافی 1000 ہوتی ہے۔

یوریا (پیشاب میں) (Urates)

تھلاسپی بی (Thlaspi B): پیشاب میں یوریش کی موجودگی کے باعث لاحق ہونے والے امراض۔

نیٹرم سلف (Natrium Sulph): معدے کی گنتھیا کی تکلیف کے ساتھ پیشاب میں یورک ایسڈ ہوتا ہے۔

سپیا (Sepia): یوریا کے لیکٹس کا اضافہ جگر کی خرابیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ پرائیٹ کی سوزش ہوتی ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): امونیا کے یوریش پیشاب میں ہوتے ہیں۔ جو دق کی حالت کو ظاہر کرتے ہیں۔

بیمنزوتک ایسڈ (Benzoic Acid): پیشاب میں یورک ایسڈ ہوتا ہے جس کے ساتھ پیشاب گہرے رنگ کا ہوتا ہے اور بہت زیادہ بدبودار ہوتا ہے جس کے ساتھ گنتھیا کی علامات ہوتی ہیں۔ گردوں کی کمزوری۔



اعضائے تناسل کے امراض

(Diseases of Genitalia)

حصہ اول۔۔۔۔ مشترک امراض

گلیٹ — Gleet

(دیکھئے "سوزاک")

سوزاک — (Gonorrhoea)

پلسائیلہ اکونائٹ این (Pulsatilla, Aconite N): مرض کے ابتدائی مراحل کے دوران ان ادویات کو ہر گھنٹے کے بعد بدل بدل کر دینا چاہئے۔ سوزش والے مرحلے کے دوران 1x طاقت کی دوا دیجئے۔ بعد والے مراحل میں پلسائیلہ اوپچی طاقت میں بھی دے سکتے ہیں۔ جبکہ مریض ملائم طبیعت کا ہو۔ پیاس بالکل نہیں رہتی۔ پیشاب بغیر تکلیف کے خارج ہوتا ہے۔ خضیوں کی سوزش کے ساتھ پیلے رنگ کا گاڑھا پیشاب باقروط خارج ہوتا ہے۔ یہ تمام علامات انشعبی ہوتی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک علامت بھی غیر موجود نہیں ہوتی۔

کیوبیبا (Cubeba): جب سوزش والا مرحلہ گزر جاتا ہے اور پیشاب کی نالی میں پیشاب کرتے وقت صرف جلن باقی رہ جاتی ہے۔ پیشاب گاڑھا پیلا اور پیپ کی طرح کا خارج ہوتا ہے۔ گہرا سرخی مائل بلغم خارج ہوتا ہے۔ یہ بلغم بھی گاڑھا اور سوزاکی ہوتا ہے۔ سوزاک کے دوسرے اور آخری مرحلے میں یہ دوا دی جاتی ہے۔

سلیشیا (Silicea): مرض سوزاک میں یہ دوا خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ پیشاب کی نالی سے پیپ کی طرح کا مادہ خارج ہوتا ہے۔ ہلکا سا چھچھروں کی طرح کا مواد بھی خارج ہوتا ہے۔ خون آنود پیشاب جو کہ پیپ والا ہوتا ہے۔ پیشاب کی نالی سے گاڑھی متعفن پیپ خارج ہوتی ہے۔ اس دوا کو سوزاک کے تمام کیسوں میں اعتماد کے ساتھ آزمایا جا سکتا ہے۔ 1000 طاقت کی خوراک دیجئے۔

کوپائیوا (Copaiva): یہ دوا مزمن سوزاک میں مفید ہے۔ پیشاب کے اخراج سے پہلے اور بعد مٹانے کے چھپے اور پیشاب کی ٹالی میں کانٹے کی کیفیت ہوتی ہے اور جلن ہوتی ہے۔ پیشاب دودھیا ہوتا ہے۔ پیشاب کی بو ہلکا ہوتی ہے۔

تھوجا (Thuja): مزمن سوزاک میں یہ دوا دلی جاتی ہے۔ جب پیشاب پتلا اور سبز رنگ کا خارج ہوتا ہے جس کے ساتھ جلن دار درہا پیشاب کرنے کے دوران ہوتا ہے۔

ٹسی لیکویٹ (Tussilago Pet): پہلے اور سفید رنگ کے گاڑھے پیشاب کے اخراج کے ساتھ احتمالی شدید سوزاک لاحق ہو۔ پیشاب کی ٹالی میں ریگن ہوتی ہے۔ مٹی کی ٹالی میں اور فسیوں میں جھٹکے لگتے ہیں اور کھنچا ہوتا ہے۔

پتروسلینیم (Petroselinum): پیشاب کی ٹالی میں شدید قسم کی خارش ہوتی ہے۔ مریض پیشاب کی ٹالی میں خارش کرنے کے لئے کوئی چیز کھینچ دیتا جاتا ہے۔

میڈورنیم (Medorrhinum): دے ہوئے سوزاک کے لئے یہ ایک بنیادی دوا ہے۔ پیشاب گرمے رنگ کا ہوتا ہے۔ بو تیز ہوتی ہے۔ پیشاب گرمی جیسے مادے کی تہ سے اٹھکا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ زرد ہوتا ہے۔ پیشاب کا بہاؤ ست ہوتا ہے۔ غصہ قاسل کی جڑ میں کنٹن ہوتی ہے۔

سپیا (Sepia): سوزاک کا حاد مرحلہ گزر جانے کے بعد یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ یہ دوا سوزاک اور سوزاکی مسوں کے لئے مفید ہوتی ہے۔ گومزاکوٹری لومانا مکمل طور پر غصہ قاسل کے سر کو کھیرے ہوتا ہے۔ پیشاب کی ٹالی میں جھن والے اور گولی لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ پیشاب بہت زیادہ بدبو دار ہوتا ہے۔

کنٹھرس (Cantharis): سوزاک کا وہ جاننا جب اس کا اثر مٹانے پر ہو۔ پیشاب کی بندش لاحق ہوتی ہے۔ پیشاب کرنے پر جلن ہوتی ہے اور سختی ہوتی ہے۔ فسیوں کی پرورد سوجن لاحق ہو۔ خارش دار لیکوریا کے ساتھ رحم (بیضہ دانہ) کی سوزش لاحق ہوتی ہے۔

سٹابیرس (Cinnabaris): طویل مدت سے لاحق سوزاک ہو آنکھ کے ساتھ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔

کپسیکیم (Capsicum): پیشاب پیچ دار خون آمود اور متعفن ہوتا ہے۔ دبا ہوا سوزاک۔ آلات قاسل کی ٹھنڈک اور سکڑن لاحق ہو۔ نامردی ابانجھ ہیں۔

الیومن (Alumen): پیشاب کی ٹالی کے ساتھ ساتھ سوجن ہوتی ہے اور ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ پٹے رنگ کا پیشاب مزمن طور پر بغیر درد کے خارج ہوتا ہے۔ اندام نسانی میں یا رحم کی گردن پر ناسوری دھجیاں ہوتی ہیں۔

نٹرم سلف (Natrium Sulphi): یہ دوا پانی کی زیادتی والے مریضوں کو دی جانی چاہئے۔

پیلاہٹ مائل، سبزی مائل پیشاب خارج ہونے کے ساتھ مزمن سوزاک لاحق ہوتا ہے۔ حشفہ اور فصیوں کی سوزش۔ اعضاءے ناسل کی خارش۔ یہ خارش حشفہ اور عضو ناسل میں ہوتی ہے۔ مریض انہیں ملنے پر مجبور ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد جلن ہوتی ہے۔ یہ دوا علامات کی بروی تعداد کا احاطہ کرتی ہے۔ غدودوں کی سوجن لاحق ہوتی ہے۔ خون پانی کی طرح پتلا ہو جانا لاحق ہوتا ہے۔ انجماء خون، پیریکا ایسیا، جلدی دانے، ایگزاتھما، ایگزوری سینر، پھوڑے، بھنسی ہاتھوں اور پاؤں میں چھیدنے والے درد ہوتے ہیں۔ پھنسیاں ہوتی ہیں۔ آبلے ہوتے ہیں۔ ہتھیلیوں میں دکھن ہوتی ہے۔ پتلا مواد رستا ہے۔ آتشک کے گھاؤ ہوتے ہیں۔ بد شکل ناخن ہوتے ہیں۔ یہ علامات آتشک یا سوزاک کے باعث لاحق ہو سکتی ہیں۔

آر سینک، سلف، فلیو (Ars. Sul. Fl) خوفناک دردوں کے ساتھ سوزاک لاحق ہوتا ہے۔ پیشاب زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے جو کہ پتلا اور مستقل ہوتا ہے۔ بے چینی کے ساتھ تمام پیشاب کی ٹالی کے ساتھ دن رات جلن ہوتی ہے۔

سلفر (Sulphur) ایسے مریضوں کے لئے یہ دوا بطور عمل انگیز استعمال ہوتی ہے جنہیں لھنڈہ بہت جلد لگ جاتی ہے اور جن کا علاج صحیح طریقے سے نہ کیا گیا ہو۔ بہت زیادہ بھجان ہوتا ہے۔ دکھن اور جلن اعضاء میں ہوتی ہے۔

کینبائس سیئی وا (Cannabis Sativa) پیشاب کی ٹالی میں جلن اور سکڑن ہوتی ہے۔ پیشاب والے سوراخ سے لے کر مثانہ تک جلن اور سکڑن ہو۔ پیشاب کی ٹالی سوجی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں دکھن ہوتی ہے۔ پیشاب کرتے وقت ٹانگے لگتے جیسے اور جلن دار درد ہوتے ہیں۔ پیشاب کے اخراج کے آخر میں ابتری ہو جاتی ہے۔ تقریباً مسلسل پیشاب کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ پیشاب سفیدی مائل اور دھندلا ہوتا ہے۔

ٹلی فولیم (Millefolium) عضو ناسل اور فصیوں کی سوجن جس کے ساتھ خون اور پانی جیسا کہ پس دار مادہ خارج ہوتا ہے۔

ایسڈ فلوور (Acid Fluor) پرانا سوزاک، سکڑن، سوزا کی مادہ رات کے دوران خارج ہوتا ہے جو سوئی کپڑے پر زرد و جب چھوڑ دیتا ہے۔ پیشاب کی ٹالی میں جلن کے ساتھ پیشاب کرنے کی متواتر خواہش ہوتی ہے۔

ارجنٹم ٹائٹ (Argentum Nit) سوزا کی مادہ خارج ہوتا ہے۔ پیشاب کرنے کی متواتر خواہش کے ساتھ پیشاب کی ٹالی میں جلن ہوتی ہے۔ پیشاب کرنے کے فوری بعد چند قطرے خارج کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔

کریوزوٹ (Kreosote) سوزاک اور پیشاب کی ٹالی کی سوزش خصوصاً مستورات میں۔

خراش دار، خون والا اور بہت زیادہ بدبو والا مواد خارج ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ لب فرج میں خراش اور سکڑن ہوتی ہے۔

کیمفر (Camphor): قطرات گھنٹھیاں، پیشاب کرنے کے بعد بھی دور نہ ہو۔ مٹانے کے پیشاب سے بھرے ہونے کے ساتھ شدید گھٹکی اور اس کے ساتھ پیشاب کرنے کی ناقابل کوشش ہوتی ہے۔

مرکیوریس (Mercurius): قطرات کا پینٹ، سوزش، پیشاب کی نالی کی سوزش، پیشاب کمزور، دھار کے ساتھ اور کانٹے والے دردوں کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ پیشاب کے سوراخ کے ہونٹ سرخ اور سوزشی ہوتے ہیں۔ فرج کی سوزش، جس کے ساتھ سوجن ہوتی ہے نیز فرج سرخ اور گرم ہوتی ہے۔ پیلاہٹ مائل سبز پیشاب خارج ہوتا ہے۔ رات کے وقت پسینے آتے ہیں۔ ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ پسینے کے دوران اتھری ہوتی ہے۔

بال (زیر ناف) (Hair (Pubic)

ٹائٹریک ایسڈ، سلیسینیم (Selenium, Nitric Acid): زیر ناف بال گر جاتے ہیں۔
آئیوڈیم (Iodum): زیر ناف بالوں کا گر جانا، اگر اوپر دی گئی ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دوا آزما میں۔

سلفر (Sulphur): بدبو دار پسینے کے باعث زیر ناف بال تباہ ہو جاتے ہیں۔

آتشفک — Syphilis

مرک سول (Mer Sol): غیر پیدائشی اور خود حاصل کردہ آتشفک کے تمام مراحل کے لئے یہ چوبی کی دوا ہے۔ عام کیسوں میں اسے چلی طاقتوں میں دینا چاہئے اور مزمن کیسوں میں بہت اونچی طاقتیں دینی چاہئیں۔ آتشفک کے زخم سرخ ہوتے ہیں جو اندر کی جانب پھیلتے ہیں اور جن سے پیلاہٹ مائل متعفن مادہ خارج ہوتا ہے۔ ان میں سیلان خون کا رجحان ہوتا ہے۔ زبان پر سوزا کی ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔ نیز حلق یا پیچھڑوں میں آتشکی گنٹھیاں لاحق ہوتا ہے۔

اورم میٹ (Aurum Met): یہ دوا دوسرے درجے کی آتشفک میں مفید ہوتی ہے۔ جس میں پارے کا غلط استعمال کیا گیا ہو۔ میسٹوئیز میں کھونے والے درد ہوتے ہیں۔ آتشفک کے باعث ناک کی ہڈیوں کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ دماغ میں رسولیاں ہوتی ہیں جن کے ساتھ سخت قسم کا درد سر لاحق ہوتا ہے۔ کالو کی ہڈی کٹنے سڑنے لگتی ہے نیز دوسری چھٹی ہڈیاں گلتی سڑتی ہیں۔ جس کے ساتھ ہلکا نزلہ رہتا ہے۔

سائبرس (Cinnabaris): آتھک میں جو کہ سوزاک کے ساتھ چھید ہو جاتا ہے یہ ایک مفید دوا ہے۔ آتھک والے زخم سخت اور ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پیشاب کے راستے سے پیپ خارج ہوتی ہے۔

مرک ڈلس (Merc Dulc): مستورات کی آتھک میں یہ دوا مفید ہوتی ہے۔ جس میں ہر دلی اعضائے ناسل کے گرد کئی پھوڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔

الینٹر نائٹرک (Acid Nitric): آتھکی ناسوروں کے لئے یہ مفید دوا ہے۔ یہ پھوڑے کمرائی کی نسبت ارد گرد زیادہ پھیلتے ہیں۔ جس کے ساتھ ڈنگ لگتے جیسے درد ہوتے ہیں۔ جیسا کہ نگڑی کی کئی کریمیں ایک ساتھ چھ رہی ہوں۔ میلان خون کا رنخان ہوتا ہے۔ دانے بکھرتے ہوتے ہیں۔ جن کے کنارے بے قاعدہ ہوتے ہیں۔ گومڑ یا پھوڑے اور گوبھی کے پھول جیسے پھوڑے پیدا ہوتے ہیں۔ آتھکی بچے کی رات کی تکلیف جبکہ دیگر مقاصد کے لئے دی گئی ادویات ناکام ہو جائیں۔ تو زائیدہ بچوں میں ناسوری کیفیت۔ لب فرج میں ناسور ہوتے ہیں۔ مقعد کے پاس انکھر جیسے سے ہوتے ہیں۔ پھاتی پر تانبے کے رنگ والے پھوڑے پھنسیا ہوتے ہیں۔

مرک کار (Merc Gor): آتھکی زخم ہوتے ہیں۔ جن کے ساتھ منہ میں 'سوزخوں میں اور حلق میں بہت زیادہ ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔ سانس متعفن ہوتا ہے۔ تموک بہت زیادہ آتا ہے۔ ناسلز بہت بوجھ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ زبان پر آتھکی ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔ حلق یا پھپھڑوں میں بھی۔

کیلوٹروپس (Calotropis): دوسرے مرے کی آتھک جس میں ناخنوں کے سرے موٹے ہو جاتے ہیں۔ مدر ٹچر کے پانچ قطروں کی خوراک دی جائے۔

سٹینگیا سل (Stillingia Syl): دوسرے مرے کی آتھک جس کے ساتھ ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ گھٹیا لاحق ہوتا ہے۔ ماتھے اور پنڈلی کی ہڈی پر گانٹھیں ہوتی ہیں۔ آتھکی کھانسی وغیرہ ہوتی ہے۔

مائی گیل (Mygale): حدت کے ساتھ زیادہ ہلا والا پیشاب ہوتا ہے۔ پیشاب کی ٹالی میں جلن ہوتی ہے اور ڈنگ لگتے ہیں۔

کالی آئیوڈ (Kali Iod): گہری ناسوری کیفیت۔ آتھکی کھاؤ اور حلق، پھپھڑوں یا زبان کی سوجن ہوتی ہے جو کہ آتھک کے باعث ہوتی ہے۔ آتھکی گھٹیا خصوصاً انگلیوں اور انگوٹھوں کا۔ درد کے ساتھ یا درد کے بغیر ٹیلنٹس کا بتدریج بڑا ہو جانا۔ زکام ہوتا ہے۔ نحتوں اور ہونٹوں پر چھالے ہوتے ہیں۔ ناک میں اور پیشانی کی ہڈیوں میں جھکن ہوتی ہے اور جلن ہوتی ہے۔ کترین والے اور کھودنے والے درد ہڈیوں میں ہوتے ہیں۔ کھوپڑی اور کمر پر معروف پھوڑے

پھنسیاں ہوتی ہیں۔

فلورک ایسڈ (Fluoric Acid): منہ کی آتشکی ناسوری کیفیت، صلق اور ناک کی آتشک والی ناسوری کیفیت لاحق ہو جبکہ پیشاب گاڑھا خراش دار خارج ہوتا ہے۔ مریض خوف زدہ اور چڑچڑا ہوتا ہے۔ خصوصاً ناک اور چنڈی کی ہڈیوں کا گھٹنا سزنا لاحق ہوتا ہے۔

کریو زوٹ (Kreosote): آتشک کا حادو زکام جس کا اثر دانتوں پر ہوتا ہے۔ یہ مرض دانتوں کو کالا کر دیتا ہے اور جلد ہی تباہ کر دیتا ہے۔ منہ اور گلا دکھتے ہیں اور منہ کے کناروں پر ناسوری کیفیت اور شکاف ہوتے ہیں۔

کالی یاٹیکرام (Kali Bich): آتشکی زکام جو منہ کی باغی جھلی کو متاثر کرتا ہے نیز ناک اور گلے کی باغی جھلی کو بھی متاثر کرتا ہے۔ منہ یا ناک میں چمید کرنے والے ناسور ہوتے ہیں۔ بدبو دار اور تباہ کن نزلہ ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ گاڑھا پیلا مواد ناک سے خارج ہوتا ہے۔

تھوجا (Thuja): چپ وق والی آتشک، جلد پر دانے ہوتے ہیں۔ پھوڑے ہوتے ہیں ناسور ہوتے ہیں۔ آتشکی چیرے ہوتے ہیں۔ جملن دار اور خراش والی رطوبت رستی ہے۔

باڈیاگا (Badiaga): غدود کی سخت قسم کی سوجن کے ساتھ نوزائیدہ بچوں میں آتشکی کیفیت۔

سفیلیلیم (Syphilinum): یہ ایک نوسوز ہے۔ نئے اونچی طاقوں میں دینا چاہئے۔ یہ دوا علاج کے شروع میں دینی چاہئے یا پھر عمل انگیز دوا کے طور پر استعمال کرنی چاہئے جبکہ بہترین منتخب شدہ ادویات ناکام ہو جائیں۔

لیکیسیس (Lachesis): یہ دوا آتشکی اوزینا (پرانا زکام) اور پارسے کے غلط استعمال کے بعد آواز کے جاتے رہنے کے مرض کو درست کرتی ہے۔

حصہ دوم۔۔۔ مردانہ امراض تولیدی جراثیموں کی غیر موجودگی

(Azoospermism)

(مادہ منویہ میں تولیدی جراثیموں کی غیر موجودگی یا امراضی حالت)

ڈامیانہ (Damiana): جنسی ضعف اعصاب کے باعث نامردی میں تولیدی جراثیموں کی غیر موجودگی، پرائیٹ کا مزمن اخراج۔

چائنی نم سلف (Chininum Sulph): جنسی خواہش کے دب جانے یا کم ہو جانے کے ساتھ

مادہ منویہ کی غیر موجودگی۔

شرابی کینیم (Stychnium): جب مادہ منویہ کی غیر موجودگی کے ساتھ بہت زیادہ جنسی خواہش پائی جائے اور / یا خضیوں کی سوجن موجود ہو۔

کوئیم (Conium): مادہ منویہ کی غیر موجودگی نامردی کے ساتھ۔ ناکافی ایستادگیاں یا ایستادگیوں کی غیر موجودگی۔ مجامعت میں طاقت کا فقدان پایا جاتا ہے۔ عورت کی موجودگی ہی انزال کا باعث بن جائے۔

آئیوڈیم (Iodium): بڑھی ہوئی جنسی خواہش کے ساتھ یہ دوا ایسے اشخاص کی نشاندہی کرتی ہے۔ جو شدید قسم کی یا مستقل ایستادگیاں رکھتے ہیں۔ خضیے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور پردہ ہوتے ہیں۔

سرطان (Cancer)

(نیز دیکھئے "متفرقات" کے ذیل میں "سرطان")

کوئیم (Conium): عضو تناسل کا سرطان۔

سپونجیا (Spongia): خضیوں کا سرطان۔

مجامعت — (Coition)

گریفائٹس (Graphites): نامردی کے ساتھ مجامعت سے بے ذارمی، مجامعت کے دوران اچانک طاقت کھو جائے۔ مجامعت کے بعد ناقص ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ مجامعت کے بعد پیوستہ آتا ہے۔

اگریکس ایم (Agricus M): مجامعت کے بعد بد مزاجی۔

سلیمنیم (Selenium): مجامعت کے بعد مریض بد مزاج ہو جاتا ہے اور کمزوری محسوس کرتا ہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): مجامعت کے بعد گھٹنے جواب دے جاتے ہیں۔ مجامعت کے بعد مریض غیر مطمئن اور غصہ ور ہوتا ہے۔ کمزوری ہوتی ہے۔

نٹرم کارب (Natrum Carb): مجامعت کے بعد بہت زیادہ پسینے کا رجحان ہوتا ہے۔

سٹیفیساگیا (Staphisagria): جنسی غلط کاریوں کے برے اثرات۔ ذہن مسلسل جنسی مضامین پر مرکوز رہتا ہے۔ (یعنی جنسی خیالات رہتے ہیں) مجامعت کے دوران اور بعد تنگی تنفس لاحق ہو جاتی ہے۔ مجامعت کے بعد پیشاب کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔

ٹائی ٹینیم (Titanium): ہجامعت میں منی کا اخراج بہت جلد ہو جانے کے ساتھ ہنسی کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ (سرعت انزال)

سیپیا (Sepia): ہجامعت کے باعث تکالیف لاحق ہوں۔ خصوصاً چکر آتے ہیں۔

موسکس (Moschus): ہجامعت کے بعد قے لاحق ہو۔

کینتھارس (Cantharis): ہجامعت کے بعد پیشاب کی ٹالی میں درد ہوتا ہے۔

ڈافنی (Daphne): ہجامعت کے بعد دانت کا درد لاحق ہو۔

سٹرائی کینافاس (Strychina Phos): شرم یا اس سوچ کے باعث کہ وہ نامرد ہے حلاکت حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا، ہجامعت کے وقت ایستادگیوں کا فقدان لاحق ہو جاتا ہے۔ تیسری ڈاکٹی لیوشن استعمال کیجئے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): عضو تناسل اچانک ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور انزال کو روک دیتا ہے۔

ہجامعت کے بعد خواہش بڑھ جاتی ہے اور اعتلام ہوتا ہے۔

سلفر (Sulphur): اس سے پہلے کہ ایستادگی مکمل ہو۔ انزال ہو جاتا ہے۔

بیریٹا کارب (Baryta Carb): جماع کے دوران سو جائے۔

لانی سین (Lyssin): انزال بہت دیر سے ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا۔

لائیکو پوڈیم (Lycopodium): ہجامعت سے بے زاری، آہ تناسل مرحلے ہونے کے

ساتھ۔ ہجامعت کے دوران سو جائے۔ ہجامعت کے دوران اچانک طاقت زائل ہو جائے۔

امبرا گریسیا (Ambra Grisea): جماع کی کوشش کرنے پر دمہ لاحق ہو۔

کالی کارب (Kali Carb): ہجامعت کے بعد نظر کمزور ہو جائے اور / یا کمر میں درد ہو۔

یوفو (Bufo): ہجامعت کے دوران تشفی جھٹکے لگتے ہیں۔

سبل سیرولانا (Sabai Serrulata): ہجامعت کے بعد پیشاب کرنے میں دقت ہوتی ہے۔

مرک کار (Merc Cor): ہجامعت کے بعد امعاء مستقیم میں پر درد تشفی دورے ہوتے

ہیں۔

کریو زوٹ (Kreosote): ہجامعت کے دوران آہ تناسل جیسے ہی اندام نعلی کی رطوبت کو

چھوتا ہے تو آلات تناسل میں جلن پیدا ہو جاتی ہے۔

سٹرامونیم (Stramonium): ہنسی بھجان لاحق ہوتا ہے، ہاتھ مسلسل اعضائے تناسل پر رہتے

ہیں۔

ملی فولیم (Millefolium): ہجامعت میں انزال کا فقدان۔

خواہش۔۔۔ گھٹی ہوئی (نامردی)

Desire---Decreased (Impotency)

نیوفر (Nuphur): ایستادگیوں اور جنسی خواہش کی مکمل غیر موجودگی۔ پاخانہ کرنے کے دوران یا جب پیشاب کر رہا ہو تو غیر ارادی طور پر مادہ منویہ خارج ہو جائے۔

سبل سیرولاٹا (Sabal Serrulata): نامردی، اعضائے قاسل ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے سکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آواز قاسل سکڑا ہوا اور ٹھنڈا ہوتا ہے جس کے ساتھ پیشاب کی تکلیفات بھی ہوتی ہیں۔

اونوس موڈیم (Onosmodium): جنسی خواہش مدہم پڑ جائے، آواز قاسل کے ٹھنڈے ٹھنڈے محسوس ہوتی ہے۔ احتکام لاحق ہوتا ہے۔ بہت جلد انزال ہو جاتا ہے۔

ڈامیانہ (Damiana): نامردی کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ 5 سے 10 قطروں کی خوراک روزانہ تین مرتبہ دیجئے۔

ٹائی ٹی ٹیم (Titanium): جماع کے دوران ضرورت سے زیادہ جلدی انزال ہو جانے کے ساتھ جنسی کمزوری لاحق ہوتی ہے۔

کیلڈیم (Caladium): جلق کے باعث نامردی لاحق ہو، شدید جنسی خواہش کے ساتھ آواز قاسل ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ صبح کے وقت کچی نیند میں ایستادگیاں ہوتی ہیں۔ جبکہ مکمل طور پر بیدار ہونے پر ایستادگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پرانے عیاشوں میں نامردی لاحق ہو جو کہ ایستادگیوں کے فقدان کے باعث ازدواجی تعلقات انجام دینے کے قابل نہیں ہوتے۔ جنسی بے اعتدالیوں کے باعث اور تمباکو نوشی کے باعث یا تمباکو چبانے کے باعث ذہنی اور جسمانی ٹھنڈت لاحق ہوتی ہے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): بوڑھے لوگوں میں نامردی، جزوی نامردی، 1M طاقت کی خوراک ہر ماہ استعمال کیجئے۔

سٹیفنی سیکریا، فاسفورس (Staphisagria, Phosphorus): بے اعتدالیوں کے باعث نامردی لاحق ہو۔

موسکس، کیپورم میٹ (Moschus, Cuprum Met): شوگر کے ساتھ نامردی لاحق ہو۔

نٹرم میور (Natrum Mur): بغل گیر ہونے کے دوران مادہ منویہ کم خارج ہو۔

یوہم بیٹیم (Yohimbinum): اعصابی کمزوری کے باعث نامردی لاحق ہونے کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔

گرافائٹس (Graphites): تھپہ برائی اور جنسی بے اعتدالیوں کے بعد نامردی لاحق ہو۔
 آرنیکا، ہائپرکیم (Arnica, Hypericum): گر جلنے کے باعث مکا وغیرہ لگ جانے کے
 باعث۔

مرکیوریس، کالی آیوڈ (Mercurius, Kali lod): آشک کے باعث نامردی لاحق ہو۔

خواہش۔ بڑھی ہوئی

(Desire- Increased)

ایسڈ فلورک (Acid Flouric): یہ دوا گھٹیا ذہنیت کی نشاندہی کرتی ہے جبکہ ایک آدمی ایک
 عورت سے مطمئن نہیں ہوتا اور یکے بعد دیگرے بیویاں بدلتا رہتا ہے۔ مریض گلی کی ٹکڑ پر کھڑا
 ہو جاتا ہے اور معصوم قسم کی گلی سے گزرنے والی عورتوں سے خواہشات نفسانی رکھتا ہے۔ یہ
 دوا برائی کرنے والوں (بدکاری) کے لئے ہوتی ہے جو اپنی بیوی سے کبھی مطمئن نہیں ہوتے
 جنہیں اپنے بچوں اور عزیز ترین دوستوں سے نفرت ہوتی ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): متواتر ایستادگیوں ہوتی ہیں اور ایسے جنسی خیالات ہوتے ہیں
 جن پر قابو نہیں پایا جاسکتا ہے۔ جوان آدمیوں میں جذبات پر قابو پانے کی کوشش کے باوجود
 ایستادگیاں ہوتی ہیں جبکہ ذہن اور اعصابی نظام میں خرابی اس کیفیت کا باعث ہو۔

ٹیرنٹولا ایچ (Tarentula H): اختصار ہے کا جنسی جوش۔

سٹیفیسیا (Staphisagria): بڑوں میں یعنی بالغوں میں نامناسب قسم کی جنسی بھوک۔

پیکریک ایسڈ (Picric Acid): شدید قسم کی اور خطرناک قسم کی ایستادگیاں جن کا باعث ذہنی
 اور اعصابی نظام کی خرابی ہوتی ہے۔ عضو تناسل اتکا ہوتا ہے کہ بچنے کے قریب ہو جاتا ہے۔
 اوری گی نیم (Origanum): حد اعتدال سے بڑھی ہوئی ایستادگیوں کی لہریں اور جلق کی
 عادت میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ تیسری طاقت کی دوا دینے۔

انین تھیرم، کنٹھرس (Anantherum, Cantharis): خطرناک قسم کی جنسی بھوک ہوتی
 ہے جسے مطمئن کرنے کی ہر کوشش اس میں اضافہ کر دیتی ہے یہاں تک کہ مریض خود لذتی اور
 پاگل پن تک پہنچ جاتا ہے۔ شدید قسم کی ایستادگیاں ہوتی ہیں، دی ہوئی ترتیب کے مطابق
 ادویات آزمائی جاتی ہیں۔

کیلڈیم (Caladium): شدید قسم کی جنسی خواہش، نامردی اور عضو تناسل کے ڈھیلا پڑ جانے
 کے ساتھ۔ صبح کے وقت جب مریض نیم خوابی میں ہوتا ہے تو ایستادگیاں ہوتی ہیں لیکن مکمل
 طور سے جاگنے پر ایستادگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایستادگیاں خود بخود خواہش کے بغیر ہوتی ہیں، بہت

سخت اور نر درد ایستادگیاں ہوتی ہیں۔
 نکلس دامیکا (Nux Vom): جنسی بھوک ہوتی ہے جو کہ شراب نوشی کی بے اعتدالیوں کے باعث ہوتی ہے۔
 کونیم (Conium): معمولی قسم کا جذبہ مادہ منویہ کے اخراج کا باعث بن جاتا ہے۔ اخراج ہوتا ہے اور پروڈیٹ خورد سخت ہو جاتا ہے، خواہش کے دب جانے کے بد اثرات۔
 موسکس (Moschus): جنسی خواہش بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔
 پلائینا (Platina): غلام کی تحریک (لڑکے کے مقعد کے ذریعے جنسی فعل انجام دینا) اور ہم جنس پرستی (جنسی فعل مقعد کے ذریعے انجام دے)۔

ایستادگیاں (Erections)۔۔۔

(نیز دیکھئے ”جماعت“ اور ”خواہش“)
 کونیم (Conium): ایستادگیاں نہیں ہوتیں۔ جزوی یا مکمل طور پر ایستادگیاں غیر موجود ہوتی ہیں۔
 ڈائیوسکوریہ (Dioscorea): دن رات متواتر ایستادگیاں ہوتی ہیں۔
 نیٹرم میور (Natrium Mur): احتکام کے ساتھ متواتر ایستادگیاں ہوتی ہیں۔
 پلائینیم (Platinum): خصوصاً رات کے وقت شدید ایستادگیاں ہوتی ہیں۔
 کینتھارس (Cantharis): شدید قسم کی ایستادگیاں ہوتی ہیں جو کہ نر درد ہو سکتی ہیں۔
 کامفر (Camphor): خوابوں کے دوران شدید قسم کی ایستادگیوں کا حملہ ہوتا ہے۔
 فاسفورس (Phosphorus): ایستادگیاں نہیں ہوتیں یا کمزوری ہوتی ہیں۔
 کینابیس انڈیکا (Cannabis Ind): بڑھی ہوئی جنسی خواہش کے ساتھ میکاگی اور نر درد ایستادگی۔

ایسڈ پیکریک (Acid Picric): خوفناک قسم کی ایستادگیاں جو نیند میں خلل پیدا کر دیتی ہیں۔
 کسی بھی جنس میں حد اعتدال سے بڑھا ہوا جنسی نظام کا جوش جو کہ ریڑھ یا دماغ کی تکالیف کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ آگے ناسل اتاتا ہوا ہوتا ہے کہ پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے۔
 اوسیم (Osmium): صبح سویرے اٹھنے کے بعد سخت قسم کی ایستادگیاں ہوتی ہیں۔
 آرنیکا ایم (Arnica M): پھل قوی کرنے کے بعد ایستادگیاں ہوتی ہیں۔

حشفہ (عضو تناسل کا سر)

(Glans)

(نیز دیکھیے "کھونٹ" کے ذیل میں "سوجن")

آر سینک البم (Ars Alb): حشفہ میں شکاف ہوتے ہیں۔ پیشاب کرنے کے دوران حشفہ میں جلن ہوتی ہے۔

مرک کار (Merc Cor): مزمن، گریس دار، چربیلا، بدبودار مواد خارج ہونے کے ساتھ حشفہ کی سوزش لاحق ہوتی ہے۔ حشفہ کی حساسیت۔

مرکیورئیس (Mercurius): حشفہ پر گوشت خور پھوڑے ہوتے ہیں۔

نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid): حشفہ کے گرد نمی ہوتی ہے۔

کوپاوا (Copaiva): سوزاک کے بعد حشفہ میں درد ہوتا ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): حشفہ کے پردہ کی سوجن کے باعث حشفہ میں درد ہوتا ہے جس کے باعث حشفہ کا پردہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔

سرساپاریل (Sarsaparilla): حشفہ میں پھاڑنے والا درد ہوتا ہے۔

اورم میور نیٹرم (Aurum Mur, Nat): حشفہ پر ناسور ہوتے ہیں جو گہرے گوشت خور ہوتے ہیں۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): حشفہ پر سے ہوتے ہیں، ضدی قسم کا لگاؤ ہوتا ہے۔

سلفر (Sulphur): نرم، مرغے کی کافٹی کی طرح کے سے اسٹھی جن سے آسانی کے ساتھ سیلان خون ہوتا ہے، حشفہ کی برقی ٹھنڈک۔

تھوجا (Thuja): سوزاک کے بعد سے چھوٹے نوک دار ہوتے ہیں۔ جن سے لیس دار مواد خارج ہوتا ہے۔

کالی میور (Kali Mur): آتشکی زخم کے بعد عضو تناسل کے سر پر سے ہوتے ہیں۔

اورم سلف (Aurum Sulph): آرتھرائٹس کے حشفہ کا گومڑ، نامردی کے ساتھ یا نامردی کے بغیر، عضو تناسل کے حشفہ کی سوزش۔

خصیوں کی تھیلی میں پانی بھرنا (Hydrocele)

(دیکھئے ”خصیوں کی سوزش“)

نامردی — (Impotency)

(دیکھئے ”خواہش۔ تمکنی ہوئی“)

جلق — (Masturbation)

پلاٹینم (Platinum): من بلوغ سے پہلے جلق اور اس کے اثرات۔

کونیوم: (Conium): جلق اور بے اعتدالیوں کے بگاڑا اثرات۔

اگنس کاسٹس (Agnus Castus): جلق اور بے اعتدالیوں کے بعد عضو تناسل کی کمزوری حتیٰ کہ مریض کی جوان اور خوبصورت بیوی بھی اس میں الیٹا دیگوں کا جوش پیدا نہ کر سکے۔

کیلیڈیم (Caladium): یہ دوا جلق کی عادت کو دور کرنے کے لئے اور اس کے بگاڑا اثرات کو رفع کرنے کی لئے استعمال کی جاتی ہے۔ سر ذکر پلپلا ہو جاتا ہے۔ عضو تناسل ڈھیلا ہوتا ہے۔

یوفو (Bufo): جلق کی عادت پوری کرنے کے لئے مریض تھائی کا خواباں رہتا ہے۔ ذہنی حالت کھو رہی ہوتی ہے۔ گھر کے اندر طیش میں بھرا ہوا ادھر ادھر دوڑتا ہوا پھرتا ہے۔

اورنی گینم ایم (Origanum M): حد اعتدال سے بڑھی ہوئی تحریکات کے ساتھ جلق کی نہ رکنے والی عادت، جنسی خواہش اسے پاگل کر دے۔

اسٹیلگو (Ustilago): جلق کا نہ رکنے والا رتخان، شہوانی خیالات اور پُرشہوت خوابوں کے ساتھ خود لذتی کی عادت۔

سٹیفنی سیکریا (Staphisagria): بچوں میں جلق کی عادت اور اس کے بگاڑا اثرات۔

مرک سول (Merc Sol): لڑکوں کے پستانوں میں دودھ ہوتا ہے۔

جنسی جنون — Nymphomania (Satyriasis)

(تیز دیکھئے ”خواہش بڑھی ہوئی“)

کینتھارس (Cantharis): اگر مقامی بیجان کے باعث خواہش کا بڑھ جانا لاحق ہو۔

نکس دامیکا (Nux Vom): شراب نوشی کی بے اعتدالیوں کے باعث۔

فاسفورس، پیکرک ایسڈ (Phosphorus, Picric Acid): دماغ یا اعصاب کی خرابی کے باعث۔

عضو تناسل — (Penis)

غیر موجود (عضو تناسل) — (Absent)

کوکا، کوکین (Coca, Cocaine): یہ احساس ہوتا ہے جیسے عضو تناسل موجود نہ ہو۔

جلن (عضو تناسل کی) — (Burning)

کریو زوٹ (Kreosote): مجامعت کے دوران عضو تناسل میں جلن ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ اگلے دن عضو تناسل سوجا رہتا ہے۔

مگنیشیا مور (Magnesia Mur): منج سورے متواتر التئادگیوں کے ساتھ جلن ہوتی ہے۔

پیرا (Pariera): وقفوں کے ساتھ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کے ہمراہ جلن ہوتی ہے۔

ٹھنڈا (عضو تناسل) — (Cold)

اگنس کاسٹس، لائیگو پوڈیم (Agnus Castus, Lycopodium): عضو تناسل ٹھنڈا ہوتا ہے۔

پھوڑے، پھنسیاں (عضو تناسل کی) — (Eruptions)

گرافائٹس (Graphites): آلہ تناسل پر داو جھسی پھنسیاں ہوتی ہیں۔

کروٹن ٹگ (Croton Tig): آلہ تناسل پر مچالوں کی طرح کی پھنسیاں ہوتی ہیں۔

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): زخم لگنے کے بعد جامنی سرخ رنگ کی پھنسیاں ہوتی ہیں۔

کاسٹیکم (Causticum): آلہ تناسل کی خارش۔

پکڑنا — (Handling)

(نیز دیکھئے "عضو تناسل" کے ذیل میں "کھینچنا")

سٹرامونیم (Stramonium): مریض مسلسل اعضاء تناسل پر ہاتھ رکھتا ہے۔

بوفو (Bufo): آلات تناسل پر مسلسل ہاتھ رکنے کا رجحان۔

درد (عضو تناسل کا) — (Pain)

اگنیشیا (Ignatia): کھانسنے پر (آلہ تناسل میں درد ہوتا ہے۔)
 ڈیجیٹلین (Digitalis): مادہ منویہ کے اخراج کے بعد۔
 پیٹروسلینیم (Petroselinum): پیشاب کی ٹالی کے امراض میں آلہ تناسل کی جڑ میں درد ہوتا ہے۔ خصوصاً سوزاک میں۔
 کپسکیم (Capsicum): دوران شب پر درد الیٹا دگیاں ہوتی ہیں۔
 نکس وامیکا (Nux Vom): صبح کے وقت پر درد الیٹا دگیاں ہوتی ہیں۔
 کالی کارب (Kali Carb): باقراط پر درد احتلام ہونے کے بعد درد ہوتا ہے۔
 نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): رات کے وقت تشنجی دوروں کے ساتھ آلہ تناسل میں درد ہوتا ہے۔

کھینچنا (عضو تناسل کا) — (Pulling)

مرک سول، کینتھرس (Merc Sol, Cantharis): بچہ اپنے آلہ تناسل کو مسلسل کھینچتا رہتا ہے۔ دی گئی ترتیب کے مطابق ادویات آزمائی جائیں۔

سکڑاؤ (عضو تناسل کا) — (Retracted)

اگنیشیا (Ignatia): آلہ تناسل چھوٹا ہو جاتا ہے۔
 نوفر (Nuphur): آلہ تناسل کی سکڑن۔

چھوٹا (عضو تناسل) — (Small)

لائکو پوڈیم (Lycoodium): جلق کے بعد آلہ تناسل چھوٹا ہو جاتا ہے۔
 اگنس کاسٹس (Agnus Castus): آلہ تناسل چھوٹا اور سرد ہو جاتا ہے۔
 اگنیشیا (Ignatia): آلہ تناسل چھوٹا اور سکڑا ہوا ہوتا ہے۔

ناسور (عضو تناسل کے) — (Ulcers)

نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): عضو تناسل کی ساری جلد کینچلی کی طرح اتر جاتی ہے۔ جس سے عضو تناسل نکا ہو جاتا ہے۔
 لیکسیس (Lachesis): پارے والے آتنگی ناسور ہوتے ہیں۔

احتلام — Pollutions

(دیجئے ”مادہ منویہ کا اخراج“)

گھونگھٹ (عضو تناسل کا)

Prepuce (Foreskin of the Penis)

سرخ باد (گھونگھٹ کا) — Erysipelas

ایشپس ایم (Apis M): نقتہ کے بعد سرخ باد لاحق ہو جائے۔

سوزش (گھونگھٹ کی) — Inflammation

مرکوریس (Mercurius): چوٹی کی دوا ہے۔ آگہ ناسل کا گھونگھٹ سوجا ہوا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حشفہ کے ساتھ ساتھ اس میں بھی پانی بھرا ہو۔ باریک سرخ رنگ کی پھنسیاں ہوتی ہیں۔ شکاف ہوتے ہیں اور جلن، کنکن، خارش اور درد کے ساتھ جلد پھٹ جاتی ہے۔
کلکیریا کارب (Calcaria Carb): پبلی پیپ کے ساتھ سوزش ہوتی ہے۔ اعضاء سفید ہوتے ہیں نہ کہ سرخ۔ حشفہ میں کنکن اور جلن ہوتی ہے۔ آگہ ناسل کا گھونگھٹ سرخ اور سوزشی ہوتا ہے۔

کورایم (Corallium): دکھن ہوتی ہے جیسا کہ سونیاں چھوٹی جاری ہوں۔
ہیپرسلف (Hepar Sul): پیپ کو روکنے یا جاری کرنے کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔
نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid): اندرونی سطح کی سوزش اور اس کے کناروں کی سوزش جس کے ساتھ پیپ والے ناسور ہوتے ہیں جو کہ چھپنے ہوتے ہیں۔ ڈنگ لگنے جیسے اور پھاڑنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ شام ہوتے ہوتے ابتری ہو جاتی ہے اور تمام رات جاری رہتی ہے جس سے نیند میں خلل ہوتا ہے۔

اکونائٹ این (Aconite N): حشفہ اور گھونگھٹ میں ریگنے جیسے اور ڈنگ لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ گھونگھٹ سوجا ہوا اور سوزشی ہوتا ہے۔ پیشاب کرتے ہوئے حشفہ میں چکی بھرنے جیسا درد ہوتا ہے۔

ایشپس ایم (Apis M): تیز ڈنگ لگنے جیسے اور جلن دار دردوں کے ساتھ آگہ ناسل کی سوزش اور بہت زیادہ سوجن۔

آرنیکا ایم (Arnica M): میکانیکی زخم کے باعث سوزشی حالت، چمچ قدمی کے بعد ایستادگیاں ہوتی ہیں۔

کروٹن ٹنگ (Croton Tig): آرز قاسل کے گھونگھٹ کی اندرونی سطح کی سوزش جس کے ساتھ پیشاب کرتے وقت حشفہ میں جلن ہوتی ہے۔ نصیوں اور حشفہ پر کھا جانے والی خارش ہوتی ہے۔

کونیم (Conium): آرز قاسل کے گھونگھٹ کی سوزش جس کے ساتھ ڈنگ لگنے جیسے اور کانٹے والے درد ہوتے ہیں۔ پیشاب کرتے ہوئے آرز قاسل میں پھاڑنے والا درد ہوتا ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): عضو قاسل کے حشفہ اور گھونگھٹ کی سرخی اور سوجن جس کے ساتھ پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کی ٹالی میں جلن اور کنٹن ہوتی ہے۔

سٹائیرس (Cinnabaris): گھونگھٹ کی سوجن بہت زیادہ خارش کے ساتھ۔ گھونگھٹ پر سے ہوتے ہیں۔ جن کو چھونے سے خون بہتا ہے۔

خارش (گھونگھٹ کی) — Itching

سٹائیرس (Cinnabaris): یہ خارش کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔

اگنیٹیا (Ignatia): اندرونی سطح پر خارش ہو۔

کونیم (Conium): ہر جڈے پر پروسٹٹ والا اخراج ہونے کے ساتھ گھونگھٹ کی خارش۔

رشاکس، یوفوریم (Euphorbium Rhus Tox): ششمانی خارش، رات کے وقت اتری ہوتی ہے۔

وائیولائی آر (Viola Tr): سوجن کے ساتھ خارش ہوتی ہے۔

سرساپاریلا (Sarsaparilla): گھونگھٹ پر داد ہوتی ہے جس کے ساتھ ناقابل برداشت خارش اور اخراج ہوتا ہے۔ حشفہ سرخ اور سوزشی ہوتا ہے۔

گھونگھٹ کے پردہ کی تنگی

(Phimosis)

مرکیوریس آیوڈ (Mercurius Iod): یہ گھونگھٹ کے پردہ کی تنگی کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔

سلفر (Sulphur): متعفن پمپ خارج ہونے کے ساتھ بچوں میں گھونگھٹ کے پردہ کی تنگی لاحق ہو۔

ہیپیر سلف (Hepar Sulphr): پیپ خارج ہوتی ہے نیز چکن والا درد ہوتا ہے۔
 سلیبرس (Cinnabaris): پیپ کی طرح کا اخراج ہوتا ہے۔ پیپ متعفن ہوتی ہے۔ (آٹھک
 کا دوسرا مرحلہ) آٹھک کا گھونگھٹ سو جاتا ہے۔
 نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid): گھونگھٹ کے پردہ کی تنگی جس کے ساتھ سو جن ہوتی ہے اور
 آٹھکی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ گھونگھٹ کے پردہ کی تنگی کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔
 ایسٹک ایسڈ (Acetic Acid): گھونگھٹ موٹا ہو جاتا ہے۔ اس میں چیرے ہوتے ہیں وہ
 سوزشیں ملتا اور خوف زدہ کر دینے والی خارش ہوتی ہے۔
 مرکوریس (Mercurius): آٹھک کے باعث۔
 جاکارا انڈا (Jacaranda): گھونگھٹ کے پردہ کی تنگی جس کے ساتھ گھونگھٹ پر درد اور
 سو جاتا ہے۔
 اکونائٹ این 'ایپس ایم' پلاڈونا (Belladonna, Apis M, Aconite N): گھونگھٹ
 کے پردہ کی حاد سوزش 'دی گئی ترتیب کے مطابق ادویات استعمال کیجئے۔

سو جن (گھونگھٹ کی)

(Swelling)

گرافائٹس (Graphites): بڑا سا پانی والا چھلا ہوتا ہے جس کی سو جن ہوتی ہے اور درد
 نہیں ہوتا۔
 رشاکس (Rhus Tox): کمرے سرخ رنگ کی سو جن ہوتی ہے جس کے ساتھ درد اور جلن
 ہوتی ہے۔
 کیلڈیم (Caladium): کناروں کے ساتھ ساتھ سو جن ہوتی ہے۔
 مرک سول (Merc Sol): جلد خند کے اوپر کھینچی نہیں جا سکتی یعنی کھینچ نہیں سکتی۔
 پلاہٹ مائل سیز پیپ با افراط ہستی ہے۔ جب ایسا کرنے کی کوشش کی جائے۔

خیزش — (Priapism)

(دیکھئے "ابتداء گمیاں")

پروٹیٹ — (Prostate)

سرطان (پروٹیٹ کا) — (Cancer)

کروٹیلز ایچ (Crotalus H): سیلان خون کے ساتھ سرطان لاحق ہو۔

اخراج — (Discharge)

کونیئم (Conium): گھونگھٹ کی خارش کے ساتھ ہر جذبے پر اخراج ہوتا ہے۔
گلس وامیکا، سیپیا، سلینیم (Selenium, Sepia, Nux Vomica): پاخانے کے دوران اخراج ہو جاتا ہے۔

کالی بانٹیکرام (Kali Bich): پروٹیٹ کی مزمن سوزش میں پاخانے کے دوران اخراج ہو۔
سلیشیا (Silicea): جب پاخانے پر زور لگایا جا رہا ہو۔

نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): پاخانے کے بعد اخراج ہوتا ہے۔
تھوجا (Thuja): جب اخراج سبزی مائل اور گاڑھا ہوتا ہے۔
سٹیفیسیا (Staphisagria): پروٹیٹ والا اخراج جنسی بے اعتدالیوں کے بعد لاحق ہوتا ہے۔

بڑھ جانا (پروٹیٹ غدود کا)

Enlargement

اکونائٹ، ہلاڈونا (Aconite, Belladonna): سوزش کے ابتدائی مرحلے کے لئے یہ موزوں ادویات ہیں۔

سپونجیا (Spongia): جب پیشاب کی دھار چھوٹی ہوتی ہے۔ جو کہ بھاگ دار ہوتی ہے اور خیموں کی سوجن اور مادہ متویہ والی نالی میں سوجن ہوتی ہے۔ اس وقت یہ دوا موزوں ہوتی ہے۔

ہیرش کارب (Baryta Carb): ضعیف لوگوں میں پروٹیٹ غدود کا بڑھ جانا۔

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): جب زخموں کے باعث پروٹیٹ غدود بڑھ جائے۔ زخموں والے کیسوں میں یہ احساس ہوتا ہے جیسے خراشیں ڈالی گئی ہوں 'پٹا گیا ہو۔ سن ہو جانے کے ساتھ جھنجھٹا ہوتی ہے۔

تھوجا (Thuja): سوزاک کے باعث 'حاد سوزش لاحق ہوتی ہے۔

اوسی میم کین (Ocimum Can): پیشاب میں خون آتا ہے۔ پروٹیٹ غدود کی تکالیف کے ساتھ یا پروٹیٹ والی بواسیر کے ساتھ۔

کونیم (Conium): پروٹیٹ غدود بڑھ جاتا ہے۔ یہ چوٹی کی دوا ہے۔

سبل سیر (Sabal Ser): مزمن یا حاد طور پر پروٹیٹ غدود کا بڑھ جانا جس کے ساتھ پیشاب کرنے میں دقت ہوتی ہے یا پیشاب کرتے ہوئے جلن ہوتی ہے۔

کینابیس انڈیکا (Cannabis Ind): مقعد کے علاقہ میں یہ احساس ہوتا ہے جیسے مریض ایک گیند پر بیٹھا ہو۔

فاسفورس (Phosphorus): مزمن ہائپر ٹرائی جس کے ساتھ پرائیٹ والا اخراج ہوتا ہے۔ سولی ڈیگو (Solidago): مزمن طور پر پروٹیٹ غدود کے بڑھ جانے میں 2x ڈالی لیڈن دیتے۔

سٹیفنی سیکریا (Staphisagria): پیشاب کرنے کی مسلسل حاجت ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ کم مقدار میں پیشاب خارج ہوتا ہے۔ جو کہ پتلی دھار کی صورت میں ہوتا ہے یا قطروں کی صورت میں ہوتا ہے۔ پیشاب کرنے کے دوران اور پیشاب کرنے کے بعد جلن ہوتی ہے اور پیشاب کی حاجت رہتی ہے جیسا کہ مثلاً ابھی خالی نہ ہوا ہو۔

پیریرا (Pereira): پروٹیٹ کا بڑھ جانا پیشاب کی بندش کے ساتھ لاحق ہو۔

آئیوڈیم (Iodium): خنازیری اور تپ دق والے اشخاص میں پروٹیٹ کی سوزش۔

مرک آئیوڈ (Merc Iod): جب پروٹیٹ میں پیپ پڑ گئی ہو تو ایسے کیسوں میں یہ دوا دی جاتی ہے۔

ڈیجی ٹالس (Digitalis): پروٹیٹ غدود کا بڑھ جانا لاحق ہوتا ہے۔ دل کی تکالیف کے ساتھ 'پیشاب کی بندش لاحق ہو جاتی ہے یا پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے۔ جس کے ساتھ پرائیٹ بڑھ جاتا ہے۔ پیشاب کے دب جانے کے ساتھ استقاء لاحق ہو۔ جریان رات کا احکام۔

ورم خصبہ — Sarcocoele

(دیکھئے "خصبوں کی سوزش")

بڑھی ہوئی خواہش جماع Satyriasis

(دیکھئے "خواہش" بڑھی ہوئی "نیز" جنسی جنون")

مادہ منویہ کا اخراج

Seminal Emissions

(Spermatorrhoea and Pollution)

ایسڈ فاس (Acid Phos): مادہ منویہ کے اخراج کے بعد بہت زیادہ کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ ریزہ میں جلن کے ساتھ ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اعضاءے نکاسل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور خصبے پلپے ہو جاتے ہیں۔ آئر نکاسل میں ایلتادگی کی طاقت نہیں رہتی۔ ایلتادگیوں نامکمل ہوتی ہیں۔ مجامعت کے دوران مادہ منویہ بہت جلد خارج ہو جاتا ہے۔ اچانک آئر نکاسل کا ڈھیلا پڑ جانا اخراج کو روک دیتا ہے۔ لذت کے ساتھ یا لذت کے بغیر انزال۔

سلینینم (Selenium): مادہ منویہ کے اخراج کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ یہ تقریباً 95 فیصد کیسوں کو درست کر دیتی ہے۔ اخراج بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ سفی بہت دیر تک رہتی ہے۔

کالی برومیم ڈیجی ٹیلس (Digitalis, Kali Brom): دونوں دوائیں نامناسب تواتر کے ساتھ مادہ منویہ کے اخراج کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ڈیجی ٹیلس مادہ منویہ کے اخراج کے ساتھ دل کی دھڑکن کی نشاندہی کرتی ہے۔

پیکریک ایسڈ (Picric Acid): خوفناک ایلتادگیوں اور بہت زیادہ خواہش کے ساتھ مادہ منویہ کا اخراج ہوتا ہے۔

سلیشیا (Silicea): پاخانہ کرتے وقت منی ضائع ہو جاتی ہے جبکہ پاخانہ بڑا ہو اور مشکل سے خارج ہو۔

کاسٹیکم (Causticum): جب مادہ منویہ کا اخراج خون والا ہو۔

سلفر (Sulphur): ایلتادگی مکمل ہونے سے پہلے ہی اخراج ہو جائے۔

گرافائٹس (Graphites): مادہ منویہ کے اخراج کی غیر موجودگی۔

کلییریا کارب (Calcareo Carb): مادہ منویہ کا اخراج ست ہوتا ہے جس کے ساتھ جلن دار اور ڈنگ لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ ہر مرتبہ مجامعت کے بعد یا مادہ منویہ کے اخراج کے بعد رات کے پینے آتے ہیں جس کے بعد دماغ اور جسم کی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ مادہ منویہ بہت دیر سے خارج ہوتا ہے۔

سپیا (Sepia): کافی ایٹادگیوں کے ساتھ مادہ منویہ کا اخراج۔

کاربوووج (Carbo Veg): مادہ منویہ بہت جلد خارج ہو جاتا ہے اور پھر سر میں گر جن ہوتی ہے۔

لائسی سین (Lyssin): مادہ منویہ بہت دیر سے خارج ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا۔

فارمیکا (Formica): مادہ منویہ بہت کم خارج ہوتا ہے جس کے ساتھ ایٹادگیاں نامکمل ہوتی ہیں۔

کونیئم (Conium): معمولی سا جذبہ بھی مادہ منویہ کے اخراج کا باعث بن جاتا ہے۔ مریض عورتوں کی موجودگی میں بہت جلد پر جوش ہو جاتا ہے اور منی خارج ہو جاتی ہے۔

چائنا (China): مادہ منویہ کے اخراج سے کمزوری ہو جاتی ہے۔

جیلسمیم (Gelsemium): غیر ارادی طور پر رات کے وقت بغیر کسی خواب کے مادہ منویہ خارج ہو جاتا ہے۔ معمولی سے جوش کے باعث یا تھکاوٹ کے باعث مادہ منویہ خارج ہو جاتا ہے۔

سٹانم (Stann): اعتدال سے بڑھی ہوئی نقامت کے ساتھ مادہ منویہ کا اخراج۔ جماع کی لذت بڑی آسانی سے پیدا ہو جاتی ہے حتیٰ کہ بازو کو کھجلائے سے بھی۔

نکس وامیکا (Nux Vomica): جماع کی لذت کے بغیر رات کے وقت غیر ارادی طور پر مادہ منویہ تواتر کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ مریض کو درد سر لاحق ہو جاتا ہے۔ خصوصاً صبح ہونے کے قریب، کمر درد ہوتا ہے۔

ڈیجی ٹیلس (Digitalis): مریض کو جگائے بغیر گہری نیند میں مادہ منویہ خارج ہو جاتا ہے۔

پرسیکا (Persica): ایٹادگی کے بغیر پاخانہ کرنے کے دوران منی خارج ہو جاتی ہے۔

ایٹک ایسڈ (Acetic Acid): کمزور کر دینے والا مادہ منویہ کا اخراج 'پاخانہ کرتے وقت منی خارج ہو جاتی ہے۔

اکونائٹ کیم (Aconite Cam): شہوانی خوابوں کے بغیر احتلام ہو جائے۔

کالی بروم (Kali Brom): مادہ منویہ کا متواتر اخراج 'طبیعت دلی دلی ہوتی ہے۔ سوچ مدہم

ہوتی ہے۔ کمر میں درد ہوتا ہے۔ چال میں لڑکھاہٹ ہوتی ہے اور بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے۔ جماع کی لذت کے ساتھ یا جماع کی لذت کے بغیر بھی یہ کیفیت ہو سکتی ہے۔

زنکم میٹ (Zincum Met): افسردگی اور ناامیدی کے ساتھ عضو تناسل کا بہت زیادہ غلط استعمال، پیلاہٹا ہوا چہرہ، جس کے ساتھ آنکھوں کے گرد نیلے حلقے ہوتے ہیں۔

کینتھریس (Cantharis): شدید قسم کی ایتادگی کے ساتھ مادہ منویہ کا اخراج۔

کیلیدیئم (Caladium): جنسی بے اعتدالیوں کے بد اثرات کے باعث مادہ منویہ کا اخراج جبکہ شہوت یا کسی جنسی جوش وغیرہ کے بغیر خوابوں میں انزال ہو جائے۔ بغیر خوابوں کے یا بغیر جنسی خوابوں کے ساتھ رات کے وقت اخراج ہو جاتا ہے۔ یہ دوا جلق اور اس کے اثرات کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ عضو تناسل کا حشد پلپا ہو جاتا ہے۔

اگنس کاسٹس (Agnus Castus): پرانے گناہ گاروں میں مادہ منویہ کا اخراج۔ اعضاء ٹھنڈے اور ڈھیلے ہوتے ہیں۔ جنسی بھوک نہیں ہوتی اور مریض مالتھولیا کا شکار ہوتا ہے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): مکمل نامردی میں مادہ منویہ کا اخراج۔ جب کہ ایتادگیوں یا تو موجود نہیں ہوتیں یا نامکمل ہوتی ہیں۔ اعضاء تناسل ٹھنڈے اور مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں۔

ٹائی ٹینیم (Titanium): جماع میں بہت جلد انزال ہو جاتا ہے۔ جنسی کمزوری لاحق ہوتی ہے۔

سٹیفنی سگریا (Staphisagria): جلق کی وجہ سے بہت زیادہ نفاہت کے باعث مادہ منویہ کا اخراج۔ آنکھوں کے گرد گہرے نیلے حلقے ہوتے ہیں۔ چہرہ زرد ہوتا ہے۔ چڑچاہٹ اور شرمیلا پن بہت نمایاں ہوتا ہے۔

ڈائیوسکوریہ (Dioscorea): طاقتی کے ساتھ مادہ منویہ کا اخراج، عضو تناسل اتنا ڈھیلہ ہوتا ہے کہ ایک ہی رات میں خوابوں کے ساتھ دو یا تین مرتبہ مادہ منویہ خارج ہو جاتا ہے۔ جس کے بعد کمزوری ہو جاتی ہے۔ خصوصاً گھٹنوں میں۔

اوسمیم (Osmium): مادہ منویہ کا بہت زیادہ اور مسلسل طویل تر اخراج۔

اوسٹیلگو (Ustilago): شہوانی تصورات اور پر شہوت خوابوں کے ساتھ مادہ منویہ کا اخراج۔

ٹیرنٹولا ایچ (Tarentula H): خون آلود منی جلن اور حرارت کے ساتھ خارج ہوتی ہے۔

ایرین جیم اے کیو (Eryngium Aq): منی کے اخراج کے لئے یہ ایک چوٹی کی دوا ہے۔

اخراج ایتادگیوں کے ساتھ یا ایتادگیوں کے بغیر ہوتا ہے۔ 2x طاقت کی دوا دیتے ہیں۔

فیرم بروم (Ferrum Brom): خون کی کمی کے ساتھ مادہ منویہ کا اخراج۔

جنسی — Sexual

(دیکھئے "مجامعت")

خصیے — Testicles

لاغرگی (خصیوں کی) — Atrophy

اورم میٹ (Aurum Met): لاغرگی لڑکوں میں کم حوصلگی اور سن ہو جانے کی کیفیت کے ساتھ۔

کیپسکیم (Capsicum): نامردی میں لاغرگی لاحق ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ خصیوں کی ٹھنڈک بھی ہوتی ہے اور خصیوں کی لاغرگی کا رجحان ہوتا ہے۔

آئیوڈیم (Iodum): خصیوں کا سٹاک، خواہوں کے ساتھ مٹی کا برہ، ٹھنڈا، نامردی۔
کاربو انیمالس (Carbo Animalis): جلن دار بھالے لگنے جیسے اور کائے جیسے دردوں کے ساتھ غدہ سخت ہو جاتا اور بچہ درد ہوتا ہے۔

کونیئم (Conium): جلن دار اور کائے والے دردوں کے ساتھ خصیے پتھر کی طرح سخت ہوتے ہیں۔

اپیس ایم (Apis M): دیگر اعضاء میں استقامت کے ساتھ ڈنگ لگنے جیسا درد ہوتا ہے۔ خارش اور سرخی کے ساتھ خصیوں کا استقامت۔

کالی آئیوڈ (Kali Iod): خصیوں کی عمومی کمزوری، دایاں خصیہ غالب ہو جاتا ہے۔
ایوینا سیٹوا (Avena Sat): بہت زیادہ جنسی مشغولی کے بعد نامردی کے ساتھ مادہ منویہ کا اخراج۔

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): گھونسا لگنے یا کوئی دوسرا زخم یا پوٹ لگنے کے یا مٹ خراش دار درد کے ساتھ لاغرگی ہوتی ہے۔ جامنی سرخ سوجن ہوتی ہے۔

روڈوڈنڈرون (Rhododendron): چھوٹے سے حساسیت ہوتی ہے۔ مطلوب موسم میں ابتری ہوتی ہے اور حرکت سے بہتری ہوتی ہے۔

گلگیر یا کارب، سلیشیا، سلفر (Sulphur, Silicea, Calcarea Carb): جب متدرج بالا ادویات ناکام ہو جائیں تو دی گئی ترتیب کے مطابق یہ دوائیں آزمائی جاسکتی ہیں۔

سرطان (خصیوں کا) — Cancer

آرسینک الیم (Arsenic Alb): جب مریض درد یا کسی اور وجہ سے سبے ہمیں ہو جائے۔ پھوسٹے وقفوں کے ساتھ پانی کی تھوڑی تھوڑی مقدار کی پیاس ہوئی ہے۔ IM ذاتی یوشن دن میں تین مرتبہ دیجئے۔ یہاں تک کہ افادہ شروع ہو جائے پھر اس دوا کو لمبے وقفوں کے ساتھ دینا چاہئے۔

کونیم (Conium): یہ کینسر کے لئے ایک عمدہ دوا ہے اسے بھی آرسینک الیم ہی کے طرز پر دینا چاہئے۔

سکرینم (Scirrhinum): یہ ایک نوسوڈ ہے۔ جسے عمل انگیز دوا کے طور پر دیا جائے۔ خوراک 200 طاقت کی یا IM طاقت کی دی جائے۔ جس دن یہ دوا استعمال کی جائے۔ اس دن کوئی دوسری دوا نہ دی جائے۔

اعصابی درد (خصیوں کا) — Neuralgia

اگنیشیا (Ignatea): جب جنسی نقطہ کاریوں کے باعث اعصابی درد لاحق ہو۔ ہیمامیلس (Hamamelis): اعضاء کی غیر معمولی حساسیت اور حرارت کے ساتھ اعصابی درد لاحق ہوتا ہے۔

اورم میٹ (Aurum Met): سخت قسم کے اگاؤ کے ساتھ اعصابی درد ہوتا ہے۔ مگنیشیا فاس، کولوسٹھ (Coliocynth, Magnesia Phos): جب اعصابی درد کی وجہ معلوم نہ ہو۔

خصیوں کی سوزش — Orchitis

(Inflammation of Testicles & Hydrocele)

(نیز دیکھئے ”خپئے“ کے ذیل میں ”تپ دق“)

براہمیونیا (Bryonia): جب پیدائشی طور پر خصیوں میں پانی بھرا ہوا ہو۔ ایبروٹانم (Abrotanum): بچوں کے خصیوں میں پانی بھرا ہوتا ہے اور جب روڈوڈنڈرن تکام ہو جائے تو یہ دوا دی جائے۔

اورم سلف (Aurum Sulph): بچوں کے خصیوں میں پانی بھرا ہوتا ہے۔ خپئے سخت ہو جاتے ہیں۔ عضو قاسل کے مشق کی سوزش آؤ قاسل کے نامور خپئے سوجے ہوتے ہیں۔

خصوصاً دائیں جانب والا خصیہ۔

مرکیوریس (Mercurius): یہ دوا سوزاک کے بدترین نکسوں میں دینی چاہئے جبکہ سوزاک دبا ہوا ہو لیکن سوزاک کے دب جانے سے پہلے پیپ والا سبز رنگ کا مادہ خارج ہوتا ہو۔ دائیں جانب کے خصیوں کی سوزش جس کے ساتھ شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔ جو پھیل کر چیت اور ناگوں تک چلا جاتا ہے۔ خصیے سرخ اور پٹیلے ہوتے ہیں۔

پلسائیل (Pulsatilla): اگر مرکیوریس ناکام ہو جائے تو اس دوا کو آزمانا چاہئے۔ خصیوں کی سوجن کے ساتھ یا سوجن کے بغیر جن اور دکھن ہوتی ہے۔ پیشاب کی ٹالی میں ٹھنچا ہوتا ہے اور گرمے رنگ کے خون کا اخراج ہوتا ہے۔ آنکھوں کی سوزش کا نشان ہوتا ہے۔ ٹھنچا لاحق ہوتا ہے جس کے ساتھ درد ایک جگہ سے دوسرے میں تیزی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ دائیں یا بائیں خصیے میں سوجن ہوتی ہے 'جاڑا لگتا ہے۔ بھوک اور پیاس کھو جاتی ہے۔ اس دوا کے استعمال کے بعد پیلاہٹ ماکل سبز رنگ کا مواد خارج ہوتا ہے۔ خصیوں میں پانی بھر جانے کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔

اورم میٹ (Aurum Met): خصیوں کی پر گوشت سوجن * خصیوں کا گوشت بھرا چھوڑا جو کہ مزمن قسم کا ہوتا ہے۔

آئیوڈیم (Iodidum): خصیے سخت اور سوسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اعضائے ناسل کا بدبودار پھیلتا ہے۔

گرافائٹس (Graphites): خصیوں کی استسقامی سوجن۔

اپیس مل (Apis Mel): خصیوں کی اور پے اسٹیٹ کی پر درد سوجن۔

تھوجا (Thuja): سوزاک کے باعث نیز انجیر جیسے مسوں اور گو مزوں کے باعث خصیوں کی سوزش کے عود کر آنے والے حملے۔

کلیٹس (Clematis): خصیوں کی سوزش کے لئے یہ دوسری دوا ہے جبکہ سوزش سوزاک کے دب جانے کے باعث لاحق ہو۔ پلسائیل کے ناکام ہو جانے کے بعد اسے آزمایا جائے۔ ان دونوں ادویات میں گرم چیزیں لگانے سے درد میں بہتری ہوتی ہے۔

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): جب خصیوں کی سوزش چوٹ لگنے کے باعث ہو اور اس کے ساتھ دکھن بھی ہو۔

کونیم (Conium): خصیے بڑے ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ خصوصاً چوٹوں کے لگنے کے نتیجے میں۔

روڈوڈنڈرون (Rhododendron): اس احساس کے ساتھ خصیوں کی سوزش لاحق ہوتی ہے

کہ جیسے خضیوں کو پھل دیا گیا ہو۔ کھینچنے والا درد خضیوں میں ہوتا ہے جو پھیل کر رانوں اور پیٹ تک چلا جاتا ہے۔ خصوصاً دائیں جانب پھونے سے حساسیت ہوتی ہے۔ دکھن ہوتی ہے۔ پانی بھرا ہوتا ہے۔ مرطوب موسم میں اتھری ہوتی ہے اور حرکت سے بہتری ہوتی ہے۔

سپونجیا (Spongia): خضیوں کی سوزش جو کہ سوزاک کے دب جانے کے باعث لاحق ہو

بتدریج سختی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

اولیم انیل (Oleum Animale): خضیوں کا اعصابی درد نیز مادہ منویہ کی نالی کا اعصابی درد لاحق ہوتا ہے۔

آگزالیک ایسڈ (Oxalic Acid): منی کی نالی کا اعصابی درد۔

خضیوں کا چڑھ جانا — (Undescended)

اورم میور نیٹروناتم (Aurum Mur Natronatum): خضیے اوپر کو چڑھ جاتے ہیں جب تک کے لڑکیوں جیسا رویہ ظاہر کریں۔ ظاہری حالت اور جسمانی ہیئت لڑکیوں جیسی ہو۔ اوربٹ سوڈی کلورائیڈ کا 1x محلول کشیدہ کئے ہوئے پانی میں ملا کر ایک قطرے کی ایک نوراک دیجئے۔ دوا صبح شام روزانہ 2 مرتبہ دی جائے۔ اس دوا کا ہومیوپیتھک نام اورم میور نیٹروناتم ہے یہ پہلی طاقت میں دی جاسکتی ہے۔

تپ دق (خضیوں کا) — Tuberculosis

سپونجیا (Spongia): عادً مزمن یا تپ دق والی خضیوں کی سوزش۔ خضیے بھوار سو جے ہوئے اور سوزش ہوتے ہیں۔ جن کے ساتھ اختناق والا دکھن والا اور تپکن والا درد ہوتا ہے۔ منی کی نالی میں اوپر کی جانب گولی سی لگتی ہے۔

اورم میٹ (Aurum Met): خضیوں کی سوزش مزمن یا تپ دق والی ہوتی ہے۔ اعصابی درد ہوتا ہے۔ شدید درد کے ساتھ خضیے سو جے ہوئے ہوتے ہیں۔ خصوصاً رات کے وقت خضیے لاغری کے نقطہ پر ہوتے ہیں۔ خضیوں میں پانی بھرا ہوتا ہے۔ کم جوصلگی ہوتی ہے۔ مردگی ہوتی ہے۔ یادداشت کھو جاتی ہے۔ نالی میں اعصابی درد ہوتا ہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): کھٹنے والے دبانے والے اور خراش دار درد۔ خنازیری مریضوں کے خضیوں میں ہوتے ہیں۔

مرکب بن آئیوڈ (Merc Bin Iod): آتشکی خضیوں کی سوزش منی کی نالی کی حساسیت کے ساتھ۔

سلیشیا (Silicea): خضیوں کا فیل پاؤں والا درد، خضیوں میں پانی بھرا ہوتا ہے۔ خضیے دکھتے ہیں اور تر ہوتے ہیں۔ خضیوں میں رنگین والا درد ہوتا ہے۔ خضیوں میں پدپ پڑ جاتی ہے اور ہرنیا ہو جاتا ہے۔

سلفر (Sulphur): خضیے اکیلے پڑ جاتے ہیں اور نیچے کو لٹک جاتے ہیں۔ خضیوں میں تری ہوتی ہے۔ دباؤ اور کھنچاؤ منی کی ٹالی میں ہوتا ہے۔

خضیوں کی رگوں کا پھول جانا

(Varicocele)

ہیما میلین (Hamamelis): خضیوں کی رگوں کے پھول جانے کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ خضیے منی کی ٹالی میں کھینچنے والے درد کے ساتھ سوج جاتے ہیں۔ اعضاء بہت زیادہ اکیلے پڑ جاتے ہیں اور ان پر لچینہ آتا ہے۔ کھینچنے والا درد خضیوں سے پیٹ تک جاتا ہے۔

لیکسیس (Lachesis): جب وریدوں کا رنگ نیلا پڑ جائے اور اس کے ساتھ ذہنی دباؤ یا افسردگی بھی ہو۔

پلساٹیل (Pulsatilla): وریدیں نیلی ہو جاتی ہیں۔ جس کے ساتھ منی والی ٹالی میں کھینچنے والا درد ہوتا ہے۔ جو کہ سوجی ہوئی اور پردرد ہوتی ہے۔

امونیا میور (Ammonia Mur): منی والی دائیں ٹالی میں ٹانگے لگنے اور کانٹے والے درد ہوتے ہیں۔ اس میں کئی علامات کھانسی کے ساتھ ہوتی ہیں۔

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): منی والی ٹالی درد کے ساتھ سستی ہوتی ہے۔ پیٹ میں ٹانگے سے لگتے ہیں۔ زخموں والی تکلیف۔

بیلادونا (Belladonna): پھاڑنے والا درد اوپر کی جانب سفر کرتا ہے۔ شام کے وقت یا بستر میں اتری ہوتی ہے۔

چائنا آف (China off): مادہ منویہ کی ٹالی اور خضیوں میں پردرد سوجن ہوتی ہے۔ بائیں خضیے میں نیز بائیں جانب کے گھونگھٹ میں بھی پھاڑنے والا درد ہوتا ہے۔ تکلیف آسانی سے ہو جاتی ہے۔ درد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔

کلیمٹس (Clematis): مادہ منویہ کی دائیں ٹالی حساس ہوتی ہے۔ خضیے اوپر کو کھینچ جاتے ہیں۔ خضیوں میں درد ہوتا ہے۔ مادہ منویہ والی ٹالی میں کھینچن ہوتی ہے۔

کالی کارب (Kali Carb): خضیوں میں اور مادہ منویہ والی ٹالی میں سوجن ہوتی ہے۔ خضیوں میں خراش ہوتی ہے۔ خضیے اور آلتے کا سل بائیں جانب کھینچتے ہیں۔ کانٹے والے درد اس دوا کی

بنیادی علامت ہیں۔

سٹیفیسیا (Staphisagria): مٹی والی ٹالی میں گولی لگنے جیسے اور کھینچنے والے درد ہوتے ہیں۔ غصے، غم، اداسی، افسردگی، پریشانی اور جذبات کے مجروح ہو جانے کے باعث تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رطوبات کے ضائع ہو جانے کے باعث، جلق کے باعث، جنسی بے اعتدالیوں کے باعث، متاثرہ حصوں کو پھونکے کے باعث، تمباکو کے باعث، پارت کے غلط استعمال کے باعث۔

سلفر (Sulphur): خضیوں اور مادہ متوسیہ والی ٹالی میں دباؤ اور کھینچاؤ ہوتا ہے۔ خضیے ڈھیلے ہو کر نیچے کو لٹک جاتے ہیں۔ جس کے ساتھ دکھن ہوتی ہے اور خضیوں والی تھیلی غم آلود ہوتی ہے۔

حصہ سوم — زنانہ

سرطان — Cancer

(دیکھئے "رسولی")

موقونی حیض — Climacteric

(Change of Life or Menopause)

سلفر (Sulphur): تھکاوٹ ہوتی ہے۔ وزن کم ہو جاتا ہے۔ جلد کھردری ہوتی ہے اور گندی نظر آنے کی طرف راغب ہوتی ہے۔ ارد گرد کی ہر چیز گندی ہوتی ہے اور ناقابل وضاحت حد تک بے ترتیب۔ جب دیگر تمام اچھی منتخب شدہ ادویات مکمل شفا دینے میں ناکام ہو جائیں تو اس دوا کو عمل انگیز دوا کے طور پر استعمال کرنا چاہئے۔

کیمفر (Camphor): گرم کمرے میں گرمی اور پسینے کا زور ہوتا ہے۔ بازو اور ٹانگیں اور چیٹ بہت سرد ہوتا ہے اور جب بہت زیادہ پسینہ آیا ہو تو کپڑے اتارنے سے مریض کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): مزاج چڑچڑا ہوتا ہے جو کہ بدلتا رہتا ہے۔ بند اور گرم کمرے میں گرم پسینے آتے ہیں۔ مریض روئے بغیر اپنی علامات نہیں بتا سکتی۔

اکٹیارلیس موسا (Actea Racemosa): سر میں شدید درد ہوتا ہے جیسا کہ چوٹی سے سر کٹا ہوا ہو۔ کمر اور گردن کے عضلات میں دکھن ہوتی ہے۔ گھٹیا لاحق ہو یا گھٹیا کارہنجان ہو۔

لکسیس (Lachesis): موقونی حیض کے زمانہ کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ سر کے پچھلے حصہ

میں شدید درد ہوتا ہے اور سر کے اگلے حصے تک آتا ہے۔ چھوٹے سے بہت زیادہ حساسیت ہوتی ہے۔ دل کی دھڑکن پریشان کن ہوتی ہے اور بدن میں تنگی ہوتی ہے۔ گہرے رنگ کا سیلان خون ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ مریض حیران کن حد تک باتونی ہوتی ہے۔ جلن کا احساس ہوتا ہے جیسا کہ جسم پر جلتا ہوا کوئلہ رکھ دیا گیا ہو۔ تھمتھاہٹ ہوتی ہے۔ مریض بالستولیائی اور چڑچی ہوتی ہے۔ بے ہوشی کے دورے ہوتے ہیں۔ جریان خون ہوتا ہے۔

گلوٹائین (Glutamine) دھڑکن متلاطم ہوتی ہے۔ سر میں ہتھوڑے لگتے ہیں۔ گرم کمرے میں اور سورج کی حرارت میں اتھری ہوتی ہے۔ مریض بستر میں نہیں لیٹ سکتی۔ پیاز پر چڑھتے ہوئے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb) چلی، پیلی، ست اور ٹھنڈی مریضوں کے لئے جو اعتدال سے زیادہ کام کرنے کے باعث تھک چکی ہوں۔ سلفر کی طرح یہ دوا بھی ٹھل انگلیز دوا کے طور پر استعمال ہونی چاہئے۔

نکس وامیکا (Nux Vom) حساس مستورات میں افراط کے ساتھ سیلان خون ہوتا ہے۔ جو کہ چڑچی اور جھگڑالو ہوتی ہیں۔ وہ بہت جلد ناراض ہو جاتی ہیں۔ اس دوا کو صرف اسی صورت میں استعمال کرنا چاہئے۔ جب یہ تمام علامات نظام ہضم کی تکلیف کے ساتھ لاحق ہوں۔ سپیٹا (Sepia) رحم کے خروج کے ساتھ سیلان خون ہوتا ہے۔ نیچے کو دبانے والے درد ہوتے ہیں۔ مریض جسمانی طور پر لمبی اور دلی ہوتی ہے اور جلدی سے افسردہ ہو جاتی ہے۔ مریض ٹھنڈی، چلی اور کینہ پرور ہوتی ہے۔ تکلیفات سے تھک ہوئی ہوتی ہے۔ ہمدردی کو ناپسند کرتی ہے۔ بد ہضمی یا قبض کے ساتھ لیکوریا ہوتا ہے۔ اچانک حدت والی تھمتھاہٹ ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ پینہ آتا ہے اور کمزوری ہوتی ہے اور بے ہوشی کا ارتکان ہوتا ہے۔

سینگوئی نیریا (Sanguinaria) لیکوریا خراش دار متعفن ہوتا ہے۔ حیض کے ختم ہو جانے کے بعد مسلسل جاری رہتا ہے۔

پلاٹینا (Platina) بیض دان میں درد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ اعتدال سے زیادہ خون جاری ہوتا ہے۔

سبنا (Sabina) چمک دار سرخ رنگ کا خون جاری ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ شدید قسم کے درد پیڑ سے ناف کے اگلے سرے تک مار کرتے ہیں۔

کروکس (Crocus) گہرے رنگ کے لوتھڑوں کے ساتھ ہسٹریائی مستورات میں سیلان خون پینٹ کے نچلے حصہ میں وزن کے احساس کے ساتھ۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مریض کو بچہ پیدا کرنا ہو۔

بیسی لینم (Bacillinum): چہرے کا بائیں جانب کا اعصابی درد، بستر میں جانے کے وقت اتھری ہوتی ہے۔

میڈورنٹیم (Medorrhinum): نیلے لگوانے کے باعث لیکوریا کے دب جانے کے بعد چہرے کا اعصابی درد، تیزابیت، زبان کے طبع، کندے ڈالتے اور کندے تنفس کے ساتھ صبح کے وقت چھوٹی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ زبان اتنی گندنی ہوتی ہے کہ صاف ہونے کے قابل نہیں ہوتی۔ کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ پیٹا ہٹ ہوتی ہے۔ جازا ہوتا ہے، ٹھنڈے مرطوب موسم سے اتھری ہوتی ہے۔

بیلِس پیر (Bellis Per): موقوفی حیض کے دوران دریدیں پھول جاتی ہیں۔
فریکسیس آیم (Fraxinus Am): رحم کی کمزوری کی حالت کے ساتھ زندگی میں تبدیلی آنے کے وقت (یعنی موقوفی حیض کے وقت) دماغی امراض میں یہ دوا مفید ہوتی ہے۔
ٹریلیم (Trillium): حد اعتدال سے بڑھی ہوئی کمزوری کے باعث سلطان خون لاحق ہوتا ہے۔
کامفور (Camphor): گرم کمرے میں گرمی اور پیٹنے کا زور ہوتا ہے۔ بازو اور ٹانگیں اور پیٹ بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ باافراط پینہ آنے پر جب کہ جسم کپڑوں سے ڈھکا ہوتا ہے، اگر جسم نکال کر دیا جائے تو مریض کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے۔
اوپورنیم (Oophorinum): ماسوں اور دیگر موقوفی حیض کی جلدی خرابیوں کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔

مجامعت — Coition

مجامعت کے دوران و بعد کے امراض

(Ailments During and After)

سپیا (Sepia): مجامعت سے نفرت اور اندام نسانی کی خشکی کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے اور اسے سب سے پہلے آزمانا چاہئے۔ قبض کے ساتھ لیکوریا ہوتا ہے۔
نیٹرم میور (Natrum): بے زاری کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ یہ دوا کئی خون دانی مستورات کی نشاندہی کرتی ہے۔ جن کی جلد خشک اور متہ خشک ہوتا ہے۔ پرورد جماع کے ساتھ اندام نسانی کی خشکی۔
ہائیڈراستس (Hydrastis): مجامعت کے خیال کو بھی برداشت نہ کر سکے۔ لیکوریا کے دوران مریض اتھرتی ہے۔ لیکوریا انڈے کی سفیدی کی طرح کا ہوتا ہے۔

امبر اگریشیا (Ambra Gr): جماعت کے دوران دمہ لاحق ہوتا ہے۔
 کریو زوت (Kreosote): جماعت کے دوران اور جماعت کے بعد اندام نسائی میں جلن،
 شدید سختی اور خراش ہوتی ہے۔ جماعت کے بعد خون جاری ہو جاتا ہے۔
 سٹاپیاریا (Stapiaria): جماع کے آخر تک پچھتے پچھتے نفسی لاحق ہو جاتی ہے۔ رحم
 کا سرطان ہوتا ہے۔ شادی شدہ زندگی کے ابتدائی ایام میں مستورات میں پرورد جماعت۔
 گرافٹائٹس (Graphites): جماعت سے نفرت ہوتی ہے۔ بیضہ دان بڑے اور سخت ہو
 جاتے ہیں۔ رحم اور بیضہ دان کی نری۔
 کیکٹس (Cactus): جماعت کے دوران اندام نسائی کی سکون۔
 برومیم (Bromium): جماعت کے دوران جذباتی لہر (یعنی لذت) کی غیر موجودگی۔
 پلساتیلہ (Pulsatilla): جماعت کے دوران رحم کو چھونے سے حساسیت ہوتی ہے۔
 فیرم میٹ (Ferrum Met): جماعت کے دوران اندام نسائی میں دکھن اور کٹھن ہوتی ہے۔
 پلائٹینا (Platina): جماعت کے دوران فرج میں درد کے ساتھ حساسیت ہوتی ہے۔
 فاسفورس (Phos): جماعت کے دوران اندام نسائی میں حساسیت نہیں ہوتی۔
 لائیو پوڈیم (Lycopodium): جماعت کے دوران اور جماعت کے بعد اندام نسائی میں
 شدید قسم کی جلن ہوتی ہے۔ اندام نسائی کی ضدی قسم کی خشکی۔ جاگھ میں نیچے کی جانب دباؤ
 ہوتا ہے جیسے کہ حیض شروع ہو جائیں گے۔
 سیڈرون (Cedron): جماعت کے بعد مستورات میں ہکلاہٹ۔
 امبر اگریشیا (Ambra Grisea): جماعت کی کوشش کرنے پر دمہ لاحق ہو جائے۔

لطف - غیر موجود (Enjoyment - Absent)

بربرس فول (Berberis Vul): جماعت کے دوران لطف کا احساس نہیں ہوتا۔ اعضاء میں
 تانگی سے لگتے ہیں۔
 کاسٹیکم (Causticum): جنسی خواہش بہت زیادہ کمزور ہونے کے ساتھ لطف کا نہ ہونا۔
 سپیا (Sepia): جماعت سے بیزاری کے ساتھ مسرت کی غیر موجودگی۔

لذت جماع (اعضائے تناسل میں مسرت کا احساس)

Orgasm

سٹانئم (Stannum): لذت جماع آسانی سے پیدا ہو جائے۔ بازوؤں کو کھٹکانے سے اعضاء

تامل میں ناقابل برداشت خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔
 بربرس فول (Berberis Vul): مؤخر شدہ خوشی کے احساس میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ خوشی
 کے احساس کی غیر موجودگی میں بھی یہ دوا دی جاتی ہے۔
 برومیم (Bromium): خوشی کے احساس کا فقدان۔
 اوسمیم (Osmium): انزال کے دوران معمول والی سنسنی نہیں ہوتی۔

نہ درد — Painful

فیرم میٹ (Ferrum Met): مجامعت پر درد ہوتی ہے۔ جس کے بعد خون جاری ہو جاتا
 ہے۔ اندام نسائی میں دکھن اور کانٹے والا درد ہوتا ہے۔
 کربوزوٹ (Kreosote): مجامعت کے دوران اور مجامعت کے بعد درد ہوتا ہے۔
 ار جینٹم ٹائٹ (Argentum Nit): مجامعت کے دوران درد ہوتا ہے۔
 نیٹرم میور (Natrium Mur): جنسی عمل کے دوران درد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ اندام
 نسائی کی خشکی بھی ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اندام نسائی کی دیواروں کو کسی چھتری
 سے دبایا جا رہا ہو۔
 لائی سین (Lyssin): مجامعت کے لئے ناپسندیدگی کے ساتھ درد ہوتا ہے۔ یہ کیفیت بچے کی
 پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔
 سیپیا (Sepia): لیکوریا کے ساتھ مجامعت کے دوران خوفناک درد ہوتا ہے۔
 ہائیڈرا سٹس (Hydrastis): تقریباً مستقل جنسی خواہش کے ساتھ درد لاحق ہوتا ہے۔
 خصوصاً جب مریضہ انڈے کی سفیدی کی طرح کا مواد خارج کرتی ہے۔
 مرک کار (Merc. Cor): رحم کو دبائے یا پھونکے سے تکلیف دہ درد ہوتا ہے۔
 بربرس ول (Berb. Vul): انزال پر در دیا بہت دیر سے ہوتا ہے۔

وضع حمل — Delivery

وضع حمل سے پہلے، دوران اور بعد کی تکلیفات

(Ailments Before, During and After)

اکٹیار لیس موسا (Actea Racemose): یہ دوا وضع حمل سے تین یا چار مہینے پہلے دی جا
 سکتی ہے تاکہ وضع حمل محفوظ اور بغیر درد کے ساتھ یقینی بنایا جاسکے۔ یہ دوا وضع حمل کو محفوظ

اور درد کے بغیر بنانے میں مدد دے گی۔ حتیٰ کہ اگر وضع حمل سے چند دن پہلے بھی دی گئی ہو تب بھی کار آمد ہوتی ہے۔ یہ دوا زندہ بچوں کی پیدائش کو بھی یقینی بناتی ہے لیکن اس مقصد کے لئے اسے وضع حمل سے چھ سات ماہ پہلے سے روزانہ تین مرتبہ دینا چاہئے۔ یہ زچگی کے غلط قسم کے دردوں کو روکتی ہے۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): زچگی کے جھوٹے دردوں سے بچنے کے لئے اور وضع حمل کو محفوظ بنانے کے لئے عین موقع پر یہ دوا دی جاسکتی ہے۔ ہر پندرہ منٹ کے بعد 1000 طاقت کی دوا دی جائے۔ جب وضع حمل متوقع ہو تو اس وقت صرف تین خوراکیں دی جائیں۔ اس کے بعد وضع حمل محفوظ ہو گا۔ خواہ وضع حمل میں حقیقتاً دوا تین دن لگ جائیں۔ یہ بچے کو صحیح حالت میں رکھتی ہے اگرچہ بچہ 'پچھ دانی' میں اپنی حالت بدل ہی چکا ہو۔ بشرطیکہ ہتھکڑیاں پھٹنے سے پہلے دی جائے۔ نفاس کم مقدار میں ہوتا ہے۔

وسکم الیم (Viscum Album): آنول کی بندش لاحق ہوتی ہے۔

بیلادونا (Belladonna): گرم خون بافراط خارج ہونے کے ساتھ آنول کی بندش لاحق ہو۔

کنٹھارس (Cantharis): پرورد پیشاب ہونے کے ساتھ آنول کی بندش لاحق ہو۔

سبینا (Sabina): کمزور حالت کے باعث آنول رک جاتی ہے۔

اکونائٹ این (Aconite N): جب نفاس دب جائے۔

نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid): نفاس خراش دار ہوتا ہے۔

ٹرلیم (Trillium): نفاس خون والا ہوتا ہے۔

بیلادونا (Belladonna): نفاس گرم اور کم مقدار میں خارج ہو۔

کریو زوٹ (Kreosote): نفاس خراش دار ہوتا ہے اور وقت دار ہوتا ہے۔

اورم میور نیٹرم (Aur Mur Nat): آتشکی ماؤں کو یہ دوا دینی چاہئے تاکہ ان کے بچے اس

مرض سے محفوظ رہیں۔

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): وضع حمل کے بعد لاحق ہونے والے دردوں کے لئے یہ

ایک عمدہ دوا ہے۔

کالوفائلیم (Caulophyllum): زچگی کے درد جھوٹے 'بے قاعدہ' تشنجی ہوتے ہیں۔ زچگی کے

شروع میں جھوٹے درد ہوتے ہیں۔ جلد لاحق ہو جانے والی زچگی کے بعد سیلان خون ہوتا ہے۔

قوت کے فقدان کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ بہت لمبی زچگی کے بعد زچگی کے بعد

والے درد لاحق ہوتے ہیں۔ تشنجی درد ہوتے ہیں جو کہ پیٹ کے زیریں حصہ میں ہوتے ہیں اور

جائگہ تک چلے جاتے ہیں۔ یہ دوا پلساٹیلہ والے کیسوں کی تکمیلی دوا ہے۔ جن میں بچہ نامناسب

حالت میں رحم کے اندر ہوتا ہے۔ 30 طاقت کی ایک خوراک روزانہ وضع حمل سے دو تین ہفتے پہلے سے دی جائے۔ یہ وضع حمل کو آسان بنائے گی اور زچگی کے بھونے ووروں کو روکے گی۔

چائنا (China): وضع حمل میں بہتات کے ساتھ سیلان خون کے بعد 1000 طاقت کی ایک خوراک مریضہ کی طاقت کو بحال کر دے گی۔

سٹرامونیم (Stramonium): زچگی کے دوران ناقابل برداشت جنسی عمل کی خواہش۔

پیتھوئی ٹرین (Piturn): مؤخر شدہ زچگی کے لئے دردزہ کے دوسرے مرحلہ میں جب کہ قرن حمل طور پر پھیلی ہوئی ہو۔

روٹا (Ruta): زچگی کے بعد امعاء مستقیم کا خروج لاحق ہو جائے۔

کیوپریم میٹ (Cuprum Met): زچگی کے دوران مریضہ اچانک اندھی ہو جاتی ہے۔ زچگی کے درد رک جاتے ہیں اور تشنگی بھٹکے لگتے ہیں۔ یہ بھٹکے انگلیوں اور انگوٹھوں سے شروع ہوتے ہیں۔

نکس وامیکا (Nux Vomica): زچگی کے دوران بھگی لگ جاتی ہے جو کھانے پینے اور سونے کو روک دیتی ہے۔

پلاٹینا (Platina): جنسی عمل کی ناقابل برداشت خواہش، دردزہ میں مبتلا مستورات میں بہت زیادہ جنسی خواہش۔

کالی کارب (Kali Carb): خون کی نالیوں کی حالت کمزور ہو جانے کے باعث سیلان خون ہوتا ہے اور زچگی کے ایک ہفتہ بعد خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔

کاسٹیکم (Causticum): زچگی کے بعد پیشاب میں بندش ہو جائے۔

واہرنم اوپ (Viburnum Op): زچگی کے بھونے ووروں کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔

یہ درد ایک عورت کی زندگی کو کئی ہفتوں تک اذیت ناک بنائے رکھتے ہیں۔ ہر درد کے بعد ایک خوراک زچگی کے بعد والے ووروں کو آرام دے گی۔

خواہش (جنسی) بڑھی ہوئی — (Increased)

(نیز دیکھئے "جنسی جنون")

موسکس (Moschus): بغیر کسی ظاہری وجہ کے جنسی خواہش بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔

پلاٹینا (Platina): ناقابل برداشت جنسی عمل کی خواہش، نوجوان لڑکیوں میں ہوتی ہے۔ جن کے جنسی اعضاء اور حیوانی بہت وقت سے پہلے نشوونما پا لیتے ہیں۔ یہ حیوانی بہت زچگی کے

دوران عورتوں میں بدترین ہوتی ہے۔
ایسٹریا زرب (Asterias Rub): بھڑکی ہوئی جنسی طلب ہو جماع کے بعد بھی تسکین نہیں پاتی۔ رحم میں پھڑکن ہوتی ہے۔ باہر کو دھکیلنے کا احساس ہوتا ہے۔ صبح کے وقت شدید قسم کا جوش ہوتا ہے۔
ہائیوسکیمس (Hyoscyamus): شدید قسم کی جنسی طلب ہوتی ہے۔ مریض بے حیالی سے اپنے آپ کو ٹگا کرتی ہے وہ فحش گفتگو میں ملوث ہوتی ہے۔
کالی فاس (Kali Phos): کنواری لڑکیوں میں جنسی جوش جو وقت سے پہلے جوان ہو جاتی ہیں۔ ہر حیض کے بعد جنسی خواہش شدید ہو جاتی ہے۔
لیلیئم ٹیگ (Lilium Tig): حیض دان کی تکلیفات کے ساتھ مستورات میں نہ ختم ہونے والی جنسی خواہش ہوتی ہے۔ بھراؤ کے احساس کے ساتھ اندام نمائی میں شہوانی خارش ہوتی ہے۔ خواہش بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ جنسی خواہش کو دبانے کے لئے خود کو مصروف رکھنا پڑتا ہے۔
اوری گی ٹم (Origanum): یہ دوا ایسی مستورات کی نشاندہی کرتی ہے۔ جن کی اعتدال سے بڑھی ہوئی جنسی طلب انہیں جلتی کی طرف لے جاتی ہے۔ ناقابل مزاحمت جنسی جذبہ اور تحریک، شدید قسم کا جنسی بوجھ اور جوش ہوتا ہے۔
لیک ویک فلوک (Lace Vace Floe): جیسے ہی ہاتھ پستانوں کو چھوتے ہیں۔ جنسی خواہش آسانی کے ساتھ جوش پر آ جاتی ہے۔
نیٹرم کارب (Natrurn Carb): بغل گیر ہونے کے بعد یا ہم آنخوش ہونے کے بعد مستورات مٹی کو نہیں روک سکتیں۔
فاسفورس (Phosphorus): بیواؤں میں بڑھی ہوئی جنسی خواہش، مجبوری کے تجرد کے باعث جنسی خواہش کا بڑھ جانا (غیر شادی شدہ زندگی)
ٹیرنٹولا ایچ (Tarentula H): چیخنے کی خواہش کے ساتھ ہسٹیریا میں جنسی جوش، رحم میں درد ہوتا ہے۔ سکڑاؤ ہوتا ہے۔ ٹخنوں ہونے کے احساس کے ساتھ خفی ہوتی ہے۔
میوریکس (Murex): اعضاء کے ساتھ معمولی سا رابطہ ہونے پر شدید جنسی جوش پیدا ہو جاتا ہے۔

دبی ہوئی یا گھٹی ہوئی (جنسی خواہش)

(Suppressed Or Decreased)

کونیئم (Conium): حیض دان اور رحم کی خفی اور بڑھ جانا۔ پیڑوں کی خفی اور سوزش کے ساتھ

رحم کا خروج ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ بافراط لیکوریا لاحق ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ بھنسی خواہش کے دبانے سے لاحق ہوتا ہے۔

اونوس موڈیم ویر (Onosmodium Vir): بھنسی خواہش تھل طور پر تھاہ ہو جاتی ہے۔ دیگر رحمی آکالیف کے ساتھ یا ان کے بغیر جیسا کہ نیچے کو دبانے والے درد، اینٹھن اور رحم کی دکھن پستان سوجے ہوئے اور سخت محسوس ہوتے ہیں۔ CM طاقت کی دوا دیجئے۔

رحم کی یا بیضہ دان کی سوزش

Inflammation of Uterus/ Ovaries

(Metritis. Ovaritis)

نکس وامیکا (Nux Vomica): رحم کی حاد سوزش والے کیسوں میں یہ دوا موزوں ترین ہوتی ہے۔ پیری نوئم کی سوزش کے ساتھ یا اس کے بغیر بیکہ بخار اونچے درجے کا نہیں ہوتا یا جب کہ بخار کم ہو چکا ہو۔ معدے کے زیریں حصہ میں درد ہوتا ہے۔ چھوٹی کمر میں درد ہوتا ہے۔ رحم کے سوراخ میں سوجن ہوتی ہے۔ پیٹ میں بھاری پن اور جلن ہوتی ہے۔ سیدیا (Sepia): حاد رحمی سوزش میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ رحم کی پرورد سختی لاحق ہوتی ہے۔ اینٹھن والا دباؤ نیچے کی طرف ہوتا ہے جیسے کہ ہر چیز اندام نمائی سے خارج ہو جائے گی۔ رحم کا گر جانا لاحق ہوتا ہے۔

گریفائٹس (Graphites): رحم کی مزمن سوزش میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ بیضہ دان کی سوزش کے ساتھ یا اس کے بغیر۔ ہلکی آکالیف کے ساتھ۔

پلائینا (Platina): رحم اور بیضہ دان کی حاد سوزش میں زچگی کے بعد بڑھی ہوئی بھنسی خواہش اور اندرونی رحم کی خارش کے ساتھ۔

کونیم (Conium): رحم کی مزمن سوزش میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ بیضہ دان یا پیری نوئم کی سوزش کے ساتھ یا اس کے بغیر پیٹ تھاہ ہوتا ہے۔ رحم میں جلن اور اینٹھن ہوتی ہے۔ نیچے کی جانب پرورد دباؤ ہوتا ہے۔ خون والا یا دودھ کی طرح کالیکوریا ہوتا ہے۔ قے ہوتی ہے، بھلی ہوتی ہے۔

کیمومیلا (Chamomilla): رحم کی حاد سوزش میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ شدید ٹامیدی کے باعث نیز غصے کے دورے کے باعث یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ حیض کے دوران یا زچگی کے بعد پیٹ پھولا ہوا اور حساس ہوتا ہے۔

کولو سنقٹس (Colocynthis): حیض یا نفاس کے دب جانے والے کیسوں میں جب کچھ میلا
تکام ہو جائے تو یہ دوا دی جاتی ہے۔

کریو زوٹ (Kreosote): رحم کی مزمن سوزش میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ اندام نسائی اور
رحم میں ٹانگے سے لگتے ہیں۔ کھلی کے صدموں کی طرح ہے۔ لیکو دیا سوتی کپڑے پر غیلا دوا
ڈال دیتا ہے۔

بیلادونا (Belladonna): غصہ کے بعد، خصوصاً زچگی کے بعد سوزش لاحق ہوتی ہے۔
اعضائے تناسل پر بچہ درہا ہوتا ہے۔ چہرے کی سرخی کے ساتھ کھودنے والا درد ہوتا ہے۔

چائنا (China): خون ضائع ہو جانے کے بعد یا جماع کی بے اعتدالی کے بعد۔

آر سینک البم (Arsenic Alb): بچے کی پیدائش کے دوران۔

رٹاکس (Rhus Tox): ٹائیفائیڈ کی علامات کے ساتھ وضع حمل کے بعد۔

پلساٹیل (Pulsatilla): پاؤں گیلے ہو جانے کے بعد یا حیض دب جانے کے باعث دودھ میں کمی
کے ساتھ، جاڑے کے ساتھ اور پیاس نہ ہونے کے ساتھ۔ معدے کے زیریں حصہ میں کھینچنے
والا تکاؤ اور سکڑاؤ ہوتا ہے۔

اپیس (Apis): بچپن میں بیضہ دان کی سوزش۔

اکونائٹ (Aconite): حیض کے دب جانے کے بعد یا خوف کے باعث بیضہ دان کی سوزش
لاحق ہوتی ہے۔ یہ دوا علاج کے آغاز میں دی جاتی ہے۔

لکیسیس (Lachesis): صبح کے وقت یا سونے کے بعد درد ہوتا ہے۔

اعضائے تناسل کی خارش

(Itching of the Genitals)

سلفر (Sulphur): خشک خارش ہوتی ہے جو کہ خوفناک قسم کی ہوتی ہے اور مریض مسلسل
کھجائی رہتی ہے۔ حتیٰ کہ اعضاء سے خون بہنے لگتا ہے۔

کولن سونیا (Collinsonia): فرج کی خارش خصوصاً حمل کے دوران۔

ئیرن ٹولا ایچ (Urtica Urens): فرج کی خارش جس کے ساتھ اندام نسائی سے ہوا خارج
ہوتی ہے۔ خیشے کی خواہش کے ساتھ ہنسی جوش اور ہسٹریا ہوتا ہے۔ رحم میں درد ہوتا ہے۔ نیز
رحم میں سکڑاؤ، سختی اور گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔

ارٹیکا یورنس (Urtica Urens): جلن، سوجن اور لبہ بائے فرج کے موٹا ہونے کے ساتھ
فرج میں خارش ہوتی ہے۔ ایگزیم لاحق ہوتا ہے۔

کیلڈیم (Caladium): فرج اور اندام نسائی کی خارش کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ بعض اوقات یہ خارش آنکھوں کے کیزوں کے باعث ہوتی ہے جو کہ اندام نسائی میں داخل ہو کر حلق کا باعث بنتے ہیں نیز حتیٰ کہ ناقابل برداشت جنسی خواہش کا باعث بنتے ہیں۔ حمل کے دوران خارش حلق میں جھلا کر دیتی ہے۔

امبرا گریشیا (Ambra Grisea): دھن اور سوجن کے ساتھ فرج کے بیرونی حصہ کی خارش لاحق ہوتی ہے۔ دو حیضوں کے درمیان کے عرصہ میں خون خارج ہوتا ہے۔ پیلاہٹ مائل لیکوریا ہوتا ہے۔

ہیلونیا (Helonias): فرج اور اندام نسائی میں خارش ہوتی ہے۔ اتنی شدید خارش ہوتی ہے کہ مریض خارش کر کے گوشت چھاڑ ڈالنا چاہتی ہے۔ جلد سرخ اور سوجی ہوئی ہوتی ہے۔ جو کہ پتلے سفید دہی کی طرح کے مواد سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔

اورم میور نیٹرونیم (Auru Mur Natronatum): اندام نسائی کی آگے کو بڑھی ہوئی جلد پر ناسور ہوتے ہیں۔ رحم میں رسولی ہوتی ہے۔

سپیا (Sepia): لیکوریا کے ساتھ اندام نسائی کی خارش۔

برومیم (Bromium): ذہنی ابتری (پاگل پن) کے ساتھ رحم کی خارش لاحق ہو۔

کریوزوٹ (Kreosote): فرج کے اندر گرمی پر شہوت خارش ہوتی ہے جس کے ساتھ لب ہائے فرج میں جلن اور سوجن ہوتی ہے۔ جنہیں مریض ہر وقت مسکے پر مجبور ہوتی ہے۔ درد خارش دار لیکوریا ہوتا ہے۔

لیلیئم ٹگ (Lilium Tig): اعضاء کے بھراؤ کے ساتھ پر شہوت خارش ہوتی ہے۔

بوریکس (Borax): دوران حمل خارش ہوتی ہے۔

مرکوریس (Mercurius): پیشاب لگ جانے کے باعث جسے دھواہی پڑتا ہے۔ رحم میں ابتری ہوتی ہے۔ رحم کی خارش میں ابتری ہوتی ہے۔ اس میں لیکوریا بھی ہو سکتا ہے جو کہ خارش دار ہوتا ہے اور اس میں رات کے وقت ابتری ہو جاتی ہے۔

اوفورنیم (Oophorum): یہ خارش کے لئے دوا ہے جو کہ حیض کے بعد تھوڑے وقت کے لئے بہتر ہو جاتی ہے۔

لیکوریا — (Leucorrhoea)

سپیا (Sepia): قبض کے ساتھ پتلا لیکوریا لاحق ہوتا ہے۔ لیکوریا خارش دار تھلا دینے والا پیلاہٹ مائل پانی کی طرح کا یا سرخی مائل سبز ہوتا ہے۔ فرج میں گرمی اور خارش ہوتی ہے۔

فرج کے بیرونی حصہ میں دکن کے ساتھ حیض سے پہلے لیکوریا ہوتا ہے۔ چھوٹی لڑکیوں میں لیکوریا۔

مرکوریس (Mercurius): لیکوریا خراش دار، جلن دار، خارش والا ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ کچا پن ہوتا ہے۔ ہمیشہ رات کے وقت اتری ہو جاتی ہے۔ رحم کی خارش ہوتی ہے جو پیشاب کے لگنے سے اتر ہو جاتی ہے جسے ضرور ہی دھونا پڑتا ہے۔

بوریکس (Borax): لیکوریا دہی کی طرح کا اور انڈے کی سفیدی کی طرح کا ہوتا ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہوتا ہے جیسے کہ گرم پانی بہہ رہا ہو۔ خراش دار لیکوریا لاحق ہوتا ہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): پتلا دودھ کی طرح کا لیکوریا خارج ہوتا ہے۔ کیوبیبا (Cubeba): باقراط پیسے رنگ کا سبزی مائل، خراش دار اور بدبودار لیکوریا لاحق ہوتا ہے۔ چھوٹی لڑکیوں میں لیکوریا۔

ہائیڈرا سٹس (Hydrastis): چپکنے والا گاڑھا لیکوریا خواہ رحم والا یا اندام نسائی والا ہو۔ لمبے دھاگے کی طرح کا اور ایک قسم کی خارش کا باعث بننے والا۔

آر سینٹک آئیوڈ (Ars iod): جب خارج ہونے والے ملوے بھانہ خیز اور کھلا دینے والے ہوں۔ ان مادوں میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے۔

ایسڈ نائٹرک (Acid Nitric): کھلا دینے والا لیکوریا جس کے ساتھ لب ہائے فرج پر چٹکے ہوتے ہیں۔ بیض دان کے علاقہ میں جلن دار اور پھاڑنے والا درد ہوتا ہے۔

بربرس ول (Berberis Vul): نر درو پیشاب کی علامات کے ساتھ لیکوریا لاحق ہوتا ہے۔ ملی فولیم (Millefolium): بچوں میں لیکوریا۔

پلساٹیل (Pulsatilla): پانی والا، خراش دار اور جلن دار لیکوریا لاحق ہوتا ہے۔ دودھ کی طرح کا لیکوریا گاڑھا اور سفید۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): کبھی کم اور کبھی زیادہ لیکوریا ہوتا ہے۔ دودھ کی طرح کا یا اعصابی (پورے چاند کے وقت) لیکوریا لاحق ہو۔ لیکوریا لاحق ہونے سے پہلے کانٹے والا درد قویج معدے کے گڑھے میں ہوتا ہے۔ (معدے کا زیریں حصہ)

فاسفورس (Phosphorus): حیض کی بجائے لیکوریا لاحق ہو جاتا ہے۔ حیض سے پہلے انڈے کی سفیدی کی طرح کا لیکوریا لاحق ہوتا ہے۔ رونے کا موڈ ہوتا ہے اور پیشاب کرنے کی متواتر خواہش ہوتی ہے۔ مسوڑھے سوختے ہوتے ہیں۔

نیٹرم کارب (Natrum Carb): گاڑھا، زرد رنگ کا، متعفن لیکوریا۔

سٹینم میٹ (Stannum Met): سبز، گاڑھا، پیلا، باقراط لیکوریا لاحق ہوتا ہے۔ اعصابی درد

کے دور ہو جانے کے بعد۔

گریفائٹس (Graphites): حیض کی بجائے لیکوریا لاحق ہو جاتا ہے۔ حیض کے دوران انتہا درجے کی سستی ہوتی ہے۔ حیض سے پہلے شدید قسم کی خارش فرج میں ہوتی ہے۔

کاربودیج (Carbo Veg): جب لیکوریا کا اخراج ہوتا ہے تو مریضہ بہتری محسوس کرتی ہے لیکن جیسے ہی لیکوریا غائب ہوتا ہے کوئی دوسری تکلیف لاحق ہو جاتی ہے۔

میڈورینم (Medorihinum): جب اچھی منتخب شدہ ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دوا دینی چاہئے۔ IM ذاتی لیوشن کی ایک خوراک ہر پندرہ دن کے بعد دی جائے۔

کریوزوٹ (Kreosote): جب خارج ہونے والا مادہ خراش دار اور خون والا ہو۔ سفیدی مائل لیکوریا خارج ہوتا ہے۔ جو سوتی کپڑے پر داغ ڈال دیتا ہے۔ چھوٹی کمر میں درد ہوتا ہے۔ ٹانگوں کی کمزوری ہوتی ہے۔

الیومینا (Alumina): جب اخراج اتنی افراط سے ہوتا ہے کہ اس کا ہواؤ اینڈیوں تک چلا جاتا ہے۔ یہ اخراج خراش دار، چپنے والا، بافراط، پھیلنے والا، گاڑھا اور پیلا ہوتا ہے۔ فرج میں خارش ہوتی ہے۔

اووالٹسٹا (Ova Testa): یہ دوا لیکوریا کے لئے تقریباً مخصوص دوا ہے۔ 3x ٹرائی ٹوریشن کی صورت میں دینی چاہئے۔

کالوفائلیم، کینابیس سیئی وا (Cannabis Sat, Caulophyllum): چھوٹی لڑکیوں میں لیکوریا۔

کوکولس آئی (Cocculus I): چھوٹی لڑکیوں میں لیکوریا، حیض کی بجائے لیکوریا ہو جاتا ہے۔ آیوڈین (Iodine): بیڑو کی سوجن اور سختی کے ساتھ لیکوریا لاحق ہوتا ہے اور اخراج اتنا خراش دار ہوتا ہے کہ جاتنگھوں میں دکھن پیدا کر دیتا ہے۔ مزمن لیکوریا جو کہ گاڑھا، لیس دار اور بعض اوقات خون والا ہوتا ہے۔

نیٹرم فاس (Natrurn Phos): حیض کے بعد لیکوریا لاحق ہوتا ہے جو کہ خراش دار، بافراط، کریم کی طرح کا، شد کے رنگ جیسا، کھنسی بو والا، پیلا اور پانی کی طرح کا ہوتا ہے۔ جنسی خواہش بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔

ایلو (Aloe): درد قولنج کے ساتھ شروع ہونے والا خون آلود بلغم والا لیکوریا۔ تھلاسپی (Thlaspi): خون والا، بدبودار لیکوریا افراط کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ جو حیض کے خون کی مدت کو طویل کر دیتا ہے۔

اونوس موڈیم (Onosmodium): ہلکے پیلاہٹ مائل رنگ والا لیکوریا جو بدبودار، پھیلنے والا

اور باافراط ہوتا ہے۔ نیچے ٹانگوں تک بہتا رہتا ہے۔
 ایسکولس ہپ (Aesculus Hip): گمراہ پیلا، گاڑھا اور چپکے والا لیکوریا لاحق ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ کمر کے نیچے حصہ میں ٹکڑا ہٹ ہوتی ہے جو چلنے سے ظاہر ہوتی ہے۔
 تھوجا (Thuja): دو حیضوں کے درمیان یا حیضوں کی بجائے لیکوریا لاحق ہوتا ہے جبکہ مریض کی ہسٹری میں حفاظتی ٹیکے نہیں لگوائے گئے ہوتے یا جب حفاظتی ٹیکے کئی مرتبہ لگوائے گئے ہوں۔

سینی کولا (Carnicula): مچھلی کے چٹکوں کی تیز بدبو کے ساتھ لیکوریا لاحق ہوتا ہے۔
 چائنا (China): حیض سے پہلے لیکوریا لاحق ہوتا ہے۔ یہ لیکوریا متعفن یا خون والا ہوتا ہے۔
 پردرد دباؤ، جاگمہ اور مقعد کی طرف ہوتا ہے۔
 میوریکس (Murex): جب لیکوریا میں اختری ہوتی ہے تو مریض حوصلہ مند ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔
 کاربو انیلس (Carbo Ani): لیکوریا سوتی کپڑے پر پھیلا داغ ڈالتا ہے۔
 سیفیلیم (Syphilinum): لیکوریا باافراط ہوتا ہے جو رد مال کو بھگو دیتا ہے اور ایزیموں تک بہتا ہے۔

الیومن (Alumen): رحم کے ماسوروں اور حتیٰ کہ سرطان اور رحم کی سختی کے ساتھ باافراط لیکوریا خارج ہوتا ہے۔ مریض زرد چہرے والی ہوتی ہے۔

زندہ بچے کی پیدائش

(Living Birth)

(”حمل“ کے ذیل میں دیکھئے)

پستان — Mammae

پھوٹا (پستان کا) — Abscess

ہیپر سلف (Hepar Sulph): سوزش میں جبکہ پیپ پڑ چکی ہو یا پیپ پڑنے والی ہو۔ یہ دوا پیپ بننے کے عمل کو روکتی ہے۔ شدید قسم کی حرارت اور چکن والے درد کے ساتھ سوزش ہوتی ہے۔

بیلادونا (Belladonna): سوزش کے ابتدائی مراحل میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ جبکہ متاثرہ حصے

سرخ اور سخت ہوتے ہیں۔

فالٹی ٹولاکا (Phytolacca): کیک (ٹکیا) جیسی سختی ہوتی ہے۔ جب کہ پیپ نگزیر ہوتی ہے۔ پستانوں میں سخت قسم کی ٹکیوں یا کیکوں کی طرح کی سختی کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ یہ سختی بچے کے سر کی چوٹ لگنے کے باعث ہو سکتی ہے یا پھر دودھ کے اجتماع کے باعث بھی ہو سکتی ہے۔

برائی اونیا (Bryonia): پستانوں کی ابتدائی مراحل والی سختی جبکہ یہ سختی دودھ کے اکٹھا ہو جانے یا بعض دوسری وجوہات کے باعث لاحق ہو۔ ہر 6 گھنٹے کے بعد 200 ڈالری لیوشن کی دوا دی جاسکتی۔ تین یا چار خوراکیوں میں شفا حاصل ہو جائے گی۔

سیلیشا (Silicea): ایک کے بعد دوسری ناسوری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے لیکن اخراج ایک ہی مشترکہ ناسور سے درد کے ساتھ ہوتا ہے یا پھر ہر حصے کے ناسور میں بہت سے سوراخ ہو سکتے ہیں۔ پیپ والی ٹالی کا مواد پیپ کی صورت میں خارج ہوتا دکھائی دیتا ہے۔

لیکس (Lachesis): جب متاثرہ حصے ٹیلاٹ مائل یا ارغوانی مائل صورت میں موجود ہوتے ہیں۔ مریض کو رات کے وقت جاڑا لگتا ہے اور دن کے وقت حرارت سے تھماہٹ ہوتی ہے۔

لاغری (پستانوں کا گھٹ جانا)

Atrophy (Wasting Away)

اونوس موڈیم (Onosmodium): جب پستان اپنی معمولی جسامت سے بہت چھوٹے ہو جائیں یا بالکل غائب ہو جائیں تو ایسی صورت میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ GM طاقت کی دوا دیجئے۔ **کیمافیلہ (Chimaphila):** پستانوں کی کمزوری (چھوٹا ہو جانا) یا ضرورت سے زیادہ نشوونما کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔

سبل سیر (Sabal Serr): ہمیشہ جینوں کے باعث پستان سکڑ جاتے ہیں یا پھر رحم کے دوسرے امراض کے باعث پستانوں کا سکڑنا۔

ٹکس موسکاٹا (Nux Mosch): پستان چپٹے ہو جاتے ہیں جو کہ کبھی خوب گول ہوتے تھے۔ پستان بہت ہی چھوٹے ہو جاتے ہیں اور ان میں دودھ نہیں رہتا۔ چوچیاں اندر کو دھنس جاتی ہیں۔

کریوزوٹ (Kreosote): پستانوں میں چھوٹے سخت اور پردرد ڈھیلوں کے ساتھ پستان کھٹے کھٹے بالکل کم رہ جاتے ہیں۔

کونیم (Conium): پستانوں کی لاغری جو انیس بہت ڈھیلا کر دیتی ہے۔ پستانوں کی جلد تھیلے کی طرح سے ڈھیلی ڈھالی ہو جاتی ہے۔ یہ دوا پستانوں کے بڑھ جانے اور پستانوں کی تختی کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے۔

ڈلکارامارا (Dulcamara): جب پستانوں کی لاغری لیکوریا یا حیضوں کی موجودگی کے ساتھ لاحق ہو۔

آئیوڈیم (Iodium): پستانوں کا کھٹتے جانا جبکہ دیگر غدود بڑھتے رہتے ہیں۔

سیلان خون (پستانوں سے) — Bleeding

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): پستانوں سے خون آتا ہے اور بچہ اتنا زیادہ خون پی جاتا ہے کہ اسے تے ہو جاتی ہے چنانچہ وہ خون کی تے کرتا ہے۔ پستانوں سے خون اور پانی کا اخراج ہوتا ہے۔ سیلان خون آسانی سے ہوتا ہے۔

ہیمامیلس (Hamamelis): بہت زیادہ دکھن کے ساتھ پستانوں سے خون کا سیلان ہوتا ہے۔
سپیا (Sepia): پیپ پڑ جانے کے امکان کے ساتھ سیلان خون ہوتا ہے۔

سرطان (پستانوں کا) — Cancer

(دیکھئے ”رسولیاں“)

پستانوں کا بڑھ جانا Hypertrophy

فلانی ٹولا کا (Phytolacca): پستانوں کا بڑھ جانا لاحق ہوتا ہے۔ پستان اتنے زیادہ بھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے اہل پڑیں گے۔

فری جیریا ورسکا (Fragria Vesca): یہ دوا پستانوں کی جسامت کو گھٹاتی ہے اور دودھ خشک کرتی ہے۔

کونیم (Conium): پستانوں کا بڑھ جانا خواہ عمومی ہو یا خواہ زچگی والا۔

کیمافیلہ (Chimaphila): یہ دوا پستانوں کی لاغری اور پستانوں کے بڑھ جانے دونوں کو کھٹا دیتی ہے۔

سوزش (پستانوں کی) — Inflammation

برائی اونیا (Bryonia): دودھ کے جم جانے کے باعث یا کسی دوسری وجہ سے سوزش لاحق ہو

جاتی ہے۔

بیلادونا (Belladonna): جب کہ متاثرہ حصے سرخ اور گرم ہوتے ہیں۔
مرکیوریس (Mercurius): جب بیلادونا اور برائیو نیا ناکام ہو جائیں۔
بیلس پیر (Bellis Per): مکالگ جانے کے بعد لاحق ہونے والی سوزش اور ختی۔
کونیم (Conium): سوزش کی ختی والا مرحلہ 'متاثرہ حصے مضبوط سخت اور پردرد ہوتے ہیں۔
 پائیں پستان میں سوجن اور ختی کے ساتھ سوتیوں سے ٹانگے گلنے کا احساس ہوتا ہے۔
فائی ٹولا کا (Phytolacca): جب پستان پتھر کی طرح سخت ہو جائیں اور ساتھ میں بہت زیادہ
 درد ہو تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ پستانوں کی سوزش 'سوجن اور چپ پڑنے والی کیفیت 'پستانوں میں
 دھن ہوتی ہے اور ڈھیلے ہوتے ہیں۔ (گھٹیاں)

Milk — دودھ

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): دودھ بڑھانے کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔
لیک ویک ڈیفل (Lac Vace Defl): دودھ میں کمی کرنے کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔
چو تھس (Chioanthus): دودھ روکنے کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔
سبل سیر (Sabal Serr): دودھ پیدا کرنے کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔
لیکٹوسا داتروسا (Lactusa Virosa): دودھ میں زیادتی کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔
رکی نس (Ricinus): دودھ پلانے والی عورتوں میں اور حتیٰ کہ کنواریوں میں بھی اس دوا
 سے دودھ پیدا ہو جاتا ہے۔
سٹیکٹا پی (Sticta P): دودھ کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ یہ دوا دودھ کی مقدار کو زیادہ کر دیتی
 ہے۔ حتیٰ کہ ایسے کیسوں میں بھی مفید ہوتی ہے جن میں دودھ سوکھ چکا ہوتا ہے۔ مریضہ ہمیشہ
 دودھ کی کمی کی وجہ سے پرہم رہتی ہے۔
بوریکس (Borax): دودھ بہت گاڑھا ہوتا ہے اور بد مزہ ہوتا ہے۔ یہ کیفیت ماؤں کو اپنے
 بچوں کو دودھ پلانے سے روک دیتی ہے۔ (یہ دوا دوران حمل دینی چاہئے تاکہ بچے کی پیدائش
 کے بعد اسے موزوں اور خوش مزہ دودھ مل سکے۔) بد مزہ دودھ کی وجہ سے بچہ پستان منہ میں
 نہیں لیتا۔
ارٹیکا یورٹیس (Urtica Ur): دودھ کا اخراج کم ہو جاتا ہے۔ پستانوں کی سوجن کے ساتھ۔
 دودھ چھڑانے والی مستورات میں بھی دودھ خشک ہو جاتا ہے۔
پلساٹیل (Pulsatilla): یہ دوا ایسی ماؤں کو دودھ منتشر کرنے کے لئے دی جاتی ہے۔ جو بچوں

کو دودھ پلانا چھوڑ چکی ہوں۔ دودھ پلانا روکنے کے فوراً بعد یہ دوا دینی چاہئے۔ اگر یہ دوا در دیا تکلیف میں افادہ نہ کرے تو کلکیریا کارب آزمائی جاسکتی ہے۔ یہ دوا دودھ کے دب جانے یا (سوکھ جانے) کے لئے بھی مفید ہے۔ جس کے نتیجے میں پستان سو جے ہوئے اور پُرورد ہوئے ہیں۔

ایسافوئیڈا (Asafoetida): دودھ کا معیار بہتر بنانے اور بڑھانے کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ پستان دودھ کے ساتھ تنے ہوئے ہوتے ہیں حتیٰ کہ حمل کے بغیر بھی۔
لیسی ٹھم (Laceithim): یہ دودھ بڑھانے کے لئے عمدہ دوا ہے۔ جس سے دودھ زیادہ مقوی ہو جاتا ہے اور مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

مرکیوریس (Mercurius): حیض کا خون آنے کی بجائے پستانوں میں دودھ بھر جاتا ہے۔ یہ دوا ایسے لڑکوں کے لئے بھی مفید ہے۔ جن کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکیوں کے پستانوں میں دودھ کا آ جانا۔

کلکیریا فاس (Calcarea Phos): بچہ دودھ پینے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ دودھ کا ذائقہ تکمیل نہیں ہوتا ہے۔

فائی ٹولاکا (Phytolacca): پستانوں میں سوزش ہوتی ہے جبکہ دودھ تیار دار ہوتا ہے اور سر پستان سے نکل کر نیچے کو لٹکا ہوتا ہے۔ ہمارا دودھ 'دودھ کم مقدار میں' گاڑھا' غیر صحت بخش اور جلد سوکھ جانے والا ہوتا ہے۔ خون والا پانی کی طرح کا مواد خارج ہوتا ہے۔ جو کئی سالوں سے مسلسل نوزائیدہ بچوں کا دودھ چھڑانے کے باعث لاحق ہوتا ہے۔ یہ دوا اس شکایت کو بھی رفع کر دیتی ہے۔

یوفو (Bufo): جب دودھ خون آلود ہو۔

اورم سلف (Aurum Sulph): دودھ کا دب جانا یا غائب ہو جانا لاحق ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ پستانوں کی سوجن بھی ہوتی ہے۔

لیک ٹینیم (Lac Can): دودھ خشک کرنے کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے کیونکہ دودھ بہت زیادہ افراط کے ساتھ آتا ہے۔

سیکیل کار (Secale Cor): دودھ کا دب جانا یا دودھ کا ظاہر نہ ہونا وضع حمل کے بعد۔

اگنس کاسٹس (Agnus Castus): شفا سے ناامیدی کے ساتھ دودھ میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جب دودھ زچگی کے بعد ظاہر ہونے میں ناکام ہو جائے۔ اس کے ساتھ مذکورہ بالا ذمینی حالت بھی ہوتی ہے۔

کیمومیل (Chamomilla): جب غصے کے دورے کے نتیجے میں دودھ دب جائے۔

الفالفا (Alfalfa): یہ دوا دودھ پلانے والی عورتوں کے دودھ کے معیار اور اس کی مقدار میں اضافہ کرتی ہے۔ دن میں چار مرتبہ ہر گچھر کے 5 سے 10 قطروں کے خوراک دی جائے۔

سرہائے پستان (چوچیاں)

(Nipples)

فائیٹولوکا (Phytolacca): سرہائے پستان (چوچیاں) میں دکن ہوتی ہے اور پستانوں میں پھوڑے کا رجحان ہوتا ہے۔ چوچیاں اندر کو دھنسی ہوتی ہیں۔ پستان بچے کے منہ میں دینے پر شدید درد ہوتا ہے۔ سرہائے پستان میں شکاف ہوتے ہیں۔ سرہائے پستان (چوچیاں) حساس ہوتے ہیں۔ ان میں دکن ہوتی ہے اور چیرے ہوتے ہیں 'دودھ پلاتے وقت شدید اہتری ہوتی ہے۔

سرسلپاریلا (Sarsaparilla): پُر درد حیض 'اسال' قے اور بے ہوشی کے دوروں کے ساتھ چوچیاں سکڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ چوچیاں پھوٹی 'مرحمانی ہوئی اور ناقابلِ جوش ہوتی ہیں۔ کاسٹر اکی (Castor Equ): چوچیوں میں دکن ہوتی ہے 'ان میں شکاف ہوتے ہیں اور بچی ہوئی ہوتی ہیں 'بڑھی ہوئی حساسیت ہوتی ہے 'مریضہ ان کا چھوٹا برداشت نہیں کر سکتی۔ ہائیڈراسٹس (Hydrastis): دودھ پلانے والی عورتوں کے سرہائے پستان میں خراش ہوتی ہے۔ سرہائے پستان دھنسنے ہوتے ہیں۔

گریفائٹس (Graphites): گھلا دینے والے چھالے یا تاسور ہوتے ہیں جن سے چپکنے والا مواد رستا ہے پھر پٹریاں بن جاتی ہیں جو کہ دودھ پلانے سے اتر جاتی ہیں لیکن بعد میں دوبارہ بن جاتی ہیں۔ چوچیاں دودھ پلانے سے پھٹ جاتی ہیں۔

کاسٹیکم (Causticum): چوچیوں پر پٹریاں وغیرہ ہوتی ہیں جن کے گرد داو ہوتی ہے۔ کاربو ایملس (Carbo An): چوچیوں پر رسولیاں ہوتی ہیں جو کہ سخت ہوتی ہیں اور اتنی بڑی جتنا کہ مرئی کا انڈا ہوتا ہے۔

کروٹن ٹیگ (Croton Tig): بچے کو دودھ پلاتے ہوئے چوچیوں میں درد ہوتا ہے جو پیچھے کی طرف جاتا ہے۔ چوچیوں میں پُر درد کمپن ہوتی ہے جیسا کہ رسی سے کھینچا جا رہا ہو۔

سلیسیا (Silicea): دودھ پلاتے ہوئے تمام جسم میں اور سرہائے پستان میں درد ہوتا ہے۔ فیلینڈریم (Phellandrium): دودھ پلانے کے وقفہ کے دوران ناقابلِ برداشت درد ہوتا ہے۔

بوریکس (Borax): دودھ پلاتے ہوئے دوسرے پستان میں درد ہوتا ہے۔

رٹننیا (Ratanhia): چوچی میں شکاف اور چیرے ہوتے ہیں جو دودھ پلانے کے باعث ہو جاتے ہیں۔

جلق — (Masturbation)

اوری گینم (Origanum): جلق اور حد اعتدال سے بڑھی ہوئی ہنسی تحریک میں یہ دوا پر اثر ہوتی ہے، لیکوریا لاحق ہوتا ہے، ہسٹیریا ہوتا ہے، پر شہوت خیالات اور خواب ہوتے ہیں۔
کیلڈیم (Caladium): لب ہائے فرج اور اندام نسائی میں خارش ہوتی ہے جس کے باعث جلق کا رجحان ہوتا ہے۔ رات کے وقت رحم میں انٹشن والے درد ہوتے ہیں۔

حیض کا دب جانا یا رک جانا

(Menopause)

(دیکھئے موقوفی حیض)

حیض - غیر موجودگی

(Menses- Absent) (Amenorrhoea)

پلساٹیل (Pulsatilla): بلوغ کی عمر کو پہنچنے پر حیض ظاہر نہیں ہوتے جس کی کوئی بظاہر وجہ نہیں ہوتی، مریضہ بنیادی طور پر ڈر پوک، رونے والی ہوتی ہے اور یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب مریضہ اپنے مرض کی وضاحت کر رہی ہوتی ہے۔ کھلی ہوا میں بہتری محسوس کرتی ہے۔ پاؤں گیلے ہو جانے کے باعث حیض کا دب جانا لاحق ہوتا ہے۔

فیرم میٹ (Ferrum Met): جب غناہت یا خون میں کمی کے باعث حیض دب جائیں یا مؤخر ہو جائیں۔ اس کے ساتھ کابلی ہوتی ہے اور دل کی دھڑکن لاحق ہوتی ہے۔

سائیکلے من (Cyclamen): گیلا ہو جانے کے باعث حیض دب جاتے ہیں۔ یہ دوا اس حالت کی نشاندہی کرتی ہے جب پلساٹیل کی علامات موجود ہوتی ہیں لیکن مریضہ کھلی ہوا میں بہتری محسوس کرتی ہے۔ غنودگی اور درد سر محسوس ہوتا ہے۔

اکونائٹ این (Aconite N): جب جاڑا لگ جانے کے باعث حیض دب جائیں، اگر اس دوا سے اتفاق نہ ہو تو پلساٹیل کے بعد دینی چاہئے۔

سلفر (Sulphur): جب مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں، خصوصاً جب معدہ میں خالی پن کا

احساس ہو جس کے ساتھ درد سر بھی ہوتا ہے۔
سنی شیو اورینس (Senecio Aurens): کھانسی، ہسٹیریا، لیکوریا، سبزیرقان، ضیق النفسی وغیرہ، امراض جب حیض کے دب جانے کے باعث لاحق ہوں، گچھر کی صورت میں یا 1x طاقت کی دوا استعمال کیجئے۔

ٹرنرا (یا ڈامیانہ) (Turnera or Damiana): مستورات کی افسردگی (ٹھنڈا پن) یہ دوا نوجوان لڑکیوں میں معمول کے مطابق حیض کا خون لانے میں مدد دیتی ہے۔ ہر گچھر کے 10 سے 15 قطروں کی خوراک دن میں دو مرتبہ کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد دی جائے۔
سٹرامونیم (Stramonium): حیض یا نفاس وغیرہ کے دب جانے کے باعث تکلیفات لاحق ہوں۔

سبل سر (Sabal Serr): رحمی امراض اور پستانوں کے مرجھا جانے یا سکڑ جانے کے باعث حیضوں میں تاخیر ہوتی ہے۔

لیک ویک ڈیکلوریٹم (Lac Vacc Defloratum): ٹھنڈا پانی پینے یا ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے کے باعث حیض دب جاتے ہوں۔ رحم کے علاقہ میں شدید درد ہوتے ہیں۔ شدید قسم کا درد سر ہوتا ہے۔

نکس موسکاٹا (Nux Moschata): ذہنی جوش یا گھبراہٹ ہو جانے کے باعث حیض دب جاتے ہیں۔ جس کے ساتھ غنودگی بے ہوشی اور بازوؤں، ٹانگوں کا ٹھنڈا ہو جانا بھی ہوتا ہے۔ اندام نمائی کا اچھا رو لاحق ہوتا ہے۔

یوپونی اوٹیم (Eupionum): جب حیض کا خون وقفوں میں آئے تو ناک سے خون جاری ہوتا ہے۔ جب خون جاری ہو جاتا ہے تو کانٹے والا درد رک جاتا ہے۔ پیلے رنگ کے لیکوریا کے ساتھ کمر درد لاحق ہوتا ہے۔

مگنیشیا میور (Magnesia Mur): حیض سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں۔

مرکوریس (Mercurius): پستانوں میں درد ہوتا ہی جیسا کہ ان میں ناسوری کیفیت موجود ہو یہ کیفیت ہر حیض کے عرصہ میں ہوتی ہے۔ حیض کی بجائے پستانوں میں دودھ بھر جاتا ہے یا حیض کے زمانہ میں پستانوں میں دودھ بھر جائے۔

اپیس مل (Apis Mel): اعصابی، ہسٹریائی، بودے اور بے وقوف قسم کی مریضوں میں سن بلوغ کو پہنچنے پر حیضوں کی غیر موجودگی۔ یہ بودا پن قدرتی نہیں ہوتا بلکہ عضلات کے عدم ارتباب کے باعث پیدا ہو جاتا ہے۔

کیسٹوریم (Castoreum): پُر درد اچھارے کے ساتھ حیضوں کی غیر موجودگی، رحمی

کنزوریوں کے باعث حیض کا خون قطروں کی صورت میں بہتا رہتا ہے۔ جذباتیت پاؤں کی ٹھنک وغیرہ کے باعث۔ ٹھنڈے پینے آتے ہیں اور طاقت اچانک کھو جاتی ہے۔ ناف کے نزدیک کانٹے کا احساس ہوتا ہے۔ ہوا کے باعث پیٹ پھولا ہوتا ہے۔ جاگھ میں کھینچن ہوتی ہے۔ حیض کے دوران پاخانہ کار تھان ہوتا ہے۔

کوکولس انڈ (Cocculus Ind): غم اور پریشانی کے باعث حیض دب جاتے ہیں جس کے ساتھ چکر آتے ہیں، درد سر ہوتا ہے اور مٹلی ہوتی ہے۔

سپیا (Sepia): حیضوں کی بندش جبکہ ساتھ میں شدید قسم کا ہسٹریائی درد سر ہوتا ہے، لیکوریا ہوتا ہے اور دانت کا درد ہوتا ہے، جسم نازک ہوتا ہے، چہرے پر پیلاہٹ یا مکمل رنگ والے دماغ ہوتے ہیں، کبھی بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے اور کچکپاہٹ ہوتی ہے اور کبھی گرمی لگتی ہے، یہ دونوں کیفیتیں اولتی بدلتی رہتی ہیں۔ نازک مزاج مستورات میں ٹھنڈ کے باعث من بلوغ کو پہنچنے پر حیضوں کی بندش کا لاحق ہونا۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): حیض خوف کے باعث دب جاتے ہیں، درد سر لاحق ہوتا ہے، کھٹکتے ہوئے ہوتی ہے پاؤں سوج جاتے ہیں، بے ہوشی کے دورے ہوتے ہیں اور لیکوریا ہوتا ہے، جب مریضہ 15، 16، 17، 18 سال کی عمر بغیر حیضوں کے گزار دے۔ پستان نشوونما نہیں پاتے اور بیض دان اچھا کام انجام نہیں دیتے۔ اندام نمائی سے ہوا خارج ہوتی ہے۔

ڈلکامارا (Dulcamara): ٹھنڈ یا تر خانے میں رہائش رکھنے کے باعث حیض دب جاتے ہیں، پستانوں میں اجتماع خون ہوتا ہے اور سخت ہوتے ہیں، ہاتھوں پر مسے ہوتے ہیں، ہر حیض کے زمانہ کے دوران جلد پر پھوٹے پھنسی نکل آتے ہیں۔

کالی کارب (Kali Carb): ضیق النفس، دل کی دھڑکن، پیٹ کی ایشمن، رخساروں اور مسوڑھوں کی سوجن کے ساتھ ابتدائی یا ثانوی حیضوں کی بندش کے لئے یہ بہترین دوا ہے۔ لیکوریا لاحق ہوتا ہے۔

چائینو نٹھس (Chionanthus): برکان کے باعث حیضوں کی غیر موجودگی۔ نوٹ خون کی کمی یا تپ دق کے باعث حیضوں کی غیر موجودگی کے لئے مریانی فرما کر یہ طریقہ اختیار کیجئے کہ پہلے ان امراض کا علاج مناسب دواؤں سے کر لیجئے۔

مؤخر اور / یا پُر درد

(Delayed and/ or Painful) (Dysmenorrhoea)

اکتیاریس موسا (Actea Racemosa): حیضوں کے دوران اور بعد درد ہوتا ہے۔ حیض

بے قاعدہ بہت جلد جلد یا بہت تاخیر سے ہوتے ہیں بہت زیادہ خون جاری ہوتا ہے اتنا زیادہ درد ہوتا ہے۔ مریض اعلیٰ بے چین اور بالخصوص ہوتا ہے۔ رحم کا خروج لاحق ہوتا ہے جو کہ حیض جاری ہونے کے دوران لاحق ہوتا ہے۔ گنٹھیا لاحق ہوتا ہے، حیض بند ہو جاتے ہیں، رحم اور بیض دان کے علاقہ میں دھکن ہوتی ہے۔

ایسڈ نائٹرک (Acid Nitric): بڑے درد حیض ہوتے ہیں جن کے ساتھ پیشاب کرنے کی مسلسل حاجت ہوتی ہے۔

ایٹریس فارینوسا (Aletris Farinosa): قبض لاحق ہوتی ہے، حیض باافراط اور وقت سے پہلے جاری ہوتے ہیں، درد نہ جیسے درد ہوتے ہیں یا حیضوں کی بندش لاحق ہوتی ہے (حیضوں کی غیر موجودگی) رطوبات کے ضائع ہو جانے کے باعث نقاہت ہوتی ہے۔ ہاتھ پیر ہوتا ہے، استقامت حمل کا رجحان عموماً ہوتا ہے، رحم کا خروج ہوتا ہے۔

واجرنم اوپولس (Viburnum Opulus): حیض سے پہلے شدید قسم کا درد ہوتا ہے جو دوہرا ہونے سے کم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی حیض کا خون جاری ہوتا ہے درد غائب ہو جاتا ہے۔ درد قویٰ ہیٹ کے زیریں حصہ میں ہوتا ہے جو کہ ناقابل برداشت ہوتا ہے، درد اچانک شدت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ ہر گچھر کے 3 قطروں کی خوراک دیکھنے یا 1x طاقت کی خوراک دیجئے۔
کیمومیلا (Chamomilla): باافراط اور بڑے درد حیض میں شدید قسم کا درد قویٰ ہوتا ہے۔ اس سال کے ساتھ اطراف میں درد نہ جیسا درد ہوتا ہے۔

کریوزوٹ (Kreosote): حیض بہت جلد بہت باافراط اور دیر تک رہتے ہیں۔ اخراج گہرے رنگ کا ہوتا ہے اور بجا ہوا خون خارج ہوتا ہے، حیض صرف اسی وقت ہوتا ہے جب مریض لیٹی ہو، بیٹھنے پر حیض بند ہو جاتا ہے یا چلنے سے بھی حیض بند ہو جاتا ہے۔ جب درد قویٰ شدید ہو، حیض کا اخراج صاف اور پانی والے خون کا ہوتا ہے۔ ناف میں درد ہوتے ہیں جو کہ سفیدی مائل لیکوریا کے بعد لاحق ہوتے ہیں۔ حیض کے عرصہ کے دوران تھکے اور دل کی جلن لاحق ہوتی ہے۔

لکسٹس (Lachesis): حیض بہت زیادہ تاخیر سے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کم مقدار میں اور بہت زیادہ کم دورانیہ کے ہوتے ہیں۔ جس کے ساتھ بواسیری دردیں ہوتی ہیں، ناک سے خون بہتا ہے، خون والے پاخانے ہوتے ہیں، قبض ہوتی ہے، لیکوریا ہوتا ہے اور دانت میں درد ہوتا ہے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): حیض بہت تھوڑے اور بہت تاخیر سے ہوتے ہیں یا بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور بہت باافراط کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر 6 یا 8 دن کے بعد دوبارہ حیض ہو

جاتے ہیں، معمولی سے خوف کے باعث حیض دب جاتا ہے۔ پیٹ میں اچھارہ ہوتا ہے۔
پلساٹیلہ (Pulsatilla): ڈرپوک لڑکیوں میں پُر درد حیض ہوتے ہیں، جو کہ بہت جلد پُر جوش ہو جاتی ہیں، بہت جگے مزاج دہلی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ اپنے مرض کی علامات بتاتے ہوئے رونے لگتی ہیں۔ جسمانی طور پر موٹی ہوتی ہیں، صحتی اور کھلی ہوا کو پسند کرتی ہیں۔ جب حیض کا خون جاری ہوتا ہے تو درد رک جاتا ہے۔

لیپس ایلبس (Lapis Albus): حیض کا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ مریض گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب حیض کا خون جاری ہوتا ہے تو درد میں افادہ ہو جاتا ہے۔ پہلے دن گہرے رنگ کے لوتھڑے اور خون کی کھلیاں خارج ہوتی ہیں، کندھوں کی ہڈیوں کے درمیان درد ہوتا ہے، درد سر ہوتا ہے کمرے سے باہر رہنا پسند کرتی ہیں، یعنی کھلی ہوا میں رہنا پسند کرتی ہیں۔

سابینا (Sabina): حیض کے وقت پریشان کر دینے والا درد ہوتا ہے جس کے ساتھ نیچے کی جانب دباؤ ہوتا ہے اور درد ذہ کی طرح سے درد ہوتا ہے، بیض دانوں اور رحم میں سوزش ہوتی ہے۔

کاربو انیمالس (Carbo Animalis): پُر درد حیض ہوتے ہیں جس کے ساتھ رحم کا بڑھ جانا اور رحم کی سختی لاحق ہوتی ہے۔ حیضوں میں انتہی ہوتی ہے۔ گہر میں شدید درد ہوتا ہے جو کہ کولہوں تک پھیل جاتا ہے، قبض لاحق ہوتی ہے۔

کیوپرم میٹ (Cuprum Met): اینٹھن اور ہڈیان کے ساتھ شدید درد ہوتا ہے۔
بوفو (Bufo): بیض دانوں اور پیڑو میں حیض سے پہلے اور حیض کے دوران جلن کے ساتھ درد ہوتا ہے۔

کولوفائلم (Coulrophyllum): تشنگی و دروں والے شدید درد پیٹ میں ہوتے ہیں۔
کولوشنٹھ (Colocynth): حیض سے پہلے حیض والا درد قویٰ ہوتا ہے، حیض بہت جلد ظاہر ہو جاتے ہیں، خون سیاہی مائل ہوتا ہے جس میں اکثر خون کے لوتھڑے ہوتے ہیں۔ خراش دار لکھو رہا ہوتا ہے۔ حیض والا درد قویٰ ہوتا ہے جبکہ جھک کر دوہرا ہونے سے اس میں افادہ ہوتا ہے نیز سخت دباؤ سے بھی افادہ ہوتا ہے۔ درد رحم یا بیض دانوں میں ہو سکتا ہے، مریض اعصابی ہوتی ہے۔

سرساپاریلا (Sarsaparilla): اسال، تے اور غشیوں کے ساتھ جو کہ حیض کے وقت لاحق ہوتی ہیں، پُر درد حیض ہوتا ہے۔ سرہائے پستان سکڑے ہوتے ہیں۔

لوبیلیا انفلیٹا (Lobelia Infl): حیض پُر درد ہوتے ہیں جو کہ بے قاعدہ ہوتے ہیں، سارے

بھیٹ میں درد ہوتا ہے۔ خصوصاً بیض دانوں میں درد ہوتا ہے 'ٹانگوں میں پُر خوف درد ہوتا ہے' سارے جسم میں درد ہوتا ہے 'مسلل غشیاں ہوتی ہیں' تے اور مٹکی ہوتی ہے۔ جب حیض تاخیر سے ہوں۔ حیض سے پہلے اور حیض کے بعد تے بھی ہوتی ہے جبکہ مریضہ صحتی ٹوٹی اور بخار میں مبتلا محسوس کرتی ہے۔ حیضوں کی بے قاعدگی کے ساتھ اسلٹ لاحق ہوتے ہیں۔

گن پاؤڈر (Gun Powder): پُر درد اور کم مقدار والے حیضوں کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ حیض کا خون رک جاتا ہے اور پھر دوبارہ جاری ہو جاتا ہے۔ 3x کی دوا دیجئے۔

کیسٹوریم (Castoreum): حیض والا درد قورنچ ہوتا ہے جس کے ساتھ مریضہ پبلی ہو جاتی ہے اور ٹھنڈے پینے آتے ہیں۔

کالی کارب (Kali Carb): یہ دوا ان تمام صورتوں میں دی جاتی ہے مثلاً حیض خواہ بہت تاخیر سے ہوں اور بہت کم مقدار والے ہوں یا بہت جلدی ہوں اور بہت افراط کے ساتھ ہوں اور دیر تک رہیں۔

سیپیا (Sepia): ٹکٹنی یا ست یا جلد ہونے والے اور باافراط حیض جن کے ساتھ اینٹھن والے درد ہوتے ہیں۔ کمزور اور مرمل قسم کی مریضوں میں پہلے حیض میں تاخیر ہونے پر جبکہ حیض کی بجائے لیگوریا لاحق ہو جاتا ہے۔ خون کے چھاتی میں معین ہو جانے کے ساتھ پیڑو کے علاقہ میں نیچے کی جانب بھاری پن کا احساس ہوتا ہے۔ بھوک کے کھو جانے کے ساتھ مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ حیض کے بعد تے اور دل کی جلن لاحق ہوتی ہے۔

گرافٹس (Graphites): بہت زیادہ حد اعتدال سے بڑھی ہوئی تاخیر حیضوں میں ہوتی ہے۔ بہت کم حیض ہوتے ہیں 'مستحکم قسم کی قبض بھی ساتھ ہوتی ہے جس کے ساتھ گردہ دار بلیغم خارج ہوتی ہے۔ بائیں بیض دان میں سختی ہوتی ہے جو کہ پتھری جیسی ہوتی ہے 'جلدی امراض کا رجحان ہوتا ہے 'سونا پے کا رجحان بھی ہوتا ہے۔

کولن سونیا (Collinsonia): یواسیر کے ساتھ حیض کی شدید قسم کی بندش ہوتی ہے 'رحم کے علاقہ میں شدید قسم کے درد سے پہلے شدید قسم کا تشنج ہوتا ہے 'دل کے اعصاب کا بیجان لاحق ہوتا ہے 'دل کی تکلیف دور ہو جانے کے بعد دبے ہوئے حیض واپس لوٹ آتے ہیں۔

وربٹرم ایلیم (Veratrum Alb): انتہا درجے کی ٹھنڈ کے ساتھ پُر درد حیض ہوتے ہیں 'ہونٹ نیلے ہو جاتے ہیں 'بازو اور ٹانگیں ٹھنڈی اور ٹپلی پڑ جاتی ہیں۔ ڈوبنے کا احساس ہوتا ہے 'ہر کسی کو چوسنے کا پاگل پن ہوتا ہے۔

مگنیشیا فاس (Magnesia Phos): پُر درد حیضوں کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ دوا ہر کر جھکنے اور حرارت یا گرم چیزیں لگنے سے درد میں افادہ ہوتا ہے۔ 6x ٹرائی ٹوریشن کی دوا حاد

کیسوں میں دیجئے اور اوپچی طاقت کی دوا مثلاً 1M یا 6M کی ایک خوراک ہر پھٹے یا 15 دن کے بعد مستقل اور یقینی علاج کے لئے دیجئے۔

کلکیریا فاس (Calcarea Phos): سن بلوغ کو پہنچنے پر لڑکیوں میں پُر درد حیض ہوتے ہیں جبکہ اس کی وجہ غیر محتاط طرز زندگی ہوتا ہے۔ جس کے نتیجے میں بانجھ پن لاحق ہو جاتا ہے 'سن بلوغ کے ساتھ مسلک رحم کا درد' درد زہ جیسا درد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ نیچے کی جانب دباؤ بھی ہوتا ہے۔

بوریکس (Borax): انڈے کی سفیدی اور رسی دار لیکوریا کے ساتھ پُر درد حیض ہوتے ہیں 'حیض سے کئی دن پہلے درد ہوتا ہے' درد زہ جیسا درد ہوتا ہے۔

جیبوراندی (Jaborandi): جب حیض ٹھنڈے کے احساس کے ساتھ اور غشی کے ساتھ شروع ہوتے ہیں 'سر میں اور پیڑوں میں اعصابی ٹپکن ہوتی ہے' جس کے ساتھ درد سر ہوتا ہے۔

جیبوراندی کے ایک یا دو قطرے گرم پانی میں ملا کر دینے سے اتفاق یک دم ہو جائے گا۔

سیکیل کار (Secale Cor): حیض دالا درد قویٰ ہوتا ہے 'جس کے ساتھ ٹھنڈے لگتی ہے اور ناقابل برداشت گرمی ہوتی ہے۔ رحم میں جلن دار درد ہوتے ہیں 'بھورے رنگ کی طرح کا بدبودار لیکوریا ہوتا ہے۔ اگلے حیض تک پانی والا خون مسلسل رستا رہتا ہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): یہ ایسی سورک مزاج والی ایک عمدہ دوا ہے 'بیضہ دانہ کی تشکیلات ہوتی ہیں جس کے ساتھ پلپلا پن ہوتا ہے 'تھائی رائیڈ اور پچوئری غدود کے فعل میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ موٹاپے کا رجحان ہوتا ہے۔ بیرونی اعضاء تکاسل میں خارش ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ ٹھنڈا پیتھ افراط کے ساتھ انہی جگہوں پر ہوتا ہے 'قبل از وقت حیض دیا تین دن جلدی آجاتے ہیں۔ نفس قسم کے خواب آتے ہیں 'درد سر ہوتا ہے 'اعصابی نفاست ہوتی ہے اور حیض سے پہلے پستانوں کی سوجن ہوتی ہے 'رحم میں گومڑ ہوتا ہے۔

ہیلونیا (Helonias): 'مذہال' غیر فعال 'تھکی ہوئی مریضوں میں جو کہ تھارہتا چاہتی ہوں' حیض مؤخر ہو جاتے ہیں۔ بیضہ دانوں کی تکلیف کے باعث حیض بدبودار اور لوتھڑوں والے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ گردوں کی سوزش بھی ہو سکتی ہے نیز فیا بیٹس 'الیومن اور فاسفیٹ یوریا کے اخراج والا مرض بھی ہو سکتا ہے۔

کونیئم (Conium): کم مقدار والے حیض ہوتے ہیں جن کے ساتھ خوفناک قسم کا درد دونوں بیضہ دانوں میں ہوتا ہے۔ اکثر چہرے اور دھڑ پر خارش ہوتی ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکیوں میں یہ کیفیت ہوتی ہے جو کہ دل شکستہ 'بزدل اور رونے کا رجحان رکھتی ہوں۔

اوفورائئم (Oophorinum): حیض ہر 40 سے 65 دنوں کے بعد ظاہر ہوتے ہیں جو کہ پُر درد

ہوتے ہیں اور مختصر دورانیے کے ہوتے ہیں۔ لب ہائے فرج میں خارش ہوتی ہے۔
زنتھو کسی لم (Xanthoxylum): دبے ہوئے، مؤخر اور پر درد حیض ہوتے ہیں جن کے
 ساتھ لیکوریا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ 1x ذاتی لیڈشن ہر تین گھنٹوں کے بعد دی جائے۔

گنیشیا کارب (Magnesia Carb): پر درد حیض ہوتے ہیں جو کہ عموماً بہت زیادہ تاخیر کے
 ساتھ اور کم مقدار میں ہوتے ہیں۔ اخراج رات کے دوران اور لیٹے ہوئے کی حالت میں زیادہ
 افراط کے ساتھ ہوتے ہیں اور مریض جب کھڑی ہو جاتی ہے یا چلتی ہے تو رک جاتے ہیں۔
 جوع الطب (کتوں والی بھوک) اور معدے کا درد ہوتا ہے، متلی ہوتی ہے، نگڑا پن ہوتا ہے اور
 حیض سے پہلے دھن والا درد ہوتا ہے، شدید درد قویج ہوتا ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vomica): حیض بہت جلد ہو جاتے ہیں اور بہت دیر تک رہتے ہیں
 جن سے پہلے کھینچنے والے درد پیڑوں کے پچھلے عضلات میں ہوتے ہیں۔ ہنس۔۔۔ گوشت کے ساتھ
 سستی ہوتی ہے اور بازوؤں اور ٹانگوں میں گنٹھیا کا درد ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے اور بچہ چڑا
 پن ہوتا ہے اور مزاج میں لڑاکا پن ہوتا ہے۔ رحم میں اینٹھن ہوتی ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): حیض بہت جلدی، بہت افراط کے ساتھ ہوتے ہیں اور بہت
 دیر تک رہتے ہیں جن کے ساتھ درد قویج ہوتا ہے، نیز اطراف میں درد ہوتا ہے۔ دو میضوں
 کے درمیان خون خارج ہوتا ہے، جب حیض بہت کم مقدار میں ہوتے ہیں تو ان سے پہلے
 لیکوریا ہوتا ہے۔ کانٹے والے درد ہوتے ہیں جیسے کہ چاقو کے ساتھ کانٹے سے ہوتے ہیں۔
 رونے کا مزاج ہوتا ہے اور صفراوی تے ہوتی ہے۔

پلاٹینا (Platina): حیض بہت جلد اور افراط کے ساتھ ہوتا ہے اور درد زہ جیسا درد ہوتا ہے
 اور اینٹھن ہوتی ہے، سیاہ مواد خارج ہوتا ہے جو کہ لیکوریا کے بعد ہوتا ہے۔ بے چینی ہوتی
 ہے، کم خوابی ہوتی ہے۔ مریض شکی مزاج ہوتی ہے اور احساس برتری کا شکار ہوتی ہے۔ اینٹھن
 ہوتی ہے، درد قویج ہوتا ہے، جس کے ساتھ لب ہائے فرج کے اوپر دباؤ ہوتا ہے، جاگھ میں
 کھینچن ہوتی ہے، قبض ہوتی ہے اور متواتر پیشاب کرنے کی خواہش رہتی ہے۔

سلفر (Sulphur): کھٹے ہوئے اور پر درد حیض، پریشانی کے ساتھ ہوتے ہیں، بندش ہوتی ہے،
 قبض ہوتی ہے اور پیٹ میں تھو ہوتا ہے۔ جب دیگر منتخب شدہ ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ
 ایک طبی دوا ہوتی ہے۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): پر درد حیض ہوتے ہیں جن کے ساتھ باافراط خون جاری
 ہوتا ہے۔ نہ صرف رحم سے بلکہ ناک، چھاتی، منہ وغیرہ سے بھی خون جاری ہو جاتا ہے۔

بدبودار (حیض) — (Offensive)

پلائینا (Platina): بدبودار اور متعفن حیض ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ سیلان خون کے ساتھ اسقاط حمل کے بعد لاحق ہوتے ہیں۔

کروٹیلس (Crotalus): رکے ہوئے اور نگے سڑے مواد والے بدبودار حیض ہوتے ہیں۔

لیسیس (Lachesis): پیض دانوں کے مرض کے ساتھ بدبودار حیض ہوتے ہیں۔

لیلیئم ٹگ (Lilium Tig): جلد جلد آنے والے 'کم مقدار والے' گہرے رنگ والے 'لوٹھڑوں والے' بدبودار حیض ہوتے ہیں۔ خون صرف اسی وقت جاری ہوتا ہے جب مریض حرکت کرتی ہے 'نیچے کی طرف دبانے کا احساس ہوتا ہے۔

کولوسنٹھ (Colocynth): پیض دانوں کی رسوبی میں بدبودار حیض لاحق ہوں۔

سلفر (Sulphur): کھٹی بو والے حیض۔

کالی کارب (Kali Carb): بہت میں جاڑے اور اینٹھن والے دردوں کے ساتھ تیزبو والے حیض ہوتے ہیں۔

قبل از وقت (حیض) — (Premature)

کلکیریا فاس (Calcarea Phos): مناسب عمر سے پہلے کمزور و لاغر لڑکیوں میں حیض ہوتے ہیں 'حیض بہت جلدی' بہت زیادہ اور چھلے ہوتے ہیں۔ اگر تاخیر سے ہوں تو خون گہرے رنگ کا ہوتا ہے 'لیکوریا انڈے کی سفیدی کی طرح کا ہوتا ہے۔

سابینا (Sabina): مناسب عمر سے پہلے ہی حیض لاحق ہوں 'جو کہ باافراط اور چھلے سرخ ہوتے ہیں' رحم کی کمزوری لاحق ہوتی ہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): چھوٹی لڑکیوں میں حیض 'جس کے ساتھ خارش اور جلن ہوتی ہے' حیض سے پہلے بھی اور حیض کے بعد بھی دودھ کی طرح کا لیکوریا ہوتا ہے۔ درد سر ہوتا ہے 'اور حیض سے پہلے درد قوی ہوتا ہے۔

کاربو وِج (Carbo Veg): قبل از وقت اور بہت زیادہ افراط کے ساتھ حیض آتے ہیں 'خون پیلا ہوتا ہے' لب ہائے فرج سوہے ہوتے ہیں 'حیض کے دوران ہاتھوں اور پاؤں کے ٹکڑوں میں جلن ہوتی ہے۔

بافراط (حیض)

Profuse (Menorrhagia or Malomhagia)

چائنا (China): حد اعتدال سے زیادہ خون بننے کے لئے اور حیض کا دورانیہ لمبا ہونے کے لئے یہ چینی کی دوا ہے۔ اسے سب سے پہلے استعمال کرنا چاہئے۔ خصوصاً جب مریض لاغر کمزور ہو۔

رہس اروماتیکا (Rhus Aromatica): رحم کی کمزور حالت کے باعث سیلان خون ہوتا ہے، درہنچر کی قطروں والی خوراکیں دیجئے۔

تھلاپی برساکیو (Thlaspi Bursa O): سیلان خون آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے اور پھر بہت زیادہ افراط کے ساتھ بننے لگتا ہے۔ حتیٰ کہ مریض بے انتہا کمزور ہو جاتی ہے۔ وہ بمشکل ہی اپنی طاقت دوبارہ حاصل کرتی ہے کہ اگلے مہینے کا خون جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ درہنچر کی قطروں والی خوراک دیجئے۔

میچل (Mitchella): متواتر پیشاب آنے کے ساتھ حیض کا خون آتا ہے، پیشاب آزادانہ اور پُر اچھو نہیں ہوتا، پر درد پیشاب آنے کے ساتھ خون چمکیلا سرخ ہوتا ہے۔

بیلادونا (Belladonna): وقت سے پہلے اور بافراط حیض ہوتے ہیں۔ اس احساس کے ساتھ کہ جیسے ہر چیز اندام نمائی سے خارج ہو کر گر پڑے گی، گندی بو والا بھابھا خون خارج ہوتا ہے۔ سر میں تلک والی درد ہوتا ہے اور چہرہ سرخ اور پھولا ہوا ہوتا ہے۔

سٹرامونیم (Stramonium): سیاہ خون کا بافراط اخراج ہوتا ہے، خون بھابھا لو تھڑے دار ہوتا ہے، پیٹ میں، رانوں میں اور بازوؤں اور ٹانگوں میں کھینچنے والے درد ہوتے ہیں۔ مریض ہوتی ہوتی ہے۔

ایگناتیا (Ignatia): ہر چند دن کے بعد طویل دورانیے والے حیض ہوتے ہیں، پیٹ میں اینٹھن اور سختی ہوتی ہے، ہسٹریا ہوتا ہے، غشی کے ساتھ مٹھی ہوتی ہے، روشنی برداشت نہیں ہوتی، نظر دھندلی ہو جاتی ہے۔

آرنیکا ایم (Arnica): جب بافراط خون کھچلاؤ کے ساتھ جاری ہوتا ہے، غلط اقدام یا دوسری میکانیکی چٹ کے باعث ہوتا ہے۔

کیمومیل (Chamomilla): کھینچنے والے اینٹھن والے درد قویٰ کے ساتھ، بافراط حیض جاری ہوتا ہے، درد قویٰ پیٹ کے اطراف میں ہوتا ہے۔

راتانیا (Ratanhia): پیٹ اور جانگھ میں درد کے ساتھ رحم سے سیلان خون ہوتا ہے،

اعضائے ناسل کی طرف نیچے کو دباؤ ہوتا ہے اس کے بعد لیکوریالاج ہو جاتا ہے۔
سیلیشا (Silicea): ہر مرتبہ جب پچہ پستان منہ میں لیتا ہے تو اندام نعلانی سے خون جاری ہو جاتا ہے۔

لیکسیس (Lachesis): گہرے رنگ کے لو تھڑے اور سخت قسم کے دردوں کے ساتھ اعتدال سے زیادہ خون جاری ہوتا ہے جب خون کا اجراء شروع ہوتا ہے اور لو تھڑے خارج ہوتے ہیں تو درد میں افتادہ ہو جاتا ہے۔ گرمی اور گرم موسم کے دوران بہتری ہوتی ہے ٹھنڈ میں بہتری ہوتی ہے۔ ناخوشگوار بو کے ساتھ باافراط پیسے آتے ہیں پستان غیر مکمل نشوونما یافتہ یا ناکافی نشوونما یافتہ ہوتے ہیں۔

وسکم البم (viscum Album): باافراط خون جاری ہوتا ہے جو کہ ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھونے کے باعث لاحق ہوتا ہے۔

ایپی ہسٹری نم (Epihysterinum): ریشوں والی رسولی کے باعث باافراط سیلان خون ہوتا ہے۔

آلی ٹریس فاری نوسا (Aletris Farinosa): حیض باافراط اور قبل ازوقت ہوتے ہیں جو کہ رحم کی ناطاقی والی حالت کے باعث ہوتے ہیں حیضوں کی غیر موجودگی والے درد درد زہ کی طرح ہوتے ہیں۔ رطوبات کے ضائع ہو جانے کے باعث نکابت ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پن لاحق ہوتا ہے۔ طبعی اسقاط حمل کا رجحان ہوتا ہے۔ خروج رحم ہوتا ہے قبض ہوتی ہے غذا سے نفرت ہوتی ہے مٹی اور بد ہضمی ہوتی ہے رحم سے جریان خون ہوتا ہے یہ کیفیت اسقاط حمل کے بعد ہو سکتی ہے یا اس کا تعلق حیضوں سے ہو سکتا ہے۔ باافراط سیلان خون سے پہلے بڑے بڑے خون کے لو تھڑے خارج ہوتے ہیں۔

امبرا گریشیا (Ambra Grisea): اعصابی مستورات میں معمولی سے کھنچاؤ کے ساتھ دو حیضوں کے درمیان خون جاری ہوتا ہے۔ بہت جلد اور بہت افتادہ کے ساتھ وقت سے سات روز پہلے حیض جاری ہو جاتا ہے اور پھر شدید قسم کی خارش دکن اور سوجن اعضائے ناسل میں ہو جاتی ہے۔

فائیگس ریل (Ficus Rel): خون باافراط جاری ہوتا ہے جو کہ رحم سمیت جسم کے کسی بھی حصہ سے جاری ہو جاتا ہے جس کی بظاہر کوئی وجہ نہیں ہوتی۔

کریو زوٹ (Kreosote): کوئی چیز اٹھانے کے باعث بہت زیادہ تھکاوٹ کے باعث اور بیش مجامعت کے بعد رحم سے خون جاری ہوتا ہے۔ مجامعت کے دوران کوئی درد نہیں ہوتا۔ حیض باقاعدہ ہوتے ہیں لیکن باافراط اور لو تھڑوں والے ہوتے ہیں بعض اوقات سیاہ رنگت والے

بہت زیادہ متعفن ہوتے ہیں۔ اعضاءے قائل اور رانوں میں کچا پن پیدا ہوتا ہے، حیض رک جاتے ہیں اور پھر دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں، بہت جلد شروع ہوتے ہیں اور بہت دیر تک رہتے ہیں۔ مسلسل دکھن والا دم درد کمر میں ہوتا ہے، خون جاری ہونے کے ایک دن بعد سر کے بائیں جانب خوفناک درد ہوتا ہے، دودھ جیسا لیکوریا ہوتا ہے۔ حیض صرف اس وقت ہوتے ہیں جب مریض لیٹی ہوتی ہے، بیٹھنے سے یا چلنے سے حیض رک جاتے ہیں۔

سابینا (Sabina): بچے کو دہانے کے احساس کے ساتھ خون جاری ہوتا ہے، بعض اوقات حیض کا آئندہ دور شروع ہونے تک خون جاری رہتا ہے۔ گنٹھیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ادھار ہوا سیلان خون ہوتا ہے، سیلان خون گنٹھیا کے رکنے پر شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے برعکس ہوتا ہے۔

کاربو انیمالس (Carbo Animalis): حیض بہت جلدی، بہت طویل اور باافراط ہوتے ہیں، ہر حیض کے جاری ہونے کے ساتھ شدید قسم کی نفاہت ہو جاتی ہے، اندام نہانی میں جلن ہوتی ہے جیسے کہ اس پر جلتا کوئلہ رکھ دیا گیا ہو۔ جیسے ہی مریض پستان بچے کے منہ میں دیتی ہے خالی پن کا احساس ہوتا ہے۔

کاربو ویج (Carbo Veg): ملاقات کے فقدان کے باعث رحم میں سکڑنے کی اہلیت نہیں ہوتی جس کے باعث خون جاری ہو جاتا ہے، یہ کیفیت زچگی، حیض یا عاداتی سیلان خون کے بعد ہو سکتی ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): ٹھنڈے پانی کی ناقابل برداشت پیاس کے ساتھ سیلان خون لاحق ہوتا ہے، سرگرم ہوتا ہے۔

امونیا کارب (Ammonia Carb): حیض بہت جلد ہوتے ہیں، خون سیاہی مائل ہوتا ہے، اکثر خون کے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکوریا خراش دار ہوتا ہے، اعضاءے قائل میں سوجن ہوتی ہے، حیض سے پہلے جکڑن اور درد قویٰ ہوتا ہے۔ حیض کے ہر دورے میں اعضاءے مستقیم سے خون بہتا ہے۔

امونیا ایم (Ammonia M): آنتوں اور اعضاءے مستقیم سے جریان خون کے ساتھ حیض ہوتے ہیں، خصوصاً زرد رنگت والی پیار اور کمزور مستورات میں، حیض جلد جلد ہوتے ہیں اور ہر ماہ کمر میں درد کے ساتھ ہوتے ہیں، خون کا سیلان رات کے وقت ہوتا ہے۔

سیکیل کار (Secale Cor): سیاہ رنگ کے خون کا سیلان باافراط ہوتا ہے جس کے ساتھ بازوؤں اور ٹانگوں میں برقی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ دہلی پتلی مستورات میں یہ مرض لاحق ہوتا ہے جو کہ گرمی سے ہمیشہ بیمار ہوتی ہیں۔ مریض کپڑے اتارنا چاہتی ہے اور خود کو لٹھا کرنا چاہتی

ہے، حیض کا خون پتلا اور متعفن ہوتا ہے، خون میں لو تھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔
اسٹیلگو (Ustilago): رحم کے اندر کی جانب جھکے ہونے کے باعث سیلان خون ہوتا ہے، خون
 چمکیلا سرخ جس کا کچھ حصہ مائع اور کچھ حصہ لو تھڑوں والا ہوتا ہے، معائنہ کرنے والے کی انگلی
 کو مریضہ کا رحم نرم اور اسٹنجی محسوس ہوتا ہے۔

ٹرلیم (Trillium): سیلان خون چمکیلا سرخ اور باافراط ہوتا ہے جس کے ساتھ معدے کے
 بالائی حصہ میں غشی کا احساس ہوتا ہے۔ کمر درد ہوتا ہے، بازو اور ٹانگیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، نبض
 تیز رفتار اور نرم ہونے کے ساتھ نقابت ہوتی ہے، رحم کے ریشوں کی تکلیف کے باعث جریان
 خون ہوتا ہے۔ یہ دوا جریان خون کو روک دیتی ہے اور ریشوں کی نشوونما کو جذب کر لیتی ہے۔
اکونائٹ این (Aconite N): جب تیزی کے ساتھ چمکیلا سرخ خون خارج ہونے کے ساتھ
 موت کا خوف لاحق ہو۔

فیرم میٹ (Ferrum Met): حیض بہت جلدی اور بہت افراط کے ساتھ جاری ہوتے ہیں جو
 دیر تک رہتے ہیں جن کے باعث مریضہ کو نقابت ہو جاتی ہے۔

ایپیکاک (Ipec): شدید نقابت کے ساتھ سیلان خون ہوتا ہے، چمکیلا سرخ خون ایک دھار کی
 صورت میں بہت تیزی کے ساتھ بہتا ہے جو کہ کپڑوں اور بستر میں سے گزر کر فرش پر ایک
 تالاب کی صورت میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ خون جلدی سے نہیں جمتا، مریضہ پہلی ہوتی ہے، اس
 کا جی مٹلاتا ہے اور غشی ہوتی ہے۔ 200 طاقت کی یا 1M طاقت کی خوراک ہر پندرہ منٹ کے
 بعد دہجے یہاں تک کہ اتفاقہ شروع ہو جائے اور پھر دوا روک دیجئے۔

پلاٹینم (Platinum): حیض 4 یا 6 دن پہلے جاری ہو جاتے ہیں اور بہت افراط کے ساتھ
 ہوتے ہیں۔

گلیکیریا کارب (Galcareia Carb): رحمی جریان خون ہوتا ہے جو کہ بڑے بڑے لو تھڑوں
 اور چمکیلے سرخ مائع کے ساتھ ملا جلا ہوتا ہے اور بہت افراط کے ساتھ ہوتا ہے، ذہنی صدمہ
 سیلان خون کا باعث بنتا ہے۔ پاؤں ٹھنڈے مرطوب ہوتے ہیں، یہ دوا ایسی حالت میں ناگزیر ہو
 جاتی ہے جبکہ حیض معمول کے دنوں سے چند روز پیشتر ہی ظاہر ہو جائیں خصوصاً جب خون کا
 بہاؤ نمایاں طور پر زیادہ ہو۔

ونکامائنر (Vincaminor): باافراط حیض جاری ہوتے ہیں یا بغیر رکے کثرت کے ساتھ حیض
 جاری ہوں جبکہ خون مسلسل ایک دھار کی صورت میں بہتا ہے جس کے ساتھ شدید قسم کی
 نقابت ہو جاتی ہے۔

کوکولس انڈیکا (Coccula Ind): غم اور پریشانی کے باعث بہت زیادہ لاغر مستورات میں

بہت زیادہ جلد اور بہت دیر تک رہنے والے حیض۔
فرنگی نس امریکانہ (Fraxinus Americana): بے انتہا دروں والے حیض، یہ حیض
 مؤخر ہوتا ہے لیکن باافراط ہوتا ہے، یہ 5 سے 12 ہفتوں کے وقفے سے آتا ہے۔

کم مقدار (حیض) — (Scanty)

سائیکل من (Cyclamen): کم مقدار والے حیض جن کے ساتھ چکر آنٹس اور درد سر ہو،
 پیٹ میں خفناک قسم کا درد ہوتا ہے، جو ٹکونی ہڈی سے شروع ہو کر پیٹ کے دونوں جانب پھڑو
 تک پھیل جاتا ہے، حیض بے قاعدہ ہوتے ہیں جو کہ کئی مہینوں کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ مریض
 ٹھنکیں، دل شکستہ ہوتی ہے، کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتی، سست ہوتی ہے۔
پلساٹیلہ (Pulsatilla): مؤخر اور کم مقدار والے حیض، سائیکل من والی تمام علامات کے ساتھ
 سوائے اس کے کہ پلساٹیلہ کے مریضہ پیشہ کھلی ہوا میں بستر ہو جاتی ہے۔
سلفر (Sulphur): قبض اور جلد کے پھوڑے پھنسیوں کے رچھان اور تھمبھٹ کے ساتھ
 حیض مؤخر ہوتے ہیں۔ دوپہر سے پہلے پیٹ کے گڑھے میں معدہ خالی ہونے کا احساس ہوتا

ہے۔
الیومنا (Alumina): مستورات کی مکمل جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ کے بعد کم مقدار والے
 حیض ہوتے ہیں، دو حیضوں کے درمیان لیکوریا لاحق ہوتا ہے جو کہ باافراط، خراش دار اور
 چھلنے والا ہوتا ہے اور بہہ کر اڑیوں تک چلا جاتا ہے۔

گرافائٹس (Graphites): کبھی کبھی ہونے والے حیض جو بہت پہلے اور بہت تھوڑے
 دورانیے والے ہوتے ہیں۔ جیٹ میں درد ہوتے ہیں، رحم میں انقباض ہوتی ہے، بازوؤں اور
 ٹانگوں میں گٹھلیاوی درد ہوتا ہے، ہاتھ اور پاؤں میں استسقلی سوجن ہوتی ہے، کم مقدار والا
 حیض دیگر تکلیفات کے ساتھ ہوتا ہے مثلاً درد سر اور جلدی بیماریاں۔

منگانم (Manganum): کم مقدار والے حیض اور متواتر ہونے والے حیض خون کی کمی والی
 لڑکیوں میں ہوتے ہیں۔

نایٹرم میور (Natrium Mur): ٹھیلی جلد والی مریضوں میں قبض کے ساتھ کم مقدار والے
 حیض ہوتے ہیں۔

اکٹیارئس موسا (Actea Racemosa): حیض کم مقدار والے، گہرے رنگ والے اور
 جیسے ہوئے خون والے ہوتے ہیں، شدید قسم کی عام کمزوری ہوتی ہے، دو حیضوں کے درمیان کم
 مقدار کا سیلان خون ہوتا ہے۔

گن پاؤڈر (Gunpowder): کم مقدار والے اور پُر درد حیضوں کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ سیلان خون رک جاتا ہے اور پھر ۳ گھنٹوں کے بعد جاری ہو جاتا ہے۔ 3x طاقت کی دوا دیجئے۔

دودھ (Milk)

(”پستن“ کے ذیل میں دیکھئے)

ابھار (فرج سے اوپر والی جگہ)

Mons Veneris (Projection of the Lower Part
of the Abdomen Over the Vulva)

پلائٹنا (Platina): جبکہ ٹھنڈی اور چھوٹے سے احتدال سے زیادہ حساس ہوتی ہے۔ رومل برداشت نہیں ہو سکتا۔ اندام نسائی یا رحم پر مسلسل دباؤ پڑتا ہے۔ جبکہ پُر درد ہوتی ہے۔
کونیم (Conium): بڑے بڑے کیل ماسے ہوتے ہیں جو چھوٹے سے درد کرتے ہیں۔ غارش ہوتی ہے۔

جنسی جنون — (Nymphomania)

(تیز دیکھئے ”خواہش۔ بڑھی ہوئی“)

پلائٹنا (Platina): بڑھی ہوئی خواہش جماع کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ خصوصاً زچگی کے بعد دلی مستورات میں یا حمل کے دوران۔

فسفورس (Phosphorus): اگر پلائٹنا تکام ہو جائے تو اسے آزلایا جاسکتا ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vomica): خود لذتی کے بعد (یعنی جلق کے بعد)۔

اگیریس ایلم (Agar. M): ہم آغوش ہونے کی شدید خواہش کے ساتھ اعضاء میں غارش اور لگیان ہوتا ہے۔

سپیا، پلسائٹلا (Sepia, Pulsatilla): جب یہ تکلیف لیکوریا کے ساتھ ہو۔ دی گئی ترتیب کے مطابق ادویات استعمال کیجئے۔

گریشیولا (Gratiola): مستورات میں بڑھی ہوئی خواہش جماع اور جلق کے لئے یہ ایک مخصوص دوا ہے۔

ہائوسکیمس (Hyoscyamus): حیا کے فقدان کے ساتھ جماع کی بڑھی ہوئی خواہش۔
 میوریکس (Murex): جنسی اعضاء میں شدید قسم کا جوش ہوتا ہے اور ہم آغوش ہونے کی
 اعتدال سے بڑھی ہوئی خواہش ہوتی ہے، اعضاء کو معمولی سا چھونے کے باعث شدید قسم کا
 جنسی جوش پیدا ہو جاتا ہے۔
 کیلیڈیم (Caladium): پیٹ کے کینڑوں کے باعث بڑھی ہوئی خواہش جماع، یہ کینڑے اندام
 نسائی میں ریختے ہیں اور عیجان کا باعث بنتے ہیں۔
 زنک (Zinc): حد اعتدال سے بڑھا ہوا جنسی عیجان جو مریضہ کو جلق کی طرف کھینچ کر لے جاتا
 ہے۔
 اوری گینم (Origanum): عظیم جنسی جوش جو مریضہ کو خود لذتی کی طرف لے جاتا ہے۔
 مریضہ مشکل ہی سے ایک دن اس میں ملوث ہوئے بغیر گزارتی ہے۔ بھاگ جانے کی تحریک
 ہوتی ہے۔
 سلفر (Sulphur): خود لذتی یا جلق کی خواہش کے ساتھ بڑھی ہوئی خواہش جماع۔
 سٹرامونیم (Stramonium): حیض کے وقت بڑھی ہوئی خواہش جماع۔
 کلکیر یا کارب (Calcarea Carb): ذہنی جوش کے ساتھ نہ کہ جسمانی جوش کے ساتھ
 جماع کی بڑھی ہوئی خواہش۔

بیضہ دانیائیں — (Ovaries)

(ہیز دیکھئے ”رحم کی یا بیضہ دان کی سوزش“)

اپیس مل (Apis Mel): نیچے کی جانب ران کے سن ہو جانے کے ساتھ یا اس کے بغیر دائیں
 بیضہ دانی میں اجتماع خون اور سوزش ہوتی ہے۔ چھاتی میں تنگی ہوتی ہے اور اضطرابی کسانسی
 بھی موجود ہو سکتی ہے۔

بیلادونا (Belladonna): بیضہ دانوں کی حاد سوزش چکن والے درد ہوتے ہیں، دائیں جانب
 اتھری ہوتی ہے، معمولی سا بٹنے سے درد ہوتا ہے، اعتماد رے کی حساسیت ہوتی ہے۔

لکسیس (Lachesis): بائیں بیضہ دانی میں درد ہوتا ہے جس میں رحم سے اخراج ہونے کے
 باعث اتفاق ہوتا ہے، رحم کے علاقہ میں بھاری پن برداشت نہیں ہو سکتا، یہ دوا دائیں بیضہ دانی
 کی تکلیف میں بھی مفید ہوتی ہے۔ بشرطیکہ بائیں بیضہ دانی والی دی گئی تمام علامات موجود ہوں۔

آرسینک الیم (Arsenic Alb): جلن دار شدید درد بیضہ دانیوں میں ہوتے ہیں جن میں
 اتفاق گرم چرس لگانے سے ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، مختصر وقفوں کے ساتھ تھوڑی تھوڑی

مقدار کے لئے پانی کی پیاس ہوتی ہے۔

پلاٹینم (Platinum): بیضہ دانوں میں جلن دار درد ہوتے ہیں جس کے ساتھ حساسیت ہوتی ہے اور جنسی جوش ہوتا ہے، دہاؤ درد میں اضافہ کر دیتا ہے۔

لیلیئم ٹنگ (Lilium Tig): بیضہ دانوں کا اعصابی درد ہوتا ہے، بیضہ دانوں سے شروع ہو کر جلن دار درد پیٹ میں اوپر کی جانب اور رانوں میں نیچے کی جانب پھیلتا ہے۔ گولی لگنے جیسے درد بائیں بیضہ دانی سے شروع ہو کر پیڑو تک یا اوپر پستانوں تک چلے جاتے ہیں۔

کولوسنتھ (Colocynth): بیضہ دانیوں والا درد قویٰ ہوتا ہے، ہکڑن والے درد ہوتے ہیں، جن میں افادہ جھک کر دہرا ہونے سے ہوتا ہے۔

آئیوڈین (Iodine): پستانوں کے گھٹنے گھٹنے کم ہو جانے کے باعث دائیں بیضہ دانی میں اجتماع خون اور استسقاء لاحق ہوتا ہے۔ مدہم دہانے والا درد رحم تک پھیل جاتا ہے۔ فائدہ ٹھکنے جیسا درد دائیں بیضہ دانی کے علاقہ میں ہوتا ہے۔

اوپوریم (Oophorium): بیضہ دانی میں تھیلی ہونے کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔

پالادیئم (Palladium): دائیں بیضہ دانی میں درد ہوتا ہے جس میں افادہ سخت دہاؤ سے ہوتا ہے۔

سینکریس (Cenchris): دائیں بیضہ دانی میں سوزش اور درد ہوتا ہے، اخراج گہرے رنگ کا اور گندا ہوتا ہے جس کے ساتھ دائیں بیضہ دانی میں اینٹھن ہوتی ہے۔

بیوفو (Bufo): بیضہ دانیوں میں جلن دار گرمی اور درد ہوتا ہے جو کہ پھیل کر نیچے کو رانوں تک چلا جاتا ہے۔ بیضہ دانیوں کے قریب تھیلیاں اور کیزے ہونے کے ساتھ حیض کی عدم موجودگی ہوتی ہے۔

کاربونیئم سلف (Carboneum Sulph): بیضہ دانیوں کی کمزوری ہوتی ہے، جماع سے بے زاری ہوتی ہے۔ لب ہائے فرج میں خارش ہوتی ہے۔

زینتھوکسی لم (Xanthoxylum): بیضہ دانیوں کا اعصابی درد ہوتا ہے۔ حیض بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور پُر درد ہوتے ہیں جن کے ساتھ زیریں پیٹ میں اور جاکھ میں درد ہوتا ہے۔ بائیں ناقص ہوتا ہے، بے خوابی ہوتی ہے، چاند میں درد سر ہوتا ہے۔

مرکبوریس سول (Mercurius Sol): دائیں بیضہ دانی میں درد ہوتا ہے جو گرم کپڑوں سے ڈھانپنے سے بہتر ہوتا ہے اور پیسے آنے سے دور ہوتا ہے، بیضہ دانیوں میں ڈنگ لگنے جیسے پھاڑنے جیسے اور کاٹنے جیسے درد ہوتے ہیں۔

ویسپا (Vespa): متواتر جلن دار پیشاب آنے کے ساتھ بائیں بیضہ دانی میں درد ہوتا ہے،

اندام نسائی کے بیرونی سوراخ کے ارد گرد پھیلن ہوتی ہے۔

حمل — (Pregnancy)

اسقاط (حمل) — (Abortion)

اکونائٹ این (Aconite N): خوفناک خوابوں کے باعث اسقاط حمل لاحق ہوتا ہے مثلاً لیروں کے خواب، آگ یا سمندر میں ڈوبنے وغیرہ کے خواب ہوتے ہیں۔ 200 ملاقت کی دوا دیتے ہیں۔

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): غلط قدم یا بھاری وزن اٹھانے کے باعث یا دیگر جسمانی نقصان، جلوتوں، گرنے، خراشوں یا چوٹوں کے گھٹنے کے باعث اسقاط حمل ہوتا ہے۔

سبائنا (Sabina): ہر مرتبہ دوسرے یا تیسرے مہینے میں اسقاط حمل ہو جانے کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ اسقاط حمل کی علامت ہوتی ہے۔ گہرے رنگ کا خون خارج ہوتا ہے۔ چھوٹی کمر میں اور اعضائے تناسل میں درد ہوتا ہے۔

واہبرنم پرو (Viburnum Pru): اسقاط حمل کر روکنے کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ خصوصاً آنکھیں مہینے میں جب کہ بچے پیدائش کے فوراً بعد مر جاتے ہیں۔ یہ دوا ایسی ادویات کے اثر کو زائل کر دیتی ہے جن کے کھانے سے اسقاط حمل لاحق ہوتا ہے۔ کوئی عورت اسقاط نہیں کر سکتی اگر اسے یہ دوا استعمال کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔

سپیا (Sepia): پانچویں سے ساتویں مہینے کے دوران اسقاط حمل لاحق ہو، مریضہ کمزور اور نازک ہوتی ہے، لیکوریا اور قبض والا مزاج ہوتا ہے۔

جلسی میم (Gelsemium): ذہنی جوش کے باعث اسقاط حمل لاحق ہوتا ہے، درد پیٹ سے اوپر کی طرف جاتا ہے اور کمر میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔

اورم میور۔ نیٹرم (Aurum Mur. Nat): گردن رحم کی سختی کے باعث جب اسقاط حمل ہو۔

پلساٹیل (Pulsatilla): جوش والے اسقاط حمل کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے، یہ دوا 3x ڈائی یوشن میں ایک مہینہ کے لئے دی جاتی ہے۔ 30 ڈائی یوشن میں اگر یہ دوا دی جائے تو اسقاط حمل کو روک دیتی ہے۔ مریضہ بزدل، ٹھنڈی ہوتی ہے، بے پیاس نہیں لگتی، اخراج دقتہ دار ہوتا ہے۔

کروکس (Crocus): تیسرے مہینے میں اسقاط حمل لاحق ہوتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے

ہیٹ میں کوئی زخمہ چڑ موجود ہو۔

تھلاسپی (Thlaspi): ایسا اسقاط حمل جس کے شروع میں خون جاری ہوتا ہے، درد چھپر استعمال کیجئے۔

گوسی پلم (Gossypium): یہ ایک دوسری دوا ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بتدریج لاحق ہونے والے اسقاط حمل کے لئے مفید ہوتی ہے۔ یہ دوا درد چھپر کے قطرہوں والی خوراکیوں کی صورت میں دینی چاہئے۔

کلیسریا کارب (Calcarea Carb): افراط دم (کثیر مقدار میں خون) والی مستورات میں بلا افراط اور قبل از وقت حیضوں کے ساتھ لیکوریا کا مزاج ہوتا ہے۔ چھوٹی کمر میں درد ہوتا ہے۔ کیمفر (Camphor): پتلی جسامت والی مستورات کے لئے یہ ایک موزوں دوا ہے۔ جو لیکوریا کے لئے مددگار ہوتی ہے۔ چھاتی میں ٹھنڈک ہوتی ہے یا سر میں ٹھنڈک ہوتی ہے یا نزلہ دبی مادے خارج ہوتے ہیں۔

فیرم سیٹ (Ferrum Mel): سبز رنگ والی مریضوں کے لئے یہ موزوں دوا ہے۔ جن میں حیض رک جاتا ہے اور وہ لیکوریا میں جکڑا ہو جاتی ہے۔

ایپیکاک (Ipec): چکلیے سرخ خون کے مسلسل اخراج کے ساتھ درد توڑخ اور ہیٹ میں کانٹے والے درد کے ساتھ حاد سیان خون ہوتا ہے رجم پر شدید دیا ہوتا ہے۔

پلاٹینا (Platina): جب اپنی کاک ٹاکم ہو جائے تو اسے آزمایا جاسکتا ہے۔

سیکیل کار (Secale Cor): جب رجم میں عضلاتی مرض لاحق ہو چکا ہو یا طاقت میں کمی واقع ہو گئی ہو۔ پتلی دلی اور تھکی ہوئی مستورات کے لئے موزوں دوا ہے، اسقاط حمل تیسرے مہینے میں ہوتا ہے۔

نوٹ: یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہئے کہ ہومیو پیتھی میں کوئی دوا ایسی نہیں ہے جو امراض کو پیدا کرے۔ لہذا اسقاط حمل پیدا کرنے میں ناکامی ایک عام اصول ہو گا۔ تاہم اوپر دی گئی ادویات ایسے کیسوں میں آزمائی جاسکتی ہیں جن میں مریض کی صحت کے اعتبار سے ان ادویات کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحت مند عورتوں میں اسقاط حمل کا باعث بننا ایک جرم ہے۔

البیومن کا اخراج (دوران حمل)

(Albuminuria)

اپیس مل (Apis Mel): حمل کے دوران پیشاب میں البیومن خارج ہوتا ہے جس کے لئے یہ چھوٹی کی دوا ہے۔

کنٹھرس (Cantharis): جلن دار پیشاب ہوتا ہے نیز پیشاب جلتا ہے اور اس کے ساتھ الیومن خارج ہوتا ہے۔ پیشاب کم مقدار میں خارج ہوتا ہے۔

ایونی من (Euonymin): دوران حمل پیشاب کے ساتھ الیومن خارج ہو۔ ۲ گرین tx کی خوراک آدھے گلاس پانی میں ملائیں اور ہر گھنٹے کے بعد ایک چھوٹا چمچ خوراک دیں۔

ہیلونیا (Helonias): دوران حمل پیشاب میں الیومن خارج ہو۔

ٹیری۔سم (Terebinth): پیشاب کی بندش کے ساتھ یا پیشاب قطرہ قطرہ خارج ہونے کے ساتھ الیومن خارج ہوتا ہے۔

مرکیورس کار (Mercurius Cor): حمل میں گردوں کی سوزش کے ساتھ الیومن کا اخراج۔

فسفورس (Phosphorus): تاخیری حمل میں اور حمل کا زمانہ پورا ہو جانے پر الیومن خارج ہوتا ہے۔

مقعد (دوران حمل) — (Anus)

کیپسکیم (Capsicum): دوران حمل مقعد میں جلن ہوتی ہے۔

نفرت، بیزاری (دوران حمل) — (Aversion)

سپیا (Sepia): حمل میں روئی سے نفرت ہوتی ہے۔ غذا کے متعلق مریض سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ اس سے وہ بیمار ہو جاتی ہے۔

لاروسیراس (Laurocerasus): دوران حمل غذا سے نفرت ہوتی ہے۔

نیچے کو دباؤ (خروج)

Bearing Down (Prolapsus)

(نیز دیکھئے "رحم" کے ذیل میں "نیچے کو دباؤ")

سپیا (Sepia): نیچے کی جانب دباؤ کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے خواہ حمل میں یا اس کے بغیر ہو۔ ساتویں مہینے میں درد زہ جیسے درد ہوتے ہیں۔ اونچے درجے کی دوا دیجئے۔ مثلاً 1000 یا CM طاقت کی دوا۔

سرساپارٹلا (Sarsaparilla): کمر میں کھینچنے والا درد ہوتا ہے جس کی لہریں ہاتھوں، پاؤں اور انگوٹھوں تک جاتی ہوں، پاخانہ کرنے سے پہلے اور پاخانہ کرنے کے دوران کمر میں شدید درد

ہوتا ہے۔

کالی کارب (Kali Carb): چھوٹی کمر میں شدید درد ہوتا ہے جیسا کہ کوئی بوجھ پیڑو میں رکھا ہو۔ ۱۰۰۰ طاقت کی ایک خوراک دیتے اور تین یا چار دن تک انتظار کیجئے۔

سیکیل کار (Secale Cor): متواتر اور دیر تک رہنے والا زور دار درد ہوتا ہے۔ جسمانی ساخت پتلی اور مزاج خراب ہوتا ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): بچے کو دہانے کے احساس کے ساتھ درد ذہ جیسے درد ہوتے ہیں یہ رات کی چوکیداری یا ذہنی تکاؤ کے باعث ہو سکتا ہے۔

اسٹیلگو (Ustilago): یہ دوا پردرد اور طویل حمل کے لئے مفید ہوتی ہے۔

تنفس (دوران حمل) — Breathing

نکس وامیکا (Nux Vom): دوران حمل تنفس میں دقت ہوتی ہے۔

کھانسی (دوران حمل) — Cough

کالی پائیکرام (Kali Bi): کمروری مسلسل کھانسی ہوتی ہے۔ اعصابی کھانسی ہوتی ہے جس سے مستقل حمل کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔

کالی بروم (Kali Brom): حاملہ مستورات کی اضطرابی کھانسی رات کے وقت خشک تھکا دینے والی کھانسی ہوتی ہے۔

کاسٹیکم (Causticum): خشک کھانسی ہوتی ہے۔

کونیم (Conium): مسلسل خشک کھانسی ہوتی ہے جس میں ذہنی یا جسمانی تھکاوٹ سے ابتری ہوتی ہے۔ نیز بولنے سے یا چلنے سے ابتری ہوتی ہے۔ رات کے وقت ابتری ہوتی ہے۔

بیلادونا (Belladonna): کمروری کھانسی خشک چہرہ پر تنہا ہوتی ہے۔

موت (کا خوف دوران حمل) — Death

اکونائٹ این (Aconite N): دوران حمل موت کا خوف ہوتا ہے۔ 200 ڈائی لیوشن کی دوا استعمال کیجئے۔ چار گھنٹوں کے وقفے کے ساتھ دوا تین خوراکیں کافی ہوں گی۔

خواہش (دوران حمل) — Desire

ورٹرم البم (Veratrum Alb): تیزابیوں کی خواہش ہوتی ہے۔ ہر چیز ٹھنڈی نہیں پسند

کرتی ہے یا غذا۔
 سلفر (Sulphur): شکر یا اچار کی خواہش ہوتی ہے۔
 مگنیشیا کارب (Magnesia Carb): مخصوص قسم کی غذا کی خواہش ہوتی ہے۔
 نیٹرم میور (Natrium Mur): خشک اور نمکین غذا کی خواہش ہوتی ہے۔
 چیلی ڈونیم (Chelidonium): غیر معمولی غذا کی اشیاء کی خواہش ہوتی ہے۔
 نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid): مٹی یا چاک یا چوڑے کی خواہش ہوتی ہے۔
 ایومینا (Alumina): کوئلے چاک یا چوڑے کی خواہش ہوتی ہے۔

استسقاء — Dropsy

ایپس (Apis): پاؤں اور چہرے کی استسقاءئی سوجن کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ پیاس نہیں ہوتی۔
 ایپوسائٹم (Apocynum): جب استسقاء جگر کے باعث ہو۔ پیاس ہوتی ہے اور مریضہ کھلی ہوا میں رہنا پسند کرتی ہے۔
 آر سینک البم (Ars Alb): دل کی تکلیف کے باعث استسقاء لاحق ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ مختصر وقفوں کے ساتھ تھوڑی مقدار میں پانی کی پیاس ہوتی ہے۔
 ڈیجی ٹالس (Digitalis): دل کی دھڑکن کے ساتھ استسقاء لاحق ہوتا ہے۔

غلط تصور (حمل کا)

(False Conception)

کروکس (Crocus): رحم میں جنین کی شدید حرکات محسوس ہوتی ہیں یا خیالی حمل ہوتا ہے۔
 کالوفیلیم (Caulophyllum): غلط تصور، خیالی حمل۔

جنین — اپنی جگہ سے ہٹ جانا اور حرکت کرنا

(Foetus-Displacement and Movement of)

پلساٹیل (Pulsatilla): جنین کو یا بچے کو صحیح جگہ رکھنے کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ حتیٰ کہ جب بچے کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہو جائیں۔ تب بھی اس دوا سے اتفاق ہوتا ہے۔
 کالوفیلیم (Caulophyllum): جب حرکات رک پھٹی ہوں۔

کروکس (Crocus): جب حرکات بہت شدید اور پرورد ہوتی ہیں۔
 کھوجا (Thuja): سلاخیں یا آٹھویں مہینے کے دوران بچے کی شدید حرکات جو ماں کی نیند میں
 خلل پیدا کرتی ہیں۔ جس کے ساتھ پیشاب کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔
 آرنیکا ایم (Arnica M): جب رحم میں حساسیت، دکھن اور نرمی کا احساس ہوتا ہے۔ جو کہ
 جنین کے حرکت کرنے کے باعث ہوتا ہے۔
 لائیگو پوڈیم (Lycopodium): رحم میں جنین ہوتا ہے جس کے باعث حد اعتدال سے بڑھی
 ہوئی حرکات سے تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔
 سلفر (Sulphur): رحم میں جنین اس طرح سے محسوس ہوتا ہے جیسے کے مار رہا ہو۔

پاگل پن (دوران حمل) — Insanity

سٹرامونیم (Stramonium): حمل کے دوران پاگل پن لاحق ہوتا ہے۔ 200: ایلی لیوشن کی
 دوا دیجئے۔

وضع حمل کے درد (غلط) (False)

Labour Pains

(دیکھئے ”وضع حمل“ کے ذیل میں)

زندہ پیدائش — Living Birth

اکٹیاریسی موسا (Actea Racemosa): اس دوا سے زندہ بچوں کی پیدائش یقینی ہوتی
 ہے۔ ایسی مستورات میں جو پہلے مردہ بچے پیدا کر چکی ہوں۔

درد (دوران حمل) — Pain

واہیرنم اوپ (Viburnum Op): دوران حمل جھٹ میں اور ٹانگوں میں درد یا اینٹھن ہوتی
 ہے۔

بے خوابی (دوران حمل) — Sleeplessness

اناکارڈیم (Anacardium): یہ دوا 200 ڈائی لیوشن میں دوران حمل بے خوابی کے لئے دی
 جاسکتی ہے۔

کافیا (Collea): اگر انکار ذمہ ناکام ہو جائے تو یہ دوا آزمائی جاسکتی ہے۔ رات کو سوتے وقت 200 طاقت کی ایک خوراک کافی ہو سکتی ہے۔

اکونائٹ این (Aconite N): بے خوابی اگر خوف کے باعث، ڈر یا پریشانی کے باعث ہو۔
ہائوسکامس (Hyoscyamus): اعصابیت اور چڑچڑے پن کے باعث اگر بے خوابی لاحق ہو۔

اگنیشیا (Ignatia): اگر پریشان کن خیالات، غم، اداسی یا کسی افسردہ کر دینے والے جذبے کے باعث بے خوابی لاحق ہو۔

دانت کا درد (دوران حمل) — Toothache

سٹیفنی سگریا (Staphisagria): پرورد چکن ہوتی ہے۔ دانتوں اور مسوڑھوں میں کترن اور چکن کا احساس ہوتا ہے۔ بے ہوش کر دینے والا یا کھودنے والا درد سر ہوتا ہے۔ دانت ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ کالے ہو جاتے ہیں۔ بوسیدہ ہو جاتے ہیں اور پھونک ہو جاتے ہیں۔

سپائی جیلیا (Spigelia): پھاڑنے والا اور چکنے والا درد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ پرورد جھٹکے لگتے ہیں۔ ٹھنڈ سے ابتری ہوتی ہے۔ آرام کرنے سے شدید ترین ہو جاتا ہے۔ ٹکے پر سر رکھتے ہی درد میں شدت پیدا ہو جاتی ہے اور جیسے ہی ٹکے سے سر اٹھایا جاتا ہے۔ شدت میں کمی آ جاتی ہے۔

سیدیا (Sepia): دوران حمل دانت کے درد کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔

کیمومیل (Chamomilla): ایک ہی گلے سڑنے والے دانت میں درد ہوتا ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): جب جڑے کی ایک جانب متاثر ہو یا درد منتقل ہو جائے۔

نکس وامیکا (Nux Vom): جب کسی ایک گلے سڑنے والے دانت سے درد شروع ہو کر چہرے کی ہڈیوں تک چلا جاتا ہے اور اس میں ابتری شراب اور کافی پینے سے ہوتی ہے۔ نیز ذہنی کام سے بھی ابتری ہو جاتی ہے۔ درد چکنے والا، کھینچنے والا، پھاڑنے والا، کھودنے والا یا جھٹکوں والا ہوتا ہے۔

بیلادونا (Belladonna): جب دانت کا درد، درد سر کے ساتھ ہو۔ پھاڑنے والا، کھینچنے والا درد اور چکن والا درد ہوتا ہے۔

پیشاب (کی بندش دوران حمل) Urine

(Retention of)

نکس وامیکا، کیمفر، پلساٹیل (Nux Vom, Camphor, Pulsatilla): دوران حمل
پیشاب کی بندش کے لئے یہ دوائیں دی گئی ترتیب کے مطابق آزمائی جاسکتی ہیں اگرچہ ہیں کھینے
کے اندر افادہ نہ ہو تو کیتھرز کا استعمال کرنا چاہئے۔
کاسٹیکم (Causticum): پیشاب کرنے کی متواتر خواہش کے لئے بیت الخلاء میں پہنچنے سے
پہلے ہی چند قطرے پیشاب نکل جاتا ہے۔

قے (دوران حمل صبح کے وقت کی تکلیف)

Vomiting (Morning Sickness)

نکس وامیکا متبادل ۱-نٹم کروڈ (Nux Vomica alternated with Antim Crud):
یہ دوائیں دوران حمل قے کو روکتی ہیں۔ بشرطیکہ یہ دونوں دوائیں چند روز تک۔ ہر آدھے گھنٹے
کے بعد اول بدل کر دی جائیں۔ نکس وامیکا 1x ڈاکٹی لیوشن میں دینی چاہئے جبکہ ۱-نٹم کروڈ 6 ڈاکٹی
لیوشن میں۔ تکلیف کے بغیر اچھارے کو بھی نکس وامیکا سے آرام ہوتا ہے۔ زبان پر کریم کی
طرح کی نٹم کا طمع ہوتا ہے۔ تیزابیت ہوتی ہے اور دل میں جلن ہوتی ہے اس کے ساتھ معدہ
بھی خراب ہوتا ہے۔

مفقوری کارپس ریس (Symphoricarpus Race): شدید قسم کی متلی ہوتی ہے۔ قے
مستل ہوتی ہے۔ شدید ابکائیاں ہوتی ہیں۔ 200 طاقت کی دوا دیجئے۔ یہ چوٹی کی دوا ہے۔
ایپیکاک (Ipec): اعتدال سے بڑھا ہوا اچھارہ تکلیف اور دل کی جلن کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبح
کی تکلیف کے لئے یہ عمدہ دوا ہے۔

کالچیکم (Colchicum): متلی سر میں محسوس ہوتی ہے اور جب مریضہ گاڑی میں بیٹھتی ہے یا
حسّی میں بیٹھتی ہے تو اتھری ہوتی ہے۔ غذا کی بو سے متلی ہوتی ہے۔
کالی کارب (Kali Carb): جب مریضہ چلتی ہے تو قے کے بغیر متلی ہوتی ہے۔ کھاتے ہوئے
بست زیادہ غنودگی ہوتی ہے۔ یہ اس دوا کی مخصوص علامت ہے۔

گلکریٹا پیپس (Cucurbita Peps): دوران حمل قے آتی ہے اور تھوک بہتا ہے۔ شدید
قسم کے کیموں میں اس دوا کو آزمانا چاہئے۔ نیپ والے پیٹ کے کیموں کے لئے عمدہ دوا ہے۔

لیکٹک ایسڈ (Lactic Acid): حمل کی تے جس کے ساتھ منہ میں پانی بھرتا ہے۔ قہوک آتا ہے اور تیزابیت ہوتی ہے۔

اسارم پوروم (Asarum Europum): حمل کی مٹلی۔

فاسفورس (Phosphorus): جب پانی کو دیکھنے سے حمل کی تے لاحق ہو۔ حمل کرتے وقت مریض کو آنکھیں بند کرنا پڑتی ہیں۔ ہاتھ گرم پانی میں ڈالنے سے مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

نکس موسکاتا (Nux Moschata): دوران حمل مٹلی اور تے ہوتی ہے۔ پیسری (Passary) (حورقوں کر رحم ٹھیک کرنے کا آلہ جو رحم کے منہ پر لگا دیا جاتا ہے) کے باعث۔

کالی کلور (Kali Chlor): گلے کی دھکن کے ساتھ حمل کی مٹلی کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ **کریوزوم (Kreosotum):** مٹلی ہوتی ہے اور مٹھے پانی کی تے ہوتی ہے۔

ایلٹریس فار (Aletris Far): پہلے 'ہیڈر' ہیزبھس والے چرے کے ساتھ تے لاحق ہو۔ مریض لیٹ جانا چاہتی ہے اور کچھ کرنا نہیں چاہتی بلکہ آرام کرنا چاہتی ہے۔ ایسی لاغر حاملہ مستورات میں تے کا لاحق ہونا۔

سپیا (Sepia): حمل کی صبح کے وقت کی تکلیف۔ معدے کے گڑھے میں کچھ نہ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ کھانے سے تے رخص ہو جاتی ہے۔

بانجھ پن — Sterility (Barrenness)

سپیا (Sepia): بانجھ پن کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ لیگوریا اور قبض کے ساتھ حیضوں کی بے قاعدگی ہوتی ہے۔

ہیرٹا کارب (Baryta Carb): بیض دانوں اور پستانوں کے غدود کے گھٹنے کے باعث بانجھ پن لاحق ہوتا ہے لیکن لیٹک غدد بڑھ جاتے ہیں اور فلٹر نہیں ہوتے۔

اورم میور نیٹرم (Aurum Mur Nat): بانجھ پن کے لئے یہ ایک مخصوص دوا ہے۔ 3x ٹرائی ٹوریشن کی صورت میں دی جا سکتی ہے۔ یہ ناموری کیفیت 'سختی' بیض دانہ کی مزمن سوزش 'اندام نہانی کے بیرونی سوراخ کے ناموروں اور بیض دانہ کی سوجن کو آرام دیتی ہے۔ یہ دوا استقامت حمل کی عادت کو بھی شفا دیتی ہے اور خروج رحم بھی اس سے درست ہوتا ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): مؤخر اور بافراط حیضوں کے ساتھ بانجھ پن 'اعتدال سے بڑھی ہوئی شہوت پرستی کے ساتھ بانجھ پن۔

کالی بروم (Kali Br.): بیض دانوں کی نالطافتی کے باعث بانجھ پن ہوتا ہے۔

اورم میٹ (Aurum Met): ذہنی افسردگی کے باعث بانجھ پن لاحق ہوتا ہے۔

نیرم کارب (Nat. Carb): ہم آغوش ہونے کے بعد مستورات میں بلغم کا اخراج ہوتا ہے۔ جس کے نتیجے میں بانجھ پن لاحق ہو جاتا ہے۔

پیتوٹری ٹرین (Pituitrin): بانجھ عورتوں میں بیضہ دانوں کے پھیلاؤ کے عمل کو متوازن کرنے والی دوا ہے اور کئی کیسوں میں اس سے حمل ٹھہر جاتا ہے۔

اگنس کاسٹس (Agnus Castus): جب جنسی خواہش بالکل نہ ہو اور / یا حیض بھی نہ آتے ہوں۔ زرد وجہ ڈال دینے والا لیکوریا ہوتا ہے۔

املی ٹرس ایف (Aletris F): جب بانجھ پن رحم کی کمزوری کے باعث لاحق ہو۔ یہ دوا رحم کو قوت دیتی ہے۔

پلائٹینا (Platina): حد اعتدال سے بڑھی ہوئی جنسی خواہش کے ساتھ مستورات میں بانجھ پن ہوتا ہے۔ یہ دوا ۱۲ سال سے لاحق بانجھ پن کا علاج کر چکی ہے۔

تھوجا (Thuja): لیکوریا کے ساتھ بانجھ پن ہوتا ہے۔ خون کی کمی کا مرض بھی موجود ہو سکتا ہے۔ مستورات کے چہرے اور ٹانگوں پر بال ہوتے ہیں۔ جس کے ساتھ اعضائے تناسل کا بدبودار بچھنے ہوتا ہے۔

کالوفالیم (Caulophyllum): لیکوریا کے بعد بانجھ پن لاحق ہوتا ہے۔ 10 سال سے شادی شدہ ایک عورت کا علاج اس دوا سے کیا گیا تھا۔

بچے ماں کا دودھ نہیں پیتے

Suckling, Disinclination To

سینا (Cina): جب بچہ پستان منہ میں لینے سے انکار کر دے۔ خواہ پیدائش کے بعد چند گھنٹوں کے اندر ہی اسے دیا جائے۔ 200 ملاقات کی صرف ایک خوراک دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔

مرکوریس کار (Mercurius Cor): تیسری ڈاکی لیوشن میں اس دوا کو آزمایا جائے۔ بشرطیکہ نتائج کام ہو جائے۔

سلیشیا (Silicea): جب نوزائیدہ بچے بڑی تیزی کے ساتھ ماں کا دودھ پھینک لیں اس کے فوری بعد دودھ نکال دیں تو یہ دوا دی جا سکتی ہے۔

رسولیاں (سرطان، تھیلیاں، گومڑا) Tumors

(Cancer, Cysts and Polypus)

(نیز دیکھئے ”متفرقات“ کے ذیل میں ”سرطان“)

پلساٹیلہ (Pulsatilla): ریشہ دار رسولیوں کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ خصوصاً فلوئس کے قریب رحمی دیوار میں ہوتی ہیں۔ 1000 ڈائی لیوشن کی دوا ہر ماہ یا 3 ہفتے کے بعد دہرائی جائے۔
ہائیڈراستس (Hydrastis): پستان کی رسولی سخت اور نرود ہوتی ہے۔ سرہائے پستان اندر کو دھنسنے ہوتے ہیں۔ یہ دوا بیضہ دانوں کے سرطان کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے۔ پستانوں کا سرطان رات کے وقت اتری ہوتی ہے۔

اسٹریا زرب (Asterias Rub): پستانوں کا سرطان سخت نشوونما ہوتی ہے۔

چیمافیلہ (Chimaphila): پستانوں کی رسولی جان لیوا ہو یا دوسری۔

کالی آیوڈ (Kali Iod): رحم کی ریشہ دار رسولی اگر پلساٹیلہ ناکام ہو جائے تو اس دوا کو آزمایا جا سکتا ہے۔ رحم ریشہ دار رسولی سے بھرا ہوتا ہے۔ ٹانگوں میں جھکن اور سو جانے کا احساس ہوتا ہے۔ پاؤں گرم ہوتے ہیں اور جلتے ہیں۔ گو بعض اوقات سارے جسم میں شدید قسم کی کچکپاہٹ ہوتی ہے۔

کریوزوٹ (Kreosote): رحم کا سرطان خصوصاً گردن رحم کا خوفناک قسم کے بدبودار اور خون آلود اور متعفن مواد کے رسنے کے ساتھ۔

لکسیس (Lachesis): غمگین، پریشان اور باتنی قسم کی مریضوں میں ریشہ دار رسولی ہوتی ہے۔

اورم آرس (Aurum Ars): بڑھی ہوئی جنسی خواہش اور بیضہ دانوں کی سوزش کے ساتھ رحم کا سرطان ہوتا ہے۔ لب ہائے فرج پر پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں۔ حیض موجود نہیں ہوتے یا بہت افراط کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ خراش دار اور بہت متواتر ہوتے ہیں۔ لب ہائے فرج میں خارش ہوتی ہے۔

فریکسی نس ایم، ورٹرم البم (Fraxinus Am, Veratrum Alb): پُرورد خضیوں کے ساتھ ریشہ دار رسولیوں کے لئے یہ ادویات اول بدل کر دی جائیں۔ فریکسی نس ایم کی مدد کچھ کے قطرے سونے سے پہلے دیئے جائیں اور ورٹرم البم 30 ڈائی لیوشن میں ہر صبح دی جائے۔
لیپس البس (Lapis Albus): جملہ دار شدید قسم کے دردوں کے ساتھ اور کمزور کر دیئے والے با افراط سیلان خون کے ساتھ رحم کی ریشہ دار رسولی رحم کا سرطان۔

کوپاچوا (Copaiva): مستورات میں مژمن درم مثلاً 'بے نتیجہ اور مستقل پیشاب کی خواہش ہوتی ہے۔ مثلاً میں درد کے ساتھ پیشاب کی ہندش لاحق ہوتی ہے۔
ٹریٹیم پینڈولم (Tritium Pendulam): رحمی جریان خون جو رحم میں ریشوں کے پیدا ہو جانے کے باعث ہوتا ہے۔ شدید قسم کے نیچے کی جانب دباؤ کے ساتھ خروج رحم لاحق ہو۔
لیکوریاست افراط کے ساتھ پیلے رنگ کا اور داغ چھوڑنے والا ہوتا ہے۔
سلفر (Sulphur): اندرونی خارش اور بواسیری سیلان خون کے ساتھ پستانوں کی رسولی یا پستانوں کا سرطان لاحق ہوتا ہے۔ IM یا CM طاقت کی ایک خوراک حیض کے ہر زمانہ میں دی جائے۔

پالیدیئم (Palladium): بیضہ دانوں کی رسولی۔
تھلاسپی برسرا (Thlaspi Bursara): جریان خون کے ساتھ رحم کا سرطان لاحق ہو۔
ٹیوکریم (Teucrium): اندام نہانی میں گو مز (پچوڑا) ہوتا ہے۔
الیومن (Alumen): ضدی قسم کی قبض کے ساتھ بیضہ دانوں کی رسولی لاحق ہو۔ 200 ڈائی لیوٹن کی خوراک ہر ہفتہ دی جائے۔

کالی کارب (Kali Carb): رحم کا سرطان جس کے ساتھ کولہوں سے شروع ہو کر شدید قسم کا درد گھٹنوں تک جاتا ہے۔ خصوصاً دائیں جانب۔ تاہم میں درد اس دوا کی طبیعت علامت ہے۔
تھوجا (Thuja): گردن رحم پر گو مز ہوتا ہے۔ خروج رحم اور غلط قسم کا حیض۔
کونڈورانگو (Condurango): پستانوں کے غدود کا سرطان۔ رسولی انڈے کی جسامت والی سخت ہوتی ہے اور بائیں پستان پر ہوتی ہے۔ جس میں اضافہ ہائیڈراسٹس اور فائی ٹولا کا کے استعمال سے ہوتا ہے۔ عارضی طور پر کوئیم کے ذریعے رک جاتی ہے۔ کونڈورانگو کی پہلی ڈائی لیوٹن اس کو شفا دیتی ہے۔

کوئیم (Conium): پستانوں پر سخت قسم کی رسولیاں ہوتی ہیں۔
سیلیشیا (Silicea): اندام نہانی میں تھیلیاں ہوتی ہیں جو مٹر کے دانے یا سنگترے کی جسامت والی بڑی بڑی ہوتی ہیں اور اندام نہانی سے باہر کو نکلی ہوتی ہیں۔
فائی ٹولا کا (Phytolacca): ٹھنڈ یا دودھ کے جم جانے کے باعث پستانوں میں گتلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جن سے میسیں نکلتی ہیں اور وہ موتی ہو جاتی ہیں۔ دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ خون آلود ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ دیگر عورتوں کا علاج بھی اس دوا سے ہو چکا ہے۔
نکس وامیکا، ایپیکاک (Nux. Vom. Ipec): ہائیڈروجینی جسامت والے مریضوں میں رحمی ریشے لاحق ہوتے ہیں۔ (ایسی جسامت جس میں پانی بھرا ہوتا ہے اور اس طرح مرطوب موسم

اور پانی پینے کے باعث علامات میں بہتری ہو جاتی ہے۔)
 کیڈمیئم میٹ کیڈمیئم آئیوڈ کیڈمیئم سلف (Cadmium Iod, Cadmium Sulph)
 (Cadmium Met): ریڈیائی شعاعوں کے ذریعے علاج کے تکام ہو جانے کے بعد یہ دوائیں
 رحم کے سرطان کے لئے استعمال ہوتی ہیں۔ CM طاقت میں یہ دوائیں دی گئی ترتیب کے
 مطابق آزمائی جاسکتی ہیں۔

پوفو (Bufo): سرخ دھاریوں کے ساتھ سرطان ہوتا ہے۔
 سکروفولیریا (Scrophularia): چھاتیوں میں گانٹھیں پڑ جاتی ہیں۔

رحم — Uterus

نیچے کی جانب دباؤ (Bearing Down)

(نیز دیکھئے ”حمل“ کے ذیل میں ”نیچے کی جانب دباؤ“)

سپیا (Sepia): نیچے کی جانب دباؤ کے لئے یا کمر کی جانب سے پیٹ کی طرف دباؤ کے ساتھ
 رحم کے خروج کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ اسے اونچی طاقت میں دینا چاہئے مثلاً 1000 طاقت
 یا CM طاقت کی خوراک ہر چند روز کے بعد دی جائے۔ کمر کی جانب سے پیٹ کی طرف دباؤ
 کے باعث سانس میں بھی دباؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ ماں کا ابھرا ہوا پیٹ۔

بیلادونا (Belladonna): یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پیٹ میں موجود ہر چیز باہر نکل آئے گی۔
 گھڑے ہونے سے بہتری ہوتی ہے۔

سبائنا (Sabina): کمر کے زیریں حصے سے پیٹ کے ارد گرد سے اور رانوں کے ارد گرد سے
 دباؤ نیچے کی جانب ہوتا ہے۔

لیلیئم ٹیگ (Lilium Tig): اس دوا کی علامات سپیا کے مماثل ہوتی ہیں۔ جب سپیا تکام ہو
 جائے تو اسے آزمانا چاہئے۔ نیچے کی جانب دباؤ کا احساس ہوتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے
 پیڑوں کی اشیاء اندام نسائی میں نیچے کی طرف دباؤ ڈال رہی ہوں۔ لب ہائے فرج کی مدد ہاتھ سے
 کرنا پڑتی ہے۔ حیض جلد آتے ہیں۔ کم مقدار میں ہوتے ہیں۔

آرنیکا ایم (Arnica M): چوٹ کے باعث خروج رحم لاحق ہوتا ہے۔ خروج رحم میں مریض
 اٹھ کر نہیں چل سکتی یا سیدھی ہو کر نہیں چل سکتی۔

لیکسیس (Lachesis): سن یا اس کے دوران خروج رحم لاحق ہو جاتا ہے۔ حرارت کی
 تہمتا ہٹ ہوتی ہے۔ سر کی چوٹی پر حرارت ہوتی ہے۔ سر میں اجتماع خون ہوتا ہے۔

ہیلونیاں (Helonias): بھاری رحم کے باعث رحم کا خروج لاحق ہوتا ہے۔ رحم نیچے جھک جاتا ہے۔ فٹس (رحم کا پینڈا) آگے کو لڑھکا ہوتا ہے۔ اندام نہانی کے سوراخ اور امعاء مستقیم (مقعد) کے بیچ انگلی مشکل سے گزاری جاتی ہے۔
موریکس (Murex): شدید قسم کا نیچے کی جانب دباؤ۔ ٹانگیں آپس میں ملانے سے درد ہوتا ہے۔

فریکس ایم (Frax Am): رحم کی تمام بھاری حالتوں میں جیسے خروج رحم نیچے کی جانب دباؤ اور رحم کے بندوں کا ڈھیلا پڑ جانا۔ ان تمام حالتوں میں یہ دوا استعمال ہوتی ہے جو کہ مقوی رحم دوا ہے۔

سٹانم (Stannum): جب خروج رحم میں پانچا کے دوران ابتری ہو۔ خصوصاً زور لگانے کے دوران۔

اگیریکس ایم (Agar. M): نیچے دبانے والے درد بہت بری طرح سے لاحق ہوتے ہیں جو کہ تقریباً قاتل برداشت ہوتے ہیں۔

ایسکولس ہپ (Aesculus Hip): رحم کی گردن کی سوزش، رحم کا ٹل جانا، رحم کا خروج، رحم کا بڑا ہو جانا اور رحم کی سختی جب کہ نرمی اور خشکی طبعی طور پر ہوتی ہے۔

اورم میٹ (Aurum Met): بھاری وزن اٹھانے کے بعد رحم کا خروج لاحق ہوتا ہے۔ بیض کے زمانہ میں ابتری ہوتی ہے۔

پوڈوفالیم (Podophyllum): رحم اور اندام نہانی کا خروج عام نقابست کے باعث ہوتا ہے۔ اعتدال سے زیادہ وزن اٹھانے کے باعث اور خصوصاً زچگی کے بعد جس کے ساتھ شدید قسم کا درد کمر ہوتا ہے اور زیادہ یا کم خروج مقعد بھی ہوتا ہے۔

ارجنٹم میٹ (Argentum Met): عضلات اور طویل بند (Ligament) وغیرہ کے ڈھیلے پڑ جانے کے باعث رحم کا خروج لاحق ہوتا ہے۔ گردن رحم میں اجتماع خون اور سختی ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ ناسوری اور جلن دار نیز ڈنک لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ رحم سے پیلا، خراش دار اخراج ہوتا ہے۔

الیو (Aloe): طویل مدت تک کھڑے رہنے کے باعث خروج رحم لاحق ہوتا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے بیڑو کی ہڈی اور دیگی کی ہڈی کے درمیان فائدہ گڑا ہوا ہے۔ رحم نیچے کی طرف کھینچا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بیڑو کے تمام اعضا تیزی کے ساتھ گھست کر باہر نکل آئیں گے۔

ایسٹریاز ربنز (Asterias Rubens): رحم میں پھنسن کے ساتھ باہر کو دھکیلنے کا احساس

ہوتا ہے۔
نایٹرم ہائپو کلورو (Natrium Hypochloro): پیڑ کا نیچے کی طرف دھڑا رحم پانی سے بھرا
 ہوتا ہے۔
پلساٹیل (Pulsatilla): نیچے کی طرف دباؤ میں لیٹنے سے ابتری ہوتی ہے۔

شعور — Consciousness

ہیلونیا (Helonias): رحم کا شعور، گردن رحم کی سوزش، خروج رحم، کمرے رنگ کا
 بدبودار لیکوریا، مریض بے چین ہوتی ہے۔ ہر کسی میں نقص نکالتی ہے۔ چڑچڑی ہوتی ہے۔ جب
 ذہن اور جسم مصروف ہوں تو بہتری ہوتی ہے۔

اینٹنشن — Cramps

کاسٹیکم (Causticum): معدہ میں، پچھائی میں اور چھوٹی کمر میں درد کے ساتھ اینٹنشن کے
 لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ درد مریض کو جھک کر دہرا ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کھانے
 کے بعد ابتری ہوتی ہے۔
کوکولس (Cocculus): پچھائی میں دباؤ اور اینٹنشن کے ساتھ رحم میں پرورد دباؤ ہوتا ہے۔
 مریض بے چین ہوتی ہے اور اسے غشی آتی ہے۔ نئے آتی ہے اور پھر آتے ہیں۔
کونیم (Conium): لب ہائے فرج میں سراسیمگی کے ساتھ رحم میں اینٹنشن ہوتی ہے۔ پیٹ
 میں تھو ہوتا ہے اور پچھائی میں درد ہوتا ہے۔
مگنیشیا میور (Magnesia Mur): رحم میں اینٹنشن ہوتی ہے جس کے ساتھ درد ہوتا ہے۔ جو
 پھیل کر رانوں تک چلا جاتا ہے اور اس کے بعد لیکوریا ہو جاتا ہے۔
اگنیشیا (Ignatia): دردزہ جیسے دردوں کے ساتھ رحم میں اینٹنشن ہوتی ہے۔ جس کے بعد
 لیکوریا ہو جاتا ہے۔

ٹل جانا (رحم کا) — Displacement

بیلادونا (Bell): پُر خون مریضوں میں رحم کا اپنی جگہ سے ٹل جانا لاحق ہوتا ہے۔
پوڈوفائلیم (Podophyllum): مقعد کے خروج کے ساتھ اور اس کی وجہیگی کے ساتھ۔
سپیا (Sepia): الٹا ہوا رحم، اندام نسائی کا سوراخ اوپر کی جانب پیڑ کے مقابل دھڑا ہے۔
 نڈش (رحم کا پینڈا) نیچے کی جانب جھک کر سیکرم کے مقابل تک آ جاتا ہے۔

لیلیئم ٹنگ (Lilium Tig): رحم کا الٹ جانا، رحم کا پیندا سیکرم کے بالفاظ آ جاتا ہے۔ اندام نسائی کا سوراخ، بیڑ کی جانب ہوتا ہے۔ رحم قبض کے ساتھ ٹیڑھا ہو جاتا ہے یا الٹا ہو جاتا ہے۔
ہیلونیاس (Helonias): رحم نیچے کی جانب ٹل جاتا ہے۔ رحم کا پیندا آگے کی جانب لڑھکا ہوتا ہے۔ اندام نسائی کے سوراخ اور مقعد کے درمیان انگلی بڑی مشکل سے گزاری جاتی ہے۔ کمزور مریضوں میں یہ تکلیف ہوتی ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vom): رحم کا گر جانا، رحم کا ہرنیا، رحم کا ٹیڑھا ہو جانا، اندر کی جانب جھک جانا، رحم سے خون کا جاری ہونا سوزش کے ساتھ۔

سہانکا (Sabina): استقامت حاصل کے بعد۔

آرنیکا ایم (Arnica M): پیٹ کے ذریعے حصہ میں مکالمہ جانے کے بعد۔

مرکوریس (Mercurius): جب رحم کی باقی مہلیوں کی سوزش کے باعث مرض لاحق ہو۔

استسقاء (رحم کا) — Dropsy

پلساٹیل (Pulsatilla): حیضوں کے دب جانے کے باعث، لیکوریا یا نفاس کے دب جانے کے باعث، استسقاء لاحق ہوتا ہے۔

کریوزوٹ (Kreosote): جب سرطان کے باعث استسقاء لاحق ہو۔

آرسینک ایلیم (Arsenic Alb): جب استسقاء کی وجہ معلوم نہ ہو اور بے چینی ہو، پیاس کے ساتھ گرم کمرے میں یا گرم چیزیں لگانے سے بہتری ہوتی ہے۔

کلکیریا کارب کونیئم (Calcarea Carb Conium): ان ادویات کو دی گئی ترتیب کے مطابق آزمایا جاسکتا ہے۔ جبکہ استسقاء کو مژوں یعنی پھوٹوں کے باعث لاحق ہو۔

تھوجا (Thuja): قبل از وقت زچگی ہو جانے کے ساتھ رحم دوگنا بڑا ہو جاتا ہے۔

سپیا (Sepia): گردن رحم بڑی اور موٹی ہو جاتی ہے۔

اسٹیلگو (Ustilago): رحم کا بڑھ جانا لاحق ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ اسٹیلٹی نری ہوتی ہے۔

اندام نسائی کا سوراخ اور رحم کی گردن کافی ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ انگلی گزر سکتی ہے۔

کونیئم (Conium): بھالے گئے جیسے درد کے ساتھ رحم کا بڑھ جانا لاحق ہوتا ہے۔ بیض دانوں

میں سخت ہوتی ہے۔ نیز خروج رحم کے ساتھ رحم میں بھی سختی ہوتی ہے اور رحم کی گردن میں

ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔

کاربو انیمالس (Carbo Animalis): رحم کی سختی اور اس کا بڑھ جانا لاحق ہو جاتا ہے جس

کے ساتھ حیضوں میں اتاری ہوتی ہے۔ کمر میں شدید درد ہوتا ہے۔ جو پھیل کر کولہوں تک چلا

جاتا ہے۔ قبض ہوتی ہے۔ اندام نہانی کے سوراخ پر ناسور ہونے کے ساتھ رحم کی گردن کا موٹا ہو جانا لاحق ہوتا ہے۔ بوڑھی عورتوں میں یہ تکلیف ہوتی ہے۔

بریادی (رحم کی) Erosion

(دیکھئے "رحم" کے ذیل میں "ناسور")

گلنا، سرسڑنا — Gangreen

سیکیل کار (Secale Cor): رحم کے گلنے سڑنے والے مرض کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ 30 یا 200 ڈاکی لیوشن کی خوراک دیجئے۔ اگر یہ دوا ناکام ہو جائے تو آرسینک الیم 30 اور کرپو زوٹ 30 آزمائیں۔

ہوا (اچھارہ) (Gas (Flatulence)

ایسڈ فاس (Acid Phos): رحم سے ہوا خارج ہونے کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ یہ رحم کی ڈھول بھی کیفیت کا بھی علاج کرتی ہے۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): جب اندام نہانی سے گندی بو والی گیس خارج ہو۔
کاربو وچ، چائنا (Carbo Veg. China): ان ادویات کو دی گئی ترتیب کے مطابق آزمایا جا سکتا ہے بشرطیکہ اوپر والی دونوں ادویات ناکام ہو جائیں۔

رحم کی سختی Induration

(دیکھئے "ناسور")

گوشت کا لو تھڑا (Moles)

یا دیگر بیرونی اجسام مثلاً پانی کی تھیلیاں اور خون وغیرہ رحم میں

(or other foreign bodies like Hydatids and Sanguineous)

کینتھرس، سبائنا (Cantharis, Sabina): رحم سے گوشت کے لو تھڑے وغیرہ خارج

کرنے میں یہ دوائیں مدد دیتی ہیں۔ دی گئی ترتیب کے مطابق آزمائی جائیں۔

پلساٹیل، سیکیل کار (Pulsatilla Secale Cor): دی گئی ترتیب کے مطابق رحم کے اندر

گوشت کے لو تھڑوں کے لئے آزمائیں۔

ٹائٹرک ایسڈ، ایسڈ فاس (Nitric Acid, Acid Phos) جیسے ہوئے خون کا نیز عضلاتی
بندوں کا سخت ہو جانا لاحق ہوتا ہے۔ دی گئی ترتیب کے مطابق آزمائیں۔
کلیئر یا سیلیشیا (Calcarea, Silicea) رحم میں پانی سے بھری ہوئی تھیلیوں کے لئے دی
گئی ترتیب کے مطابق ان دواؤں کو آزمائیں۔

درد — Pain

کونیم (Conium) جلن دار، ڈنک لگنے جیسے اور تیر لگنے جیسے درد رحم کی گردن میں ہوتے
ہیں۔ بھالے لگنے جیسے درد ہوتا ہے۔ رحم کا اعصابی درد ہوتا ہے۔
پلساٹیل (Pulsatilla) حیضوں کی غیر موجودگی کے ساتھ رحم میں درد ہوتا ہے۔
لیکسیس (Lachesis) رحم میں درد ہوتا ہے جو کہ خون کے جاری ہونے سے دور ہو جاتا
ہے۔ زچگی کے بعد اور حیضوں کے دوران بیضہ دانوں میں سخت دھکن والے درد ہوتے ہیں۔
میوریکس (Murex) رحم کے دائیں جانب درد ہوتا ہے جو پیٹ میں جاتا ہے۔ مخصوص
کیموں میں درد سارے بدن میں سے گزرتا ہے اور اوپر کو بائیں پستان تک پھیل جاتا ہے۔
ہائپرکیم (Hypericum) جراحی کے بعد سارے پیڑ پر درد ہوتا ہے اور نرمی ہوتی ہے۔ ۲۰۰
ڈاکٹی لیوشن کی دوا دیجئے۔

سمبل (Sumbul) چست اور زندہ دل مستورات میں چہرے کا یا بیضہ دانوں کا اعصابی درد
ہوتا ہے۔

لیلیئم ٹنگ (Lilium Tig) چست اور زندہ دل مستورات میں چہرے کا یا بیضہ دانوں کا اعصابی
درد ہوتا ہے۔ بیضہ دانوں میں تیز درد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ نیچے کی جانب دباؤ کا احساس ہوتا
ہے۔

پلائٹینا (Platina) مزمن سوزاک کے باعث بیضہ دانوں میں درد ہوتے ہیں۔

پوڈوفیلیم (Podophyllum) کم مقدار میں ہونے والے حیضوں کے ساتھ بیضہ دانوں میں
درد ہوتا ہے۔ حرکت سے اتری ہوتی ہے۔ لیٹنے سے بہتری ہوتی ہے۔ جگر کی خرابی کے باعث۔
اکتیاریس موسا (Actea Racemosa) رحم کی گردن کی جھلی کی سوزش لاحق ہوتی ہے۔
لیک گینیم (Lac. Can) دائیں بیضہ دانی میں درد ہوتا ہے۔ چکلیے سرخ خون کے جاری
ہونے کے بعد بہتری ہوتی ہے۔

لوڈیم (Lodum) درد دائیں بیضہ دانی میں شروع ہوتا ہے اور نیچے کو رحم میں سے گزر جاتا
ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): حیض کے دوران بائیں بیضہ دانی میں درد ہوتا ہے۔ جو نیچے کی طرف راتوں تک پھیل جاتا ہے۔
 برائیو نیا (Bryonia): دائیں بیضہ دانی میں درد جو نیچے کو راتوں کی طرف دوڑتا ہے۔ آرام کرنے سے بہتری ہوتی ہے۔ حرکت کرنے سے یا پھونے سے بہتری ہوتی ہے۔
 ار جنتیم میٹ (Argentum Met): خروج رحم کے ساتھ بائیں بیضہ دانی میں درد ہوتا ہے۔
 ہائیڈرو کوٹائل (Hydro Cotyle): گولی لگنے جیسے، تیر لگنے جیسے اور بھالے لگنے جیسے درد اندام نہانی میں ہوتے ہیں۔
 کریوزوٹ (Kreosote): اندام نہانی میں جلن دار اور کسلاؤ والا درد ہوتا ہے۔ جینھی ہوئی حالت سے اٹھنے پر بہتری ہوتی ہے۔ اندام نہانی سوجی ہوئی ہوتی ہے۔

گو مڑ — Polypus

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): یہ دوا گو مڑوں کو ٹکالنے کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ گو مڑ خواہ عضلاتی ہوں، گوشت دار پھپھو عی والے ہوں، خواہ دانے دار ہوں۔ متواتر سیلان خون کا علاج بھی اسی دوا سے ہو جاتا ہے۔
 تھوچا (Thuja): گوشت دار گو مڑوں کے لئے، رحم کی گردن پر گو مڑ ہوتے ہیں۔ جس کے ساتھ خروج رحم ہوتا ہے اور خرابی والے حیض ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بے قاعدہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات باقراط اخراج کے ساتھ لمبے وقفوں میں ظاہر ہوتے ہیں لیکن سارے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا خون بہتا رہتا ہے۔
 کوئیم (Conium): جب گو مڑ پتھر کی طرح سخت ہوں۔
 ٹیو کریم (Teucrium): جب مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں تو اس دوا کو آزمایا جاسکتا ہے۔

خروج (رحم کا) — Prolapsus

(دیکھئے ”نیچے کی جانب دباؤ“)

ناسور (رحم کے) — Ulcers

ار جنتیم نائٹرکیم (Argentum Nitricum): اندام نہانی کے سورخ پر ناسوروں کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ خروج رحم کے ساتھ سیلان خون والے ناسور ہوتے ہیں۔ ایبوسن خارج ہوتا ہے۔

ارجنٹم میٹ (Argentum Met): جب ارجنٹم ٹاٹ ٹاکام ہو جائے تو اس دوا کو آزما چاہئے۔ اس میں خون والے اخراج کے ساتھ رحم کی گردن پر ٹاسور ہوتے ہیں جو سرطان کے باعث ہو سکتے ہیں۔ خروج رحم ہوتا ہے۔

کریو زوٹ (Kreosote): رحم کی گردن پر پرانے ٹاسور ہوتے ہیں۔ جن سے خون آسانی کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ متعفن خراش دار مادہ خارج ہوتا ہے۔ رحم کی گردن کی سوزش ہوتی ہے۔

کاربوائٹیلس (Carbo. An): اندام نسائی کے سوراخ پر مسلک ٹاسور ہوتے ہیں۔ جن کے ساتھ گندے مادے خارج ہوتے ہیں اور جن سے سیلان خون آسانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کونیئم (Conium): خروج رحم کے ساتھ رحم میں ٹاسور ہوتے ہیں۔

کیلنڈولا (Calendula): یہ دوا بھی ٹاسوروں کو رفع کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اسے ۳۰ طاقت میں دینا چاہئے۔

ایسڈ سلف (Acid Sulph): عمر رسیدہ مریضوں میں رحم کی گردن کی ٹاسوری کیفیت ہوتی ہے۔

آر سینک الیم، کاربوائٹک ایسڈ (Ars Alb, Carbolic Acid): متعفن، خراش دار اخراج کے ساتھ رحم کی گردن کی ٹاسوری کیفیت۔

الیومن (Alumen): رحم کا ٹاسور یا سرطان۔ درد جملع کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ رحم کا وزن نیچے کی طرف دباؤ ڈالتا ہے۔

اورم میٹ (Aurum Met): بار بار کے استسقا حل کے نتیجہ میں رحم کی سختی اور ٹاسوری کیفیت۔

اندام نسائی — Vagina

خشکی — Dryness

(دیکھئے ”مجامعت“ کے ذیل میں)



ہڈیوں، جوڑوں اور عضلات کے امراض (Diseases of Bones Joints & Muscles)

حصہ اول — ہڈیاں اور جوڑ

ہڈیوں کا گلنا سڑنا Caries

گلکیریا فاس (Calcareo Phos): ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے نہ جڑنے کے لئے اور ہڈیوں کے گلنے سڑنے کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ جب کہ ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں یا ٹاکارہ ہو جاتی ہیں۔ ہڈیاں خمیدہ ہو جاتی ہیں۔

انگس چوراویرا (Angustura Vera): لمبی ہڈیاں کھٹی سڑتی ہیں اور جوڑ ٹوٹ جاتے ہیں۔ درد گودے تک سرایت کر جاتا ہے۔

گلکیریا کارب (Calcareo Carb): ریزہ کی ہڈی کے امراض، ریزہ کی ہڈی کا گلنا سڑنا لاحق ہوتا ہے۔ ہڈیوں کی نشوونما نہیں ہوتی اور دانت ظاہر نہیں ہوتے۔

گلکیریا فلور (Calcareo Fluor): ہڈیوں کا ریزہ جلا لاحق ہوتا ہے۔ کسی وجہ کے ساتھ یا بغیر کسی وجہ کے۔ یہ دوا گلکیریا فاس کے جالنے میں دی جا سکتی ہے کیونکہ اس کی علامات ان علامات کے مماثل ہیں جو گلکیریا فاس میں دی گئی ہیں۔

ایسڈ فلور (Acid Fluor): لمبی ہڈیوں کا پھپھڑنے کے ساتھ گلنا سڑنا لاحق ہوتا ہے۔ جن میں اتھری اور بھتری کے دورے ہوتے ہیں۔ شدید جسم کی خفایت کے ساتھ رات کے وقت دروں میں اتھری ہوتی ہے۔ کانوں اور ناک سے ہڈیوں کے سڑنے کے باعث بدبودار مواد خارج ہوتا ہے۔

پلاٹینم (Platinum): خصوصاً فٹوں کی ہڈیوں کا گلنا سڑنا لاحق ہو۔

سیلیشیا (Silicea): ہڈیاں خمیدہ ہو جاتی ہیں۔ سوکھا مسکن (Rickets) لاحق ہوتا ہے اور کولوں کے جوڑ کے امراض ہوتے ہیں۔ بدبودار پھینک بھی موجود ہو سکتا ہے۔ ناسوری سوراخ ہوتے ہیں۔ جن سے بدبودار مواد خارج ہوتا ہے اور ان کے ارد گرد کے حصے سخت اور سوجے

ہوئے ہوتے ہیں۔

اورم میٹ (Aurum Met): پارے کے غلط استعمال کے بعد آشنگی مریضوں میں ہڈیوں کا گلنا سڑنا لاحق ہو۔ سرویکل ہڈیوں کا گلنا سڑنا لاحق ہوتا ہے۔ نیز تالو کی ہڈیاں گلتی سڑتی ہیں۔ بدبو ہوتی ہے اور ہڈیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے خارج ہوتے ہیں۔

ایسا فوئیڈا (Asafoetida): بدبودار مواد خارج ہونے کے ساتھ ہڈیوں کا گلنا سڑنا لاحق ہوتا ہے۔ دکن ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ ناسوروں کے گرد دکن اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ حتیٰ کہ پٹی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ درد مدہم، کھینچنے والے اور جلن دار ہوتے ہیں۔ آرام کرنے سے ابتری ہوتی ہے۔

ہیکلا لانا (Hecle Lava): یہ دوا ہڈیوں کے امراض میں دی جاتی ہے۔ بشمول اوسٹیو سارکوما، ختازیری اور آشنگی ہڈیوں کی سوزش میں۔

کالچیکم (Colchicum): ہڈیوں کا گلنا سڑنا لاحق ہوتا ہے۔ خصوصاً جب ہڈیوں کے نشوونما پانے والے سرے متاثر ہوں۔

فاسفورس (Phosphorus): یہ دوا ہڈیوں کے گلنے سڑنے کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ جب سلیشیا مکمل شفا دینے میں ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جاسکتی ہے یا جب مرض کا ٹھیک ہونا رک جائے۔

سٹیفیسیا (Staphisagria): لمبی ہڈیوں میں جب بدلنے والا درد ہوتا ہے۔ اعصابی دردوں میں اور ہڈیوں کے گلنے سڑنے میں یہ دوا دی جاتی ہے۔

خمیدگی (ریڑھ کی) (Curvature (Spine))

ایسڈ فاس (Acid Phos): سروں کے گلنے سڑنے کے باعث ریڑھ کی ہڈی کا خم کھا جاتا۔
کالکیریا کارب (Calcarea Carb): ریڑھ کے سروں کے ملاقہ میں ریڑھ کی ہڈی کا خمیدہ ہو جانا لاحق ہوتا ہے۔ نیز لمبی ہڈیاں خمیدہ ہو جاتی ہیں۔ گردن اور کمر کی خمیدہ ہڈیوں میں سوجن ہوتی ہے۔

سلیشیا (Silicea): یہ دوا ہڈیوں کی سوزش ہڈیوں کے نرم ہو جانے اور ہڈیوں کے سڑنے کے امراض کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ امراض خواہ کہیں بھی پائے جائیں۔ ہڈیوں کے پھوڑے لاحق ہوتے ہیں۔ آخر کار ان پھوڑوں کے متہ مکمل جاتے ہیں اور بدبودار پیپ خارج ہوتی ہے۔

کالکیریا فاس (Calcarea Phos): ہڈیوں کے ریشوں میں پیپ پڑنے کا عمل جاری ہوتا ہے۔ گولہوں کے جوڑ کی ہڈیاں گلتی سڑتی ہیں۔ ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو

جاتی ہے۔ ہڈیاں خمیدہ ہونے لگتی ہیں۔ خصوصاً بائیں جانب، بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتیں۔

کلکیریا فلور: (Calcarea Fluor): جب کلکیریا کی دیگر اقسام ناکام ہو جائیں تو یہ دوا دینی چاہئے۔

سلفر: (Sulphur): کمر کے علاقہ میں مرہم لگانے سے ترخارش کے دب جانے کے بعد ریزہ کی ہڈی خمیدہ ہو جاتی ہے نیز پسلیاں بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ 200 طاقت کی دوا ہر ہفتے دی جائے۔

کالی ہائیڈ: (Kali Hyd): کولے کے امراض میں ہڈیوں کا خمیدہ ہو جانا لاحق ہوتا ہے۔ آتشک کے باعث ریزہ کی ہڈی گلنے سڑنے لگتی ہے۔

تھوجا: (Thuja): فرش پر بیٹھنے میں سرگھٹنوں میں گھس جاتا ہے۔ حفاظتی ٹیکوں کے برے نتائج، مریض پیچھے کی جانب جھک جاتا ہے۔ سیدھا نہیں بیٹھ سکتا۔

ہڈیوں کی سوزش (Osteitis)

(Inflammation of the Bones)

سلیشیا: (Silicea): کھوپڑی کی ہڈیوں کی سوزش۔

سٹیلنگیا: (Stillingia): لمبی ہڈیوں کی سوزش، مثلاً ران کی ہڈی، پنڈلی کی ہڈی، کندھے سے کہنی تک کی ہڈی وغیرہ۔ یہ مرض آتشک کے باعث ہو سکتا ہے۔

سٹرانٹیا کارب: (Strontia Carb): ہڈیوں کی سوزش ہوتی ہے۔ خصوصاً ران کی ہڈی کے ناسوروں کے ساتھ جن سے زیادہ یا کم مقدار میں ٹوٹی ہوئی ہڈیاں خارج ہوتی ہیں۔

سٹیفنی سیگریا: (Staphisagria): ہڈیوں کی سوزش اور جگہ بدلنے والے درد، لمبی ہڈیوں میں ہوتے ہیں۔ اعصابی دردوں میں نیز ہڈیوں کے گلنے سڑنے میں یہ دوا دی جاتی ہے۔

اورم میٹ: (Aurum Met): ہڈیوں کے دردوں کے لئے یہ ایک عظیم دوا ہے۔

اکیبریکس ایچ: (Agaricus M): ٹانگوں کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔

مینگانم: (Manganum): ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ رات کے وقت ابتری ہوتی ہے۔ متاثرہ حصوں کو چھونے سے ابتری ہوتی ہے۔ کھلی ہوا میں بہتری ہوتی ہے۔

ایسڈ فاس: (Acid Phos): رات کے وقت جلن ہوتی ہے۔ جو کہ پارے والے آتشکی یا خنازیری زہروں کے باعث ہوتی ہے۔

روٹا: (Ruta): چوٹ کے باعث ہڈیوں کی سوزش لاحق ہو۔

سمفٹی ٹم: (Symphytum): ہڈیوں کے ٹوٹ جانے کے باعث یا ہڈیوں کی چوٹ کے باعث ہڈیوں میں سوزش لاحق ہوتی ہے۔
ہیگلا لادا: (Hecula Lava): جسم میں کسی بھی جگہ ہڈیوں کی بڑھی ہوئی نشوونما کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ یہ مرض جڑے میں یا کہیں بھی ہو سکتا ہے۔

درد کمر — Lumbago (backache)

(نیز دیکھیے "سوزاک" اور "آٹک")

کولوسینٹس: (Colocynthis): کمر میں درد ہوتا ہے نیز پھوٹی کمر میں درد ہوتا ہے۔ جو آخر کار ران کے اوپر والے حصہ میں اور چوترا (سرین) میں ٹھہر جاتا ہے۔ شروع میں درد تھوڑی سی جگہ میں ہوتا ہے۔ جس کے باعث مریض لنگراتا ہے اور آخر کار اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ مریض نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ چل سکتا ہے۔ ٹکونی ہڈی کے ساتھ شدید جلن ہوتی ہے۔

رشاکس: (Rhus Tox): جبکہ چلنے سے درد میں افادہ ہوتا ہے اور آرام سے یا پہلی حرکت پر ابتری ہوتی ہے۔ رات کے وقت بھی ابتری ہوتی ہے۔ ٹکونی ہڈی والا درد ہوتا ہے۔ اگر ایک طاقت سے مرض میں افادہ نہ ہو تو دوا کی طاقت کو بدل لیجئے۔

انٹیم تارٹ: (Antim Tart): تھکاوٹ کے باعث درد کمر ہوتا ہے۔ کمر کے ٹپلے حصہ میں اذیت ناک درد ہوتا ہے۔ حرکت کرنے کی معمولی کوشش کے باعث ہلکیاں آتی ہیں۔ نیز ٹھنڈے اور چھپے پینے آتے ہیں۔ نیچے کی جانب دزن کے لگے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔
امونیا کارب: (Ammonia Carb): کمر کے علاقہ میں درد ہوتا ہے۔ جاڑے اور بخار کے ساتھ دونوں گروں میں تکلیف ہوتی ہے۔

اکٹیارلس موسا: (Actea Racemosa): بے چینی اور بے خوابی کے ساتھ عضلاتی درد ہوتا ہے۔ مریض احوالی، لٹخولیاہی اور بے چین ہوتا ہے۔

برائیونیا: (Bryonia): جب درد ہر حرکت سے ابتر ہو جائے اور لیٹنے سے نیز آرام کرنے سے بہتر ہو۔ جس کے ساتھ کمر میں خراشوں کا احساس ہوتا ہے۔ کمر کے نیچے مریض دباؤ یا کوئی سخت چیز رکھنا پسند کرتا ہے۔ رات کے وقت یا 3 بجے ابتری ہوتی ہے۔

بربرس ول: (Berberis Vul): وجع المفاصل یعنی درد کمر لاحق ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ پیشاب کی تکلیفات ہوتی ہیں۔

ڈالکامارا: (Dulcamara): جب مرطوب تر خانوں میں رہائش کے باعث درد کمر لاحق ہو یا جب 24 گھنٹوں کے دورانے میں درجہ حرارت بہت زیادہ کم و بیش ہونے کے باعث درد کمر

لاحق ہو۔

کالی کارب: (Kali Carb): کمر کے زیریں حصہ میں پیچھے کی جانب درد ہوتا ہے۔ کمر ٹوٹ کر دو حصوں میں بٹی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ درد نیچے کی جانب ٹانگوں کے پچھلی طرف جاتا ہے۔ مریض غبٹلی، مشکل، بلا ضرورت پریشان ہونے والا، ٹھنڈا اور زود حس ہوتا ہے۔

میڈورینیم 200: (Medorrhinum 200): درد کمر لاحق ہوتا ہے۔ (یعنی وجع المفاصل) انگلی کی کمرنگونی ہڈی میں درد ہوتا ہے جو کہ اکثر پھیل کر ٹانگوں تک چلا جاتا ہے۔ گدی میں اور کمر میں کھنچاؤ ہوتا ہے۔ ساری کمر میں درد ہوتا ہے۔ یہ عمل انگیز دوا ہے۔
ایلو: (Aloe): درد کمر جو درد سر کے ساتھ اولٹا بدلتا رہتا ہے۔

نیٹرم میور: (Natrium Mur): درد کمر لاحق ہوتا ہے جب کہ مریض درد کرنے والے حصہ میں دباؤ کو پسند کرتا ہے۔ وہ اپنے پیچھے کرسی میں کتاب رکھنا پسند کرتا ہے۔ بستر میں اپنے نیچے کوئی سخت چیز رکھنا چاہتا ہے۔ مریض کرسی پر بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کمر پر رکھنے کے ساتھ ادھر ادھر ہلتا ہے۔

الومینا: (Alumina): کمر میں درد ہوتا ہے جیسے کہ گرم لوہا ریزھ کی ہڈی کے نچلے سرے میں ٹکس گیا ہو۔

نکس وامیکا: (Nux Vomica): بڑے عضلات کا درد کمر، بستر پر اوپر نیچے ہوتا ہے۔ صبح کے وقت درد میں اضافے کے ساتھ جاڑے کے باعث درد ہوتا ہے۔ گرنی سے بہتری ہوتی ہے۔

ایسکولس ایچ: (Aesculus H): سخت مشقت یا سخت کام کرنے کے باعث کمرنگونی ہڈی میں کھنچاؤ ہوتا ہے۔ جس کے باعث کمر میں درد ہوتا ہے۔ کمرے ہونے سے درد میں افادہ ہوتا ہے۔

کلکیریا فاس: (Calcarea Phos): گردن کے پاس گدی میں درد ہوتا ہے نیز کھوپڑی کے علاقہ میں درد ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اس دوا کے متعلق سوچنا چاہئے۔ جب رشا کس اور ایسکولس ٹاکام ہو جائیں تو اس دوا کو آزمانا چاہئے۔ شدید قسم کے درد کے ساتھ کولے کے جوڑ کے امراض۔

ہائپرکیم: (Hypericum): کولے کے جوڑ میں شدید اعصابی درد ہوتا ہے۔
یوپاٹوریم پرف: (Eupatorium): شدید قسم کی پیاس اور جاڑے کے ساتھ ہڈیوں کے اندر گہرائی میں درد کمر ہوتا ہے۔ لمبیا بخار وغیرہ کے بعد اثرات کے باعث یہ تکلیف ہو سکتی ہے۔
کلکیریا فلور: (Calcarea Flour): درد کمر آرام کرنے کے دوران اجتر ہوتا ہے اور گری سے بہتری ہوتی ہے۔ کمر میں درد ہوتا ہے جو کہ پھیل کر کمرنگونی ہڈی تک چلا جاتا ہے۔ جب

رہیں تاکس ناکام ہو جائے تو اسے آزمایا جائے۔
 سلفر: (Sulphur): جنسی خواہش رکھنے والوں میں درد کمر لاحق ہوتا ہے۔ سیدھے ہو کر نہیں چل سکتے۔ کندھوں کے درمیان کھینچنے والا درد ہوتا ہے۔ آرام سے بہتری ہوتی ہے۔ رات کے وقت پاؤں کے ٹکڑوں میں اور ہاتھوں میں جلن ہوتی ہے۔ پیسے کی بو بسن بھیسی ہوتی ہے۔
 روڈوڈنڈرون: (Rhododendron): بازوؤں اور ٹانگوں میں پھاڑنے والا درد ہوتا ہے۔
 خشک سردی کے باعث درد کمر ہوتا ہے۔ آرام کرنے سے اور طوفان آنے پر بہتری ہوتی ہے۔
 گرمی اور کھانے کے بعد بہتری ہوتی ہے۔

ہڈیوں کا ٹوٹ جانا

(Osteogenesis Imperfecta)

(ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور بے قاعدہ طور پر نشوونما پاتی ہیں)

کلکیریا فاس: (Calcareia Phos): نازک اور آسانی سے ٹوٹ جانے والی ہڈیوں کے لئے یہ ایک عمدہ ہے۔ سر کی ہڈیاں معیار اور مقدار کے اعتبار سے ناکافی ہوتی ہیں۔ یہ بہت زیادہ موٹی اور بہت زیادہ پتلی ہوتی ہیں۔ گردن کی ہڈیاں اتنی چھوٹی اور اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ سر کو سہارا نہیں دے سکتیں۔ جو کہ معمولی بڑا ہوتا ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں کی ہڈیاں بھی کمزور اور نازک ہوتی ہیں۔ پانچاٹھ سبز غیر منظم اور بدبودار ہوتے ہیں۔ بھوک نہیں لگتی۔ یہ دوا ہڈیوں کی تعمیر کرنے والی اور خون کے نئے خلیے بنانے والی ہوتی ہے۔ یہ دوا تمام نامیاتی جسم کے لئے عمومی طور پر قوت بخش ہوتی ہے۔

کلکیریا کارب: (Calcareia Carb): یہ دوا کھلے کالو والے اور کھوپڑی کی ہڈیوں کے کھلے جوڑوں والے مریضوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ ہڈیوں کی تعمیر کرنے والے مادے تو خوب مہیا ہوتے ہیں لیکن ان کی مناسب تقسیم نہیں ہوتی۔

کلکیریا آئیوڈ: (Calcareia Iod): جب عضلات میں کمزوری ہوتی ہے اور پختائی کی کمی پائی جاتی ہے تو اس حالت کی وجہ سے ہڈیاں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں کلکیریا آئیوڈ کے متعلق سوچنا چاہئے۔ غدد کی غیر صحت مندانہ حالت ہمیشہ موجود ہوتی ہے چنانچہ اس حالت میں اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

کلکیریا فلور: (Calcareia Fluor): اس دوا کی نمایاں علامت یہ ہے کہ اس میں دانتوں کا اٹیل بہت جلد (یعنی قبل از وقت) جڑا ہو جاتا ہے۔ کسی عضلاتی ریشے یا عضو کی ذیلی حالت۔ یہ دوا شریانوں اور وریدوں کے لچک دار ریشے تعمیر کرتی ہے۔

سلیشیا (Silicea): یہ دوا ٹکیریا فاس کے بعد دینی چاہئے۔ جب کمری ہڈیوں کے ریشے مناسب طور پر ہڈیوں میں تبدیل نہ ہوئے ہوں۔ سلیشیا اور کمری ہڈی سے ہڈی تعمیر ہوتی ہے۔ اس لئے سلیشیا اس مرض کے لئے ایک اہم دوا ہے۔ لیستہ آتا ہے اور پیپ پڑنے کا رجحان ہوتا ہے۔ کمری سے بہتری ہوتی ہے۔ یہ علامات اس دوا کی نمایاں علامات ہیں۔ سلیشیا کے مریضوں میں ٹھنڈے سے مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کی سوزش

(Osteomyelitis)

نیز دیکھئے ”اعصابی نظام“ کے ذیل میں ”ریڑھ کی ہڈی کی سوزش“
سلیشیا (Silicea): زخموں کو دور کرنے کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ یہ دوا ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی باہر نکال دیتی ہے۔ جو زخم کے ٹھیک ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔

میڈورنیم (Mederrhinum): جب سلیشیا ناکام ہو جائے تو یہ دوا آزمائی جاسکتی ہے۔ مریض چڑچڑاہٹ گرم ہوتا ہے۔ اس کی ہتھیلیاں گرم ہوتی ہیں۔ قبض لاحق ہوتی ہے۔ ٹھنڈی غذاؤں کو اور ٹھنڈے مشروبات کو پسند کرتا ہے نیز نمکین غذا پسند کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا پسند کرتا ہے حتیٰ کہ سرد ترین موسم سرما میں بھی ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہے۔ گھٹنوں کو چھاتی سے ملا کر لیتا ہے۔ چنانچہ یہ اس دوا کی طبعی علامت ہے۔

اکی نیٹیا (Echinacea): یہ دوا اندرونی طور پر 3x طاقت میں دی جاسکتی ہے اور بیرونی طور پر پانی میں ملا کر لگائی جاسکتی ہے۔ پانی اور دوا کا تناسب یہ ہے کہ 10 قطرے دوا کے آدھے اونس پانی میں ملائے جاتے ہیں۔

درد (جوڑوں کا درد، گشیا، وجع المفاصل)

Pain (Pneumatism, Gout and Arthritis)

برائیوٹیا (Bryonia): جب معمولی سی حرکت سے دردوں میں اضافہ ہو جائے اور معتدل قسم کی دواؤں اور گرمی سے افادہ ہو۔ جوڑوں میں سوزش ہوتی ہے جو کہ گرم اور سوختے ہوئے ہوتے ہیں۔ مریض جاڑا محسوس کرتا ہے۔ یہ دوا 1x ذائقہ لیوشن میں دی جاسکتی ہے یا پھر 200 طاقت میں دی جائے جبکہ چلی طاقت کی دوا میں ناکام ہو جائیں۔

لیڈم پال: (Ledum Pal): یہ دوا گھٹیا اور جوڑوں کے درد کے لئے مخصوص ہے۔ جبکہ تکلیفات نیچے سے اوپر کی جانب سفر کریں۔ انگلیوں کے جوڑوں میں 'کھائی' میں اور انگوٹھوں میں چاک جمع ہو جاتا ہے۔ جوڑوں میں سوزش ہو سکتی ہے۔ جاڑا ہوتا ہے حالانکہ درد ٹھنڈی چیزیں لگانے سے بہتر ہوتا ہے۔ چڑچڑاہٹ ہوتا ہے اور تھمارہنے کی خواہش ہوتی ہے۔ شراب نوشی، حشرات الارض کے ڈنک، زخم، درد کا باعث ہو سکتے ہیں۔ گرم چیزیں لگانے سے بہتری ہوتی ہے۔

کالمیا لونی فولیا: (Kalmia Lotifolia): یہ دوا گھٹیا کے دردوں کے لئے ہے جبکہ تکلیف نیچے کی جانب سفر کرتی ہے۔ جس کے ساتھ من ہو جانے کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ دل کی دھڑکن اور سست نبض کے ساتھ درد ہوتا ہے۔ درد تیزی سے منتقل ہوتے ہیں۔ کھائی کے عصب میں درد ہوتا ہے۔

کالچیکم: (Colchicum): گھٹیا کے لئے یہ ایک عام دوا ہے۔ غذا سے ہزاری ہو سکتی ہے۔ ہڈا جیسے ہی پیش کی جاتی ہے۔ مریض کو اس کی بو آتی ہے۔ جس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جوڑوں کی سوجن لاحق ہوتی ہے جو کہ سرخ یا پیلی ہو سکتی ہے۔ پیٹ ہوا سے بھرا ہوتا ہے۔ پیشاب میں البیومن خارج ہوتا ہے جو کہ سیاہی کی طرح نکلا ہو جاتا ہے۔ استسقاء سوجن کے ساتھ پیشاب کم مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ دردوں یا ہڈوں سے نمایاں جھپٹا ہوتا ہے۔ حرکت سے پھوٹنے سے یا ذہنی مشقت سے بہتری ہوتی ہے۔ گرمی، آرام اور پینے سے بہتری ہوتی ہے۔ سگریٹ نوشوں میں گھٹیا اور جوڑوں کا درد لاحق ہوتا ہے۔

رشاکس: (Rhus Tox): جب گرم ہو تو جاڑا لگنے کے باعث گھٹیا کے حملے عود کر آتے ہیں۔ مرطوب موسم کے باعث گھٹیا لاحق ہوتا ہے اور مرطوب ماحول میں بہتری ہوتی ہے۔ بے حرکت ہوتی ہے اور پہلی حرکت پر دردوں میں بہتری ہوتی ہے۔ مسلسل حرکت سے بہتری ہوتی ہے۔ کچھ دیر حرکت کرنے کے بعد دوبارہ بہتری ہو جاتی ہے۔ جب مریض کے لئے رک جانا ضروری ہوتا ہے۔ IM ذاتی لیوشن میں یہ دوا بہترین نتائج دیتی ہے۔

کیکٹس جی: (Cactus G): استسقاء کے ساتھ اور ہازوؤں، ٹانگوں میں استسقاء سوجن کے ساتھ گھٹیا لاحق ہوتا ہے۔ گردے اور آنتیں متاثر ہوتی ہیں۔ دل کا گھٹیا ہوتا ہے جبکہ دل میں تکلیف ہوتی ہے اور جوڑوں سے آزاد ہوتے ہیں۔

سٹیلاریا میڈ: (Stellaria Med): جسم کے تمام حصوں میں دکن کے ساتھ نخل ہونے والے دردوں کی نشاندہی اس دوا سے کی جاتی ہے۔ جگر میں دردوں کے ساتھ حرکت سے بہتری ہوتی ہے۔ گھٹیا والے جوڑے بڑھ جاتے ہیں اور ان میں سوجن ہوتی ہے۔ جوڑوں میں درد بھی ہوتا ہے۔

ہے۔ (یہ دوا اندر گچھر کو زیتون کے تیل میں ملا کر بیرونی طور پر بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔)
ڈالکامارا: (Dulcamara): ٹھنڈے لگنے سے اور گیلا ہو جانے سے گھٹیا لاحق ہوتا ہے۔ مرطوب
 تر خانوں میں رہائش رکھنے کے باعث یا ایسی جگہوں پر رہنے کے باعث جس 24 گھنٹے کے اندر
 درجہ حرارت میں بہت زیادہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ گرمیوں کے گرم دنوں میں جو ٹھنڈی راتوں
 کے بعد آتے ہیں۔ گھٹیا لاحق ہو جاتا ہے۔ پسینوں کے دب جانے کے باعث گھٹیا لاحق ہوتا ہے۔
پلساٹیل: (Pulsatilla): گھٹنوں میں، ٹخنوں میں اور ہاتھوں اور پاؤں کے چھوٹے جوڑوں میں
 تکلیفات ہوتی ہیں۔ درد مفل ہونے والا ہوتا ہے۔ جو کہ رات کے وقت آتا ہے۔ گرم کمرے
 میں اور آرام کرنے پر یہ درد لاحق ہوتا ہے۔ کھلی ہوا میں اور حرکت سے اور گرم چیزیں لگانے
 سے بہتری ہوتی ہے۔ ایڑیوں میں کیل ٹھونکنے جیسا درد ہوتا ہے۔ مریض شریف الطبع، بزدل
 اور جلدی سے رو دینے والا ہوتا ہے۔

گولتھیریا آئل: (Gultheria Oil): 10 سے 20 قطرہوں کی خوراکیں کبھی کبھی درد روکنے میں
 ناکام نہیں ہوتیں۔

اسکلی پاس ٹیوب: (Asclepias Tub): درد ترقیمے چلتے ہیں (مثلاً ایک جانب کے بازو اور
 ایک جانب کی ٹانگ میں درد ہو۔)

ملیریا آف: (Malaria Off): ملیریا بخار کے بعد گھٹیا لاحق ہوتا ہے۔

فیرم پیک: (Ferrum Pic): چٹے سے گھٹیا کے درد میں زیادتی ہوتی ہے یا درد پیدا ہو جاتا ہے۔
لائکوپوڈیم: (Lycopodium): اچھارہ کے ساتھ انگلیوں کے جوڑوں میں گھٹیاوی درد ہوتا

لیکٹک ایسڈ: (Lactic Acid): ذیابیطس کے ساتھ گھٹیاوی درد لاحق ہو۔

گوائیگم: (Guaiacum): آتشک یا تپ دق والی طبیعتوں میں جوڑوں کا درد اور گھٹیا لاحق
 ہو۔ گرمی اور حرکت سے دیکھتے ہوئے اور سو بے ہوئے جوڑ اور بھی زیادہ پردرد ہو جاتے ہیں۔
 جوڑوں میں گھٹیاوی پھوڑے ہوتے ہیں۔ ٹانگ اور ٹخنے کی ہڈیاں خصوصاً متاثر ہوتی ہیں۔ ٹانگوں
 میں گولی لگنے جیسا درد پاؤں سے گھٹنے تک آتا ہے۔ چڈی کی بڑی ہڈی میں درد ہوتے ہیں۔
 ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہانے سے اور ٹھنڈی چیزیں لگانے سے بہتری ہوتی ہے۔

فارمیکا اور فارمک ایسڈ: (Formica and Formic Acid): گھٹیا یا جوڑوں کے درد،
 یورٹیس اور الیومن کے پیشاب میں خارج ہونے کے باعث لاحق ہوتے ہیں۔ جوڑوں میں
 سوزش ہوتی ہے جو بہت پردرد ہوتی ہے۔ حرکت سے، ٹھنڈے سے یا طوفان سے قبل دردوں میں
 بہتری ہو جاتی ہے اور دہانے سے بہتری ہوتی ہے۔

لیتھیم کارب (Lithium Carb): پورک الیٹھ کے باعث مزمن گھٹیا لاحق ہو۔ دل کی دھڑکن ہوتی ہے اور دل میں جھکے لگتے ہیں۔ پاؤں کے ٹکڑوں میں درد ہوتا ہے اور پھوٹے جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ ان میں جلن کا احساس بھی ہوتا ہے۔

کالی کارب: (Kali Carb): ٹانگے لگتے جیسے، خنجر گھونپنے جیسے اور جلن دار درد ہوتے ہیں۔ جن میں ٹھنڈی چیزیں لگانے سے عارضی طور پر آفاقہ ہو جاتا ہے لیکن آرام کرنے سے یا حرکت کرنے سے کوئی آفاقہ نہیں ہوتا۔ مریض درد کے باعث چلاتا ہے۔ بہت زیادہ کمزوری اور باافراط پسینہ آنے کے ساتھ کمر درد ہوتا ہے۔ اگر پروردھے کو ڈھانپ دیا جائے تو درد ایسے جیسے میں چلا جاتا ہے۔ جو ڈھانپنا نہیں کیا ہو۔ کھانا کھانے کے بعد اور کپڑا اتارنے سے اضافہ ہوتا ہے۔ IM ذائی لیوشن کی صورت میں دوا دیجئے۔

کلکیریا کارب: (Calcarea Carb): ہڈیوں کے ریشوں کی ست نشوونما، ہڈیوں کی نشوونما ہے قاعدہ ہوتی ہے۔ ہڈی کا ایک حصہ پرورش پالیتا ہے جبکہ دوسرا حصہ محروم رہتا ہے۔ ریس ٹاکس کی طرح اس دوا میں بھی درد مسلسل چلنے سے رفع ہوتے ہیں اور لیٹنے سے یا آرام کرنے سے ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وجع المفاصل والی سو جن یا ہاتھوں اور انگلیوں کے جوڑوں کا گرہ دار گھٹیاوی درد یا گھٹنوں میں گھٹیاوی درد پر گوشت اور پسینے کی طبیعت رکھنے والے مریضوں میں لاحق ہوتا ہے۔ ٹھنڈ سے اتھری ہوتی ہے۔

گنیشیا میور: (Magnesia Mur): جب درد بیٹھنے سے اتر ہوں، چلنے سے بہتر ہوں اور لیٹنے سے عمل طور پر جاتے رہیں۔

سلی سلک الیٹھ: (Salicyli Acid): گھٹیاوی درد جوڑوں پر خصوصاً کٹنی اور گھٹنے کے جوڑوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ شدید قسم کی سو جن، سرخی ہوتی ہے اور اونچے درجے کا بخار ہوتا ہے۔ حاد اور چھیدنے والا درد گرمی سے بہتر ہوتا ہے اور ٹھنڈ سے اتر ہوتا ہے۔

سٹیکٹا پلموناریا ون ایکس: (Sticta Pulmonaria 1x): دامنیں کندھے کی پچھٹی ہڈی یا جوڑ میں گھٹیاوی درد ہوتا ہے۔ کلائی کے جوڑ میں، گھٹنے یا گھٹنے کے جوڑ میں گھٹیاوی درد ہوتا ہے یہ جوڑوں میں رطوبت کو بھی کم کرتی ہے۔

الیٹھ ٹارٹارکیم: (Acid Tartaricum): پاؤں کے ٹکڑوں میں ایڑیوں میں درد ہوتا ہے۔

ٹرائکی میتھائل ایمائنیم: (Trimethylaminum): کلائیوں میں اور گھٹنوں میں بخار کے ساتھ درد ہوتا ہے۔ یہ دوا پورٹس کی مقدار کو گھٹاتی ہے۔

سرساپاریلہ 200: (Sarsaparilla 200): ساگو ٹک لوگوں میں گھٹیاوی درد سوزاک کے دب جانے کے باعث لاحق ہوتے ہیں۔ یہ سوزاک کا دوا ٹیکوں کے ذریعے یا دیگر بیرونی استعمال

کے باعث ہوتا ہے۔

بربرس ولگ 200: (Berberis Vulg 200): ایزبوں کے درد میں افادہ ایزبوں پر زیادہ وزن ڈالنے سے ہوتا ہے۔ وجع الفاصل اور گھٹیا کی تکلیفات لاحق ہوتی ہیں۔ گردوں میں چپکنے والے درد اور کمر درد کے باعث۔

مارس ٹیکاٹیلی فیرا: (Myristica Sebifera): سوزش یا / اور پیپ پڑنا جوڑوں میں یا دیگر حصوں میں لاحق ہوتا ہے۔ انگلیوں کے ناخنوں میں اور ہاتھوں کی چھوٹی پٹریوں میں درد ہوتا ہے۔

چیلی ڈونیم: (Chelidonium): سو جن 'گرمی' نری اور سختی کے ساتھ گھٹیاوی درد ہوتے ہیں۔ قبض اور سفیدی مائل پانڈے ہوتے ہیں۔ معمولی حرکت یا چھو جانے سے درد میں افادہ ہو جاتا ہے۔ صرف گرم پانی سے مسلسل نہانے سے ہی افادہ ہوتا ہے۔
کیوپرم اسٹیکم: (Cuprum Acet): دائیں پاؤں کے انگوٹھے میں عضلاتی تشنج ہوتا ہے۔ بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔

نیفالیم: (Gnaphalium): گھٹاؤ اور سن ہو جانے کی کیفیت کے اولے بدلنے کے نتیجہ میں درد شقیقہ لاحق ہو۔ ٹھنڈے اور مرطوب موسم میں ابتری ہوتی ہے۔
گریٹیولا: (Gratiola): حیرانیت اور قبض کے ساتھ گھٹیا لاحق ہوتا ہے۔ کندھوں میں 'بازوؤں میں' انگلیوں میں 'خصوصاً کہنی میں اور کلائی کے جوڑوں میں' جوڑوں کے درد اور گھٹیاوی درد ہوتے ہیں۔

یوپاٹوریم پرف: (Eupatorium Perf): مزمن گھٹیاوی حالت جس کے ساتھ انگلیوں کے جوڑوں میں 'کہنیوں کے جوڑوں میں' انگوٹھوں وغیرہ میں سوزش ہوتی ہے۔ جوڑوں کے درد کے ساتھ سر میں گھٹیاوی یا فکری درد ادا بدلتا رہتا ہے۔

کالی آئیوڈ: (Kali iod): جوڑوں کی گھٹیاوی تکلیف ہر جوڑ میں ہوتی ہے۔ گھٹیا کے پرانے مریض جنہیں افادہ حاصل کرنے کے لئے کھلی ہوا میں حرکت میں رہنا پڑتا ہے۔ جب وہ آرام سے بیٹھ جائیں تو تھک جاتے ہیں۔ مریض گرم مزاج 'بد مزاج' پتہ پڑا اور سخت مزاج ہوتا ہے۔

روڈوڈنڈرون: (Rhododendron): گھٹیاوی درد ہوتے ہیں جو ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ میں پھرتے رہتے ہیں۔ ساتھ میں جوڑوں کی سو جن بھی ہوتی ہے۔ طوفان باد و باران کے دوران یا پہلے ابتری ہوتی ہے۔ ٹھنڈے یا گیلا ہونے سے یا غیر مستحکم موسم سے ابتری ہوتی ہے۔ گرم کمزوری میں لپٹنے سے بہتری ہوتی ہے۔ جوڑوں کا بیڑہ جانا گھٹیا کے باعث نہیں ہو سکتا۔ وجع الفاصل والی کاٹھیں ہوتی ہیں۔

فلانی ٹولا کا: (Phytolacca): جسم کی مزمن خراش والی حالت، ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ جسم دکھتا ہے۔ جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ رات کے وقت اتھری ہوتی ہے۔ بستر کی گرمی سے اتھری ہوتی ہے۔ گرم چیزیں لگانے سے اتھری ہوتی ہے۔ مریض ٹھنڈی چیزیں پسند کرتا ہے۔ جوڑوں کا گھٹیا لاحق ہوتا ہے۔ کان کے قریب کے غدود اور نچلے جڑے کے غدود بڑھ جاتے ہیں۔ دل دانے علاقہ میں درد ہوتا ہے۔ دائیں بازو میں گولی لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔

نایٹرم سلفیڈ: (Natrium Sulph): جب پیشاب میں یورک ایسڈ کے باعث جوڑوں کا درد لاحق ہو۔ جس کے ساتھ معدہ کی تکلیفات بھی ہوں۔

میگنولیا: (Magnolia): دل کی تکلیف کے ساتھ گھٹیا کا مرض لاحق ہو۔ تلی اور دل میں درد اول بدل کر ہوتا ہے۔ مریض تھکا ہوتا ہے لیکن اکڑا ہوا نہیں ہوگا۔ بے قاعدہ خفقان ہونے والے درد ہوتے ہیں۔ ضیق النفسی ہوتی ہے۔ تیز چلنے سے دم گھٹنا محسوس ہوتا ہے۔

بیسنزوئکک ایسڈ: (Benzoic Acid): یوریک اور تھیمک طبیعتوں میں جوڑوں کے درد اور گھٹیاوی درد لاحق ہوتے ہیں۔ جب پیشاب کم مقدار میں خارج ہو تو مریض زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ بہ نسبت اس کے کہ پیشاب زیادہ ہو اور باافراط خارج ہو۔ اس سے دردوں میں افادہ ہوتا ہے۔ اس حالت میں پیشاب کا رنگ گہرا ہوتا ہے اور یو تیز ہوتی ہے۔ جیسا کہ کھوڑے کے پیشاب کی بو ہوتی ہے۔ پیشاب میں مواد کے نہ آنے کے باعث درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیشاب میں یورک ایسڈ ہوتا ہے جو سرخ رنگ کا مادہ بناتا ہے۔ گھٹیاوی درد ٹھنڈ لگ جانے کے بعد رک جاتے ہیں اور زبان کی سوزش یا معدہ کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ بعد میں مریض ہر کھانسی جانے والی چیز سے کڑھتا ہے۔ دپے ہوئے درد معدہ میں چلے جاتے ہیں اور پھر بیسنزوئکک ایسڈ، ایشٹم کروڈ اور سیٹکولیئیریا یہ دوائیں مفید بن جاتی ہیں۔ دسہ کی پیچیدگیوں کے ساتھ ٹانگوں میں استسقاءی سوجن ہوتی ہے۔ لکھتے وقت الفاظ بھول جاتا ہے۔ جب ٹیٹ آتا ہے تو اداسی اور پریشانی ہوتی ہے۔ یوریک یا اخون میں پیشاب کا شامل ہونا لاحق ہوتا ہے۔ جازا لگتا ہے۔ کپڑا اتارنے سے اتھری ہوتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا سے، موسم کی تبدیلی سے، حرکت سے اور شراب سے اتھری ہوتی ہے۔ گرمی سے یا باافراط پیشاب آنے سے بہتری ہوتی ہے۔ پھرے والے درد ہوتے ہیں جو اچانک حالت بدل لیتے ہیں۔ جوڑوں میں گھٹیاوی درد ہوتے ہیں۔ دوا گھٹیاوی دردوں کو رفع کرتی ہے۔

اوکزالک ایسڈ: (Oxalic Acid): ہائیں جانب کا جوڑوں کا درد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ ہائیں کھچھڑے کی ذریعہ لو میں تیز جسم کے درد ہوتے ہیں۔ یہ علامت اس دوا میں قابل غور ہے۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ مرض کا نام کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ذات الحجب، نمونیا یا اس

ہو۔ بہر حال جب یہ درد موجود ہو تو اوگزالک الیڈ کام کرے گا۔ جوڑوں کا گھٹیاوی درد لاحق ہوتا ہے۔ خصوصاً پینے سے ابتری ہوتی ہے۔ یہ معدے کو خراب کر سکتا ہے۔ تھوک بہتا ہے۔ بے ذائقہ ڈکار آتے ہیں۔ معدہ میں جلن ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ دوا اوگزیریا (وہ مرض جس میں براستہ پیشاب اوگزالیٹ خارج ہوں) کا بھی اعلاہ کرتی ہے یعنی اسے شفا دیتی ہے۔ کندھے کے جوڑے کے نیچے درد ہوتا ہے۔ کندھوں کے درمیان میں درد ہوتا ہے۔ جو نیچے چھوٹی کمر تک پھیل جاتا ہے۔ شدید دکھن والا درد کمر میں نیچے رانوں تک ہوتا ہے۔ جس میں حالت کے بدلنے سے افادہ ہوتا ہے۔

منگانیم: (Manganum): بازو اور ٹانگیں تکلیف سے پڑھتی ہیں۔ حتیٰ کہ گھٹیا لاحق ہو جاتا ہے۔ ہڈیوں میں دکھن ہوتی ہے۔ ٹکڑوں میں جلن ہوتی ہے۔ وجع المفاصل والی بڑھوتری ہوتی ہے۔ ہڈیوں کے غلاف میں درد ہوتا ہے۔ جوڑوں میں درد ہوتے ہیں۔ یہ دوا عود کر آنے والی تکلیفات میں مفید ہے جبکہ پہلی دفعہ کے حملے میں کم ہی مفید ہوتی ہے۔

کیمفر: (Camphor): نیم ہوش مندی کی حالت کے دوران درد محسوس ہوتے ہیں لیکن جب مریض ان کے متعلق سوچتا ہے تو درد غائب ہو جاتے ہیں۔

کیمومیل: (Chamomilla): شدید قسم کا تیز درد اچانک آتا ہے جو مریض کو پاگل کر دیتا ہے۔ مریض کہتا ہے کہ وہ موت کو یا کسی اور تکلیف کو ان دردوں پر ترجیح دے گا۔ یہ دوا خصوصاً سن ہو جانے کے ساتھ درد کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے۔

سیکارم لیکٹس: (Saccharum Lactis): برقی ٹھنڈے والے درد تمام اطراف میں سے گزر جاتے ہیں۔

انٹیم کروڈ: (Antim Crud): گھٹیا تے کے ساتھ اولٹا بدلتا رہتا ہے جب گھٹیا رک جاتا ہے تو تے شروع ہو جاتی ہے۔ انگلیوں کے جوڑوں میں گرہ دار گھٹیاوی درد ہوتے ہیں نیز جبکہ بدلنے والے گھٹیاوی درد ہوتے ہیں لیکن زبان پر سفید طبع ہوتا ہے۔ تھنوں میں شکاف ہوتے ہیں اور منہ کے کونوں میں شکاف ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے غسل سے نفرت ہوتی ہے۔

میفاٹس: (Mephites): پیشاب کرنے کے دباؤ کے ساتھ پھرنے والے درد ہوتے ہیں۔

فیسولس این: (Phaseolus N): ذیابیطس کے ساتھ گھٹیا کے لئے یہ ایک اہم دوا ہے۔

سبائنا: (Sabina): گھٹیا اور رحم سے سیلان خون اول بدل کر آتے ہیں۔ سیلان خون کا آغاز ہو جاتا ہے جبکہ گھٹیا رک جاتا ہے اور اسی طرح سے اس کے برعکس ہوتا ہے۔

سلفر: (Sulphur): گرمیوں کے دوران دردوں میں ابتری ہوتی ہے۔ صاف غیر ابر آلود ایام میں ابتری ہوتی ہے اور مرطوب و سرد موسم کے دوران ابتری ہوتی ہے۔ مزمن وجع المفاصل

جس کے ساتھ ٹکڑوں کی جلن اور سرکی چوٹی کی جلن ہوتی ہے۔
 لائیو پوس وی: (Lycopus V): جب دروں میں بہتری گرم کرے میں یا بستر میں ہوتی ہے
 لیکن براہ راست حرارت کے باعث بہتری نہیں ہوتی۔
 اکونائٹ نیپ: (Aconite Nap): گولی لگنے جیسے درد ہوتے ہیں جو شراب نوشی یا کسی
 دوسری محرک چیز سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت بہتری ہوتی ہے اور بیٹھنے کی حالت میں
 عموماً درد خائب ہو جاتا ہے۔

اکٹیارلیس موسا: (ACTR): ریڑھ کی ہڈی کے سروں کے جوڑوں میں گھٹیاوی تکلیفات ہوتی
 ہیں اور خصوصاً گردن میں۔ گردن کی گدی میں درد ہوتا ہے۔ یہی اس دوا کی طبیعت علامت
 ہے۔ جب گھٹیا میں بہتری ہوتی ہے تو دماغی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں یا اسہال لاحق ہو جاتے ہیں
 جبکہ دماغ میں خلل واقع نہ ہو۔ تھوڑا سا اخراج افقہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

اکٹیا سپاکی کاٹا: (Act Spicata): پھاڑنے والے اور کھینچنے والے درد چھوٹے جوڑوں میں
 اور گلہبوں میں ہوتے ہیں۔ معمولی تھکاوٹ کے بعد جوڑ سوچ جاتے ہیں۔

ایپورٹینم: (Abortanum): اسہال رک جانے کے بعد جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے۔
 گھٹیاوی درد جوڑوں سے دل کی طرف منتقل ہو جاتا ہے یا ریڑھ کی ہڈی کی طرف منتقل ہو جاتا
 ہے۔ کمر میں اچانک دھکن والا درد ہوتا ہے۔ جس میں حرکت سے بہتری ہو جاتی ہے۔ رات
 کے وقت اور فطرتی ہوا میں علامات کے اندر بہتری واقع ہو جاتی ہے۔

آر سینک البم: (Arsenic Alb): جلن دار درد آدمی رات کے وقت اور درد والی جانب
 لیٹنے سے بہتر ہوتے ہیں جبکہ گرمی سے اور تکلیف والے حصے کو حرکت دینے سے افقہ ہوتا
 ہے۔ گھٹیاوی درد کشی سے کدھے تک ہوتے ہیں۔

جلی میم: (Gelsemium): جلن دار درد جن میں گرمی سے افقہ نہیں ہوتا۔ رات کے 10
 بجے بہتری ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت گھٹیاوی درد ہڈیوں اور جوڑوں میں پھرتے رہتے ہیں۔

ہائپرکیم: (Hypericum): گھٹیاوی وجع المفاصل کے لئے یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔ زخمی
 عصب کو ٹھیک کرنے میں یہ دوا حیرت انگیز حد تک اثر انداز ہوتی ہے۔ گھٹنے میں کھچاؤ ہوتا
 ہے۔ ٹانگ، پاؤں، انگوٹھے بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔

مرک سول: (Merc Sol): گھٹیاوی اور وجع المفاصل والے درد ہوتے ہیں۔ جن کے ساتھ
 بدبودار بھید آتا ہے۔ جتنا زیادہ بھید آتا ہے، مریض اتنی ہی زیادہ بہتری محسوس کرتا ہے۔
 تھکاوٹ ہوتی ہے۔ بستر میں بہتری ہوتی ہے لیکن جیسے ہی مریض بستر میں گرمی محسوس کرتا ہے۔
 دروں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اسے اپنے کپڑے اتار پھینکنا پڑتے ہیں تاکہ بہتری حاصل کر

سکے۔ بعد والی حالت بھی درد میں اضافہ کرتی ہے چنانچہ اسے پھر دوبارہ خود کو بستر میں ڈھانپنا پڑتا ہے اور اسی طرح تمام وقت ہوتا رہتا ہے۔ رات کے دوران اتھری ہوتی ہے۔

کالی بائی: (Kali Bi) حرکات سے دردوں میں اتھری ہوتی ہے اور گرمی سے بہتری ہوتی ہے۔ پھرنے والے اور خفقل ہونے والے درد ایک جوڑے دوسرے جوڑے کی طرف چلتے رہتے ہیں۔ اس سال یا نزلاوی اخراج کے دوبارہ ظاہر ہونے پر دردوں میں بہتری ہوتی ہے۔ یہ اس دوا کی نمایاں علامت ہے۔ بیٹھنے پر ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے۔ مختصر حصوں میں درد ہوتا ہے جنہیں انگلی کے سرے کے ساتھ ڈھانپا جا سکتا ہے۔ کولہوں کے جوڑوں میں اور گھٹنوں میں حرکت کرنے پر درد ہوتا ہے۔

اپیس مل: (Apis Mel) جوڑوں کی سوزش لاحق ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ ڈنک لگنے جیسے اور جلن دار درد ہوتے ہیں۔ جن میں اتھری گرم کمرے میں نیز گرم چیزیں لگنے سے ہوتی ہے اور ٹھنڈی چیزیں لگنے سے اور ٹھنڈی ہوا سے بہتری ہوتی ہے۔ متاثرہ حصے سرخ دکھائی دیتے ہیں اور چھونے سے گرم محسوس ہوتے ہیں۔ استقلالی سوجن ہوتی ہے۔ اونچے درجے کی طاقتوں والی دوا دیکھئے۔

سلیسینیم: (Selenium) گھٹیاوی امراض۔ تپ دق والے امراض، طویل بخاروں کے بعد انتہا درجے کی کمزوری ہوتی ہے۔ شدید قسم کی اور اعتدال سے بڑھی ہوئی عمومی نقاہت ہوتی ہے۔ بازو اور ٹانگیں مر رہا جاتی ہیں۔ بال گر جاتے ہیں۔ پھل کھانے کے بعد یا شراب پینے کے بعد یا چائے پینے کے بعد اس سال لاحق ہو جاتے ہیں۔

کاسٹیکم: (Causticum) گھٹیاوی وجع المفاصل لاحق ہوتا ہے۔ جس میں بہتری مرطوب ہوا اور گرم موسم میں ہوتی ہے اور اتھری ٹھنڈے اور خشک موسم میں ہوتی ہے۔ بندھنوں کی کھین اور سختی لاحق ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ کمزوری اور کپکپاہٹ ہوتی ہے۔ گھٹیاوی وجع المفاصل ہوتا ہے۔ خصوصاً جہاں جوڑوں میں سختی اور بندھنوں میں سکڑاؤ ہوتا ہے۔ بازو اور ٹانگیں کھینچ کر اپنی ہیئت خراب کر لیتی ہیں۔ جوڑوں کی بد وضعی لاحق ہوتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو مریض سکون محسوس کرتا ہے۔ فالٹی کپکپاہٹ ہوتی ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں کمزوری ہوتی ہے۔

میڈورنیم: (Medorrhinum) جب اچھی منتخب شدہ ادویات ناکام ہو جائیں تو اس دوا کو آزمانا چاہئے۔ یہ دوا خصوصاً گھٹیاوی وجع المفاصل کی نشاندہی کرتی ہے۔ جو مریض کو نیند سے بیدار کر دیتا ہے۔ پیشاب کم مقدار میں گھرے رنگ والا اور تیز بو والا ہوتا ہے۔ مریض ٹھنڈے سے حساس ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ تلوؤں کی نری ہوتی ہے۔ ٹانگیں اوپر کو اٹھائے ہوئے لیٹنا

پسند کرتا ہے یہ حالت اسے آرام بہم پہنچاتی ہے۔ ایڑیوں میں درد ہوتا ہے۔ یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ مزاج میں چڑچڑاہٹ ہوتا ہے۔ 200 ذاتی لیوٹن یا اوپچی طاقتوں کی دوا دیجئے۔
سفی لینئم: (Syphilinum) آفتک والی طبیعتوں میں گنہیادی دردوں کے لئے یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔ جبکہ دیگر اچھی منتخب شدہ ادویات ناکام ہو جائیں۔ دردوں میں دوران شب اتھری ہوتی ہے۔ رات کو سوتے وقت 1000 طاقت کی ایک خوراک دیجئے۔

لیکیسیس: (Lachesis) گھٹنوں اور کہنیوں میں گنہیادی درد ہوتا ہے۔ گھٹنے سوج جاتے ہیں۔ سیلان خون کے باعث چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ پانی کی بہت زیادہ پیاس ہوتی ہے۔
ڈروسرا: (Drosera) ران کی ہڈی میں اور لمبی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔

پائیروجینیئم: (Pyrogenium) پہلی دفعہ حرکت شروع کرتا ہے تو درد میں بہتری ہوتی ہے لیکن جب حرکت وقفے کے ساتھ مسلسل ہوتی رہتی ہے تو اتھری ہو جاتی ہے۔ (رٹاکس کے برعکس) درد سے افادہ حاصل کرنے کے لئے مریض کو تھوڑی سی حرکت کر کے رک جانا پڑتا ہے اور پھر دوبارہ تھوڑی سی حرکت کرنا پڑتی ہے اور رک جانا پڑتا ہے اور اسی طرح سے کرتے رہنا پڑتا ہے۔

آرنیکا مونٹ: (Arnica Mont) گنہیادی درد کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے جبکہ مریض چھوئے جانے سے یا کسی کے قریب آنے سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی چیز اس کے قریب اسے تکلیف پہنچانے کے لئے آ رہی ہے کیونکہ وہ دکھی اور نرم ہوتا ہے۔ گنہیادی بخار ہوتا ہے جبکہ دل بھی ملوث ہو سکتا ہے۔

اورم میٹ: (Aurum Met) درد جوڑ جوڑ پھرتے رہتے ہیں اور آخر کار دل میں پہنچ جاتے ہیں۔ جن کے نتیجے میں انجانا کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ جوڑوں میں سوجن ہوتی ہے۔ کمری ہڈیاں اور ہڈیوں کی شکلیات ہوتی ہیں۔ ہڈیوں کے قلاف کی سوزش لاحق ہوتی ہے۔ رات کے وقت اتھری ہوتی ہے۔

اورم میور: (Aurum Mur) پھاڑنے والے، کھینچنے والے، دبائے والے اور سخت قسم کے درد ہوتے ہیں۔ جن میں ٹھنڈ سے بہتری ہوتی ہے اور گرمی سے نیز گرم چیزیں لگانے سے اتھری ہوتی ہے۔ رات کے وقت اتھری ہوتی ہے۔ مریض زندگی سے تھک رہا ہوتا ہے۔

نیٹرم فاس: (Natrurn Phos) پیٹ کے گول کیرڈوں کے ساتھ گنہیادی درد لاحق ہوتے ہیں۔ دل کے ٹپلے حصہ میں درد ہوتا ہے۔ جب بازوؤں اور ٹانگوں میں نیز انگوٹھوں میں درد دور ہو جائے نیز اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔

ارجنٹم میٹ: (Argentum Met) اعصاب اور کمری ہڈیوں کے ساتھ ساتھ جوڑوں میں

گھٹیاوی درد ہوتے ہیں۔ خصوصاً کھنی اور گھٹنے میں۔ ٹانگیں کمزور ہوتی ہیں اور کانپتی ہیں۔ میڑھیاں چڑھتے ہوئے اترتی ہوتی ہے۔ ٹخنوں کی سوجن لاحق ہوتی ہے۔ کمری ہڈیوں میں سوزش ہوتی ہے نیز ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور ان میں سخت کانٹھیں پڑ جاتی ہیں۔ کمری ہڈیوں کا موٹا ہو جانا لاحق ہوتا ہے۔

کالوفائلیم: (Caulophyllum): چھوٹے عضلات کا گھٹیاوی درد اور بازوؤں اور ٹانگوں کے چھوٹے جوڑوں کا گھٹیاوی درد لاحق ہوتا ہے۔ کلائیوں اور انگلیوں کے جوڑوں کا گھٹیاوی درد ہوتا ہے۔ حیض کے زمانہ میں گھٹیاوی درد میں اترتی ہوتی ہے۔ شکل ہونے والے درد ہوتے ہیں جو ہرچند منٹوں میں جگہ بدل لیتے ہیں۔

پتیرولیم: (Petroleum): ایڑیوں میں ٹانگے لگنے جیسے درد ہوتے ہیں جیسے کہ ان میں پھپھیاں پھست ہوں۔ چلنے سے اترتی ہوتی ہے۔

ارٹیکا یورینس: (Urtica Urens): گاڑھے پیشاب کے ساتھ گھٹیا لاحق ہو۔ مدر ٹھنڈے کے 5 قطروں کی خوراک ہر دو یا تین گھنٹوں کے بعد دیجئے۔ یہ دوا ناصرف درد کو دور کر دے گی بلکہ بہت سی پتھریوں کو بھی پیشاب کے راستے خارج کر دے گی۔

نیٹرم میور: (Natrurn Mur): ایسے مریضوں میں گھٹیاوی درد لاحق ہوتے ہیں۔ جو ہمدردی، ہنگامہ، ٹھنڈ، مرغن غذا اور نمک کو ناپسند کرتے ہیں۔ مریض کے ہونٹ سرد موسم میں پھٹ جاتے ہیں۔ ایسے اشخاص میں گھٹیا لاحق ہو جنہوں نے کونین کی بہت زیادہ مقدار استعمال کی ہو یا جاڑے والے اشخاص میں ساحل سمندر پر اترتی ہوتی ہے۔

گھلیہ ریافاس: (Calcarea Phos): ہڈیوں کی کمزوری اور نرمی لاحق ہو۔ موسم سرما یا ٹھنڈے موسم میں گھٹیا عود کرتا ہے۔ گرم موسم کے لوٹ آنے پر بہتری ہوتی ہے۔

کاربونیم سلف: (Carboneum Sul): مزمن جوڑوں کے درد اور گھٹیا میں یہ دوا مفید ہوتی ہے۔ خصوصاً جوڑوں میں۔

کونیم: (Conium): بازوؤں اور ٹانگوں کو لٹکائے رکھنے سے جب درد میں بہتری ہو۔

اگریکس اییم: (Agaricus M): تریچے درد ہوتے ہیں مثلاً دائیں بازو اور بائیں ٹانگ میں۔

ٹیرنٹولا: (Tarentula): دائیں بازو اور بائیں ٹانگ کا درد۔

لائکوپرسیکم: (Lycopersicum): گھٹیاوی درد ہوتے ہیں جو کہ کمرے سے یا گھر سے باہر

کھلی فضا میں اتر ہو جاتے ہیں۔ دائیں کندھے کے پٹھے میں درد زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔

سلیشیا: (Silicea): دہی کی ہڈی میں درد ہوتا ہے۔ جیسے کہ گاڑی میں لہا سفر کیا ہو۔ دہی کی

ہڈی میں ڈنک لگنے جیسے درد جو دباؤ سے اتر ہوتے ہیں۔ گھٹنے میں درد ہوتا ہے۔ جیسے کہ سختی

سے باندھ دیا گیا ہو۔

سٹیفیسیا سیکریا: (Staphisagria): گھٹیا والا وجع المفاصل، تمام جوڑوں میں سختی اور تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ جوڑوں میں گرہ دار وجع المفاصل۔ معمولی پھوٹے سے ابھری ہوتی ہے۔ یہ اس دوا کی طبی علامت ہے۔

الیومینا سلیکیٹ: (Alumina Silicate): جوڑوں، بازوؤں اور ٹانگوں میں 'کندھوں میں' کمبھی میں 'بازو کے اگلے حصے میں' رانوں میں 'ٹانگوں میں' پاؤں وغیرہ میں درد ہوتا ہے۔ درد نیچے سے اوپر کی طرف سفر کرتا ہے۔

امونیا فاس: (Ammonia Phos): یہ گھٹیا اور جوڑوں کے درد کے لئے بنیادی دوا ہے جبکہ جوڑوں میں گرہیں ہوتی ہیں۔ جوڑوں میں ٹھوس جھٹکا ہوتا ہے اور ہاتھ مز جاتے ہیں اور ان کی ساخت خراب ہو جاتی ہے۔

تھوجا: (Thuja): ریشوں کے گھٹیاوی مرض میں یہ دوا مددگار ہوتی ہے۔ خصوصاً کندھوں کی پچھلی جانب اور کولہوں کے علاقہ میں۔ یہ دوا گھٹنوں کی رطوبت کو بھی رفع کرتی ہے۔ IM طاقت کی خوراک دیجئے۔ جوڑوں کا وجع المفاصل جس کی اصل سوزاک ہوتی ہے۔ یہ دوا جوڑوں کو ڈھیلا کرنے میں حیران کن کام کرتی ہے اور حرکت کرنے کے عمل کو بحال کرتی ہے۔ جبکہ دیگر نشاندہی کی کئی ادویات ناکام ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔

ویلیرینا: (Valeriana): منتحل ہونے والے گھٹیاوی درد اوپر نیچے چلنے سے اور متاثرہ حصوں کو مسئلے سے رفع ہوتے ہیں۔ پیاس اور منگی کے ساتھ اچانک گرمی کی قہقہاہٹ ہوتی ہے۔ آدھی رات سے پہلے بے خوابی ہوتی ہے۔

کلکیریا فلور: (Calcaria Flour): ہڈیوں کی خراب نشوونما کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ ہڈیوں کی سوزش ہوتی ہے اور پھوڑے ہوتے ہیں۔ مریض گرمی سے بہتر ہو جاتا ہے اور شخصہ سے ابھری ہوتی ہے۔

فلورک ایسڈ: (Fluoric Acid): یہ دوا کانٹوں کو نیز ہڈیوں کی دیگر غیر موزوں نشوونما کو نرم کرتی ہے اور جذب کرتی ہے۔ اس میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ متاثرہ حصوں میں کچھ کمزوری اور سرخی ہوتی ہے۔ ناخن تیزی سے نشوونما پاتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں۔

پیکرک ایسڈ: (Picric Acid): ڈاکٹر ایچ۔ بی ہالبرٹ کے تجربات کے مطابق اس دوا نے دوسری کسی بھی دوا کی نسبت بہتر نتائج پیدا کئے ہیں۔

سمفیٹم: (Symphytum): چوٹ کے باعث 'ہڈیوں کے ٹوٹ جانے میں یا دراڑ آ جانے میں یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ ہڈیوں کی دراڑوں کے لئے خواہ وہ سادہ ہوں یا بکثرت ہوں۔ یہ

ایک عمدہ دوا ہے۔ tx یا IM طاقت کی دوا دیتے۔
 روٹا: (Ruta): لمبی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ خواہ چوٹ کے باعث ہو یا گتھیا کے باعث ہو۔ یہ
 دوا چوٹوں میں اور ہڈیوں کی دراڑوں میں بھی استعمال ہوتی ہے۔
 پوفورٹیم: (Euphorbium): ہڈیوں میں جلن دار درد ہوتے ہیں یا سرطان میں جیسے کہ بجلی
 کے جھٹکے لگیں۔ گلے کے غدود میں سوجن ہوتی ہے اور پیپ پڑ جاتی ہے اور ہڈیوں کا گلنا سڑنا
 لاحق ہوتا ہے۔ دہی کی ہڈی میں درد ہوتا ہے۔
 ٹیمس: (Tamus): ہڈیوں کے دردوں میں بیرونی استعمال کے لئے مدد دینے پر استعمال کیجئے۔

رکٹس (ہڈیوں کا نرم پڑ جانا)

Rickets (Softening of Bones)

کلکیریا کارب: (Calcarea Carb): ہڈیوں کا خیدہ ہو جانا خصوصاً ریڑھ کی ہڈی کی خیدگی
 یا لمبی ہڈیوں کا نرم کھانا۔ خنازیری اشخاص میں ہڈیوں کی خراب نشوونما بازو اور ٹانگیں بدو وضع ہو
 جاتے ہیں، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کی نشوونما مکمل ہوتی ہے۔ تالو کی ہڈیاں تاخیر سے ملتی
 ہیں اور دانت بہت دیر سے نکلتے ہیں اور بڑی مشکل سے نکلتے ہیں۔ پھولے ہوئے پیٹ والا
 بچہ۔

کالی کارب: (Kali Carb): ہڈیوں کی کمزوری لاحق ہوتی ہے۔
 کلکیریا فاس: (Calcarea Phos): ہڈیوں کی ناموزوں ساخت جس کے ساتھ وزن کم ہو
 جاتا ہے۔ رکٹس کے لئے یہ بہترین اور مفرد دوا ہے۔ بچہ پتلا ہوتا ہے۔ کمزور ہوتا ہے۔ پیٹ
 اندر کو دھنسا ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہ پیٹ پھولا ہوا ہو سر بڑا ہوتا ہے اور تالو لمبے عرصہ
 تک کھلا رہتا ہے۔ یہ نسبت کلکیریا کارب والے بچے کے جس میں ایسا نہیں ہوتا۔
 ٹیوبرکولینم 200 (Tuberculinum 200): علاج اسی دوا سے شروع کیا جائے اور ہر تین
 مہینے کے بعد اسے دہرایا جائے۔ اس دوا کو دینے سے دو دن پہلے اور دو دن بعد تک کوئی دوسری
 دوا نہ دی جائے۔

فلورک ایسڈ (Fluoric Acid): یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ خصوصاً جب آتھکی اور ریڑھ کی ہڈی
 کی سوزش کا احتیاج پایا جائے۔ جسم کی ساخت کمزور ہوتی ہے اور رنگ زرد ہوتا ہے۔ عضلات
 نرم ہو جاتے ہیں اور پلپے ہو جاتے ہیں نیز پاؤں اور ہاتھ مسلسل پیسے سے بھیگے رہتے ہیں۔
 سیلیشیا (Silicia): تالو کی ہڈی کھلی رہتی ہے۔ پیٹ سوجا ہوتا ہے اور گرم ہوتا ہے۔ جس کے
 ساتھ سر پر کھٹا پیٹ بہتات کے ساتھ آتا ہے اور جسم خشک ہوتا ہے، آبلے ہوتے ہیں۔

پھوڑے ہوتے ہیں۔ جن غدد میں پیپ پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ انہیں بھی اسی دوا سے آرام ملتا ہے۔

ہیرٹا کارب (Baryta Carb): جب ذہنی اور جسمانی ہوتا پن لاحق ہو۔ ٹائلسز اور گردن اور گلے کے عضلات لمبے ہو جاتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں۔

کلکیریا فلور (Calcarea Flour): نوزائیدہ بچوں کی کھوپڑی کی ہڈیاں بڑھ جاتی ہیں اور سوج جاتی ہیں۔ دانتوں پر ٹاکنی انیل ہوتا ہے۔ سرویکل غدد عموماً سخت ہوتے ہیں اور پیپ کے ساتھ ہڈیوں میں گانٹھیں پڑ جاتی ہیں۔

کریوزوٹ (Kreosote): بچوں میں جب دانت بہت جلد تباہ ہوتے نظر آئیں خصوصاً دودھ کے دانت ان دانتوں پر گہرے داغ دکھائی دیتے ہیں اور پھر جیسے ہی یہ ظاہر ہوتے ہیں۔ دانت ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔

ارجنٹم ٹائٹ (Argentum): ذہین اور قبل از وقت دماغی طور پر نشوونما پانے والے بچے پاخانے پکے ہوتے ہیں اور سفید اخراج ہوتا ہے۔ مٹھائیوں کی طلب ہوتی ہے۔

ہیرٹا میور (Baryta Mur): پیلے ست اور سوکھا مسان والے بچے حتیٰ کہ جو بغیر مدد کے کھڑے بھی نہ ہو سکیں۔ ٹائلسز بڑھ جاتے ہیں۔ دل کمزور ہوتا ہے اور سردی سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔

عرق النساء — Sciatica

کولوسنٹھ (Colocynth): حاد عرق النساء کے درد کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ مدہم ٹانگے لگنے جیسے درد کولمے میں ہوتے ہیں۔ جو اچانک ظاہر ہوتے ہیں اور کولی کی سی تیزی کے ساتھ ران کے پچھلے حصہ تک یعنی چوتھ تک چلے جاتے ہیں یا گھٹنوں تک چلے جاتے ہیں یا پاؤں تک چلے جاتے ہیں۔ درد میں گرمی سے بہتری ہوتی ہے اور چھونے سے یا حرکت کرنے سے بہتری ہوتی ہے۔ یہ دوا اونچی طاقت میں دی جاسکتی ہے مثلاً 200 طاقت میں۔ چار سے پانچ گھنٹوں کے وقفہ کے ساتھ تین یا چار خوراکیں دی جاسکتی ہیں۔

رشاکس (Rhus Tox): جب درد ہوا لگنے سے یا عضلاتی تھکن کے باعث لاحق ہو۔ رات کے وقت بستر میں یا جب مریض آرام کرے بہتری ہو جاتی ہے۔ پہلی حرکت شدید قسم کے درد کا باعث بنتی ہے۔ جس میں افادہ تھوڑا سا چلنے کے بعد ہوتا ہے۔

نیفالیم (Gnaphalium): عصب میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ اینڈیشن ہوتی ہے یا اول بدل کر سن ہو جانے کی کیفیت ہوتی ہے۔ لیٹنے سے بہتری ہوتی ہے۔ پھڈی اور پاؤں

میں درد ہوتے ہیں۔

میکروٹائٹم (Macrolinum): کہا جاتا ہے کہ یہ عرق النساء والے درد کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔ اسے 2x ٹرائی ٹوریشن میں دینا چاہئے۔

ڈائیو سکوریا (Dioseorea): ٹانگوں میں پھاڑنے والا درد ہوتا ہے۔ جو حرکت کرنے سے یا بیٹھنے سے محسوس ہوتا ہے۔

مگنیشیا فاس (Magnesia Phos): بجلی چمکنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ جو گرمی سے بہتر ہوتے ہیں۔ دائیں جانب دالی دوا۔

ایسڈ سلف (Acid Phos): اس دوا سے عرق النساء اور کمر درد کے بہت سے کیسوں کا علاج کیا گیا ہے جبکہ اچھی منتخب شدہ ادویات تکام ہو گئی تھیں۔

آرسینیکم البم (Arsenicum Albe): جب مریض کو لمبیرا اور وقفہ دار درد کے بار بار حملے ہو چکے ہوں۔ شدید قسم کا کھینچنے والا 'جلن دار اور پھاڑنے والا درد پائیں کو لمبے میں ہوتا ہے جو پھیل کر چوتھوں تک چلا جاتا ہے۔ گرم چیزیں لگانے سے شدید قسم کی بے چینی کو اتفاق ہوتا ہے۔

روٹا (Ruta): یہ رشائس کے مماش کے ہے۔ اس کی تمام علامات درد کے علاوہ ایک جیسی ہیں۔ روتا میں درد کی لہریں گہری چلی جاتی ہیں اور اعصاب کی شاخوں میں اندر کی جانب گھسکتی ہیں۔ بجائے اس کے کہ باہر کی جانب آئیں۔ ٹھنڈے اور لیٹنے سے بہتری ہوتی ہے۔

کیمومیلا (Chammomilla): عرق النساء کا درد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ یہ ایک دماغی علامت ہوتی ہے۔ "میں درد کی نسبت موت کو ترجیح دوں گا۔"

کلکیس یا کارب (Calcareo): پاؤں ٹھنڈے اور نیچے ہونے کے ساتھ عرق النساء کا درد لاحق ہوتا ہے۔ رشائس کی طرح پلٹے سے اتفاق ہوتا ہے۔

موربیلینم (Morbilinum): اسے عمل انگیز دوا کے طور پر دینا چاہئے جبکہ عرق النساء کا درد کہنا گھانے کے بعد شروع ہو۔ 1000 ڈائی لیوشن کی دوا دیجئے۔

ایسکولس ہپ (Aesculus Hip): درد عرق النساء جس کے ساتھ مدہم درد کمر ہوتا ہے۔ جو چلنے کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ مریض جھکتا ہے اور پھر جھکنے کے بعد اٹھنے سے بہت درد ہوتا ہے۔

گلیسینک (Glinicum): عرق النساء کے لئے یہ مخصوص دوا ہے جبکہ اچھی منتخب شدہ ادویات تکام ہو جائیں۔ تیزابیت ہوتی ہے۔ زبان طبع شدہ ہوتی ہے۔ ذائقہ کندہ ہوتا ہے اور سانس متعفن ہوتا ہے۔ IM طاقت کی دوا دیجئے۔

امونیم میور (Amm Mur): عرق النساء کا درد۔ جیسے کہ بند بہت چھوٹے ہو گئے ہوں۔ بیٹھنے

یا چلنے سے اتری ہوتی ہے۔

میڈورنیم 200 (Medorrhinum 200): جب تمام منتخب شدہ ادویات ناکام ہو چکی ہوں اور مریض بستر پر ناقلیں اوپر اٹھائے لیٹ جائے۔ یہ حالت درد میں اتفاقہ کا باعث ہوتی ہے۔
 کاچیکم (Colchicum): دائیں جانب تیز گولی لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ جو پھیل کر گھٹنے تک چلے جاتے ہیں۔ حرکت سے اتری ہوتی ہے۔ درد اچانک ہوتا ہے۔ مسلسل اور ناقابل برداشت ہوتا ہے۔

برائی اونیا (Bryonia): گھٹیا کی اصل والا عرق النساء۔ حرکت سے اتری ہوتی ہے۔ سخت دہانے سے اتفاقہ ہوتا ہے۔
 پلمبم (Plumbum): عضلات کی کمزوری کے ساتھ عرق النساء لاحق ہو۔ بجلی مگرنے کے سے درد ہوتے ہیں نیز اینٹھن کے دورے ہوتے ہیں۔

حصہ دوم — عضلات

پٹھوں کا ڈھیلا پن (جب پٹھے سکڑنے کے قابل نہ رہیں)

(Amyotonia)

جلسی میم (Gelsemium): عضلات ڈھیلے ہوتے ہیں۔ جلد تھک جاتے ہیں۔ کمزوری اور کپکپاہٹ عضلاتی نظام میں ہوتی ہے۔ عضلاتی ڈھیلا پن ہوتا ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں کی طاقت کھو جاتی ہے۔ گھٹنوں میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہڈیاں اپنی گھج جگہ پر نہ ہوں۔
 کوکولس (Cocculus): جب چکروں کے ساتھ یہ مرض لاحق ہو۔
 کاسٹیکم (Causticum): جب جلسی میم ناکام ہو جائے تو اس دوا کو آزما چاہئے۔ عضلات چھوٹے ہو جاتے ہیں نیز سخت ہو جاتے ہیں جو کہ ہاتھ لگانے سے سخت کمزورے محسوس ہو سکتے ہیں۔ عضلات اور بندھن کھنچ جاتے ہیں۔

اینٹھن — Cramps

(نیز دیکھئے "تکساریوں کی اینٹھن")

بیسنزوئک ایسڈ (Benzoic Acid): حرکت سے جوڑوں میں کڑکڑاہٹ ہوتی ہے۔
 رشاکس (Rhus Tox): اینٹھن کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ آرام کرنے سے اتری ہوتی ہے اور حرکت سے بہتری ہوتی ہے۔ حرکت سے جوڑوں میں کڑکڑاہٹ ہوتی ہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): رات کے وقت بستر میں اینٹھن میں اتری ہوتی ہے اور بستر میں ٹانگیں اکڑاتی ہیں۔

کیوپرم میٹ (Cuprum Met): شدید قسم کی اینٹھن ہوتی ہے خصوصاً پنڈلیوں میں۔

سیکیل کار (Secale Cor): پنڈلیوں میں اینٹھن ہوتی ہے۔ 200 طاقت کی دوا دیجئے۔

پتھرولیم (Petroleum): پٹھوں کی اکڑن (کڑل) ڈنک لگتے ہیں اور انگوٹھوں میں گولیاں لگتی ہیں۔

مگنیشیا فاس (Magnesia Phos): اینٹھن ہوتی ہے، اکڑن ہوتی ہے۔ سن ہو جانا لاحق ہوتا ہے۔ بودا پن ہوتا ہے۔ اعصاب کی مرگی ہوتی ہے۔ ان سب علامات کا باعث تھکاوٹ ہوتی ہے۔ ہاتھوں اور انگلیوں کے طویل استعمال کے باعث مصنفین کی اینٹھن۔

نیشرم فاس (Natum Phos): پنڈلیوں میں اور پاؤں میں اینٹھن ہوتی ہے۔ لکھتے وقت ہاتھوں میں اینٹھن ہوتی ہے۔ جوڑوں میں کڑکڑاہٹ ہوتی ہے۔

کیمفر (Camphor): بازوؤں اور ٹانگوں کی برقی ٹھنڈک کے ساتھ اینٹھن لاحق ہو۔

عضلات کی کمزوری Myasthenia

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): جب کمر کے لمبے عضلات بری طرح سے پھٹ چکے ہوں اور وہاں ریشہ دار نسج (ظیفے) بننے کا ثبوت موجود ہو۔ نتیجتاً کمر درد لاحق ہوتا ہے۔

کاسٹیکم (Causticum): علاج اسی دوا سے شروع کیا جاسکتا ہے۔ IM طاقت کی ایک خوراک دیجئے۔ یہ دوا اس مرض میں بھی دی جاتی ہے۔ جس میں طبی طور پر رضاکار عضلات میں غیر معمولی تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کے باعث ان کا قابو مکمل طور پر جاتا رہتا ہے۔

فیرم میٹ (Ferrum Met): پٹھوں کی تھابت کے لئے عمدہ دوا ہے۔ خون کی کمی وغیرہ کے ساتھ عضلات کی کمزوری لاحق ہوتی ہے۔

پلمبم (Plumbum): عضلات کے قلع اور قبض کے ساتھ عضلات کی کمزوری لاحق ہو۔ یہ دوا ٹانگوں کے ساتھ خصوصی لگاؤ رکھتی ہے۔

سٹرامونیم (Stramonium): آسانی کے ساتھ نقل و حرکت ہونے کے ساتھ پٹھوں کی کمزوری لاحق ہو۔ رضاکار عضلات مریض کی خواہش کے مطابق عمل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔

ایکاردیم (Aacardium): رضاکار عضلات پر قابو نہیں رہ سکتا۔ فاطر العقل کے ساتھ عضلات کا قلع۔

عضلات کی سوزش — Myositis

برائی اونیا (Bryonia): یہ دوا سوزش کی نشاندہی کرتی ہے۔ عضلات میں فعلی اور ساختی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں خصوصاً بازوؤں اور ٹانگوں میں۔ اول علامات یہ ہوتی ہیں کہ ہلکے لگتے ہیں۔ ٹانگے لگتے جیسے، پھاڑنے جیسے اور چبھنے والے درد ہوتے ہیں۔ دوئم سوجن ہوتی ہے۔ حرارت اور سرخی ہوتی ہے۔ سوئم سختی ہوتی ہے اور حرکت میں نمایاں دقت ہوتی ہے۔ یہ علامات عضلات کی جراثیمی سوزش میں پائی جائیں گی۔

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): جب عضلات کی سوزش کی وجہ زخم جراحت ہو یا کندہ اوزار سے لگنے والا زخم ہو۔

رشاکس (Rhus Tox): جب مندرجہ ذیل حالت مہشیادی پیچیدگیوں کے ساتھ لاحق ہو تو اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

تھو جا (Thuja): عضلاتی سوزش میں ہڈی بننا شروع ہو جائے۔ یہ دوا اس طرح سے ہڈی بننے کے عمل کو روک دے گی۔

ماسیو ٹونیا (Myotonia)

(حرکت کرنے پر عضلات کی بڑھی ہوئی کچھن)

رشاکس (Rhus Tox): یہ واحد دوا ہے جو حرکت کرنے پر عضلات کی بہت زیادہ کچھن کے لئے آزمائی جاسکتی ہے۔

عضلات کی لاغری (بڑھی ہوئی) Muscular Atrophy

پلمبم (Plumbum): یہ چونٹی کی دوا ہے اور عضلات کی مکمل جالی والے سلہ پیمانی کی علامات کو شفا دیتی ہے۔ یہ نہ صرف دماغی عضلات کا احاطہ کرتی ہے بلکہ دھڑ، بازو، ٹانگیں اور دیگر اعضاء کے عضلات کو بھی شفا دیتی ہے۔ حساسیت مکمل طور پر جاتی رہتی ہے۔ کمزوری ہو جاتی ہے۔ گردن میں کٹن، بکڑن، کپکپاہٹ، مروڑ اور گولی لگنے کا احساس ہوتا ہے۔ کندھوں کے عضلات کا کھنچاؤ اور ناطاقتی ہوتی ہے۔ استقامتی سوجن ہوتی ہے۔ حال میں ٹوکڑا ہٹ ہوتی ہے۔ عضلات کا اختصار لاحق ہو جاتا ہے۔ (یعنی عضلات چھوٹے ہو جاتے ہیں) رات کے وقت اور حرکت سے اتری ہوتی ہے۔ 200 یا 1000 ڈائی لیوشن میں دیجئے۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): ریڑھ کی حساسیت، ریڑھ کی ہڈی میں بہت شدید درد ہوتا

ہے جس میں رات کے وقت اتھری ہوتی ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں کمزوری اور عمومی کپکپاہٹ ہوتی ہے۔ آنکھیں بند کر کے نہیں چلا جاسکتا۔ پنڈلیوں میں سختی نیز لاغری ہوتی ہے۔ مریض چلنے میں اور کھڑے ہونے میں غیر متوازن ہوتا ہے۔ رات کے وقت اور سردی سے اتھری ہوتی ہے۔ تازہ ہوا سے بہتری ہوتی ہے۔

ہیرٹا کارب (Baryta Carb): سن بلوغ کو پہنچ کر عضلات میں نطاقتی پیدا ہو جائے۔ فاسفورس (Phosphorus): بعض حصوں کا بڑھ جانا لاحق ہوتا ہے اور دیگر میں نطاقتی پیدا ہو جاتی ہے۔ مریض کی ساخت سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسے لمبا ہونا چاہئے۔ کھوکھلی منفرد چھاتی ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ تپ دق والا یا آتشک والا مزاج ہوتا ہے۔ کپکپاہٹ کے ساتھ جلن ہوتی ہے۔ سن ہو جانا اور کمزوری نمایاں علامات ہیں۔

سیورٹک ایسڈ (Mur Acid): یہ دوا فیون کے زیادہ استعمال کے بعد لاحق ہونے والی عضلاتی کمزوری کا علاج کرتی ہے۔

تھلیئم (Thallium): عضلاتی نطاقتی لاحق ہو۔ چلنے میں درد ہوتا ہے۔ لرزہ ہوتا ہے۔ سحرے میں درد ہوتا ہے اور آنکھوں میں بجلی کے جھٹکے لگنے جیسی کیفیت ہوتی ہے۔

کلی فاس (Kali Phos): عضلاتی نطاقتی کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ اس حالت کے ساتھ تعلق رکھنے والے وائرس کو یہ دوا جاہ کر دیتی ہے۔ یہ ایک طبی دوا ہے جسے دیگر ادویات کے ساتھ استعمال کرنا چاہئے۔

آرنیکا ایم، کیورم میٹ، ہیررا آیوڈ (Baryta lod, Cuprum Met, Arnica M): ہرگز کہ بلا مرض کے لئے یہ دوا میں بھی مفید ہوتی ہیں۔ یہ دوا میں دی گئی ترتیب کے مطابق مندرجہ بالا ادویات کے ناکام ہو جانے پر آزمائی جاسکتی ہیں۔

پیشوں کی سوزش ہڈی کے بننے کے عمل کے ساتھ

Progressive (Ossifying Myositis)

کلکیریا فلور (Calcarea): یہ ایک عمدہ دوا ہے اور اسے طویل عرصہ کے لئے آزمانا چاہئے۔ یہ دوا مرض میں بہتری پیدا کرنے میں ناکام ہو جائے تو نیچے دی گئی ترتیب کے مطابق درج ذیل ادویات استعمال کی جاسکتی ہیں: کلکیریا فاس، ایسڈ فلور، ہمنی ٹم۔



جلد، بالوں اور ناخنوں کے امراض

(Diseases of Skin, Hair and Nails)

1- جلدی امراض ایک علاج کے لئے بہت اہم ہوتے ہیں چنانچہ یہاں ان امراض کے متعلق اہم امور کا خصوصی تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سوائے چند امراض کے تمام جلدی امراض اندر سے پیدا ہوتے ہیں چنانچہ اسی لئے ان کا علاج بھی اندرونی طور پر استعمال ہونے والی ادویات کے ذریعے کرنا چاہئے۔ جلد کی کوئی اپنی خود مختصر زندگی نہیں ہوتی۔ پھوڑے پھنسیاں محض اندرونی اجڑی کے باعث ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک مکمل صحت مند جسم کی جلد یقیناً مکمل طور پر صحت مند ہوتی ہے۔ نیز ایک بیمار جلد کسی مکمل صحت مند جسم کے اوپر نہیں ہو سکتی چنانچہ جلدی امراض کا علاج بیرونی استعمال کے ذریعے کرنا ایک سنجیدہ اور خطرناک پیشہ دراندہ لفظی ہے۔ بیرونی استعمال کے ذریعے مرض کو غائب کر دینا درحقیقت اس مرض کو دبا دینا ہے جو کہ جسم کے کسی دوسرے حصہ پر اندرونی طور پر حملہ کر سکتا ہے اور احتمالی برے نتائج ظاہر ہو سکتے ہیں۔ جلدی امراض کا علاج بیرونی طور پر چیزیں استعمال کرنے کے ذریعے یا لوشنوں کے ذریعے غلط اور خطرناک طریقہ کار ہے۔

2- جلد کو ایک اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ مادوں کو خارج کرنے والا ایک عضو ہے اور سارے جسم پر پھیلا ہوا ہے۔ جس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لگا رکھا ہے کہ وہ جسم کے اندرونی اعضاء کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ جلد کا ہر حصہ کسی نہ کسی اندرونی عضو یا حصے کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے چنانچہ جلدی امراض اکثر و بیشتر اندرونی امراض کا بیرونی تاثر ہوتے ہیں (یعنی اندرونی امراض اپنا انعکاس بیرونی طور پر جلدی امراض کے ذریعے کرتے ہیں۔ مترجم)

3- جلدی امراض میں جٹا ہونے والے اشخاص کے لئے دودھ اور سبزیاں پر میزبانی غذا ہیں۔ گوشت یا انڈوں سے پرہیز کرنا چاہئے۔ نظام انہضام کو درست رکھنے کے لئے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

4- متاثرہ حصوں کو صابن کے ساتھ دھونے سے پرہیز کرنا چاہئے۔ متاثرہ حصوں کو چو کر کے پانی کے ساتھ صاف کرنا چاہئے۔

حصہ اول --- جلد

دنبیل --- Abscess

(دیکھئے ”پھوڑے“)

مہاسے (چرے پرکیل مہاسے) (Acne)

(Pimple on the Face)

ایسٹریازرب (Asterias Rub): سن بلوغ کو پہنچنے پر چرے پر ٹپکنے والے کیل مہاسوں کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔

کالی بروم (Kali Brom): اگر ایسٹریازرب ناکام ہو جائے تو اس دوا کو آزمایا جاسکتا ہے۔
تھوجا (Thuja): چرے اور ناک کے مہاسوں کے لئے نیز ناک کی جلدی سوزش کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔

آر سینک آئیوڈ، سلفر آئیوڈ (Sulphur iod, Ars iod): راسخ قسم کے کیسوں میں ان دواؤں کو آزمایا جاسکتا ہے۔ ایسے کیسوں میں جو شدید قسم کے ہوتے ہیں۔

ہائیڈرو کوٹائل (Hydrocotyle): رحم کی خرابیوں کے ساتھ جب چرے پر مہاسے ہوں۔
اگیریکس (Agaricus): جب کیل مہاسوں کے ساتھ ہاتھ پاؤں پھٹنے کا (بوائیوں کا) رجحان بھی ہو۔

بربرس (Berberis Aquitolium): لڑکیوں کے چروں پر مہاسے، بد رنگ دھبے اور کیل ہوتے ہیں۔ یہ دوا جلد کو صاف بھی کرتی ہے۔

ڈلکامارا (Dulcamara): حیض سے پہلے چرے پر سرخ باد ہوتا ہے۔ مرطوب پھوڑے پھنسیاں اور بد رنگ دھبے ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے اور مرطوب موسم میں اتھری ہوتی ہے۔

سٹرپٹوکوکین (Streptococcin): مہاسوں کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ جن میں زیادتی انڈے کھانے سے اور موسم سرما کے دوران ہوتی ہے۔ پیشانی کا درد ٹھنڈی ہوا سے بہتر ہوتا ہے۔

اکونائٹ لائیگو ٹونم (Aconite Lycotonum): شدید تپ دق والے کیل مہاسے چرے پر ہوتے ہیں۔ ہونٹوں پر کیل ہوتے ہیں۔

سورینم (Psorinum): مہاسے جن میں اتھری دوران حیض، پکلتائی سے، شکر، کالی اور گوشت

سے ہوتی ہے۔

کلکیر یا فاس (Calcarea Phos): سن بلوغ کو پہنچنے پر خون کی کمی والی لڑکیوں میں کیل مسائے ظاہر ہوتے ہیں۔ کھوپڑی کا درد سر ہوتا ہے اور اچھارے والی بد ہضمی ہوتی ہے۔ جس میں افقہ کھانے سے ہوتا ہے۔

تھوجا (Thuja): مسائے یا کیل چرے پر ہوتے ہیں جبکہ مریض کی ہسٹری میں حفاظتی ٹیکوں کا نہ لگایا جاتا ہوتا ہے۔

بووشتا (Bovista): کاسینکس (سرخی پاؤڈر وغیرہ) کے استعمال کے باعث چرے پر کیل مسائے ہو جاتے ہیں خصوصاً موسم گرما کے دوران۔

اورم آرسینک (Aurum Ars): مسائے کیل چرے پر اور ماتھے پر ہوتے ہیں نیز پھوڑے ہوتے ہیں، جلد کی دق لاحق ہوتی ہے۔

سینگوئی نیریا سی (Sanguinaria C): چرے پر مسائے ہوتے ہیں جو حیض کے زمانہ میں ابتر ہو جاتے ہیں جبکہ حیض کم مقدار میں ہوتا ہے۔

سلفر (Sulphur): جب اچھی منتخب شدہ ادویات افقہ دینے میں ناکام ہو جائیں یا جب ان کی افادت رک جائے تو اس دوا کو عمل انگیز کے طور پر دینا چاہئے۔ 200 طاقت کی دوا دیجئے۔

ہیمپیر سلف (Hepar Sulph): ایسے کیل مسائوں کی نشاندہی اس دوا سے ہوتی ہے جن میں سفید رنگ کی پیپ پڑی ہوتی ہے۔

آرسینک سلف ربرم (Ars Sul Rubrum): یہ دوا مسائوں کی نشاندہی کرتی ہے جب کہ ان کے ساتھ انگیز نما اور جلدی خارش بھی ہوتی ہے۔

حجام کی خارش

(Barber's Itch)

(تیز دیکھئے دوا)

لیتھیم کارب (Lithium): رخساروں پر کھربڑ والے پھوڑے پھنسیاں ہوتے ہیں جن سے پہلے جلد سرخ ہوتی ہے اور اس میں دھکن ہوتی ہے۔ 200 ڈائی لیوشن کی صورت میں دیجئے بشرطیکہ 30 ڈائی لیوشن ناکام ہو جائے۔

پٹرولیم (Petroleum): جلد خشک، حساس، کھردری اور شکاف دار ہوتی ہے۔ شکافوں سے آسانی کے ساتھ خون بہتا ہے۔

سلفر آیوڈ (Sulphur Iod): چرے کے مشہور پھوڑے، پھنسیاں، بال اکڑے ہوئے محسوس

ہوتے ہیں۔

رشاکس (Rhus Tox): یہ دوا حجام کی خارش کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔ کسی دوسری دوا کے انتخاب سے پہلے اسی دوا کو آزمانا چاہئے۔

لیکیسیس (Lachesis): جب جلد پر شکاف ہوں جن سے مواد رستا ہو۔ یہ دب جانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): چمکوں والے پھوڑے پھنسیاں جو نیچے سے پہلے ہوتے ہیں اور ان کے منہ کے کناروں سے خون بہتا ہے۔

سلفر (Sulphur): خشک خارش ہوتی ہے جو ناک پر اور آنکھوں کے گرد ابتر ہوتی ہے۔
کریفائٹس (Graphites): انگیزیم کی قسم کی خارش ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ خچچیاہٹ والا مادہ خارج ہوتا ہے۔

سکیوٹا وائروسا (Cicuta Vir): شیو کرنے کے باعث حجام کی خارش لاحق ہو۔

پھوڑے — (Boils)

بیلادونا (Belladonna): سوزش کے مرحلہ میں جب پھوڑے سرخ ہوتے ہیں۔ چپ بننے کے عمل کے بغیر ٹپکن والا درد ہوتا ہے 'خون والے پھوڑے ہوتے ہیں۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): جب پھوڑے سرخ نہ ہوں بلکہ پیلے ہوں اور نر درد ہوں 'ہر چار گھنٹے بعد 200 طاقت کی دوا دیجئے 'تین یا چار خوراکیں کافی ہو سکتی ہیں۔

آرسینک البم (Ars Alb): گوشت خود پھوڑے کے لئے بہترین دوا ہے۔ ساتھ میں جلن ہوتی ہے۔ جیسی کہ متاثرہ حصے پر آگ کا انکارہ رکھا ہوا ہو۔ کاٹنے والے اور جلن دار درد آدمی رات کے وقت ابتر ہو جاتے ہیں۔ چپ انٹھریکس نامی دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

ہیپیر سلفر (Hepar Sulphur): چپ بننے کے عمل کے ابتدائی مرحلہ میں متاثرہ حصوں کی حساسیت اعتدال سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ جس کے ساتھ چھڑی نکتے جیسے تیز درد ہوتے ہیں۔ پھٹی ذاتی لیوشن کی صورت میں یہ دوا ہر آدمی گھنٹے کے بعد دیجئے۔ یہ چپ بننے کے عمل کو روک دے گی یا چند گھنٹوں میں پپ کو ساقت کر دے گی۔ چپ اگلنا شروع ہونے کے بعد اس کی نشاندہی کی جائے گی جب کہ پپ گاڑھی زرد ہوتی ہے اور مریض چھوٹے سے حساس ہوتے ہے 'مریض جاڑا محسوس کرتا ہے 'لیکن سلیشا کے برعکس مرطوب موسم میں بہتری محسوس کرتا ہے۔ یہ دوا پھوڑوں میں درد دور کرنے کی بہت بڑی دوا ہے۔ ناختوں کی جڑ کے گرد اور انگلیوں

کے سروں میں پیپ پڑ جاتی ہے۔

سلیشیا (Silicea): جب شفا یاب ہونے کی قوت بہت کم ہو، پیپ پٹلی اور پانی والی ہوتی ہے، بغیر درد کے ناسور ہوتے ہیں جو تندرست ہونے سے انکار کر دیتے ہیں، اونچی طاقت کی خوراک دینے (مثلاً 200 یا 1000) ہر ہفتے یا مہینے کے بعد دوہرائی جائے۔ مریض جاڑا محسوس کرتا ہے۔ خشک اور گرم موسم میں بہتری ہوتی ہے اور مرطوب و سرد موسم میں بہتری ہوتی ہے۔

مرک آئیوڈ (Mercuriod): پھوڑوں کے سوزش والے مرحلہ میں یہ ایک اچھی دوا ہے۔ جب پیپ بننے کا عمل نہیں ہوتا، غدودی پھوڑوں میں یہ دوا دی جاتی ہے، جب پیپ بن چکی ہو تو یہ سبز پٹلی اور پانی والی ہوتی ہے، شدید قسم کی چھکدار سرفی ہوتی ہے جس کے ساتھ ٹپکن والا اور ڈنک لگنے جیسا درد ہوتا ہے۔

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): چھوٹے پر درد پھوڑوں کا رجحان ہوتا ہے جو ایک کے بعد ایک بننے چلے جاتے ہیں اور جن میں اتحاد سب سے کی دھکن ہوتی ہے، بے شمار تعداد میں چھوٹے پھوڑے ہوتے ہیں۔

سلفر (Sulphur): لاتعداد چھوٹے پھوڑے ہوتے ہیں، اگر آرنیکا مونٹ ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جاتی ہے۔

انتھراکسین (Anthraxinum): گوشت خود پھوڑوں میں یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ اس میں جلن ہوتی ہے اور اونچے درجے کا بخار ہوتا ہے۔ ہر چند روز کے بعد 1000 طاقت کی دوا دینے، ایک ہی خوراک سے شفا ہو جائے گی یا بہت زیادہ بہتری ہو جائے گی۔

کالکیریا سلف (Calcarea Sulph): ایسے پھوڑے جو آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے ہیں، ان سے مسلسل پیلے رنگ کی پیپ خارج ہوتی ہے، مریض کھلی ہوا کی خواہش کرتا ہے لیکن ہوا کے جھونکوں سے حساسیت ہوتی ہے۔ پھوڑوں کے بننے کا رجحان۔

لیکسیس (Lachesis): ٹیلاہٹ مائل رنگ والے پھوڑے ہوتے ہیں جن سے خراش دار پیپ خارج ہوتی ہے جو کہ بدبودار ہوتی ہے۔ جلن دار درد ہوتے ہیں۔ چھوٹے سے حساسیت ہوتی ہے۔

تیرنٹولا سی (Tarentula C): دہل، پھوڑے، گوشت خور پھوڑے، فیلن (تھکین پھوڑے) جان لیوا ناسور اور فساد نیچا لاحق ہوتا ہے۔ سخت، نرم، سوزشی، بال توڑ لاحق ہو، یہ دوا خصوصاً پھوڑوں کے ہر مرحلہ کے لئے استعمال ہوتی ہے، بغل کے نیچے دہلوں کے لئے خصوصی دوا ہے۔

گن پائوڈر (Gunpowder): پھوڑے، داغ، کرموں کا جلد میں داخل ہونا اور خون میں زہر

پیدا ہو جانے کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔

مائرس ٹیکا ایس (Myristica S): جوڑوں میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ یہ پیپ پڑنے کے عمل کو تیز کر دیتی ہے اور اس کے دورانیے کو کم کر دیتی ہے۔ انگلیوں کے سروں پر دہل ہوتے ہیں نیز پوروں پر پھوڑے ہوتے ہیں '3x' ڈائی لیوشن دیجئے۔

کاربولک ایسڈ (Carbolic Acid): کمر کے علاقہ میں زیاہٹس کے ساتھ گوشت خور پھوڑے ہوتے ہیں 'ہست گندی بو کے ساتھ کئی جگہوں سے پیپ خارج ہوتی ہے' مریض مکی اور بدبودار تے میں جٹا ہوتا ہے۔ 200 ڈائی لیوشن کی دوا دیجئے۔

سٹرامونیم (Stramonium): شدید دردوں کے ساتھ دہل یا پھوڑے ہوتے ہیں۔ سوزش ہوتی ہے 'مزمین گوشت خور پھوڑے ہوتے ہیں' عام پھوڑے ہوتے ہیں 'جوڑوں میں دہل ہوتے ہیں خصوصاً پائیں کو لمبے کے جوڑ میں بدترین قسم کی زہریلی کیفیت ہوتی ہے اور پیپ بننے کا عمل ہوتا ہے۔

لیڈم پال (Ledum Pal): سولی چھ جانے کے باعث پھوڑے یا بسریاں ہو جاتی ہیں۔

پیکرک ایسڈ (Picric Acid): اندرونی کان میں پھوڑے ہوتے ہیں۔

موربیلینم (Morbillinum): کان کے بیرونی سوراخ میں بار بار پھوڑے نکلتے ہیں۔ شدید قسم کا درد ہوتا ہے 'مریض کی ہسٹری میں قدیم جھپک پائی جاتی ہے۔

سیکیل کار (Secale Cor): سبز مواد کے ساتھ چھوٹے اور درد کرنے والے پھوڑے نکلتے ہیں 'آہستہ آہستہ کہتے ہیں۔

گوشت خور پھوڑے (دنبیل)

(Carbuncles)

(دیکھئے "پھوڑے")

کٹے پھٹے ہاتھ اور انگلیوں کے پوروں میں شکاف

(Chapped Hands & Cracks in Finger Tips)

پٹرولیم (Petroleum): انگلیوں کے سروں پر اور ہاتھ کی پشت پر شکاف ہوتے ہیں 'جلد کھردری یا کٹی ہوئی ہوتی ہے 'خون بہتا ہے' نیس سخت ہو جاتی ہیں 'اکثر بہت زیادہ خارش ہوتی ہے۔ مختصر حصوں میں ٹھنک ہوتی ہے 'معدہ میں 'کمر میں پیپ وغیرہ میں۔

رشاکس (Rhus Tox): جھنجھناہٹ اور جلن کے ساتھ جلد میں پھجان ہوتا ہے۔ انگلیوں کے پوروں میں رنگین کا احساس ہوتا ہے۔ جلد سرخ اور سوجنی ہوئی ہوتی ہے۔ ٹھنڈے مرطوب اور برسات کے موسم میں ابتری ہوتی ہے۔

سلیشیا (Silicea): نازک، پھلی اور موی جلد، انگلیوں کے سروں پر شکاف ہوتے ہیں، بدبودار پیپ ہوتی ہے، انگلیاں خشک محسوس ہوتی ہیں، خارش صرف دن کے وقت اور شام کو ہوتی ہے۔ مریض ٹھنڈا ہوتا ہے، اسے جاڑا لگتا ہے، آگ تپتا ہے، ہوا کے جھونکوں سے نفرت کرتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔

سلفر (Sulphur): بیرونی ادویات کے استعمال کے بعد جلدی تکلیفات لاحق ہوتی ہیں۔ کھانے سے اور دھونے سے ابتری ہوتی ہے۔ جلد خشک ہوتی ہے، اس پر کھرچڑھتے ہیں اور غیر صحت مند ہوتی ہے۔ خارش اور جلن ہوتی ہے، ہاتھوں پر گرم لہینہ آتا ہے، نیند کم ہو جاتی ہے، جلد جاگ جاتا ہے۔

نیٹرم میور (Natrium Mur): انگلیوں کے ناخنوں کے قریب خشکی ہوتی ہے اور شکاف پڑتے ہیں۔ ہتھیلیاں گرم ہوتی ہیں اور ان میں لہینہ آتا ہے۔ ٹھنڈ لگتی ہے، بہت زیادہ کمزوری اور تھکاوٹ ہوتی ہے، معمولی باتوں پر مریض کو چڑچاہٹ ہوتی ہے، ہمدردی سے علامات میں اضافہ ہوتا ہے، جلد پکنی ہوتی ہے۔

الومینا سلیکیٹ (Alumina Silicate): ہاتھ مسلسل پھٹے رہتے ہیں، ہاتھوں میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ ناکھیں اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہوتے ہیں اور انگلیاں نیلی ہوتی ہیں، ناخن بھر بھرے ہوتے ہیں۔

چیلوئیڈ (زخم کے نشان پر دانے دار ابھار)

(Cheloid)

(دیکھئے "کیلویڈ")

بوائیاں — (Chilblains)

اگیریکس مس (Agaricus Mus): چوٹی کی دوا ہے۔ ٹھنڈے موسم کے دوران زیادہ درد والی بوائیاں ہوتی ہیں یعنی ہاتھ پاؤں پھٹ جاتے ہیں۔ خارش ہوتی ہے، ٹھنڈ کے کانٹے کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔

سورینم (Psorinum): جلد کمزوری ہوتی ہے۔ آسانی کے ساتھ پھٹ جاتی ہے۔ مونی ہو جاتی

ہے اور چٹکے جم جاتے ہیں 'شکاف پھٹ کر چھوٹی' بھوسی دار یا پرت دار پھوڑے پھنیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بدو ضع 'گندے اور غلیظ' قسم کے دکھائی دیتے ہیں 'جیسے کہ پھوڑے گندے سے اُحانے گئے ہوں۔

پیترو لیم (Petroleum): جلد پر شکاف ہوتے ہیں 'انگلیوں کے سروں اور ہاتھوں کی پشت پر جلد کھردری کئی پھنی ہوتی ہے اور خون بہتا ہے' تسلیں سخت ہو جاتی ہیں 'بوائیاں ٹوٹ جاتی ہیں' مریض چڑچڑا ہوتا ہے اور جلد ہی ناراض ہو جاتا ہے۔ بوائیوں میں خارش ہوتی ہے۔

رہس وین (Rhus Ven): خارش زدہ 'جلن دار' بوائیوں کے لئے یہ ایک دوا ہے 'فوری آرام اور شفا کے لئے مدد گچر بیرونی طور پر لگایا جائے۔

رشاکس (Rhus Tox): سوزشی بوائیوں میں یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔

ہیپیر سلف (Hepar Sulph): جب بوائیوں میں پیپ پڑنے کا خدشہ ہو تو یہ دوا دی جاتی ہے۔

سکس ٹس کین (Cista Can): سخت سطح پر شکاف ہوتے ہیں خصوصاً مزدوروں میں 'سخت مزدوری کرنے کے باعث۔

سلفر (Sulphur): بچائی جلد والے مریضوں میں یہ ایک مفید دوا ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): لڑکیوں میں مؤخر اور کم مقدار والے حیضوں کے ساتھ کھلی ہوا میں بہتری ہوتی ہے۔ گرمی میں بہتری ہوتی ہے 'پلاس نہیں رہتی' روغنیات سے نفرت ہوتی ہے 'بوائیاں جو کہ نیلی یا نیلاہٹ مائل سرخ ہو جاتی ہیں۔

گروتالیس (Grotalus): نساہت کا خدشہ ہوتا ہے 'مزمن نساہت یا جسم کا گلنا سڑنا لاحق ہوتا ہے لیکن یہ مرض کم طاقتی کے باعث بہت گرم موسم میں لاحق نہیں ہوتا۔

ٹامس (Tamus): بوائیاں ہوتی ہیں اور ہاتھ کٹے پھٹے ہوتے ہیں۔

ایسڈ نائٹرک (Acid Nit): انگوٹھوں میں بوائیاں ہوتی ہیں 'انگوٹھوں میں دھن کے باعث بیروں میں پسینہ ہوتا ہے۔ مریض چربی اور ٹھیکین اشیاء پسند کرتا ہے۔

اندمال زخم کے بعد کا نشان — (Cicatrix)

(دیکھئے "زخموں کے نشان")

مکڑی کا جالا — (Cobweb)

گرافٹس (Graphites): جلد پر مکڑی کے جالے کی موجودگی کا مسلسل احساس رہتا ہے۔

رینن کولس ایس (Ranunculus S): یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سارا چہرہ کھڑی کے چالے سے ڈھکا ہوا ہے۔

جلد کا رنگ — (Complexion)

آئیوڈیم (Iodium): جلد کے رنگ کو عمدہ رنگ کے ساتھ بدلنے کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ ہر چند روز کے بعد چھ ماہ تک 1000 طاقت کی دوا استعمال کرنی چاہئے۔
کاسٹیکم لائیگوپوڈیم (Causticum, Lycopodium): جب آئیوڈیم تکام ہو جائے تو دی گئی ترتیب کے مطابق ان دواؤں کو آزما چاہئے۔ 200 طاقت کی دوا ہر ہفتے استعمال کیجئے۔
سرساپارٹا (Sarsaparilla): جلد کا رنگ صاف کرنے کے لئے۔

چنٹریاں — (Corns)

فیرم پکریٹ (Ferrum Picrate): زردی مائل بھورے رنگ کی چنٹریاں ہوتی ہیں۔
تھوجا (Thuja): یہ چنٹیوں کے لئے چوٹی کی دوا ہے، مگر کچھ بیرونی طور پر چنٹیوں پر لگایا جا سکتا ہے۔
سلفر (Sulphur): دباؤ کے باعث چنٹریاں اور گھٹے پڑ جاتے ہیں۔ اگر جو تا کسی جگہ جلد کو دبا رہے اور اس کے نتیجے میں چنٹریاں یا گھٹے پڑ جائیں تو یہ دوا دی جاتی ہے۔
رینن کولس بی (Ranunculus B): جب چنٹریاں چھوٹنے سے حساس ہوں۔
اگنیٹا (Ignatia): چنٹیوں میں سوزشی دھن کی طرح کا درد ہوتا ہے۔
انٹیم کروڈ (Antim Crud): چنٹیوں میں سوزش ہوتی ہے، پاؤں کے ٹکڑوں کی جلد پر سینک دار جگہیں موجود ہوتی ہیں، پیروں کے ٹکڑے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، سارے جسم پر استسقاءئی سوجن ہوتی ہے، پاؤں کے ٹکڑوں اور پاؤں کی جلد موٹی ہو جاتی ہے۔
نیٹرم میور (Natrium Mur): چنٹریاں ہوتی ہیں۔ پُر درد نشانات ہوتے ہیں۔

حاد سوزش — (Dermatitis)

(بیرونی بیجان کے باعث جلد کی حاد سوزش)

کیلنڈولا (Calendula): سوزشی طبیعت والے بیرونی زخموں کے باعث یہ مرض ہوتا ہے۔
30 ڈائی لیوشن کی دوا دیجئے۔ نیز مگر کچھ کو آنھ گنا پانی میں ملا کر متاثرہ جگہ پر بھی لگانا چاہئے۔
ناسوروں کے لاحق ہونے کے نتیجے میں جلد کی اتھری لاحق ہو۔

آرنیکا ایم (Arnica M): لاشمی کے زخموں کے باعث جلد کی سوزش لاحق ہوتی ہے۔ ہر ٹکچر بیرونی طور پر لگائیے اور 1000 طاقت کی خوراک ہر آٹھ گھنٹے کے بعد دیجئے۔ یہاں تک کہ افادہ شروع ہو جائے تب دوا ہر چند روز کے بعد دوہرائی جائے۔

ایپس ایم (Apis M): زہر کی حراروں والی خارش جو کہ ٹھنڈ یا گرمی کے باعث لاحق ہوتی ہے۔ جلد سرخ ہوتی ہے اور سوجن ہوتی ہے۔ پارے یا کاربولک ایسڈ کو پکڑنے کے باعث بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔

کینتھرس (Cantharis): پیشاب کی تکلیفات کے ساتھ جلن ہوتی ہے، پیشاب جلتا ہے اور گرم ہوتا ہے گرمی کی خارش ہوتی ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): پیشہ ورانہ طور پر پارے یا کاربولک ایسڈ کے پکڑنے کے باعث زہریلی خارش یا سوزش ہوتی ہے جس کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ دھوبی، رنگریز یا کان کن حضرات اس قسم کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔

کھال کا اترنا — (Desquamation)

(دیکھئے پھلنا)

بد رنگ ہونا (جلد کا)

(Discolouration)

آرسینک ایلم (Ars Alb): جلد سیاہی مائل یا نیلا ہٹ مائل دھبوں سے پر ہوتی ہے۔

سلفیورک ایسڈ (Sulphuric Acid): جلد پر کالے یا نیلے دھبے ہوتے ہیں۔

فاسفورس (Phosphorus): پیٹ پر چلی یا بھوری دھبیاں ہوتی ہیں۔

آئیوڈیم (Iodium): جب زرد رنگ کی جلد بھورے رنگ میں تبدیل ہوتی ہو۔

لیکسیس (Lachesis): مار کھانے کے بعد یا بخار کے بعد جلد کا رنگ نیلا پڑ جاتا ہے، جلد جانی ہو جاتی ہے۔

ایتھوزا (Aethusa): سارے جسم پر کالے اور نیلے دھبے ہوتے ہیں یا پورا جسم نیلا یا کالا ہو سکتا ہے۔

فائیٹولاکا (Phytolacca): جلد پیسے کے رنگ کی ہو جاتی ہے۔

ہائپرکیم (Hypricum): سرخ لکیریں یا دھاریاں بازوؤں یا ٹانگوں تک پھیل جاتی ہیں۔

آرسینک آئیوڈ (Ars Iod): جلد پیسہ میں کالی ہو جاتی ہیں۔

آئرس ویرا (Iris Ver): پکپش کے بعد جب جلد نیلی پڑ جائے۔
 کونیم (Conium): جلد سبز ہو جاتی ہے۔
 لائیو پوڈیم (Lycopodium): جگر کے دھبوں کے لئے مخصوص دوا ہے۔
 کالی آرسینک (Kali Ars): کھجلی اور کوڑھ کے بعد جلد کا رنگ قسم قسم ہو جاتا ہے۔
 نیٹرم میور (Natrium Mur): جلد سلیش مائل ہو جاتی ہے۔
 سلفر (Sulphur): جب جلد گندی نظر آتی ہے، مریض عموماً گندا رہتا ہے، نمائے سے نفرت ہوتی ہے۔
 بربرس وگلیرس (Berb Vull): چہرہ زرد ہوتا ہے جس پر سلیش رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں، رخسار دھسے ہوتے ہیں، آنکھیں گہرائی میں ڈھنکی ہوتی ہیں، جن کے گرد نیلاہٹ مائل یا سیاہی مائل سلیش رنگ کے حاشے ہوتے ہیں۔
 ہسمتھ (Bismuth): چہرہ مردوں جیسا پیلا ہوتا ہے جس کے ساتھ آنکھوں کے گرد نیلے حلقے ہوتے ہیں۔
 کپسکیم (Capsicum): رخسار سرخ اور گرم ہوتے ہیں جو نیلاہٹ کے ساتھ اولتے بدلتے رہتے ہیں۔ چہرے پر سرخ نقطے ہوتے ہیں۔
 چائنا آف (China Off): چہرہ پیلا مر جاتا ہوتا ہے۔ آنکھیں دھنسی ہوتی ہیں اور ان کے گرد نیلے حاشے ہوتے ہیں۔
 سنا (Cina): چہرہ پیلا ہوتا ہے، پیاروں والا ہوتا ہے، منہ کے گرد سفید اور نیلاہٹ مائل جلد ہوتی ہے، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے ہونے کے ساتھ پیاروں والی جلد ہوتی ہے۔
 سیپیا (Sepia): چہرہ اور آنکھ کا سفید حصہ پیلاہٹ لیے ہوتا ہے۔ چھاتی پر پٹے دھبے ہوتے ہیں۔ رخساروں کے اوپر والے حصے پر اور ناک پر پٹیلی کاغھی ہوتی ہے۔

بد صورتی — (Disfigurement)

ویریولینم 'سارا سیمنیائی' (Varolinum, Sarracenia P): چہرے کے بد صورت ہو جانے کے لئے جو کہ چیچک کے باعث ہوتا ہے، ویریولینم 200 کی خوراک ہر چندہ روز کے بعد دیتے اور سارا سیمنیائی 5 دن میں تین مرتبہ لیے عرصہ کے لئے دیتے۔
 سلیشیا، کلکیریا فلور (Silicea, Calcarea Flour): چہرے کے بد ہیئت ہو جانے کے لئے جو کہ مہاسوں یا ناسوروں اور پھوٹوں کے نشانات کے باعث ہوتا ہے۔

انگریزا (کھجلی 'خارش)

(Eczema)

(دیکھئے "پھوڑے پھنسیاں")

سلفر (Sulphur): شدید قسم کی جلن اور خارش کے ساتھ کھجلی لاحق ہوتی ہے۔ دھوئے سے یا کھرچنے سے اضافہ ہوتا ہے۔ جلد کھردری اور ٹانٹاٹم ہوتی ہے۔ خشک ہوتی ہے اور اس پر چھلکے جمتے ہیں۔ تمام سوراخوں پر آگ کی طرح کی سرنخی ہوتی ہے مثلاً آنکھ کے پونوں پر اور کانوں وغیرہ پر 'جسم سے بہت گندی بو آتی ہے' معدے کے کڑھے میں ڈوبنے کا احساس ہوتا ہے 'ہاتھ اور سر گرم ہوتے ہیں' بستر کی چادروں 'تکیوں وغیرہ کی گرمی سے علامات میں اضافہ ہوتا ہے یا تھکان ہوتا ہے 'بالوں کو ڈالی کرنے کے باعث کھجلی لاحق ہوتی ہے۔ مریض عموماً لندا اور ناصاف ہوتا ہے۔

گرافٹائٹس (Graphites): انگریزا بٹے والا ہوتا ہے۔ چپکنے والا 'شد کی طرح کا مواد' کھجانے سے خارج ہوتا ہے۔ ہاتھوں پر 'چہرے پر' ہونٹوں پر اور کانوں کے پیچھے انگریزا ہوتا ہے نیز جلد میں دکھن ہوتی ہے اور مسئلے پر سخت ہو جاتی ہے۔ گرمی سے اور رات کے وقت ابتری ہوتی ہے۔ چھ ماہ تک روزانہ حاد کیسوں میں پھوٹی طاقت کی دوا دیجئے اور مزمن کیسوں میں اونچی طاقت کی مثلاً 200 یا 1000 طاقت کی دوا دیجئے 'ہر ہفتے کے بعد یا ہر ماہ کے بعد علی الترتیب دوا کو دوہرایا جائے۔ اخراج چپکنے والا 'چمکنے والا اور لیس وار ہوتا ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): سرنخی اور سوجن کے ساتھ خشک انگریزا ہوتا ہے۔ ناقابل برداشت خارش اور جلن ہوتی ہے جس میں گرمی کے باعث ابتری ہوتی ہے۔ نوزائیدہ بچوں میں کھوپڑی پر انگریزا ہوتا ہے۔ پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں جن سے پتلا پانی والا اور گہرے رنگ کا بدبودار مواد خارج ہوتا ہے۔ جو پھلکوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پیپ کار تھکان ہوتا ہے۔ 200 یا 1000 طاقت کی دوا دیجئے۔ شروع میں ہر ہفتے اور بعد میں ہر ماہ دوا دیجئے۔

ارٹیکا یورینس (Urtica Urens): حاد کیسوں میں جب کہ جلن اور خارش ہوتی ہے۔ بووٹا (Bovista): ہاتھ کی پشت پر انگریزا ہوتا ہے۔ نان ہائیوں کا انگریزا 'تھنوں کے جوڑوں میں مرطوب انگریزا ہوتا ہے جو کہ پورے چاند کے دوران ظاہر ہوتا ہے۔ پُر درد حیضوں والی مستورات میں تو اثر کے ساتھ لاحق ہو۔

کالی بانیک (Kali Bick): کھوپڑی کا انگریزا جس کے ساتھ مونے اور بھاری چھلکے ہوتے ہیں۔ جن سے پیلا 'کاڑھا' چپکنے والا مواد رستا ہے۔

ایومینا (Alumina): قبض کے ساتھ خشک بہت زیادہ بھجان والا انگیزیم لاجحق ہو۔

سکوکم چک (Skookum Chuek): انگیزیم خارش وغیرہ ہوتی ہے۔

سکیوٹاوائروسا (Cicuta V): بالوں والے حصوں میں انگیزیم ہوتا ہے۔ پھنسیاں آنکھی بہتی ہیں، پیپ دار انگیزیم ہوتا ہے جو خشک ہو کر سخت، پھٹکوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ٹوپی کی طرح سے سخت ہو جاتا ہے۔

سورینم (Psorinum): کھوپڑی اور چہرے پر خشک اور پھٹکوں والا انگیزیم ہوتا ہے۔ کھوپڑی پر پھریاں ہوتی ہیں۔ بال گر جاتے ہیں، مواد کے رتنے سے پھریاں اتر جاتی ہیں اور نئے پھوڑے ننگے ہو جاتے ہیں، رات کے وقت اور بستر کی گرمی سے اتھری ہوتی ہے، مریض کم حوصلہ ہوتا ہے، مایوس اور ناامید ہوتا ہے۔ پتلا، متعفن، پیچھے والا مواد خارج ہوتا ہے، ننگے سزے گوشت کی طرح کا تعفن ہوتا ہے، رتنے والے مواد سے متلی لاجحق کرنے والی اور بیمار گردہ بننے والی بدبو اٹھتی ہے، یہ سورینم کی عام علامات کے برخلاف ہوتا ہے۔ جس میں ٹھٹھ سے اتھری ہوتی ہے۔

نیٹرم سلف (Natrurn Sulph): اکثر دم کے باعث تعفن اور جلد کی علامات مل جاتی ہیں۔ مینگانم (Manganum): جلد صحت یاب نہ ہو۔ معمولی کھرپنے سے ناسوری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

انتھیری رم (Anantherum): کھوپڑی، عضو تناسل اور لب ہائے فرج پر ناسور ہوتے ہیں۔ ہیمپٹر سلف (Hepar Sulph): جلد کے لپٹے ہوئے حصوں میں مرطوب پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں۔ جن کے ساتھ جوڑوں میں خارش ہوتی ہے۔ جلد میں آسانی کے ساتھ پیپ پڑ جاتی ہے اور مہاسے بن جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ پارا یا زنگ پکڑنے کے باعث لاجحق ہوتا ہے۔ چھونے سے حساسیت ہوتی ہے۔ خشک، سرد ہواؤں میں اتھری ہوتی ہے۔ مرطوب موسم میں اور گرمی میں بہتری ہوتی ہے۔

پٹرولیم (Petroleum): چہرے اور گردن پر پیلاہٹ مائل سبز موٹے کھربٹے ہوتے ہیں۔ جن سے مادہ باافراط خارج ہوتا ہے۔ خون والے شگافوں کے ساتھ انگیزیم کو یہ دوا شفا دیتی ہے۔ شگاف چھونے ہوتے ہیں اور ان سے مواد خارج نہیں ہوتا۔ خشک پھٹکوں والا یا زیادہ تر گرمی میں ظاہر نہ ہونے والا مرطوب قسم کا انگیزیم ہوتا ہے جو کہ سردیوں میں یا سرد موسم میں دوبارہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں پر یا کانوں کے پیچھے انگیزیم اور چہرے لاجحق ہوتے ہیں۔ پتلا اور پانی والا مواد خارج ہوتا ہے۔

سٹریپٹوکوکین (Streptococcin): سیلان خون والے شگافوں کے ساتھ بار بار لاجحق ہونے والا انگیزیم، کھانے سے مریض کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ IM یا CM طاقت کی دوا دیتے ہیں۔

میزیریئم (Mezereum): ناقابلِ ہواشت خارش ہوتی ہے۔ بستر میں اور چھونے سے ابتری ہوتی ہے۔ زیادہ مقدار میں مواد خارج ہوتا ہے۔ مونے چوڑے کی طرح کی پٹریوں سے سرؤھکا ہوتا ہے۔ ان پٹریوں کے نیچے گاڑھی اور سفید پیپ جمع ہوتی ہے۔ بال آپس میں چپک کر جڑ جاتے ہیں۔ بالوں والے حصہ میں ایگزیریا ہوتا ہے۔

لونا (Luna): جلدی امراض ایگزیریا وغیرہ جو کہ پورے چاند کے وقت ابتر ہو جاتے ہیں۔
کلکیریا کارب (Calcarea Carb): ہر وقت شدید قسم کی خارش رہتی ہے۔ صبح ہوتے ہوتے بستر میں ابتری ہوتی ہے۔ مریض محسوس کرتی ہے کہ جیسے اس نے سرد اور گیلی جراثیم پین رکھتی ہیں۔ بوائیوں میں جھلا ہونے کا رجحان ہوتا ہے۔ کلکیریا کارب کا مزاج رکھنے والے بچوں میں ایگزیریا لاحق ہو۔ 200 طاقت کی دوا دیجئے۔

ٹیلوریم (Tellurium): ہاتھوں اور پاؤں کی خارش 'دار والے پھوڑے پھلیاں' بدبودار مواد خارج ہونے کے ساتھ گول شکل کے گمرے زخم ہوتے ہیں۔ حجام کی خارش 'جلد میں ڈنک نکلتے ہیں۔ کانوں کے پیچھے اور چاند پر ایگزیریا ہوتا ہے۔ پاؤں کا پیٹ بدبودار ہوتا ہے۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): کانوں کے ارد گرد اور کانوں کے پیچھے ایگزیریا ہوتا ہے۔
کلکیریا سلف (Calcarea Sulph): بچوں میں خشک ایگزیریا 'پیلے پیپ دار جھلکے اور پٹریاں ہوتی ہیں۔ بالوں پر چھونے سے ہوتے ہیں۔ جن سے کھرپنے پر خون بہتا ہے۔

آرسینک ایلیم (Arsenic Album): جلن اور بے چینی کے ساتھ ایگزیریا لاحق ہوتا ہے۔ خارش ہوتی ہے۔ جلن اور سوجن ہوتی ہے جو کہ ٹھنڈ اور کھانے سے ابتر ہو جاتی ہے۔ خشک کھردری اور پھلکوں والی جلد۔ گرمی سے اور گرم مشروبات سے بہتری ہوتی ہے۔ معمولی تھکاوٹ کے بعد کمزوری ہو جاتی ہے۔ انگلیوں کے درمیان ایگزیریا ہوتا ہے اور انگلیوں کے پونوں پر شکاف ہوتے ہیں۔ کھوپڑی پر اور چہرے پر پھلکوں والے چھوڑے پھلیاں ہوتے ہیں۔ جن کے ساتھ خراش دار اور متعفن مواد خارج ہوتا ہے۔ شدید قسم کی جلن اور خارش ہوتی ہے۔

انٹیم کروڈ (Antim Crud): معدہ کی خرابیوں کے ساتھ ایگزیریا لاحق ہو۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے پر مسامیت ہوتی ہے۔ گرم بستر میں خارش ہوتی ہے۔ مونے 'نخت اور شمد کے رنگ والے جھلکے ہوتے ہیں۔ جلن زیادہ ہوتی ہے۔ رات کے وقت ابتری ہوتی ہے۔

کالی سلف (Kali Sulph): گمرے زخم ہوتے ہیں جو کہ زرد پیپ کے ساتھ بھرے ہوتے ہیں۔ یہ پیپ پتے مانع کی طرح ہوتی ہے۔ ہاتھوں اور انگلیوں کی اندرونی طرف باافراط پیپ ہوتی ہے۔ ہونٹ پھٹے ہوتے ہیں۔ منھائیوں کی طلب ہوتی ہے۔ جس سے علامات میں زیادتی

ہو جاتی ہے۔ جلد کے موٹا ہو جانے کے ساتھ 'سخت سینک' دار پٹریاں بنتی ہیں۔
رینن کولس لی (Ranunculus B): جلد کے موٹا ہو جانے کے ساتھ نیز سینک دار چھلکوں
 کے بننے کے ساتھ ایگزیمہ لاحق ہو۔

سٹیفنی سیکریا (Staphisagria): ایگزیمہ جس میں پیلا 'خارش' دار مائع چھلکوں کے نیچے سے
 رستا ہے۔ رطوبت کے لگ جانے سے نئے زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔ مرطوب خارش ہوتی ہے۔
 سر پر اور کانوں کے پیچھے متعفن پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں۔ کھانسنے سے خارش کی جگہ تبدیل
 ہو جاتی ہے لیکن مائع کے رسنے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

نٹرم میور (Natrium Muri): بالوں کے حاشیے پر ایگزیمہ ہوتا ہے۔ خصوصاً سر کی پشت پر۔
منسی نیلا (Mancinella): بہت زیادہ تعداد میں چھالوں کے ساتھ جلد کی سوزش لاحق ہو۔
 چھلکے والا مواد رستا ہے اور چھلکے بنتے ہیں۔ بھاری اور بھورے چھلکے اور پٹریاں۔

کلیمٹس (Clematis): سوزشی اور پھوڑوں والا ایگزیمہ جس کے ساتھ پیپ دار یا پانی والا مواد
 خارج ہوتا ہے۔ جس کے بعد چھلکے اور پٹریاں بن جاتی ہیں۔ جن میں زیادتی ہونے کے دوران
 سوزش ہوتی ہے اور یہ جانم کے کھنسنے کے دوران خشک ہوتی ہے۔ گہرے رنگ والے کھردرے
 اور تیزی سے بننے والے چھلکے کھوپڑی پر ہوتے ہیں۔ جن سے پیلاہٹ مائل مواد خارج ہوتا
 ہے۔ بستر کی گرمی سے خارش میں اتھری ہوتی ہے نیز دھونے سے بھی۔

کالچیم (Calcium): بوڑھے لوگوں میں نیز ماہرین شراب پینے والوں میں سرخ ایگزیمہ
 جس کے ساتھ ان کے لہام میں یو ریا یا کھار کی حالت نمایاں ہوتی ہے۔

اکیمریکس ایم (Agaricus M): جلن، کفن اور انتہا درجے کی خارش کے ساتھ ایگزیمہ لاحق
 ہوتا ہے۔ جہن ایسی ہوتی ہے جیسے کہ سوئیاں چھ رہی ہوں۔ بجلی لگنے جیسے ٹانگے جلد میں لگتے
 ہیں۔ جلد کی گہرائی میں پھوٹی گرہیں ہوتی ہیں۔ ایگزیمہ موسم سرما میں اتر ہو جاتا ہے اور اس
 کے ساتھ بوئیاں ہوتی ہیں۔

تھو جا (Thuja): سائیکوٹک مریضوں میں ایگزیمہ لاحق ہو۔ سوزاک کے دب جانے کے بعد یا
 حفاظتی نیلے لگوانے کے بعد ایگزیمہ لاحق ہوتا ہے۔ گندی 'بھوری' جلد 'خارش' دار پھنسیوں سے
 بھری ہوتی ہے۔ نیلے لگوانے سے ایگزیمہ دب جاتا ہے یا دب حفاظتی نیلے لگوانے کے باعث
 ایگزیمہ لاحق ہوتا ہو۔

ایکس رے (X-Ray): ہاتھوں اور پاؤں میں گہرے شکاف اور چرے ہوتے ہیں۔ گھٹنوں
 اور جوڑوں کی پھیلنے والی سطح پر بہت گہرے چرے ہوتے ہیں۔ گہرے نیلے رنگ کی پھوڑے
 پھنسیاں ہوتی ہیں۔ جن کی مماثلت جلنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ جلد خشک ہوتی ہے۔ متاثرہ جگہ

تھلکے دار، شکاف دار اور زیادہ سوجن والے ہوتے ہیں۔ یہ دوا سلفر کے غلط استعمال سے پیدا شدہ تکلیفات کو بھی رفع کرتی ہے۔

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): جب ابھی منتخب شدہ ادویات ناکام ہو جائیں تو اس دوا کو عمل انگیز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مریض مایوس اور غمگین ہوتا ہے۔ اسے ٹھنڈا آسانی سے لگ جاتی ہے۔ کچے پن اور دکھن کے ساتھ جلد آتشی سرخ ہوتی ہے۔ سارے جسم پر انگیزہ ہوتا ہے۔ خارش رات کے وقت اتر ہو جاتی ہے۔ کپڑے اتارنے پر شدید ہو جاتی ہے۔
گن پائوڈر (Gunpowder): یہ ایک بہت بڑی ایٹنی سورک دوا ہے اور بہت بڑی خون کو صاف کرنے والی دوا ہے۔ یہ جلد کی کئی تکلیفات کو دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ دوا 3x طاقت میں لمبے عرصہ کے لئے دینی چاہئے۔

باتھنی کھال والی جلد — Elephantiasis

ہائیڈروکوتائل (Hydrocotyle): جب آدمی کی جلد باتھنی کی کھال کی طرح سے ہو جائے۔ یہ دوا انگیزہ، کوڑھ، کیل ماسوں اور دیگر جلدی امراض کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے۔

سوکھا مسان، لاغر — Emaciation (Marasmus)

کلکیریا کارب (Calcaria Carbe): جلدی کمزوری، ٹانگوں سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ اوپر کی جانب پھیلتی جاتی ہے۔

ایبروپلنم (Aberplanum): جلدی کمزوری، ٹانگوں سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ اوپر کی جانب پھیلتی جاتی ہے۔

کلکیریا فاس (Calcaria Phus): یہ سوکھا مسان کے لئے عمدہ دوا ہے۔ جلد مرجھا جاتی ہے۔ جلد خشک رہتی ہے اور جلد پر تبھریاں پڑ جاتی ہیں۔

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): جلدی کمزوری کے لئے اس دوا کو عمل انگیز دوا کے طور پر ضرور استعمال کرنا چاہئے۔ 200 طاقت کی دوا ہر ماہ دہرائی چاہئے۔ اس دوا کے دینے سے تین دن پہلے اور تین دن بعد تک دوسری کوئی دوا نہیں دینی چاہئے۔

نیٹرم میور (Natrium Mur): گردن کی کمزوری یا پاؤؤں کی کمزوری ہو کہ نیچے کی جانب پھیلتی ہے۔

آئیوڈیم (Iodium): جب بچہ چڑچڑا ہو جائے اور کسی کا بھی اپنے قریب آنا پسند نہ کرے۔ کھانا بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی کمزور ہوتا ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): بے قاعدہ حیضوں کے بعد کمزوری لاحق ہوتی ہے۔
 ہائیڈراستس (Hydrastis): خسرہ کے بعد لاغری ہو جاتی ہے۔
 سیکیل کار (Secale Cor): لاغری سے جلد مرحسا جاتی ہے۔ غیر صحت مند جلد 'ارغوانی'،
 نیلاہٹ مائل رنگ والی جلد۔ خصوصاً جب دوران خون کمزور ہو جائے۔
 اورم میور (Anum Mur): آتھک کے باعث لاغری ہو۔
 پلمبرم (Plumbum): خون کی کمی کے باعث لاغری ہوتی ہے۔

اپنی ڈرمولائی کس — Epidermolysis

{شاذ و نادر لاحق ہونے والا جلدی مرض جس میں معمولی چھونے سے جلد پر آبلے پڑ جاتے ہیں}
 رینن کولس (Ranunculus): ناقابل علاج کھلائی جانے والی اس بیماری کے لئے یہ واحد دوا
 ہے۔

پھوڑے، پھنسیاں — Eruptions

(Itching, Hives, Urticaria and Pruritus)

(نیز دیکھئے "انگریزا")

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): چھپاکی یا خارش جب وہ تھوڑی سی تازہ ہوا لگتے سے
 غائب ہو جائے۔

رشاکس (Rhus Tox): ہاتھوں والے حصے میں چھپاکی یا خارش ہوتی ہے۔ ہاتھوں کی
 ہتھیلیوں میں پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں جو ٹھیک ہو جانے کے بعد دوبارہ اسی جگہ پر ظاہر نہیں
 ہوتیں۔ جب خارش کے ساتھ تپ لرزہ (ملیریا) اور گتھیا لاحق ہو۔ پانی کے بڑے بڑے پھالے
 ہوتے ہیں۔ مردوں یا عورتوں کے اعضائے تناسل پر پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں۔
 کلورل (Chloral): بڑی جسامت کے سرخ باد ہوتے ہیں۔ جیسے کہ استسقاکی سو جن میں
 ہوتے ہیں۔

سرساپاریلا (Sarsaparilla): دوران حیض خارش والی پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں۔ دوران
 حیض دائیں جاکھ میں تر پھنسیاں ہوتی ہیں۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): کھوپڑی پر 'چرے' پر 'کانوں' کے پیچھے پھوڑے پھنسیاں ہوتی
 ہیں۔ قطعات کی صورت میں بال گر جانے کے ساتھ پھوڑے پھنسیاں نکلتی ہیں۔ ان پھوڑے
 پھنسیوں سے پانی والا یا جیلاہٹ مائل مائع رستا ہے۔ فوڑا سیدہ بچوں کا انگریزا۔

نیشترم کارب (Natrurn Carb): انگلیوں کے پھوٹوں پر اور انگلیوں کے جوڑوں پر پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں نیز بچوں پر بھی پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں۔ گڑھے دار پھنسیاں ہوتی ہیں جو کھل جاتی ہیں اور ناسور کی صورت اختیار کر جاتی ہیں۔

کارڈوس ایم (Cardus M): جلد پر پھوڑے پھنسیاں ٹکڑوں کی صورت میں ہوتی ہیں۔ جو کہ سینے کی اقلی جانب والی درمیانی ہڈی کے نچلے حصے کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ جس کا باعث جگر اور دل کی خرابی ہوتی ہے۔ پسلیوں کی درمیانی ہڈی جس کے ساتھ پسلیاں جڑی ہوتی ہیں کے پھوڑے پھنسیوں والے ٹکڑے (یا قطعات)۔

کورسلیٹیم (Coralinum): آتشکی ہوشت خور پھوڑے جن سے پدیدوار مادہ خارج ہوتا ہے۔ سرخ پاؤں جو تپنے کے رنگ کا ہوتا ہے۔

سورنیٹم (Psorunum): پھلکوں والی پھوڑے پھنسیاں جو گرمیوں میں غائب ہو جاتی ہیں اور سردیوں میں دوبارہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ کھنٹیوں کے جوڑوں پر پھوڑے پھنسیاں نیز گھٹنوں پر پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں۔ شدید قسم کی خارش بستر کی گرمی سے یا کھانے سے ابتر ہو جاتی ہے۔ پھوڑے پھنسیاں یا خارش جو گرمیوں میں غائب ہو جاکیں اور سردیوں میں دوبارہ ظاہر ہو جائیں۔

کالی میور (Kali Mur): پھوڑے پھنسیاں، دہل اور مسات لاحق ہوتے ہیں۔ جن سے سفیدی مائل مادہ خارج ہوتا ہے اور زبان سقیم ہوتی ہے۔

سلیٹیم (Selenium): جلد کی تھوں میں خارش ہوتی ہے نیز جوڑوں کے آس پاس خصوصاً ٹخنے کے جوڑوں کے آس پاس خارش ہوتی ہے۔

تھوجا (Thuja): سارے جسم پر پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں۔ دہلیوں والی پھوڑے پھنسیاں گھٹنوں کے آس پاس ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ پھنسیوں کی خارش میں افادہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت ابتری ہوتی ہے۔

کاربونیم سلف (Carboneum): پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں۔ پٹریاں ہوتی ہیں۔ انگیزما ہوتا ہے۔ کھوپڑی پر خارش ہوتی ہے۔ پھلکوں والے ترمسے ہوتے ہیں۔ جن میں دکھن اور درد ہوتا ہے۔ کھوپڑی پر سوزش والی پھنسیاں ہوتی ہیں۔

ایلنٹھس گلینڈولوسا (Ailanthus Glandulosa): سرخ پاؤں ٹکڑوں کی صورت میں ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ ظاہر ہوتا ہے۔ جلد کا رنگ جاسنی ہو جاتا ہے۔

اگیریکس ایم (Agaricus M): بالوں والی کھوپڑی کی خارش خصوصاً صبح کے وقت کھانے کے بعد متاثرہ حصے برف کی طرح سرد ہو جاتے ہیں۔

انتھراکوکالی (Anthrakokali): کھلبلی 'پرائی خارش' 'پرائی داؤ' تھنوں میں شکاف اور ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔ پورے چاند کے دوران بہتری ہو جاتی ہے۔

سلفر (Sulphur): بچان ہوتا ہے جو گرمی سے اور کپڑے اتارنے سے اتر ہو جاتا ہے اور بہتر سے پاؤں باہر نکالنے پر بہتری ہوتی ہے۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): سلفر کی تمام علامات کے ساتھ خارش ہوتی ہے لیکن مریض زود رنج اور چڑچڑا ہوتا ہے۔ ہمدردی کو پسند کرتا ہے۔ معدے یا رحم کے علاقہ کی سوزشی کیفیت۔

کروٹن ٹیگ (Croton Tig): شدید خارش اور جلن کے ساتھ گہرے پھوڑے پھنسیاں ہوتے ہیں اور چھوٹے پھوڑے ایک دوسرے کے قریب ہونے کے باعث مل جاتے ہیں۔ ان پھوڑے پھنسیوں کے دب جانے کے باعث خشک اور نہ رکنے والی کھانسی ظاہر ہوتی ہے۔

آنکھوں، کھوپڑی اور خصوصاً اعضائے تناسل، نصیوں اور مردانہ عضو تناسل کے آس پاس پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں اور خارش ہوتی ہے۔ کھانے کی خواہش ہوتی ہے لیکن کھایا نہیں جا سکتا کیونکہ اعضاء بہت حساس ہوتے ہیں۔

ڈولی کوس (Dolichos): پھوڑے پھنسیوں کے بغیر خارش ہوتی ہے۔ کھانے سے اور رات کے وقت اتری ہوتی ہے۔

لوبیلیا انفلیٹا (Lobelia Infl): انگلیوں کے درمیان ہاتھوں کی پشت پر اور بازوؤں کے اگلے حصوں پر چھوٹے پھوڑے آہلے ہوتے ہیں اور پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں۔

اولینڈر (Oleander): کھوپڑی پر شدید قسم کی خارش ہوتی ہے جیسے کہ جوؤں کے کانٹے سے ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد سکڑن ہوتی ہے۔ بدبودار پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں۔

روٹا (Ruta): گوشت کھانے سے خارش لاحق ہوتی ہے۔

اینٹاگیلس (Anagallis): ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر پھوڑے پھنسیاں اور خارش ہوتی ہے۔ پھوڑے پھنسیاں اور خارش ٹھیک ہوتے دکھائی دیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر اسی جگہ پر دوبارہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔

کاسٹیکم (Causticum): پھوڑے پھنسیوں کا دب جانا لاحق ہوتا ہے۔ جس کے باعث فایج ہو جاتا ہے۔ درد سر ہوتا ہے اور اعصابی درد ہوتے ہیں۔

الیومینا (Alumina): پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں نیز خارش ہوتی ہے۔ پھوڑے پھنسیوں کے بغیر جلد کی خارش لاحق ہوتی ہے۔ مریض یہاں تک کھجاتا ہے کہ جلد سے خون بہنے لگتا ہے۔

کھانے سے کھرنڈ جم جاتے ہیں۔ پسے کوئی پھوڑے پھنسیاں نہیں ہوتیں لیکن مریض کے کھانے سے جلد کٹ پھٹ جاتی ہے۔ خون نکل آتا ہے اور پھر کھرنڈ جم جاتے ہیں۔ صحت یاب

ہونے کے وقت یا زخم ٹھیک ہونے کے وقت خارش میں اتھری ہو جاتی ہے۔ یہ خلوش صرف اسی وقت دور ہوتی ہے۔ جب جلد کے زخم کچے ہوں، غم دار ہوں یا ان سے خون بہتا ہو۔ بستر کی گرمی میں خارش ہوتی ہے۔

اپیس میل (Apis Meli): چھپکائی جسم کی سطح پر اچانک ظاہر ہو جاتی ہے۔ لمبے لمبے سرخی مائل سفید دھبے ہوتے ہیں۔ جو کہ ناقابل برداشت خارش، جلن اور ڈنگ لگنے کے ساتھ جلد پر ابھر آتے ہیں۔ ٹھنڈے لگ جانے کے نتیجہ میں یا وقفہ دار بخار کے دوران پھوڑے پھنسیاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں۔

گرافائٹس (Graphites): پھوڑے پھنسی کے ساتھ یا پھوڑے پھنسی کے بغیر تمام جسم پر خارش لاحق ہوتی ہے۔ گرم بستر میں رات کے وقت اتھری ہوتی ہے۔ داد و آئرنیما سے لیس دار مادہ خارج ہوتا ہے۔

آرسنک البم (Arsenic Alb): اس میں بھی علامات اپیس میل کی طرح کی ہوتی ہے لیکن اس میں دھبے اپیس میل کے دھبوں سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ خصوصاً اس دوا کی نشاندہی اس وقت کی جاتی ہے جب مرض مچھلی کھانے کے باعث لاحق ہوا ہو۔ (جب چھپکائی گھوٹکا مچھلی کھانے کے باعث لاحق ہوگی ہو تو ایسی صورت میں نیری ستھ اور کویائیو بھی آزمائی جائیں۔)

ڈلکامارا (Dulcamara): سارے بدن پر پھوڑے پھنسیاں ہو جاتی ہیں جو جلد پر گڑھے بناتی ہیں اور کھرنڈ وغیرہ جم جاتے ہیں۔ ساتھ میں دکھن اور خارش ہوتی ہے۔ خارش کے ساتھ کھوپڑی پر پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہیں۔ کھانے سے خارش دور ہوتی ہے۔

کالی بروم (Kali Brom): جب اعصابی مرض کے ساتھ سرخ پادہ لاحق ہو۔

ہورالی (Hora B): ہڈیوں کے ابھرے ہوئے حصے پر تیز داڑھ کی ہڈیوں وغیرہ والے حصوں پر مساس ہوتے ہیں اور خارش ہوتے ہیں۔ انگلیوں کے پوروں میں تنگیں ہوتی ہیں۔

میزیریئم (Mezereum): جسم کی بیرونی سطح پر تیزابی کیفیت ہوتی ہے۔ اعصابی احساس ہوتا ہے۔ کھانے سے کانٹے کا، بھیجنناہٹ کا احساس ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلتا رہتا ہے۔ کھانے کے بعد متاثرہ حصے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ سر موٹے چمڑے کی طرح کے کھرنڈ کے ساتھ ڈھکا ہوتا ہے جس کے نیچے گاڑھی سفید رنگ کی پیپ جگہ جگہ جمع ہوتی ہے اور بال آپس میں جڑ جاتے ہیں۔

سٹرامونیم (Stramonium): جلد پر شدید قسم کی سرخ چھپکائی ہوتی ہے جو کہ سرخ بخار کے مشابہ ہوتی ہے البتہ اس میں چمک سرخ بخار سے زیادہ ہوتی ہے۔ جلد بہت زیادہ سرخ ہو جاتی ہے۔

رینجن کولس بی (Ranunculus B): نیلا، ہٹ مائل یا کالے رنگ کی پھوڑے پھنسیاں ہاتھوں کی پتیلیوں پر چھالوں کی مانند ظاہر ہوتی ہیں۔

ہیریم سلف (Barium Sulph): کھوپڑی پر خارش ہوتی ہے۔

ایناکارڈیم اور (Anacardium Or): شدید قسم کی جلن اور خارش کے ساتھ جلد پر پھوڑے پھنسیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ کھجائے سے جلن اور خارش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

ایتھوزا (Aethusa): ناک کی نوک پر داد والی پھنسیاں ہوتی ہیں۔

سفی لینم (Syphilinum): آٹے جیسے رنگ والے دھبے ہوتے ہیں۔

بوویشا (Bovista): اسال کے ساتھ چھپاکی لاحق ہوتی ہے۔ پختوں کے بعد ایشٹن اور نیچے کی جانب دباؤ لاحق ہوتا ہے۔

سیپیا (Sepia): کھلی ہوا میں چھپاکی میں اتھری ہوتی ہے۔ ہونٹوں کا ناک کے نٹھوں کا اور آنکھوں کے پوٹوں کا سرطان لاحق ہوتا ہے یا رسولیاں ہوتی ہیں۔

تھائیرائیڈینم (Thyroidinum): جلد کی شدید قسم کی سرخی جس کے ساتھ شدید قسم کی خارش ہوتی ہے۔ جلدی مرض جس میں چھوٹے چھوٹے چھلکے جلد سے اترتے ہیں۔

ریو میکس (Rumex): کھلی ہوا میں اتھری ہوتی ہے۔ خصوصاً بپ کپڑے اتار رہا ہو۔

ونکامینر (Vinca Minor): کھوپڑی پر چہرے پر اور کانوں کے چپچپے پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں۔ جن سے بدبو آتی ہے۔ آہستہ آہستہ چھلکے ٹم جاتے ہیں جو پیپ وغیرہ مواد کو باہر خارج ہونے سے روک دیتے ہیں۔ بال گر جاتے ہیں اور ان کی جگہ بھورے رنگ کے بال آگ آتے ہیں۔

سٹریپٹوکوکین (Streptococcin): یہ دوا پھوڑے پھنسیوں کے لئے اس وقت دی جاتی ہے جب دیگر ادویات ناکام ہو جائیں۔ زردی مائل رنگ والے چھلکوں کے ساتھ گڑھے سے بنتے ہیں۔ یہ چھلکے بعد میں کالے پڑ جاتے ہیں۔ چھلکوں کے نیچے سے خون بہتا ہے۔

پکس لیکوئیڈا (Pix Liq): ہاتھ کی پشت پر پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں۔ جن میں رات کے وقت ناقابل برداشت خارش ہوتی ہے اور کھجائے سے خون بہتا ہے۔

ہیرٹا کارب (Baryata Carb): بچوں کی کھوپڑی پر خشک پھنسیاں ہوتی ہیں۔ کھوپڑی پر مرطوب چھلکے ہوتے ہیں۔ بال گر جاتے ہیں۔ نیچے ذہنی خرابی کے ساتھ بونے رہ جاتے ہیں۔

اسٹاکس ایل (Astracus El): چھپاکی کی مزمن قسم 'سارے جسم پر سرخ ہادہ ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ خارش ہوتی ہے۔ کپڑے اتارنے پر اتھری ہوتی ہے۔

پٹرولیم (Petroleum): کھجائے سے پھوڑے پھنسیوں میں اور خارش میں اتھری ہوتی ہے۔

یہاں تک کہ جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر خون بننے لگتا ہے جس کے باعث غارش میں افادہ ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں کی جلد کھردری ہوتی ہے۔ جس میں شگاف پڑ جاتے ہیں۔ انگلیوں کے پورے ہر موسم سرما میں کھردرے ہو جاتے ہیں۔ مردانہ یا زنانہ اعضائے تناسل پر چھوٹے چھوٹے گڑھے پڑ جاتے ہیں۔

پھوڑے پھنسیوں کا دب جانا

Eruptions: Suppression of

اپیس (Apis): پھوڑے پھنسیوں کے دب جانے کے باعث دماغ کی سوزش لاحق ہوتی ہے۔ نفس چھوٹا ہو جاتا ہے۔ استسقاء لاحق ہوتا ہے۔ معدے کا درد لاحق ہوتا ہے۔ دماغ کے پردوں میں پانی کا مرض لاحق ہوتا ہے۔

کلکیریا کارب (Calcaria Carb): پھوڑے پھنسیوں کے دب جانے کے باعث مرگی لاحق ہوتی ہے۔

سلفر (Sulphur): پھوڑے پھنسیوں کے دب جانے کے باعث دانتوں میں تیلن والہ درد ہوتا ہے۔ اسہال لاحق ہوتے ہیں۔ دمہ ہوتا ہے۔

کیوپریم میٹ (Cuprum Met): پھوڑے پھنسیوں کے دب جانے کے باعث تشنہ تھپتھپکے لگتے ہیں۔

گرافائٹس (Graphites): درد سر لاحق ہوتا ہے۔ پھر آتے ہیں۔ نقاہت ہوتی ہے اور بھوک کھو جاتی ہے۔

سرخ بادہ — Erysipelas

اکونائٹ (Aconite): یہ دوا مرض کے ابتدائی مراحل میں دی جاتی ہے جبکہ پیچھے ہٹا ہوا اور جلن ہوئی ہے۔ جلد سرخ چمک دار گرم ہو جاتی ہے اور سوج جاتی ہے۔

پسی فلورا انک (Passiflora Inc): یہ دوا سرخ بادہ کے لئے مخصوص ہے۔ اسے بدر لہجے کی صورت میں دینا چاہئے۔ 4 سے 5 قطروں کی ایک خوراک ہوتی ہے۔

بیلادونا (Belladonna): جلد سرخ، ہموار اور تپتی ہوئی ہوتی ہے۔ ابتدائی مراحل میں جبکہ جلد چمک دار سرخ ہوتی ہے، اس دوا کو دیا جاتا ہے۔ چہرے اور سر کا سرخ بادہ جو کہ خصوصاً دائیں جانب ہوتا ہے۔ تیز کانٹے والے درد ہوتے ہیں یا متاثرہ حصوں میں تیلن ہوتی ہے۔ بخار ہوتا ہے اور بعض اوقات ہڈیاں ہوتا ہے۔

ایپس ایم (Apis M): حلق کا سرخ بادہ جس کے ساتھ جسم کے کسی ایک حصہ میں بہت زیادہ سوجن ہوتی ہے یا عمل جراحی کے بعد یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ جس کے ہمراہ متاثرہ حصے پھول جاتے ہیں اور استسقاءئی سوجن ہوتی ہے جو بہت بڑھے ہوئے درد کے ساتھ لاحق ہوتی ہے۔ درد جلن دار اور ذکک لگنے جیسے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ٹھنڈی چیزیں لگانے کی خواہش ہوتی ہے یا متاثرہ حصوں پر ٹھنڈی چیزیں لگانے سے آفاق ہوتا ہے۔ پیشاب جلن دار کم مقدار کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ متواتر البیومن پیشاب کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔

آر سینک البم (Ars Alb): بہت زیادہ نقاہت بے چینی اور جلن دار درد کے ساتھ سرخ بادہ کا اچانک حملہ ہوتا ہے۔ چھوٹے وقلوں کے ساتھ کم مقدار پانی کی شدید پیاس ہوتی ہے۔ مرض ایک حصے سے دوسرے حصے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ استسقاءئی سوجن آتے اور اسہال لاحق ہوتے ہیں۔

بوریکس (Borax): چہرے کا سرخ بادہ اس احساس کے ساتھ کہ جیسے چہرے پر کھڑی نے جلا تا ہوا ہو۔

کنٹھرس (Cantharis): گڑھے دار زخموں کی قسموں والا سرخ بادہ خصوصاً چہرے پر ہوتا ہے جو کہ ناک سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بے چینی جلن اور ذکک لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ جلد کی شدید سوزش لاحق ہوتی ہے اور بڑے بڑے پھالے بننے کا رجحان ہوتا ہے۔ گڑھے دار زخم اکٹھے ہو کر ایک بڑے پھوڑے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔

کروٹیلس ایچ (Crotalus H): نیلا دکھائی دینے والا سرخ بادہ حفاظتی ٹیکے لگوانے کے بعد یا حشرات الارض کے کاٹنے کے باعث لاحق ہونے والے سرخ بادہ کے لئے یہ مفید دوا ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): ٹائیفائیڈ کی علامات کے ساتھ گڑھے دار زخموں والی پھوڑے پھسیں۔ جلد سرخ ہونے کی بجائے سیاہ ہو جاتی ہے۔ ہموار ہونے کی بجائے کھردری ہو جاتی ہے۔ خشک ہونے کی بجائے تر ہو جاتی ہے۔ شدید قسم کی جلن اور خارش ہوتی ہے۔ کمر میں اور ٹانگوں میں درد ہوتا ہے۔ بالوں والے حصوں کے کنارے زیادہ تر متاثر ہوتے ہیں۔ اسہال کے ساتھ بے چینی ہوتی ہے۔ عضلات بندھنوں اور جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے۔

لیکیسیس (Lachesis): جلد کا رنگ گہرا نیلا اور جامنی ہو جاتا ہے۔ قوت حیات کا بہت زیادہ دباؤ لاحق ہوتا ہے۔ دماغی نقاہت ہو جاتی ہے۔ چہرہ پھول جاتا ہے اور سرخ ہو جاتا ہے جبکہ پیلاؤ و ناگام ہو جائے۔ متاثرہ حصوں میں کیسکریں (جسم کا گلنا) ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ غلیاوی ریشے خصوصاً ملوث ہوتے ہیں۔

ایچی نیسیا (Echinacea): پھوڑوں کے رجحان کے ساتھ سرخ بادہ لاحق ہو۔ پھوڑوں میں

درد ہوتا ہے۔ 3x ذائقہ لیوشن کی خوراک قلمروں کی صورت میں دیجئے۔
 ہیمپٹر سلف (Hepar Sulph) : جب پیپ دار اجمار اچھوڑے اٹھیک نہ ہو رہے ہوں حتیٰ کہ پیپ بھی خشک
 چاہئے۔
 سلیشیا (Silicea) : جب پیپ دار اجمار اچھوڑے اٹھیک نہ ہو رہے ہوں حتیٰ کہ پیپ بھی خشک
 ہو چکی ہو تو ایسی صورت میں یہ ایک عمدہ دوا ہوتی ہے۔
 سلفر (Sulphur) : نقل مکانی کرنے والے قسم کے کیسوں میں جو ٹھیک نہ ہوتے ہوں۔ یہ
 ایک مناسب عمل انگیز دوا ہے۔
 گریفائٹس (Graphites) : بار بار لاحق ہونے والے مزمن قسم کے کیسوں کے لئے یہ ایک
 مفید دوا ہے۔
 روٹا اور فاسفورک ایسڈ (Ruta and Phosphoric Acid) : جب سرخ بادہ زخموں
 کے ساتھ ہو تو یہ دوا دی جائے۔

سردی کا کاٹنا — (Frost Bite)

(دیکھئے ”سردی سے جلد کا پھٹنا“)

چکنی (جلد) — (Greasy)

(دیکھئے ”تیل والی جلد“)

سخت (جلد) — (Hard)

انٹیم کروڈ (Antim Crud) : سخت موٹی اور شمد کے رنگ والی جلد، جب مریض بستر میں گرم
 ہو جاتا ہے تو غارش ہونے لگتی ہے۔ دوران شب ابتری ہوتی ہے۔
 ہائیڈرو کوٹائل (Hydrocotyle) : جلد ہاتھی کی جلد کی طرح سے موٹی ہو جاتی ہے۔
 رینن کولس بی (Ranunculus B) : انگیزہ میں جلد موٹی ہو جاتی ہے نیز سخت اور سینک
 دار چھلکے بھی ہوتے ہیں۔

داد — (Herpos)

رشاکس (Rhus Tox) : غارش، جلن اور جھنجھٹ ہٹانے والے دروں کے ساتھ لاحق ہونے
 والی داد کے لئے یہ ایک معمول کی دوا ہے۔ جو اکثر کیسوں کو شفا دینے والی ہے اور مرض کا

طالع بھی اسی دوا سے شروع کرنا چاہئے۔ حجام کی غارش کے لئے یہ دوا استعمال ہوتی ہے جبکہ جلیں یا غارش بھی ہو۔

ریٹین کولس لی (Ranunculus B): جلیں دار، غارش دار اور ٹانگے لگنے جیسے اسونیاں چھینے جیسے دردوں کے ساتھ دار لاحق ہو، غارش بہت زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ چوڑے پھنیوں کے خشک ہو جانے پر ہوتی ہے۔ گڑھے نمایاں مائل رنگ کے ہوتے ہیں۔ کھلی ہوا میں حرکت کرنے سے، مرطوب موسم میں، موسم کی تبدیلی کے وقت یا درجہ حرارت کی تبدیلی سے ابتری ہوتی ہے۔ پھوٹنے سے اور ٹھنڈی ہوا سے حساسیت ہوتی ہے۔

آر سینیکم البم (Arsenicum Alb): جلیں دار اور گولی لگنے جیسے درد کے ساتھ دار لاحق ہوتی ہے۔ رات کے وقت ابتری ہوتی ہے خصوصاً رات بارہ بجے سے صبح چار بجے تک، پھلے ہے اور گھرے ہوتے ہیں جن سے کھرپٹے پر خون برس لگتا ہے، پھوٹے وقتوں کے ساتھ پانی کی تھوڑی مقدار کی پیاس ہوتی ہے۔

مرک سول، نائٹرک ایسڈ، نیٹرم میور (Merc Sol Nitric Acid, Natrum Muri): پیڑوں کی داد، قیام کی غارش۔ بیرونی طور پر فانیٹھ لال لگائی جاسکتی ہے۔

اسٹس کس ایف ایل (Astacus Fli): چھپاکی کی مزمین صورت کے لئے۔ غارش کے ساتھ چھپاکی سارے بدن پر پھیلی ہوتی ہے۔

میزیریئم (Mezereum): پھیلوں کے بیج والے عصب یا آنکھ کے بالائی اعصاب کی بیماری کا دورہ مکمل ہو جانے کے بعد دار لاحق ہوتی ہے۔ درد تیز بجلی کے ٹوندے کی طرح کا ہوتا ہے، بعض اوقات گھس کر سوراخ کرنے جیسا درد ہوتا ہے۔

سیکیوٹا وائروسا (Cicuta Viri): قیام کی غارش، یہ تکلیف شیعہ کرنے کے باعث ہوتی ہے۔ تھوچا (Thuja): بہت بڑھے ہوئے اعصابی درد کے ساتھ دار ہر نہیں ہوتا ہے۔ ایگزیمائی طرح کی یا پھوڑوں جیسی دار ہوتی ہے۔

آئرس ور (Iris Veri): ایگزیمائی جیسی یا دہلیوں جیسی چوڑے پھنیوں کے ساتھ سیاہ قسم کی دار لاحق ہوتی ہے۔

ڈلکامارا (Dulcamara): ٹھنڈ لگ جانے کے باعث اور مرطوب مکانوں میں رہنے کے باعث غریب دار دار لاحق ہوتی ہے۔

کینٹھاریس (Cantharis): بکتران والے اور جلیں دار دردوں کے ساتھ بڑے بڑے پھنلے ہوتے ہیں، یہ دوا اندرونی اور بیرونی دونوں طرح سے استعمال ہوتی ہے۔

پرونس سیائی نو سا (Prunus Spinosa): دار لاحق ہوتی ہے، استسقاء ہوتا ہے، انگلیوں کے

پوروں پر خارش ہوتی ہے، جیسے کہ وہ سردی سے جم گئی ہوں۔
سورینم (Psorinum): داد کی قسم کے پھوڑے پھنسیاں خصوصاً جوڑوں کے مڑنے والے
 حصوں پر اور کھوپڑی پر۔ خارش کے ساتھ بدبو ہوتی ہے۔ قوت حیات کی کمزوری لاحق ہوتی
 ہے۔ پھوڑے پھنسیاں خشک ہوتے ہیں، چھوئے نوک دار نیز پرت دار گڑھوں والی پھنسیاں
 ہوتی ہیں جن کے کنارے سرخ ہوتے ہیں۔ ٹھنڈ میں / بستر کی گرمی سے ابتری ہوتی ہے۔

چھپاکی۔۔۔ (Hives)

(دیکھئے ”پھوڑے پھنسیاں“)

خارش۔۔۔ (Itch)

(دیکھئے ”پھوڑے پھنسیاں“)

زخم کے نشان کے پاس ریشہ دار ابھار۔۔۔ (Keloid)

سلیشیا (Silicea): 200 طاقت کی یہ دوا سب سے پہلے آزمائی جائے۔ چھ مہینے تک یا کم و بیش
 یہ دوا ہر ہفتے دینی چاہئے۔

الیمڈ فلور (Acid Flour): جب سلیشیا ناکام ہو جائے تو یہ دوا 30 طاقت کی روزانہ تین مرتبہ
 دی جاسکتی ہے۔

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): جب مندرجہ بالا ادویات کے استعمال سے افادہ نہ ہوا ہو یا
 بہت کم بہتری ہوئی ہو تو اس دوا کو عمل انگیز کے طور پر دینا چاہئے۔

جدام۔۔۔ (Leprosy)

ہائیڈروکوتائل (Hydrocotyle): اس مرض کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔

بیسیلینم (Bacillinum): یہ دوا 200 طاقت کی ذاتی لیوشن کی صورت میں ہر پندرہ روز کے
 بعد عمل انگیز کے طور پر دینی چاہئے۔ اس دوا کے استعمال سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد
 کوئی دوسری دوا نہیں دینی چاہئے۔

اورم میٹ (Aurum Met): جب تاک سے ایک بدبو دار مادہ خارج ہو تو یہ دوا دی جائے۔

آرسینک آئیوڈ (Arsenic Iod): نیچین کا احساس ہوتا ہے، مریض گندہ دکھائی دیتا ہے،
 انگلیاں اور انگوٹھے سو جاتے ہیں۔ ندرود بڑھ جاتے ہیں۔

ہوانگ نان (Hoang Nan): ہاتھوں اور پیروں میں جھنجھٹا ہٹ اور من ہو جانے کے ساتھ جذام لاحق ہو۔

ہورابراز (Hura Braz): جذام لاحق ہو جبکہ جلد کسی ان دیکھے بندھن کے ساتھ بندھی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

گریفائٹس (Graphites): شکافوں سے چپکنے والا مواد خارج ہوتا ہے۔

انٹیم ٹارٹ (Ant Tart): نیچے جذام میں اندر کی جانب جھک جاتے ہیں۔

تھائیرائیڈسٹیم (Thyroidinum): آشفتگی پھوڑے پھنیوں کے ساتھ جذام لاحق ہو۔ جلد کی پرانی سوزش ہوتی ہے۔ شدید قسم کی سرخی ہوتی ہے اور ٹانگوں پر چھلکے یا پرت ہوتے ہیں۔

برص — (Leucoderma)

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): اس مرض کا علاج اسی دوا سے شروع کرنا چاہئے۔ درج ذیل ادویات کے ساتھ اس دوا کی 200 طاقت کی ایک خوراک ہر ماہ دینی چاہئے۔

آرسینک سلف فلیو (Arsenic Sul Fl): برص کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ یہ دوا طاقتیں بدل بدل کر ڈائی لیوٹن کی صورت میں ایک لمبے عرصہ تک دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے 3x

نرانی ٹوریشن دی جائے اور پھر دو ماہ کے بعد 30 طاقت کی ڈائی لیوٹن دیجئے۔ بشرطیکہ کم درجے کی ڈائی لیوٹن سے مرض میں اتفاق نہ ہو یا کم ہو۔ اگر 30 ڈائی لیوٹن بھی ناکام ہو جائے یا مکمل طور پر دود سے چار ماہ کے دوران شفقت ملے تو پھر ہر ہفتے 200 ڈائی لیوٹن آزمائیں۔

آرسینک الیم (Ars Alb): خنازیر میں جلد کا سفید ہو جانا۔

ایپس ایم (Apis M): بچہ دانی کے استسقاء کے ساتھ جلد سفید ہو جاتی ہے۔ چیت کا بچہ بے ترتیب ہو جاتا ہے، سفید دھبوں کے ارد گرد سرخی ہوتی ہے۔

کلی کارب (Kali Carb): جب جلد دودھ جیسی ہو جائے۔

ہائیڈروکوتا کل (Hydrocotyle): اگر آرسینک سلف فلیو ناکام ہو جائے تو یہ دوا آزمائی جا سکتی ہے۔ اسے نچلے درجے کی طاقتوں میں دینا چاہئے مثلاً 3x یا 30 دن میں تین مرتبہ۔ اس دوا کو لمبے عرصہ کے لئے آزمانا چاہئے۔

بوریکس (Borax): سرخ دھبوں کے ساتھ جلد کا سفید ہو جانا۔

سورسٹیم (Psorinum): جلد پر سفید دھبے ہوتے ہیں جس کے ساتھ بالوں کے کچھے بھی سفید ہوتے ہیں۔ اس دوا سے قدرتی رنگ آ جاتا ہے۔

لیور سپاٹس — (Liver Spots)

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): نیگیبی رنگ کے دھبوں کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے، خصوصاً یہ دھبے پیٹ پر ہوتے ہیں۔

اپیس ایم (Apis M): جسم پر قطعات کی صورت میں ہلکے سفید رنگ کے لیور سپاٹس (Liver Spots) ہوتے ہیں۔

سپیا (Sopia): اگر لائیکوپوڈیم ناکام ہو جائے تو یہ دوا آزمائی جاسکتی ہے۔
پلمبرم (Plumbum): سن یاس کے عرصہ کے دوران یا کثرت حیض میں یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔

میزیریئم (Mezereum): چھاتی اور بازوؤں پر بہت گہرے رنگ کے لیور سپاٹس ہوتے ہیں۔
کیورارے (Curara): پٹے بھورے رنگ کے دھبے (لیور سپاٹس)۔

پچھوا کچھوٹ، چھٹے (Nettlerash)

(دیکھئے ”داد“ اور ”پھوڑے پھندیاں“)

تیل والی (جلد) — (Oily)

برائی اونیا (Bryonia): بہت چکنی جلد ہوتی ہے خصوصاً بال۔ چہرہ زرد ہوتا ہے، پیلا اور سوجا ہوا، استسقاء، گرم اور پُر درد ہوتا ہے۔

مرکیورس سول (Mercurius Soli): مسلسل تر اور چکنی جلد ہوتی ہے۔ بے رنگ، لیس دار، ہیئت اعتدال سے زیادہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت ابتری ہوتی ہے۔

نیٹرم میور (Natrium Mur): جلد چکنی ہوتی ہے، تیل والی ہوتی ہے، خصوصاً بالوں والے حصوں پر چکناہٹ ہوتی ہے۔

پلمبرم (Plumbum): چہرے کی جلد چکنی اور چمکدار ہوتی ہے۔

جلد اترنا — (Peeling Off)

ہیلی پورس (Helleborus): ناخنوں اور بالوں کے گرنے کے ساتھ جلد اترتی ہے۔

انٹھراکسینم (Anthraxinum): بڑے بڑے پرتوں کی صورت میں جلد اترتی ہے۔

آئیوڈیم (Iodium): اس مرض میں جلد اترتی ہے اور پرت یا تھلکے ڈھیلے ہوتے ہیں، چکناہٹ کا اخراج ہوتا ہے۔

مزریع (Mezereum): جلد پر توں کی صورت میں اترتی ہے۔

اپیس ایم (Apis M): استسقالی سو جن کے ساتھ جلد اترتی ہے۔

ایٹیم سیٹروا (Allium Sat): ہاتھوں کی جلد اترتی ہے۔

کھجلی (Psoriasis) —

سلفر (Sulphur): کھجلی کا علاج اسی دوا سے شروع کرنا چاہئے جو کہ CM طاقت میں دینی

چاہئے۔ اس دوا کے استعمال کے پندرہ دن بعد تک کوئی دوسری دوا نہیں دینی چاہئے۔

کالی بروم (Kali Brom): آتشکی کھجلی، جلد ٹھنڈی، تیلی، داغ دار، بھریوں والی ہوتی ہے۔

بڑے بھدے اور بچہ درد پھوڑے ہوتے ہیں۔

کالی آرسینکیم (Kali Arsenicum): کمر، بازوؤں اور کہنیوں سے پھیلتی ہوئی کھجلی کے

قطعہات ہوتے ہیں۔ چھلکے اترنے والی خارش ہوتی ہے۔ چھلکے اتر جانے کے بعد لچے سے جلد

سرخ نکل آتی ہے۔ بازوؤں اور گھٹنوں کی مڑنے والی جگہیں مرجھا جاتی ہیں۔

تھائیرائیڈینم (Thyroidinum): سرد اور کئی خون والے اعضاء میں کھجلی ہوتی ہے۔ جلد

خشک اور کمزور ہوتی ہے۔ ہاتھ اور پاؤں سرد ہوتے ہیں۔

ریڈیم بروم (Radium Brom): دماغ کی کھجلی، کھجلی والی پھوڑے پھنسیاں چہرے پر

ہوتی ہیں۔ جن سے مواد رستا ہے، ماتھے پر سرخ دھبوں کے قطعہات ہوتے ہیں۔ سارے جسم پر

جلن اور خارش کا احساس ہوتا ہے۔

کورلیٹیم ربرم (Corallium Rubrum): ہتھیلیوں اور تلوؤں کی کھجلی۔ مسطح سرخ ناسور

ہوتے ہیں۔ مونگے کے رنگ والے دھبے ہوتے ہیں جو گہرے سرخ رنگ میں بدل جاتے ہیں

اور پھر ان کا رنگ تانبے کی طرح کا ہو جاتا ہے۔

آرسینک بروم (Arsenic Brom): یہ ایک عمدہ دوا ہے اور 3x ذاتی لیوشن کی صورت

میں دینی چاہئے۔

ایسڈ کرائسوفارکیم (Acid Chrysophanicum): اس دوا کو مرہم کے طور پر استعمال کیا

جائے۔ ترکیب اس کی یوں ہے کہ 4 سے 8 گرین اونس ویزلین میں ملا کر بیرونی طور پر لگائی

جائے۔ اندرونی طور پر 3x یا تیسری ذاتی لیوشن کی صورت میں دی جاسکتی ہے۔

آرسینک سلفر ربرم (Ars Sulph Rub): جلدی امراض کے لئے خصوصاً کھجلی اور

انگریما کے لئے بھی مہاسوں اور پھوڑوں کے لئے بھی یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔

سلینینم (Selenium): ہتھیلیوں کی آتشکی کھجلی، ہتھیلیوں میں خارش ہوتی ہے۔ ہاتھ مرجھا

جاتے ہیں، ہاتھوں میں پھاڑنے والا درد ہوتا ہے، اگر اس دوا سے افات نہ ہو تو دیگر ادویات علامات کے مطابق دیجئے۔

ہائیڈرو کوٹائل (Hydrocotyle): جلد کے بہت زیادہ موٹا ہو جانے اور جلد کے اکھڑنے کے ساتھ۔

میزریم (Mezereum): پتھیلیوں کی کھجلی گرمی سے خارش میں ابتری ہوتی ہے۔
پٹرولیم (Petroleum): چھروں کے ساتھ ہاتھوں کی کھجلی ٹھنڈے موسم میں ابتری ہوتی ہے۔

آرسینک البم (Arsenic Alb): ٹھنڈی چیزیں نے سے اور تری سے کھجلی میں ابتری ہوتی ہے، گرمی سے بہتری ہوتی ہے۔ 200 ذائقہ لیوشن کی صورت میں یہ دوا ہر ہفتہ دی جائے۔
آرسینک آیوڈ (Arsenic Iod): ٹھنڈے اور مرطوب موسم میں کھجلی میں بہتری ہوتی ہے یا ٹھنڈی چیزیں لگانے سے بہتری ہوتی ہے۔ گرمی سے ابتری ہوتی ہے۔ ٹھلی طاقت کی خوراکیں دیجئے۔ 6 سے 30 طاقت کی دوا مناسب ہوتی ہے۔ البتہ جب ٹھلی طاقت کے ذائقہ لیوشن تکام ہو جائیں تو اونچی طاقت کے ذائقہ لیوشن مثلاً 100 یا 1000 بھی ممنوع نہیں ہیں۔
منگنیم (Manganum): حیض کے وقت کھجلی ظاہر ہوتی ہے یا کھجلی میں ابتری ہو جاتی ہے، پُر درد شکاف ہوتے ہیں۔

رنگ ورم — (Ringworm)

بیسلی لینم (Bacillinum): رنگ ورم (ایگزیم) کی طرح کی ایک جلدی بیماری جو دائروی قطعات بناتی ہے) کے لئے چوٹی کی دوا ہے اور 200 طاقت میں دینی چاہئے، اسے ہفتے میں صرف ایک مرتبہ دینا چاہئے۔ اگر دو یا تین ہفتوں میں بہتری کی صورت پیدا نہ ہو تو مندرجہ ذیل ادویات آزمائی جائیں۔

سپیا (Sepia): مندرجہ بالا دوا کے تکام ہونے کے بعد اگلی دوا سپیا ہونی چاہئے بشرطیکہ علامات مختلف نہ ہوں جو کہ کسی دوسری دوا کی نشاندہی کریں۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): یہ دوا ٹھنڈے، پیلے، حد سے موٹے اشخاص میں اس مرض کے وقت زیر غور لائی چاہئے۔ ہاتھ اور پاؤں تر رہتے ہیں۔

سلفر (Sulphur): جب رنگ ورم کے ہمراہ تیزابیت، بد ہضمی، ڈکار، بھوک کا جاتے رہنا اور بے چینی لاحق ہو۔

اپیس مل (Apis Mel): خارش اور جلن کے ساتھ رنگ ورم لاحق ہو، ٹھنڈی چیزیں لگانے

سے بھرتی ہوتی ہے۔ 100 یا 1000 ڈائی لیوشن کی ایک خوراک دیجئے۔
ٹیلوریئم (Tellurium): رنگ ورم خصوصاً چہرے پر اور جسم پر لاحق ہو جسم سے بدبو آتی
 ہے۔۔۔ اور بدبودار پیسینہ خارج ہوتا ہے نیز لہسن کی طرح کی بو آتی ہے۔

کھردری (جلد) — (Rough)

سورینم (Psorinum): جلد کھردری ہوتی ہے، شگاف پڑ جاتے ہیں جن سے خون بہتا ہے اور
 پھلکے جھڑتے ہیں، مریض دھونے سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ مریض میلہ، گندا اور غلیظ ہوتا ہے،
 پیسے کہ گندگی سے ڈھکا ہوا ہو۔ نماتے سے اور بستر کی گرمی سے جلد کی تکالیف میں بھرتی ہوتی

سلفر (Sulphur): شگافوں کے بغیر جلد کی خشکی لاحق ہوتی ہے۔

خارش، کھجلی — (Scabies)

(دیکھئے ”پھوڑے پھنیاں“)

سرخ بخار — (Scarlatina)

بیلادونا (Belladonna): سرخ بخار کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ ہموار، سرخ اور چمکدار
 پھوڑے پھنیاں ہوتی ہیں، حلق گرم، خشک اور سرخ ہوتا ہے، معدہ میں بہت زیادہ بھجوان ہوتا
 ہے جس کے باعث متلی اور تھکے ہوتی ہے۔ جسم کا درجہ حرارت اونچے درجے کا ہوتا ہے۔ یہ
 دوا حفظ ماقدم کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔

ایلین تھس گلیٹنڈ (Ailanthus Gland): بہت زیادہ خراش والا نزل ہوتا ہے جبکہ چھپاکی
 باقاعدہ باہر نہیں نکلتی۔ جان لیوا قسم کا بخار ہوتا ہے، منہ اور ناک سے متعفن بو آتی ہے۔ بے
 ہوشی کی حالت ہو جاتی ہے جس سے باہر لانا مشکل ہوتا ہے، قدرتی اخراج دب جاتے ہیں،
 ارشکاز توجہ کی قابلیت نہیں رہتی، یادداشت کھو جاتی ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ سرخ
 بخار کے دب جانے کے بعد ہریان لاحق ہوتا ہے۔

رشاکس (Rhus Toxi): جب باقاعدہ سرخ بخار کے ساتھ گڑھے دار پھوڑے پھنسیوں کا
 بھی اضافہ ہو جائے تو اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ بڑبڑاہٹ والے ہریان کے ساتھ غنودگی
 طاری ہوتی ہے۔ پھوڑے پھنسیاں آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہیں۔

ایپس مل (Apis Mel): یہ دوا صرف اسی صورت میں مفید ہوتی ہے جب گردوں کی تکالیف

کے ساتھ استسقاء کی سوجن ہوتی ہے۔ جلد دھبوں والی سرخ اور سفید قسم کے بدرنگ دلوں ہوتے ہیں۔ چہرہ پیلا اور پھولا ہوا ہوتا ہے، ڈنک لگنے جیسے تیز درد کے ساتھ حلق میں سوجن ہوتی ہے۔ عیاس کا غائب ہو جانا اور گرمی سے تکلیفات میں اضافہ ہو جانا نظر انداز نہیں ہونا چاہئے۔

لیکسیس (Lachesis): خون کی تکلیف اول اور بلقی جھلی دوم، اس دوا کی نمایاں علامات ہیں۔ حلق کی داخلی ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔ ناسلز میں درد ہوتا ہے۔

سکارلینیٹا نم (Scarlatinum): اسے عمل انگیز دوا کے طور پر استعمال کرنا چاہئے۔ نیز سرخ بخار سے حفاظت کے لئے حفظ ماتقدم کے طور پر استعمال کرنا چاہئے۔ 200 ڈائی لیوٹن کی صورت میں استعمال کیجئے۔

زخموں کے نشان — (Scars)

لیکسیس (Lachesis): زخموں کے نشانات جن سے آسانی کے ساتھ خون بہتا ہے اور جو ٹوٹ کر کھل جاتے ہیں۔ سرخ رنگ کے نشانات۔

کالی آیوڈ (Kali Iod): چہرے پر، گردن پر، کھوپڑی پر، سینے پر اور کمر پر چھوٹے پھوڑوں کے بعد زخموں کے نشانات باقی رہ جاتے ہیں۔

دیریولیٹیم 'سرایسینیا پی (Sarracenia P. Variolinum): چہرے پر چھچک کے بعد نشانات باقی رہ جاتے ہیں۔ پندرہ روز کے بعد دیریولیٹیم 200 دیجئے اور سرایسینیا پی IX دن میں دو مرتبہ دیجئے۔ سوائے اس دن کے جب دیریولیٹیم دی گئی ہو۔

کاسٹیکم (Causticum): گہرے زخموں کے نشان، زخم دوبارہ ہرے ہو جاتے ہیں۔

لیسی سین (Lyssin): کتے کے کانٹے کے بعد زخم کا نشان رہ جاتا ہے۔

گرافٹس (Graphites): پرانے سخت زخموں کے نشانات۔

ایسڈ فلوور (Acid Flour): زخموں کے پرانے نشانات جن کے کنارے سرخ ہو جاتے ہیں۔ یہ نشانات گڑھے دار پھنسیوں سے ڈھکے ہوتے ہیں یا گہرے ہوتے ہیں۔

تھائیوسینامینم (Thiosinaminum): زخموں کے ریشموں کو گھلانے کے لئے۔ غدود بڑھ جاتے ہیں۔ چہرے کا دق ہوتا ہے۔ زخموں کے نشانات سکڑے ہوئے اور مسئلے ہوئے ہوتے ہیں۔

فالی ٹولا کا (Phytolacca): جب مندرجہ بالا بات ناکام ہو جائیں تو یہ دوا دی جاتی ہے۔

کروکس (Crocus): پرانے مندمل شدہ زخم بار بار کھل جاتے ہیں اور ان میں پیپ پڑ جاتی ہے۔

سلیشیا (Silicea): پھوڑوں یا دھبوں کے چھوڑے ہوئے زخموں کے نشانات۔

بچوں کی جلد کے ایک حصہ کی سختی

(Scleroma-Neo-Natorum)

ٹیلیس (Lechesis): یہ دوا 200 یا 1000 ذراتی یونٹن کی صورت میں ہفتہ وار یا مہینہ وار دی جاسکتی ہے۔

شکل (سمندر کے کنارے چھوٹے گول پتھر جیسی دوا) Shingles
(دیکھئے "داد")

پٹیاں — (Stripes)
(دیکھئے "دھاریاں")

موٹی (جلد) — (Thickened)
(دیکھئے "سخت جلد")

ناسور — (Ulcers)

سلیشیا (Silicea): ایسے ناسور جو تیزی سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہ دوا ست قسم کے ناسوروں کے ٹھیک ہونے کی رفتار میں اضافہ کرتی ہے۔ گرم پٹیوں سے بہتری ہوتی ہے۔ اندامی مشکل ہوتا ہے۔ گوشت اکڑا ہوتا ہے۔

ایسڈ فلوور (Acid Flour): ٹھنڈی پٹیوں سے ناسوروں میں افادہ ہوتا ہے۔

ہیپرسلف (Herpar Sulph): ناسوروں کو ٹھیک کرنے کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔

گن پائوڈر (Gunpowder): ایسے ناسور جن کا آغاز ٹخنوں کے ارد گرد سے ہوتا ہے اور ٹخنوں کی طرف پھیلتے ہیں۔ ان سے بدبودار پیپ بہتی ہے۔ سو جن کم ہوتی ہے۔ یہ ناسور سرخ اور چمک دار ہوتے ہیں۔

ارانیایڈ (Aranea Diad): متکثرین والے ناسور، جب کلکیریا اور سلیشیا سے مرض میں اضافہ ہو جائے اور آرسینک الیم سے صرف جزوی افادہ ہو تو ارانیایڈ مکمل طور پر شفا دیتا ہے۔ مریض کو جاڑا لگتا ہے اور دن بدل بدل کر ابتری ہوتی ہے۔

ہائیڈراستس کین (Hydrastis Can): گہرے خانے والے اور پھیلتے والے ناسور جلد پر

ہوتے ہیں یا باغی جھلیوں پر ہوتے ہیں۔ جن کے ساتھ جلن ہوتی ہے اور گاڑھی لیس دار پیلے رنگ کی پیپ ہوتی ہے۔

کو موکلا ڈیا ڈینٹا (Comocladia Dentata): سخت کناروں والے ٹاسور، مسک قسم کی پھسیاں ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ سوجن ہوتی ہے۔ شدید خارش ہوتی ہے۔

کاربووتج (Carbo Vegi): جلد کی کھنوں میں ٹاسور ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ پوچھنے والے ٹاسور جن سے بہت زیادہ مقدار میں مسلسل خون بہتا رہتا ہے۔ جلن دار، خارش دار اور پتلا مواد خارج ہوتا ہے۔

سلفر (Sulphur): شدید قسم کی کھلی کے ساتھ ٹاسور ہوتے ہیں۔ شیشی سیکریا (Staphisagria): رکش (سوکھا مسان) والے بچوں کی جلد میں ٹاسوری کیفیت آسانی سے پیدا ہو جاتی ہے۔

نکس موسکا (Nux Moschi): ہسٹریائی مریضوں میں ٹاسوری کیفیت۔ ٹیلم کارب (Nat Carb): پیدل چلنے کے بعد ایزیوں میں ٹاسور ہو جائیں تو یہ دوا دی جاتی ہے۔

سکس کین (Cistus Can): آہستہ آہستہ بننے والے ٹاسور اور گنگرین والے ٹاسور۔ مگرے ٹاسور جو گوشت خور ہوتے ہیں۔ یہ ٹاسور فحشوں کے ارد گرد ہوتے ہیں اور چمک دار ہوتے ہیں۔ ان سے بافراط خارش دار مواد خارج ہوتا ہے۔ نمائے سے ابتری ہوتی ہے۔ کھلی ہوا میں حساسیت ہوتی ہے۔ گرمی سے بہتری ہوتی ہے۔

کالی سلف (Kali Sulph): کئی منہ والے ٹاسور، مریض کھلی ہوا میں بہتری محسوس کرتا ہے۔ کروکس (Crocus): پرانے منہ زخم جو بار بار کھل جائیں اور ان میں پیپ بچ جائے۔ فاسفورس (Phosphorus): ایسے زخم جو ٹھیک ہوتے دکھائی دیتے ہیں لیکن بار بار پھٹ جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں اور ان سے خون بہتا ہے۔ جلد پر سکری سی ہم جاتی ہے۔ جلد میں جلن ہوتی ہے۔

پائونیا (Paeonia): جوتوں کے کانٹے کے باعث لاحق ہونے والے ٹاسوروں کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔

ٹیرنٹولا کیوب (Tarentula Cub): مسک قسم کے گنگرین والے ٹاسور، گوشت خور پھوڑوں اور عام پھوڑوں کے لئے بھی یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔ جب سلیشیا ٹاکام ہو جائے تو یہ دوا دوبارہ پیپ پڑنے کے عمل کو روکتی ہے۔

کونڈوراگو (Condurango): گندی بو کے ساتھ ٹاسور، پتلا مواد رستا ہے۔ خدی قسم کے

اور پرالے ناسور ہوتے ہیں۔ گوشت اکڑ جاتا ہے یا کھریز بن جاتا ہے۔
 اوجیم (Opium): ایسے ناسور جو مطلقاً بے درد ہوتے ہیں جو کہ مندرجہ نہیں ہوتے اور ٹھیک
 نہیں ہوتے یا پھیلتے بھی نہیں ہیں۔ متاثرہ حصوں کی بے حس لاحق ہوتی ہے۔ جو کہ اونچے
 درجے کی سوزش میں جھلا ہوتے ہیں۔
 سنٹی کیولا (Sanicula): انگوٹھوں کے درمیان ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔

پتی (Urticaria)

(نیز دیکھئے ”پھوڑے“ پھنسیاں“)

ایپس ایم (Apis M): پتی اچھلنے کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ بہتری گرمی سے ابھری ہوتی ہے۔
 خارش اور جلن ہوتی ہے لیکن پیاس نہیں ہوتی۔ دائروی سوجن ہوتی ہے جو کہ سرخ یا ہلکی ہو
 سکتی ہے جس کے ساتھ شدید خارش ہوتی ہے۔ 1x یا 6th ذاتی لیوشن دیجئے۔
 اریکا پورینس (Urtica Urens): جب ایپس ناکام ہو جائے تو اس دوا کو آزمانا چاہئے۔ اس
 کی علامات ایپس کی علامات سے مماثل ہوتی ہیں سوائے اس کے کہ اس میں پیشاب متواتر آتا
 ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): معدوی علاقہ کی پھیپاکی کا بہترین علاج کرتی ہے۔ تھوڑے اور اسال کے
 ساتھ پتی اچھلنا لاحق ہوتا ہے۔

انٹیم کروڈ (Antim Crud): جب معدوی نزلہ کے باعث پتی اچھلتی ہو یا تیزابیوں کے استعمال
 کے باعث پتی اچھلنے کا مرض لاحق ہو۔ گرمی سے ابھری ہوتی ہے۔

اسٹاکس فلیو (Asterac Fl): پتی اچھلنے کی مزمن صورت سارے جسم پر خارش کے ساتھ
 پھیپاکی ہوتی ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): جلن اور خارش کے ساتھ پتی اچھلتی ہے۔ حرارت اور گرمی سے
 بہتری ہوتی ہے۔ کپڑے اتار پھینکنے سے جلن اور خارش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

نیشرم میور (Nat Mur): قبض اور نمیالی رنگت والی جلد کے ساتھ خمدی قسم کے کیسوں میں
 یہ دوا دی جاتی ہے۔

ریڈیم (Radium): رات کے وقت سارے جسم پر خارش ہوتی ہے۔ جلد آگ کی طرح جلتی
 ہے۔

ڈولکامارا (Dulcamara): سارے جسم پر پتی اچھلتی ہے۔ کھانے کے بعد جلن دار خارش
 ہوتی ہے۔ گرمی میں ابھری ہوتی ہے اور سردی میں بہتری ہوتی ہے۔ حیض سے پہلے پھیپاکی نکلتی

آرسینک البم (Arsenic Alb): جب چھوٹے وقفوں کے ساتھ پانی کی تھوڑی تھوڑی مقدار کی پیاس ہو تو اس دوا کے متعلق سوچنا چاہئے۔ خصوصاً جب گھونگا پھلی کھانے کے باعث یہ تکلیف لاحق ہو۔ دائروی خارش ہوتی ہے۔ جلن شدید قسم کی ہوتی ہے۔ ساحل سمندر پر پتی اچھلنا لاحق ہوتا ہے۔

کیل — (Warts)

(نیز دیکھئے "مفرقات" کے ذیل میں "مے")

تھوجا (Thuja): تل یا کیل ہوتے ہیں۔ اعضائے قائل پر یا اعضائے قائل کے قریب کیل وغیرہ ہوتے ہیں۔ 200 طاقت کی دوا دن میں دو مرتبہ صبح شام دی جائے۔
کاسٹیکم (Causticum): چرے، ہاتھوں یا آنکھوں پر کیل ہوتے ہیں۔
ڈلکامارا (Dulcamara): لمبے گوشت والے اور ہموار یا چھنے کیل ہوتے ہیں۔ یہ آنکھوں پر چرے پر یا انگلیوں پر ہو سکتے ہیں۔
سٹیفیسیا (Staphisagria): کیل، مے۔ اعضائے قائل والے کیل اور پھول کو بھی کی طرح کے اگڑے ہوتے ہیں۔ ہر ہفتے 200 طاقت کی دوا دیجئے۔

بیسری — Whitlow

(نیز دیکھئے "پھوڑے")

مائرسٹیکا (Myristica): بیسری کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ یہ دوا پیپ بننے کے عمل کو تیز کرتی ہے اور تیزی سے اسے خارج کرتی ہے۔
ہیپرسلف (Hepar Sulph): یہ دوا بیسری کے پھٹنے کے بعد دینی چاہئے۔ یہ بیسری کو شفا دینے میں مدد دے گی۔ ناخنوں کی جڑوں کے گرد اور انگلیوں کے سروں پر تنگی ہوتی ہے۔ ناخنوں میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ ناخن ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور اکھڑ جاتے ہیں۔
سلیشیا (Silicea): جب ہیپرسلف ناکام ہو جائے یا جب شفا یابی میں رکاوٹ آ جائے تو یہ دوا دینی چاہئے۔

لیڈم پال (Ledum Pal): سوئی چبھ جانے کے باعث بیسری لاحق ہو۔

ڈائیوسکوریہ (Dioscorea): یہ دوا بھی بیسری میں مفید ہے۔

ایلیئم سیپا (Allium Cepa): جب دیگر ادویات ناکام ہو جائیں تو اسے آزمانا چاہئے۔

گنجاپن — (Baldness)

(دیکھئے ”بالوں کا گرنا“)

سکری — (Dandruf)

سینی کیولا 200 (Sanicula 200): کھوپڑی پر آنکھ کی بھنوں پر اور دیگر بالوں والے حصے پر پرت دار سکری ہوتی ہے۔ ہر ہفتے ایک خوراک دیجئے۔

فاسفورس 200 (Phosphorus 200): سکری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بالوں سے باقراہ سکری گرتی ہے۔ جیسا کہ بادل ہوتے ہیں۔ بالوں کے کچلے کچلے گرتے ہیں۔ کھوپڑی پر خارش ہوتی ہے۔

گرافٹس (Graphites): داد والی سکری ہوتی ہے۔ (ایسی سکری جس کے ساتھ ایگزیمایا پھوڑے پھنسی وغیرہ ہوتے ہیں) بے چین کر دینے والی خارش اور مرطوب قسم کی پرت دار سکری ہوتی ہے۔ بال گرتے ہیں۔ چاند پر جلن ہوتی ہے۔

کلکیریا سلف (Calcarea Sul): کھوپڑی پر سکری ہوتی ہے۔ جس کے باعث مونے پیلے رنگ کے چھلکوں کے ساتھ پھوڑے پھنسیاں ہو جاتی ہیں۔ ایگزیمایا لاحق ہوتا ہے۔ سکری کے باعث مساتے بھی لاحق ہو جاتے ہیں۔ بال گرتے ہیں۔

تھوجا (Thuja): سفید رنگ کی پرت دار سکری، بال خشک ہوتے ہیں اور گرتے ہیں۔ سیپیا (Sepia): دائروں کی صورت میں سکری ہوتی ہے جیسا کہ گول کیزے ہوتے ہیں۔ کھوپڑی مرطوب دار ہوتی ہے۔ بال گرتے ہیں۔ ماتھے پر بالوں کے قریب مساتے ہوتے ہیں۔

کاربونیئم سلف (Carboneum Sul): کھوپڑی پر سکری ہوتی ہے۔ پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں۔ چھلکے ہوتے ہیں۔ ایگزیمایا لاحق ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے۔ مرطوب پرت دار مساتے ہوتے ہیں۔ دکھن اور درد ہوتا ہے۔

سورنیم (Psorinum): بدبو دار سکری ہوتی ہے۔ نیٹرم میور (Natrum Mur): سفید سکری ہوتی ہے جس کا تاول نزلے سے یا قوت شکر کے کھو جانے سے ہوتا ہے۔

سلفر (Sulphur): جب اچھی منتخب شدہ ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ آرسینک البم (Arsenic Alb): کمزور مریضوں میں ایسے مریضوں میں جن کی جلد خوش نما ہوتی ہے۔ کھوپڑی پر ناقابل برداشت خارش ہوتی ہے۔ ننگے حصوں پر دائری قلععات ہوتے ہیں۔ خشک چھلکے ہوتے ہیں۔ رات کے وقت جلن اور خارش ہوتی ہے۔

ایسڈ فلور (Acid Flour): کھوپڑی پر خشک بھوسی ہوتی ہے نیز بھجانی کیفیت ہوتی ہے۔ بال گر جاتے ہیں۔

میزیریئم (Mezereum): بہت زیادہ خارش اور بالوں کے گرنے کے ساتھ سکری ہوتی ہے۔

بالوں کا گرنا (Hair-Falling of)

تھوجا (Thuja): ریت دار سفید رنگ کی خشک سکری کے باعث بال گر جاتے ہیں۔
گرافائٹس، اینٹرن تھیرم (Anantherum, Graphites): واڑھی کے بال اور بھنوں کے بال گر جاتے ہیں۔

سٹنگورس (Sphingurus): بالوں کا گرنا خصوصاً واڑھی کے اور مونچھوں کے بال گر جاتے ہیں۔

اسٹیلگوایم (Ustilago M): آتشک کے باعث کھجپن لاحق ہوتا ہے۔ بال گر جاتیں گے اور پھر نہیں اگیں گے۔

وائٹ بیڈن (Wiesbaden): اس دوا کے استعمال سے بال تیزی کے ساتھ اگیں گے اور سیاہ ہو جائیں گے۔ 200 ملاقات کی خوراک دیجئے۔

کالکیریا فاس (Calcarea Phos, Phosphorus): بال پٹھوں کے کھکھے کرتے ہیں۔ جس سے ادھر ادھر قطعات خالی جلد کے بن جاتے ہیں۔ دی گئی ترتیب کے مطابق ادویات آزمائیں۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): سر سے بالوں کا گرنا نیز آنکھوں کی بھنوں سے بالوں کا گرنا۔ آنکھوں کی پٹھوں کے بال اور اعضاءے حاصل کے بال گر جاتے ہیں۔ غم کے باعث بالوں کا گرنا لاحق ہوتا ہے۔

سلینینم (Selenium): سارے سر سے بال گر جاتے ہیں اور کھوپڑی ہموار اور بالوں کے بغیر صاف شفاف ہو جاتی ہے۔ ابروؤں کے بال گر جاتے ہیں اور چہرہ عجیب و غریب ہو جاتا ہے۔
ایومینا (Alumina): کھوپڑی پر سے بال بہت زیادہ مقدار میں گر جاتے ہیں چنانچہ کھوپڑی جگہ جگہ سے نکلی ہو جاتی ہے۔ تمام جسم پر سے پٹھوں سمیت بالوں کا گرنا لاحق ہوتا ہے۔

ایسڈ فلور (Acid Flour): آتشک کے باعث بالوں کا گرنا لاحق ہو۔ بال خشک ہوتے ہیں۔ الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بال پھٹ جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ بالوں کے کھکھے بن کر الجھ جاتے ہیں اور ان میں چمک نہیں ہوتی۔

نایٹرم میور (Natrium Mur): حمل میں بالوں کا گرنا مزمن درد سر کے بعد بال گر جاتے

ہیں۔
لیکسیس (Lachesis): دورانِ حمل بالوں کا گرنا لاحق ہوتا ہے۔
بوریکس (Borax): بال کھردرے اور سخت ہوتے ہیں۔ کشمشی سے ہموار نہیں ہو سکتے۔
 بالوں کے سرے آپس میں الجھ جاتے ہیں اور جڑ جاتے ہیں۔ اگر بالوں کے ان پکھوں کو کاٹ دیا جائے تو یہ دوبارہ بن جاتے ہیں۔
پلساٹیلہ (Pulsatilla): آنکھوں میں بال ہونے کا احساس۔
نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid): بال باافراط گرتے ہیں خصوصاً چاند سے۔ جس کے ساتھ پھوڑے پھنسیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ کیفیت آتشک، اعصابی درد سر، کمزوری یا نقہہت کے باعث ہو سکتی ہے۔ کھوپڑی حساس ہوتی ہے۔
وائیکا مینور (Vinca Minor): جلد پر خارش ہونے کے ساتھ بالوں والے حصے بالکل صاف شفاف ہو جاتے ہیں یعنی بال گر جاتے ہیں۔ رطوبت رستی ہے۔ بال آپس میں الجھ جاتے ہیں۔ کھجائے کی نہ رکنے والی خواہش ہوتی ہے۔
امونیم میور (Ammonia Mur): سکری کے ساتھ بالوں کا گرنا۔
مینسی نیلا (Mancinella): شدید قسم کے حاد امراض کے بعد بال گر جاتے ہیں۔
کالی کارب (Kali Carb): آنکھوں کی بھنوں سے بالوں کا گرنا لاحق ہوتا ہے۔
رسناکس (Rhus Tox): پٹلوں کے بال گر جاتے ہیں۔
مرکیوریس (Mercurius): آتشک کے باعث بالوں کا گرنا۔
سلفر (Sulphur): ہمت ہی بے قاعدہ بال۔۔۔ ریتکے بال، سخت اور بغیر پتک والے بال۔۔۔ یہ بال ہر سمت کو اگتے ہیں۔
میڈورینم (Medorrhinum): کھوپڑی پر خارش کے ساتھ بالوں کا گرنا لاحق ہوتا ہے۔ ساحل سمندر پر بہتری ہوتی ہے۔
سپیا (Sepia): موقوفی حیض اور حمل کے دوران بالوں کا گرنا لاحق ہوتا ہے۔ درد سر کے دوران بال گرتے ہیں۔ مباشرت کی خواہش نہیں ہوتی۔

بالوں کا اگاؤ — (Hair Growth)

تھوچا (Thuja): ایسی جگہوں پر بال بہت زیادہ مقدار میں اگتے ہیں جہاں قدرتی طور پر عموماً بال نہیں ہوتے۔ IM طاقت کی ایک خوراک ہر ماہ دی جائے۔
اولیم جیکو (Oleum Jac): یہ دوا گرمیوں میں 30 طاقت میں دی جا سکتی ہے اور سردیوں

میں تھو جا IM کے ساتھ دن میں 3 مرتبہ 3x طاقت میں دی جا سکتی ہے۔ تھو جا دینے کے 2 دن پہلے یا 2 دن بعد تک یہ دوا نہیں دی جا سکتی۔
نوٹ: آر سینک کا زرد سفید اور ان بجھا چونا ہم مقدار لے کر گرم پانی میں ملا کر مرہم تیار کر لیں۔ چہرے پر اس مرہم کو لگا کر خشک ہونے دیں۔ کئی ہفتوں تک چہرے پر کوئی بال نظر نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے کبھی بھی نظر نہ آئے۔

قبل از وقت بالوں کا سفید ہونا

(Hair- Premature Grey)

تھائی رائیڈین (Thyroidin): علاج اسی دوا سے شروع کرنا چاہئے۔ ایک ماہ تک دن میں 3 مرتبہ 30 طاقت کا ڈائی لیوشن دینا چاہئے اور بعد میں 200 ڈائی لیوشن کی خوراک ہر ہفتے ایک ماہ تک دینی چاہئے۔

ایسڈ فاس 'لائیکو پوڈیم' وائز بیڈن (Wiesbaden, Lycopodium, Acid Phos): یہ ادویات 200 ڈائی لیوشن کی صورت میں بدل بدل کر ہر ہفتے تقریباً چھ ماہ تک دینی چاہئیں۔
پائیلو کارپنی نم (Pilocarpinum): 1000 ڈائی لیوشن کی صورت میں اس دوا کو آزمانا چاہئے۔ بشرطیکہ مندرجہ بالا دیگر ادویات ناکام ہو جائیں۔ خوراک ہر ماہ دہرائی جائے۔
نیرم میور 'فاسفورس' (Phosphorus, Natrum Mur): تھکا دینے والی بیماریوں کے باعث بالوں کا رنگ بھورا ہو جاتا ہے۔ (یا سفید ہو جاتا ہے) یہ ادویات ہر ہفتے 200 ڈائی لیوشن میں بدل بدل کر دی جائیں۔

آر سینک ہائیڈ (Ars Hyd): اعضاء کی مرگی کے باعث بالوں کا برف کی طرح سفید ہو جاتا۔
نکس وامیکا (Nux Vom): بال سفید ہو جاتے ہیں۔ (رحم کا اعصابی درد)

حصہ سوم۔۔۔ ناخن

عمومی تکلیفات (Affections in General)

تھو جا (Thuja): انگلیوں کے ناخن بیمار ہو جائیں، ساتھ میں بد بلیت ہو جائیں، موی ناخن۔
مارس ٹیکا میبی فیرا (Myristica Sebilera): سوجن کے ساتھ انگلیوں کے ناخنوں میں درد ہوتا ہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): ناخن گوشت میں گھس جاتے ہیں جو کہ ناہموار

مڑے تڑے اور بے قاعدہ ہوتے ہیں۔
سلیشیا (Silicea): انگوٹھے کے ناخن اندر کی جانب اگتے ہیں۔ بدہمت ہوتے ہیں۔ یہ دوائے نئے ناخن اگانے کی تحریک پیدا کرتی ہے۔
فلورک الیڈ (Fluoric Acid): ناخنوں میں پہاڑی نما چرے سین پڑ جاتی ہیں۔
کریفائٹس (Graphites): جب ناخن مونے ہو جائیں۔ ناخن سینگوں کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔
ایپس ایم (Apis M): ناخنوں کے نیچے خون جم جاتا ہے۔
کاسٹیکم (Causticum): ناخن اندر کی جانب اگتے ہیں۔ جب سلیشیا تکام ہو جائے تو یہ دوا دی جائے۔
لکسیس (Lachesis): ناخن اندر کی جانب اگتے ہیں۔ گوشت سخت ہو جاتا ہے۔ ناخن جامنی رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ ناخنوں میں ذکک لگتے ہیں۔
میگنیٹس پولس آسٹ (Magnetis Polus Aust): ناخن کی اندرونی جانب دکھن والا درد ہوتا ہے جیسے کہ ناخن گوشت کے اندر آگ آیا ہو۔ چھوٹے سے بہت زیادہ درد ہوتا ہے انگوٹھوں اور ناخنوں کے جوتے سے دبنے کے باعث درد ہوتا ہے۔

ناخنوں کا لٹکنا (Hang Nails)

نیٹرم میور (Natrur Mur): انگلیوں کے ناخنوں کی گرد خشکی اور شکاف ہوتے ہیں۔ انگلیوں میں من ہوتا اور جھنجھناہٹ ہوتی ہے۔ بازوؤں اور گھٹنوں میں کمزوری ہوتی ہے۔ نچلا ہونٹ وسط سے پھٹ جاتا ہے۔ پتی اچھلتی ہے۔
سلفر (Sulphur): خشک چھلکوں والی غیر صحت مند جلد 'خارش ہوتی ہے اور جلن ہوتی ہے۔ کھانے سے اور دھونے سے اتھری ہوتی ہے۔ پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں اور ناخنوں کی جڑوں میں جھپ پڑ جاتی ہے یا کپکپاتے ہیں اور گرم پسینے آتے ہیں۔
کالکیریا کارب (Calcareia Carb): غیر صحت مند جلد 'ناسوری کیفیت آسانی سے پیدا ہو جاتی ہے۔ پھوٹے پھوٹے زخم آہستہ آہستہ مندمل ہوتے ہیں۔ کیل اور یونیاں ہوتی ہیں۔ پاؤں ٹھنڈے مرطوب ہوتے ہیں۔ رات کے وقت ٹھنڈے اور مردہ محسوس ہوتے ہیں۔

پھٹنے والے اور دھبوں والے ناخن (Splitting & Spotted Nails)

انٹیم گروڈ (Antim Crud): ناخن بھر بھرے ہوتے ہیں۔ غیر مناسب شکل میں اگتے ہیں۔

ہاتھوں پر اور پاؤں کے ٹکڑوں میں سیتک دار کیل ہوتے ہیں۔ جلد خشک ہوتی ہے۔ بستر میں گرم ہونے پر خارش ہوتی ہے۔ زبان بہت زیادہ پر بیجان ہوتی ہے اور اس پر سفید موٹا طبع ہوتا ہے۔ گرمی سے اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہانے سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

سیلیشیا (Silicea): انگلیوں کے ناخنوں کی تکلیفات خصوصاً جب ناخنوں پر سفید رنگ کے دھبے ہوتے ہیں۔ پاؤں خشک اور ٹھنڈے ہوتے ہیں اور ان پر پھیند آتا ہے۔ ناخن بے ڈھنگے ہوتے ہیں۔

الیومینا (Alumina): ناخن بھر بھرے ہوتے ہیں۔ انگلیوں کے ناخنوں کے نیچے کترنے کا احساس ہوتا ہے۔ جلد خشک ہوتی ہے اور آسانی سے پھٹ جاتی ہے۔ بستر میں گرم ہونے پر خارش ہوتی ہے۔ انگلیوں کی جلد بھر بھری ہو جاتی ہے۔ قبض ہوتی ہے۔

ایسڈ نائٹریک (Acid Nitric): ناخن ٹھنڈے اور ٹپے ہوتے ہیں۔ ہاتھوں پر کیل ہوتے ہیں جن سے دھونے پر خون بہتا ہے۔ شور سے 'درد سے اور چھونے سے حساس ہوتے ہیں۔

تھوجا (Thuja): ناخن نرم اور بھر بھرے ہوتے ہیں 'پھٹ جاتے ہیں۔ ہاتھوں پر اور بازوؤں پر بھورے داغ ہوتے ہیں۔ جلد چکنی ہوتی ہے۔ بالوں میں سکری ہوتی ہے۔ پھیند مینھا اور تیز بو والا ہوتا ہے۔

گرافٹائٹس (Graphites): ناخن موٹے اگتے ہیں۔ پھٹ جاتے ہیں اور ان کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ مریض اداس ہوتا ہے۔ ناامید ہوتا ہے 'روتا ہے' صرف موت سے متعلق سوچتا رہتا ہے۔

ہیلے بوریس (Helleborus): جلد اترنے کے ساتھ ناخنوں کا گر جانا لاحق ہوتا ہے۔

الیومینا سیلیکیٹ (Alumina Silicate): ناخنوں کا بھر بھرا ہو جانا۔ ہاتھ مستقل پھٹتے رہتے ہیں۔ ہاتھوں اور پاؤں میں برقی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ ناخنوں کے ساتھ ساتھ سوزش ہوتی ہے۔

ایسڈ فلوئورک (Acid Fluoric): ناخن مزے مزے ہوتے ہیں۔ ناخنوں میں لمبائی کے رخ پر بھریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ناخن بہت تیزی سے اگتے ہیں اور بد وضع ہو کر اگتے ہیں کیونکہ وہ بد نیت اور مزے مزے ہوتے ہیں۔ بعض جگہوں پر بہت موٹے اور بعض جگہوں پر بہت پتلے ہوتے ہیں۔ بہت جلد ٹوٹ جاتے ہیں اور بھر بھرے ہوتے ہیں۔



حمیات (Fevers)

عام بخار — (Fever-General)

اکونائٹ این (Aconite N): اونچے درجے کا بخار ہوتا ہے۔ بے چینی ہوتی ہے۔ زیادہ مقدار میں پانی کی پیاس بہت شدید ہوتی ہے۔ چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا لگ جاتی ہے۔ یہ دوا صرف ابتدائی مراحل میں دینی چاہئے۔

بپٹیشیا (Baptisia): پیاس اور بھوک کے ساتھ بخار لاحق ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سارے جسم میں گرمی محسوس ہوتی ہے۔ بے چینی ہوتی ہے یا بستر پر پلو بدل رہتا ہے۔ مریض باتونی ہوتا ہے جبکہ بخار کا درجہ حرارت بلند ہو جائے۔ اس حال متعفن ہوا لے ہوتے ہیں۔ گرمی بے ہوشی کے ساتھ بخار کا تبادلہ ہو سکتا ہے۔

بیلادونا (Belladonna): چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ چہرے پر چمک اور سرخی ہوتی ہے۔ بخار اونچے درجے کا ہوتا ہے۔ پیاس نہیں ہوتی۔ مریض خاموش رہنا چاہتا ہے۔ یہ اس دوا کی نمایاں علامات ہیں۔ درد سر ہوتا ہے۔ خون کی ٹالیوں میں جھکن ہوتی ہے۔ دھوپ میں کام کرنے کے باعث یا پیدل چلنے کے باعث بخار لاحق ہوتا ہے۔

جلسمی میم (Gelsemium): چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ چہرے کا رنگ گہرا ہوتا ہے۔ گردن کی گدی سے شروع ہو کر درد سر تک چلا جاتا ہے۔ پیاس نہیں ہوتی اور مریض خاموش لیٹ جانا چاہتا ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vom): مریض جاڑا محسوس کرتا ہے حتیٰ کہ دن کے گرم ترین حصے میں بھی۔ حالانکہ جاڑا محسوس کرتا ہے لیکن کپڑے اتار دینا چاہتا ہے۔ ضدی قسم کی تکلیف ہوتی ہے۔ منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ بخار دس سے گیارہ بجے دن کے دوران زیادہ ہو جاتا ہے۔

آرسینک البم (Arsenic Alb): بے چینی کے ساتھ بخار لاحق ہو۔ چھوٹے چھوٹے وقفوں کے ساتھ تھوڑی تھوڑی مقدار پانی کی پیاس ہوتی ہے۔ کمزوری اور نفاہت ہوتی ہے۔ کچکپاہٹ

ہوتی ہے اور جاڑا لگتا ہے اور اس میں بہت زیادہ شدت ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے خون کی ٹالیوں میں دوڑنے والا خون نہیں بلکہ برف کا پانی ہو۔ گرمی محسوس ہونے کے مرحلہ کے دوران یوں محسوس ہوتا ہے جیسے خون کی ٹالیوں میں ابلتا ہوا پانی دوڑ رہا ہو۔

برائی اونیا (Bryonia): خشک کھانسی۔ سارے جسم میں درد کے ساتھ بخار لاحق ہوتا ہے۔ مریض خاموش لیٹ جانا چاہتا ہے۔ کسی شخص سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ سبب و قفوں کے ساتھ بڑی مقدار میں پانی کی پیاس ہوتی ہے۔

ٹرائی اوکسیم (Triosteum): معدوی (ٹیس والا) یا ٹائیٹائیڈ بخاروں کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ یہ تمام بخاروں کے لئے خصوصی طور پر کام آتی ہے۔

کیلڈیم (Caladium): ہر شام مریض دوران بخار سو جاتا ہے اور بخار اترنے کے بعد جاگتا ہے۔

نکٹین تھس (Nyctanthes): قے کے ساتھ صفراوی بخار ہوتا ہے۔ معدہ میں جلن ہوتی ہے۔ منگی ہوتی ہے۔ جاڑے کے ساتھ شدید قسم کی پیاس ہوتی ہے۔ وقفہ وار بخار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ استسقاءی سوجن ہوتی ہے۔

اگنیشیا (Ignatia): جاڑے کے دوران پیاس اور جاڑے کے علاوہ کسی دوسرے مرحلہ میں پیاس نہ ہونے کے ساتھ بخار لاحق ہو۔ بیرونی گرمی سے جاڑے میں افادہ ہوتا ہے۔ بیرونی طور پر مریض کو ڈھانپنے سے گرمی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جاڑے کے دوران چہرہ سرخ ہوتا ہے۔

الستونیا (Alstonia): اسال کے ساتھ ست بخار۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): ہلکی قسم کا بخار۔

کیڈمیم سلف، کروٹیلس ہوور (Crotalus Hor, Cadmium Sulph): شدید قسم کی قے اور منگی کے ساتھ زرد بخار ہوتا ہے۔

ایسٹک ایسڈ (Acetic Acid): رات کے پینے کے ساتھ ست بخار ہوتا ہے۔ جلد ٹھنڈی ہوتی ہے۔

ایبیس کین (Abies Can): ٹھنڈے سے سارے بدن میں کپکپاہٹ ہوتی ہے۔ جیسے کہ ٹون برقیے پانی میں تبدیل ہو چکا ہو۔ جاڑا کمر میں نیچے کی طرف جاتا ہے۔

سورینم (Psorinum): بخاروں میں یہ دوا دی جاتی ہے جبکہ حرارت اور پسینہ شدید ہوتا ہے۔ بخاروں میں ابلتا ہوا پسینہ ہوتا ہے جیسے کہ گرم بھاپ نکلتی ہے۔

ایپس ایم (Apis M): خشک حرارت اور پسینے کے ساتھ اولٹے بدلنے کی کیفیت کے ساتھ بخار، کالا زار بخار جس کے ساتھ تلی ہو جاتی ہے۔ پیاس کے ساتھ یا بغیر پیاس کے ساتھ۔

آبلے — Blisters (Hydora)

نیزرم میور (Natrum Mur): بخار کے آبلوں کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ اسے مرض کے کسی بھی مرحلہ میں دیا جاسکتا ہے لیکن اگر یہ افادہ دینے میں ناکام ہو جائے تو دیگر ادویات آزمائی جائیں۔ وقفہ دار بخاروں میں یہ دوا دی جاتی ہے۔

اگنیشیا (Ignatia): وقفہ دار بخار ہوتے ہیں۔ جب نیزرم میور ناکام ہو جائے تو یہ دوا دینی چاہئے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): ٹائیفائیڈ بخار میں پرت دار آبلے ہوتے ہیں۔
لیکٹک ایسڈ (Lactic Acid): سرخ بنیاد والی گڑھے دار پھٹیوں کے ساتھ آبلے ہوتے ہیں۔

ہیپر سلف (Hepar Sulph): کیل ماسے ہوتے ہیں۔ جن میں دکھن ہوتی ہے اور تیز درد ہوتا ہے۔ سفید پھوڑے ہوتے ہیں جو اندر سے سرخ ہوں۔

سیلیشیا (Silicea): کانوں سے مواد خارج ہونے کے ساتھ پرت دار آبلے (یا پھوڑے) ہوتے ہیں۔

رٹاٹکس (Rhus Tox): بخار والے آبلے ہوتے ہیں۔

بپٹیشیا (Baptisia): پھول مانا (ٹائیکس) میں گندے آبلے ہوتے ہیں۔

گردن توڑ بخار

(Cerebro Spinal Meningitis)

(نیز دیکھئے "گردن توڑ بخار" "اعصابی نظام" کے قیل میں)

لاکڑا کا کڑا — (Chicken Pox)

وریولیئم (Variolinum): یہ دوا علاج کے آغاز میں دینی چاہئے۔ 200 طاقت کی صرف ایک خوراک دیجئے۔ اس دوا کا دیا جانا لازمی ہے کیونکہ یہ دوا مرض کے دوران ہیہ کو مختصر کر دیتی ہے۔
انٹیم ٹارٹ (Antim Tort): وریولیئم دینے کے 48 گھنٹوں کے بعد اس دوا کو شروع کرنا چاہئے۔ یہ دوا ہر دو گھنٹوں کے بعد دینی چاہئے۔ یہاں تک کہ بخار جاتا رہے۔

برائی اونیا (Bryonia): اگر بخار اور خشک کھانسی ہو تو یہ دوا دینی چاہئے۔ مریض خاموش لینے رہنا پسند کرتا ہے۔

مرک سول (Merc Sol): بخار چلے جانے کے بعد اس دوا کے متعلق سوچنا چاہئے۔
کلیمریا فاس (Calcarea Phos): لاکڑا کا کڑا، چھچک اور خسرہ کے بعد لاحق ہونے والی کمزوری کے لئے اسے مقوی دوا کے طور پر دینا چاہئے۔

ڈینگو (کمر توڑ بخار)

Dengue (Breakbone Fever)

برائی اونیا (Bryonia): سارے جسم میں درد ہوتا ہے۔ لیکن ہڈیوں کے اندر گہرائی میں نہیں ہوتا۔ مریض خاموش لیٹتا چاہتا ہے۔ لمبے وقفوں سے زیادہ مقدار میں پانی کی پیاس ہوتی ہے۔
یوپیٹو ریم پرف (Eupat Perf): کمر توڑ بخار کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ درد گہرائی میں ہڈیوں کے اندر تک پایا جاتا ہے۔
رشاکس (Rhus Tox): کمر توڑ بخار میں اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے جبکہ عضلات میں درد ہو۔

خناق — (Diphtheria)

(دیکھئے "ناک، گلا، حلق اور جھجھ" کے ذیل میں "خناق")

سرخ بادہ — (Erysipelas)

(دیکھئے "جلد" کے ذیل میں "سرخ بادہ")

ہائی پرپائی ریکسیا (جسم کا بہت شدید بخار)

(Hyperpyrexia)

بیلادونا (Belladonna): متقابل خون میں زہریلے مادے کی عدم موجودگی کے ساتھ اونچے درجے کے بخار کا مرحلہ، جلن دار، چہن والی بھاپ نکلتی حرارت ہوتی ہے۔ بازو اور ٹانگیں ہفلی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ پیاس نہیں ہوتی۔
ورٹرم ویرائیڈ (Veratrum Viride): بہت زیادہ کمی اور زیادتی کے ساتھ اونچے درجے کی حرارت ہوتی ہے۔

انفلو سنزا (Influenza)

آرسنک الیم (Ars Alb): یہ انفلو سنزا کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ حتیٰ کہ اگر بغیر سوچے سمجھے بھی دے دی جائے تو یہ دوا 95 فیصد کیسوں کو شفا دے دیتی ہے۔ اس کی علامات یوں ہیں: چھوٹے وقفوں کے ساتھ پانی کی ٹھنڈی مقدار کی پیاس کے ساتھ بے چینی ہوتی ہے۔ چھینکلیں آتی ہیں اور ناک سے خراش دار پتلا مواد بہتا ہے۔ یہ دوا انفلو سنزا کے بعد میں بھی دی جاسکتی ہے۔ جب کاربو و سچ ناکام ہو جائے تو انفلو سنزا کی یہ دوا علامت ہوتی ہیں۔

سلفر (Sulphur): یہ عمل انگیز دوا ہے جسے انفلو سنزا کے علاج کے وقت کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہئے۔ اگر جسم کا درجہ حرارت 48 گھنٹوں کے اندر کم نہ ہو تو یہ دوا 200 ڈائی لیوشن کی صورت میں صبح کے وقت خالی پیٹ دینی چاہئے۔ یہ علاج کو مکمل کر سکتی ہے یا علامات کو واضح کر کے دیگر ادویات کے انتخاب میں مدد دے سکتی ہے۔ جب یہ دوا دی جائے تو کم از کم بارہ گھنٹوں تک اور کوئی دوا نہیں دینی چاہئے۔

جلسیم میم (Gelsemium): قلو کے ابتدائی مراحل میں اس دوا کے متعلق سوچنا چاہئے۔ اس میں چھینکلیں آتی ہیں۔ کمر کے اوپر اور نیچے شدید قسم کا متواتر جاڑا ہوتا ہے۔ چہرہ خون سے سرخ ہوتا ہے۔ سرخی گہری ہوتی ہے۔ ناک سے پانی جیسا مواد خارج ہوتا ہے جو کہ خراش کے بغیر ہوتا ہے۔ عضلات میں درد ہوتا ہے۔ پیاس نہیں ہوتی لیکن درد سر شدید ہوتا ہے۔ 1x دیجئے۔

یو پیے ٹوریم پرف (Eupatorium Perf): یہ دوا ایسے بخار کی نشاندہی کرتی ہے۔ جس کے ساتھ جاڑا ہوتا ہے۔ جس کے بعد صفراوی قے ہوتی ہے۔ کیکاپاٹ کمر کے نچلے حصے کی طرف جاتی ہے اور پھر ہاتھوں اور پاؤں میں پھیل جاتی ہے۔ ہڈیوں میں گہرا درد ہوتا ہے۔ جس میں اتفاق دہانے سے اور حرکت سے ہوتا ہے۔ پیاس ہوتی ہے لیکن پانی کا ذائقہ نملین یا تیل والا ہوتا ہے۔ چھینکوں کے ساتھ زکام ہوتا ہے۔ گلا بیٹھ جاتا ہے اور ذیلی کھانسی ہوتی ہے۔ 2x ڈائی لیوشن دیجئے۔ جسم میں خشکی ہوتی ہے۔

برائی ادونیا (Bryonia): اس دوا کی نشاندہی اس وقت کی جاتی ہے جب قلو نمونیا کے ساتھ مخلوط ہو جاتا ہے۔ عضلات میں گولی لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ جن میں اضافہ معمولی حرکت سے ہو جاتا ہے۔ خشک کھانسی ہوتی ہے۔ جس کے باعث کھجوروں میں اور چھاتی میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ جسم پر پسینے آتے ہیں۔

کالی بانیکرام (Kali Bichi): یہ دوا بخار کے بعد کھانسی کے لئے ہوتی ہے جو کہ خشک نہیں ہوتی۔ چپکنے والا بلغم ہوتا ہے۔ یہ دھماکے کی طرح سے کھینچا جاسکتا ہے۔ کمزوری ہوتی ہے۔ ناک کی ہلکی جھلی میں ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔ ناک کی بڑ میں درد کے ساتھ خشکی ہوتی ہے

اور اس جگہ مواد جم جاتا ہے۔ (سینفہ)
نیٹرم سلف (Nat Sulph): یہ دوا دبائی انفلوئنزا کے لئے مخصوص ہے۔
رسٹاکس (Rhus Toxi): مسلسل جازا کے ساتھ قلو لاحق ہوتا ہے جیسا کہ سارے جسم پر
 ٹھنڈا پانی انڈیل دیا گیا ہو یا جیسا کہ خون سرد ہو کر ٹالیوں میں دوڑ رہا ہو۔ اس کے ساتھ بازوؤں
 اور ٹانگوں میں درد ہوتا ہے۔ بے چینی ہوتی ہے اور مریض ہلتا رہتا ہے۔ جس سے اسے اتفاق
 ہوتا ہے۔ زبان کی عکونی نوک کے ساتھ زبان کی خشکی لاحق ہوتی ہے۔ سخت قسم کی سرسراہٹ
 والی کھانسی ہوتی ہے۔

ڈلکامارا (Dulcamara): انفلوئنزا کی حاد قسم کے لئے بہترین دواؤں میں سے ایک ہے۔
 آنکھیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ گلے میں دکھن ہوتی ہے۔ عضلاتی سوزشی دکھن کے باعث
 تکلیف دہ کھانسی ہوتی ہے۔ یہ کیفیت مرطوب موسم کے باعث یا سرد موسم کے آنے پر ہوتی

کاسٹیکم (Causticum): اونچے درجے کا بخار ہوتا ہے۔ چہرہ خون سے بھرا ہوتا ہے۔ جازا
 نہیں ہو تا۔ نقاہت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مریض مشکل ہی سے بستر سے اٹکتا ہے۔ ناک بند ہو
 جاتا ہے۔ زکام آزادانہ بہتا ہے۔ ناک سے بننے والا مواد پانی کی طرح کا ہوتا ہے۔ گھاہینہ جاتا
 ہے۔ خشک کھانسی ہوتی ہے۔ جو کہ متواتر ہوتی رہتی ہے 24 کی ایک خوراک دیجئے۔
کارڈوس ایم (Cardus Mi): یہ قلو کے لئے مفید دوا ہے جبکہ جگر بھی متاثر ہو۔

انفلوئنزینم (Influenzinum): یہ ایک نوسوز (بیماری کے مواد سے تیار کردہ دوا) ہے اور
 اسے عمل انگیز دوا کے طور پر دینا چاہئے جبکہ دیگر اچھی منتخب شدہ ادویات حالت کو بہتر بنانے
 میں ناکام ہو جائیں۔ اس دوا کو دبائی قلو سے بچنے کے لئے حفظ باقاعدہ کے طور پر دیا جاتا ہے۔ یہ
 شفا بھی دیتی ہے۔ علاج اس دوا سے شروع کیا جاسکتا ہے۔

کاربو ویج (Carbo Veg): یہ دوا انفلوئنزا کے بعد ظاہر ہونے والی علامات کے لئے ایک
 عمدہ دوا ہے۔ یہ علامات اس طرح سے ہوتی ہیں مثلاً نقاہت، طاقت کا فقدان، ورم ترخہ کی
 باقیات، پاؤں کے ٹکڑوں میں جلن جیسا کہ سرخ مریض کی جلن ہوتی ہے۔ 200 طاقت کی دوا
 دن میں دو مرتبہ دیجئے۔

امونیا کارب (Ammonia Carb): انفلوئنزا کے بعد کھانسی ہوتی ہے۔ سب برائی اویا اور
 دیگر ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ ایسی کھانسی کے لئے سب سے پہلے امونیا
 کارب کو آزمانا چاہئے۔ 200 طاقت کی دوا دیجئے۔

بپتیشیا (Baptisia): مدہوش چہرے کے ساتھ دبائی انفلوئنزا میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ آنکھیں

چند ہی ہوتی ہیں۔ سر میں درد ہوتا ہے۔ گلے میں دکن ہوتی ہے۔ سارے جسم میں درد ہوتے ہیں اور دکن ہوتی ہے اور بہت زیادہ تھکات ہوتی ہے۔ بے ہوشی کے ساتھ چہرہ احفان دکنائی دیتا ہے۔ مریض کو اس بے ہوشی سے نکالنا مشکل ہوتا ہے۔
لائیکوپوڈیم (Lycopodium): جب ادنی لوگ قلو کے بعد دوبارہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتے تو یہ دوا انہیں شفا دے گی۔

ملیریا — Malaria

چائنا (China): ملیریا کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ اس میں جائز ہوتا ہے لیکن پہلے دو مراحل کے دوران پیاس نہیں ہوتی یعنی جائزے میں اور گرمی میں۔ دوسرے مرحلے کے اختتام پر پیاس شروع ہو جاتی ہے جبکہ بخار گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دوا پینے کے مرحلے کے دوران کے لئے خاص ہے۔ دوسرے الفاظ میں جائزے سے پہلے اور جائزے کے بعد پیاس ہوتی ہے۔ ہر تیسرے روز علامات میں اتتری ہو جاتی ہے۔ حملے مکمل کے ساتھ شروع ہوتے ہیں۔ بچان دل کی دھڑکن درد سر اور بھوک کا احساس بھی ساتھ میں ہوتا ہے۔ درد نظیر دیتھن یا 1x ڈائی لیوشن حلہ کی دوا میں دیتھن۔ مزمن کیسوں میں اونچی طاقت کے ڈائی لیوشن دیتھن یعنی 200 یا 1000۔

چینی نم سلف (Chinium Sulph): اس دوا میں مرض کا دورہ 10 یا 11 بجے صبح یا 3 بجے شام اور 10 بجے رات کو ہوتا ہے۔ سخت قسم کا پلانے والا جائز پیاس کے ساتھ ہوتا ہے۔ گرمی والا مرحلہ بہت شدید ہوتا ہے اور اس میں متواتر ہائیاں اور چھٹکیں آتی رہتی ہیں۔ اس مرحلے کے دوران پیاس بھی موجود رہتی ہے۔ جیسا کہ لہیو کے مرحلے کے دوران ہوتی ہے۔ لہیو تھکوت پیدا کرنے والا ہوتا ہے اور لمبے عرصہ تک آتا رہتا ہے۔

آر سینک البم (Ars Alb): شدید قسم کی تھکوت پریشانی بے چینی اور شدید قسم کی جلن دار پیاس ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ معدہ میں بچان ہوتا ہے۔ ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اس دوا کے متعلق مزمن کیسوں میں سوچنا چاہئے۔ رات بھر کی بے چینی سے پہلے عموماً جائز لگتا ہے۔ کبھی جائز لگتا ہے اور کبھی گرمی لگتی ہے۔ جائز شدید قسم کا پلانے والا ہوتا ہے۔ جو سارا دن بھی رہ سکتا ہے۔ چھوٹے وقفوں کے ساتھ تھوڑی مقدار میں پانی کی پیاس ہوتی ہے۔ جائزے کے مرحلے کے دوران مریض محسوس کرتا ہے کہ جیسے خون کی ٹالیوں میں دوڑنے والا خون برف کی طرح ٹھنڈا ہے اور پیاس بالکل نہیں ہوتی۔ گرمی کے مرحلے کے دوران مریض محسوس کرتا ہے جیسے خون کی ٹالیوں میں ابلتا ہوا پانی دوڑ رہا ہو۔ اس کے ساتھ پیاس بھی ہوتی ہے۔ یہ پیاس چھوٹے وقفوں کے ساتھ تھوڑی مقدار پانی کے لئے ہوتی ہے۔ پینے والے مرحلے کے دوران

پیاس زیادہ مقدار پانی کے لئے ہوتی ہے۔ کونین کے غلط استعمال کے بد اثرات 'جب مرض کے تین مراحل واضح نہ ہوں تو یہ دوا مناسب ہوتی ہے۔

یوپیے ٹوریم پرف (Eupatorium Perf): ہڈی میں درد ہوتا ہے جیسے کہ ٹوٹ گئی ہو۔ جاڑا کے بعد منگی اور قے ہوتی ہے۔ جاڑا کمر سے شروع ہوتا ہے۔ اور دیگر اعضاء میں اس کی لہریں جاسکتی ہیں۔ ایسا جوڑا جو چھوٹی کمر سے شروع ہو حرکت سے اجتر ہو جاتا ہے۔ نیز پیٹے سے اور کپڑا اتارنے سے بھی اجتری ہوتی ہے۔ جاڑے کے قریب ہونے پر منگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مریض کڑوے پانی جیسے مواد والی قے کرتا ہے۔ گرمی کے دوران شدید پیاس ہوتی ہے۔ اکثر کیسوں میں پیسہ آتا ہے۔ کڑوے ذائقے کے ساتھ زبان پر بھاری طبع ہوتا ہے۔ کھوپڑی پر دباؤ ہوتا ہے۔

نیٹرم میور (Natrium Mur): چٹکن والا اور ہتھوڑے لگنے جیسا درد سر ہوتا ہے اور شدید پیاس ہوتی ہے جو مریض کو مرض کے دورے سے جنگلہ مطلع کر دیتی ہے۔ مریض طویل 'شدید اور سخت قسم کے بلا دینے والے جاڑے سے ڈرتا ہے۔ جس کے ساتھ پیاس ہوتی ہے۔ درد سر کے ساتھ جاڑے کے دوران سبز رنگ کے صفراوی مادے کی قے ہوتی ہے۔ ہر بخار باافراط پسینے کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ مرض کا دورہ دس اور گیارہ بجے دن کے دوران عود کر آتا ہے۔ یہ علامت اس دوا کی نمائیاں اور سرخ روشنائی سے لکھی جانے والی علامت ہے۔ جاڑا انگلیوں 'انگوٹھوں اور کمر سے شروع ہوتا ہے جو کھنٹوں تک رہتا ہے۔ انگلیوں کے پور اور ہونٹ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ گرمی طویل 'متواتر اور شدید ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ درد سر میں اضافہ ہو جاتا ہے جو کہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ اکثر اس کے باعث بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ چہرہ پیلاہٹ مائل سمورا ہوتا ہے۔ تلی اور جگر بڑھ جاتے ہیں۔ ہونٹوں پر آبلے ہوتے ہیں۔

پلساٹیل (Pulsatilla): معدے کی معمولی خرابی مرض کے حملے کو لے آتی ہے۔ ذائقہ کڑوا ہوتا ہے یا بگھم والی کھٹی قے ہوتی ہے یا صفراوی قے ہوتی ہے۔ حملے کے دوران پیاس معدوم ہو جاتی ہے یا پیاس محض گرمی کے مرحلے کے دوران ہوتی ہے۔ حملے شام کے وقت ہوتے ہیں۔

برائی اونیا (Bryonia): جب معدے میں گزبڑ ہوتی ہے۔ ابکائیاں آتی ہیں۔ ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ زبان پشیم والی ہوتی ہے۔ قبض یا اسہال ہوتے ہیں۔ ہمائیاں آتی ہیں اور گرمی کے دوران پہلو میں چیخن ہوتی ہے۔ پیاس بہت زیادہ ہوتی ہے یا جاڑا سے پہلے گرمی لگتی ہے۔ ٹھنڈے والے مرحلے میں رخسار سرخ ہوتے ہیں۔

جلسمی میم (Gelsemium): جب جاڑا ریزھ کی ہڈی کی طرف دوڑتا ہے یا پاؤں سے شروع

ہوتا ہے۔ گردن کی گدی میں درد ہوتا ہے۔ دن کے وسط میں جاڑا ہوتا ہے۔ غنودگی ہوتی ہے۔
ذہن میں پراگندگی ہوتی ہے اور اونگھ آتی ہے، پیاس نہیں ہوتی۔ یہ دوا بچوں کے لئے بہت
مناسب ہے۔

وتھیا (Wyethia): گیارہ بجے صبح جاڑا ہوتا ہے۔ جاڑے کے دوران برف کے پانی کی پیاس
ہوتی ہے۔ گرمی کے ساتھ پیاس نہیں لگتی۔ تمام رات افراط کے ساتھ پسینہ آتا ہے۔ پیسے کے
دوران شدید درد ہوتا ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): ٹھنڈ کے مرحلہ میں ٹھنڈ کا احساس ہوتا ہے اور گرمی کے مرحلہ
میں گرمی کا احساس ہوتا ہے جو کہ خون کی ٹالیوں میں کھسکی چلی جاتی ہے۔ زبان خشک ہوتی ہے۔
جاڑے سے پہلے خشک کھالسی ہوتی ہے۔ پیشانی اور آنکھوں میں جلن ہوتی ہے۔ منہ تر ہوتا
ہے۔ بے چینی ہوتی ہے۔ جس میں حرکت کرنے سے آفاقہ ہوتا ہے۔ پانی والے زرد پاخائے
ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک ٹکونی ہوتی ہے۔ جاڑا راتوں سے شروع ہوتا ہے یا کندھوں کے
درمیان سے شروع ہوتا ہے۔

ایپس مل (Apis Mel): اچانک اور شدید قسم کی تے کے ساتھ جاڑا ہوتا ہے۔ بخار شام چھ
بجے اور سات بجے کے درمیان آتا ہے۔ جاڑا چھاتی سے اور پیٹ سے شروع ہوتا ہے۔ جس
کے ساتھ چھاتی پر وزن محسوس ہوتا ہے۔ جلد خشک اور گرم ہوتی ہے۔ چھاتی میں جلن اور
کھٹن ہوتی ہے جو کہ نمایاں علامت ہے نیز ضیق النفسی خطرناک ہوتی ہے۔

سیڈرون (Cedron): بخار گھڑی کی طرح سے وقت مقررہ پر عود کر آتا ہے۔

میناٹھس (Menyanthes): بہت زیادہ بڑھے ہوئے جاڑے کے ساتھ بخار ہوتا ہے۔ ہاتھ
اور پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ 200 یا 1000 طاقت کی دوا دیجئے۔

فیرم آرسینک (Ferrum Ars): جگر اور تلی کے بڑھ جانے کے ساتھ لمبیا بخار لاحق ہوتا
ہے۔ یہ دوا مزمن قسم کے مرض کا بھی علاج کرتی ہے۔ 6th ذائقہ لیوٹن دیجئے۔

نکس وامیکا (Nux Vomica): شدید قسم کا دیر تک رہنے والا اور کپکپاہٹ طاری کرنے
والا انگلیوں اور چہرے کا جاڑا خصوصاً ہونٹوں اور انگلیوں کے پوروں کا جاڑا بہت بے قاعدہ۔
جاڑے کے دوران پیاس نہیں ہوتی اور گرمی کے مرحلہ کے دوران شدید پیاس ہوتی ہے۔
بازوؤں اور ٹانگوں میں درد ہوتا ہے۔ جس میں آفاقہ پسینہ کے باعث ہوتا ہے۔ غنودگی طاری
ہوتی ہے جیسے کہ شراب پی رکھی ہو۔ پیٹ کے عضلات اور ٹانگوں کی پٹلیوں میں ایٹھن ہوتی
ہے۔

وریرٹرم البم (Veratrum Alb): شدید قسم کے جاڑے اور بہت زیادہ پسینے کے ساتھ صبح کے

وقت بخار ظاہر ہوتا ہے۔ جو مریض کو کمزور اور لاغر کر دیتا ہے۔ بازو اور ٹانگیں مردوں کی طرح لٹھری ہو جاتی ہیں۔

ملیریا آف (Malaria Off): یہ ایک نوسوڑ ہے اور مزمن کیسوں میں اونچی طاقتوں میں دیا جا سکتا ہے یا جب اچھی منتخب شدہ ادویات دینے کے باوجود شفا نہ مل رہی ہو تو اسے دینا چاہئے۔ یہ علاج کو مکمل بھی کرتا ہے۔ دردیں و قیرہ ہوتی ہیں۔ جو بخار کے ختم ہو جانے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں۔ یہ دوا اس تکلیف کا ازالہ کر دے گی۔

کیلڈیم (Caladium): مریض ہمیشہ دورے کے دوران شام کے وقت سو جاتا ہے اور دورہ ختم ہونے کے بعد جاگتا ہے۔

نک ٹین تھرس (Nyctanthos): صفراوی قے، قبض، معدے میں جلن کے ساتھ ملیریا بخار لاحق ہوتا ہے۔ جاڑے اور استسقاء سوچن کے ساتھ شدید پیاس ہوتی ہے۔

میمیکس (Cimex): جاڑے سے پہلے پیاس ہوتی ہے۔ جاڑے کے دوران جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ کھنچاؤ ہوتا ہے جیسا کہ جوڑوں کے بندھن بہت چھوٹے ہو گئے ہوں۔ ٹانگیں پھیلائی نہیں جاسکتیں۔ پانی پینے سے کھانسی یا درد سر یا دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے یا تحریک ہوتی ہے۔

خسرو۔ (Measles)

برائی اونیا (Bryonia): یہ خسرو کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔ 2x ذاتی لیوشن میں دینی چاہئے۔ یہ مرض کو ساقط کر دیتی ہے اور اس کے دورانیے کو مطلقاً مختصر کر دیتی ہے۔ یہ پتھیزوں کی تکالیف کی مدافعت کرتی ہے جو کہ ایک عام تکلیف ہے۔

سلیشیا (Silicea): یہ دوا خسرو کے بعد لاحق ہونے والی کھانسی کے لئے دینی چاہئے۔ پلساٹیل (Pulsatilla): یہ دوا بھی مرض کے ابتدائی مراحل میں مفید ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ زکام اور آنکھوں سے بہت زیادہ پانی کا اخراج بھی ہوتا ہے۔

جلسی میم (Gelsemium): جب مریض اونگھتا ہو اور بے پرواہ ہو۔ چہرہ پھولا ہوا ہوتا ہے اور چہرے میں خون بھرا ہوتا ہے۔ پیاس نہیں ہوتی۔ نبض بھرپور ہوتی ہے اور نبض نرم لیکن سست ہوتی ہے۔

ڈرو سرا (Drosera): خسرو کے دوران اور بعد تغیشی کھانسی ہوتی ہے۔ ایپس ایم (Apis M): خسرو کے دب جانے کے باعث چیخ کے ساتھ گردن توڑ بخار لاحق ہوتا ہے۔

کالی بائی (Kali Bi): اس دوا کی نشاندہی اس وقت کی جاتی ہے جب پلساٹیل کی طرح ساوہ

نزلے کی بجائے آنکھ کے قرنیہ میں پھنسیاں پیدا ہو جائیں۔ مطلق سے کانوں تک درد ہونے کے ساتھ گلے کی سوجن لاحق ہوتی ہے۔ نزلاوی سرورین بھی لاحق ہو سکتا ہے۔
میلینڈرینم (Malandrimum): خسرو کے لئے عافیتی دوا ہے۔ ہر ہفتہ 30 ڈالی یوشن کی ایک خوراک دیجئے۔

یوفرزیا (Euphrasia): آنکھوں اور ناک کی باقی جھلی کی سوزش لاحق ہوتی ہے۔ ناک سے نرم مادہ خارج ہونے کے ساتھ چھینکیں آتی ہیں اور آنکھوں سے خراش دار مادہ خارج ہوتا ہے۔ یہ دوا خسرو کو عام قسم میں بدل دیتی ہے۔ پھوڑے پھنسیوں کو باہر نکال دیتی ہے۔ بخار پر قابو پاتی ہے اور کھانسی کو آرام دیتی ہے۔

آرسینک ایلیم (Ars Albi): جب نقابت بہت زیادہ ہو اور چھوٹے وقفوں کے ساتھ پانی کی تھوڑی تھوڑی مقدار کی پیاس لاحق ہو۔ بے چینی ہوتی ہے۔ کمرے سبز اسال لاحق ہوتے ہیں۔ جن میں آدمی رات کے وقت اضافہ ہو جاتا ہے۔

ایلن تھس (Allanthus): خسرو کے دب جانے کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ خسرو کے دب جانے کے باعث گردن توڑ بخار میں اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ بے ہوشی ہوتی ہے جو کہ رطوبت کے اخراج کے باعث ہو سکتی ہے۔ سرخ باد اچانک ظاہر ہو جاتا ہے یا غالب ہو جاتا ہے۔

کن پڑے — (Mumps)

بیلادونا 3x (Belladonna 3x): یہ کن پیڑوں کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔ اسے مرکب آئیو 30 کے ساتھ بدلا جاسکتا ہے۔ یہ دونوں ادویات ہر آدھے گھنٹے کے بعد بدل بدل کر دینی چاہئیں۔

فالنی ٹولاکا (Phytolacca): اگر مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں تو اس دوا کو آزمانا چاہئے اور جب رسولی سخت تر ہو اور جلد زیادہ چلی ہو تب بھی اس دوا کو دینا چاہئے۔

پلساتیلہ (Pulsatilla): جب کان طوٹ ہوں اور درد بہت زیادہ شدید ہو تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ گرمی سے بہتری ہوتی ہے۔ جب کن پیڑے خیموں یا پستانوں کو متاثر کریں اور ان میں سوزش ہو تو یہ دوا دی جاتی ہے۔

ایبروٹینم (Abrotanum): جب کن پیڑے خیموں یا پستانوں کو متاثر کریں اور جب پلساتیلہ ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جاتی ہے۔

پیروٹیدینم (Parotidinum): یہ ایک ٹوسوڈ ہے اور متعدی مرض کے لئے حفظ ماقدم کے

طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اسے 200 ذاتی لیوشن کی صورت میں دو تین ہفتوں تک حفظ مانقذم کے طور پر ہفتہ میں ایک بار دیا جا سکتا ہے۔ یہ دوا علاج کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے اور اسے دیگر ادویات کے ساتھ استعمال کرنا چاہئے۔ ایسی صورت میں دیگر ادویات کو ایک روز کے لئے روک کر صرف ایک خوراک دینی چاہئے۔

پائلوکارپنی نم (Pilocarpinum): حفظ مانقذم کے طور پر دی جانے والی ایک عمدہ دوا ہے۔ یہ دوا دن میں دو مرتبہ ایک ہفتہ تک دی جا سکتی ہے۔

طاعون — (Plague)

انگیشیا (Ignatia): حفظ مانقذم کے طور پر اور علاج کے طور پر استعمال ہونے والی ایک شاندار دوا ہے۔ یہ دوا مددِ کچھ کے طور پر دینی چاہئے۔ ایک قطرے کی ایک خوراک۔

اوپر کیولینا شور (Opereulina Tur): جب Lymphatic غدود بڑھ جائیں اور سخت ہو جائیں تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ پھوڑے اور ذہل ہو جاتے ہیں۔ بخار کے ساتھ 'بے چینی' بسیار گوئی اور ہڈیاں ہوتا ہے۔

میرنٹولا کیوب (Tarentula Cub): جراثیمی اور خون میں زہر پھیل جانے کی حالت میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ سوزش کی شدید ترین قسم اور درد کے ساتھ پھوڑے (ذہل وغیرہ) ہوتے ہیں۔

آرسینکیم (Arsenicum): اسہال کے ساتھ انتہا درجے کی نفاہت ہوتی ہے۔

کروٹالیس ہور (Crotalus Hor): دائیں جانب کی نکالیف۔ جریان خون کا رتخان ہوتا ہے۔ مریض اپنی علامات کے اندر سو جاتا ہے۔

پائیروجینیم (Pyrogenium): شدید بے چینی کے ساتھ عفوئی کیفیت ہوتی ہے۔ دہشت ناک قسم کا بدبودار مواد خارج ہوتا ہے۔ خواہ اسہال کے راستے ہو 'تے کے راستے ہو یا پسینے کے راستے ہو یا پھر خواہ سانس بدبودار خارج ہو۔ متاثرہ حصوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور شدید قسم کی جلن ہوتی ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): ٹائیفائیڈ بخار کے ساتھ 'ہڈیاں کے ساتھ اور زہر دینے جلنے کے خوف کے ساتھ۔

پستینم (Pestinum (Plaguinum): مرض کے دورے کے دوران اس دوا کو عمل انگیز دوا کے طور پر دینا چاہئے۔

بیلادونا (Belladonna): مرض کے ابتدائی مراحل کے دوران دی جائے جبکہ حاد قسم کا ہڈیاں

لاحق ہو۔ خشک جلن دار حرارت اور گولی نگلنے جیسے دردوں کے ساتھ بخار ہوتا ہے۔ چہرہ اور آنکھیں چمک دار ہوتی ہیں۔

لیکیسیس (Lachesis): بہت زیادہ بے چینی اور نفاس ہوتی ہے۔ سارے جسم میں خراش دار دھن کا احساس ہوتا ہے۔ آنکھیں زرد ہوتی ہیں۔

ناجا (Naja): ہندوستان میں طاعون کے لئے اس دوا کو مفید بتایا جاتا ہے۔ لیکیسیس کی جگہ یہی دوا دینی چاہئے۔

فاسفورس (Phosphorus): جب طاعون کے ساتھ نمونیہ بھی ہو۔

ہائیڈروسیانک ایسڈ (Hydrocyanic Acid): مرض سے نڈھال ہو جانے کی حالت کے دوران یہ دوا دی جاتی ہے۔

خسرے کا بخار — Scarlet Fever (Scarlatina)

بیلادونا (Belladonna): خسرے کے بخار کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ ہموار سرخ اور چمک دار دانے (پھنسیاں یعنی خسرے کے دانے) نکلتے ہیں۔ حلق گرم خشک اور سرخ ہوتا ہے۔ معدہ بہت زیادہ ہچکائی ہوتا ہے۔ جس کے باعث مٹکی اور تے ہوتے ہیں۔ جسم کا درجہ حرارت اونچے درجے کا ہوتا ہے۔ یہ دوا حفظ مائع کے طور پر بھی عمل کرتی ہے۔

ایلیٹن گلینڈ (Ailanthus Gland): خراش دار زکام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب دانے باقاعدہ نہیں نکلتے۔ بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جس سے باہر لانا مشکل ہوتا ہے۔ مرض کا فطری اظہار دب جاتا ہے۔ ارٹکار توجہ کی قابلیت نہیں رہتی۔ یادداشت کھو جاتی ہے۔ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ خسرے کے دب جانے کے بعد ہڈیاں لاحق ہو جاتا ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): جب باقاعدہ خسرے کے ساتھ گڑھے دار پھنسیوں کا بھی اضافہ ہو جائے تو اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ بڑبڑاہٹ والے ہڈیاں کے ساتھ غنودگی ہوتی ہے۔ پھوڑے پھنسیاں آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہیں۔

ایپس میل (Apis Mel): یہ دوا صرف اسی وقت مفید ثابت ہوتی ہے جب گردوں کی تکالیف کے ساتھ استسقاءی سوجن لاحق ہو۔ جلد سچ رنگی (دھبوں والی) سرخ اور سفید داغوں والی ہوتی ہے۔ چہرہ زرد اور پھولا ہوا ہوتا ہے۔ ذنب نگلنے جیسے درد کے ساتھ گلے میں سوجن ہوتی ہے۔ پیاس کی عدم موجودگی اور گرمی سے علامات میں اضافہ جیسی علامات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔

لیکیسیس (Lachesis): پہلے خون کا متاثر ہونا اور پھر پلہنی جھلی کا متاثر ہونا اس دوا میں نمایاں

علامات ہیں۔ گلے کی دلدلی ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔ ٹانسلز میں درد ہوتا ہے۔
سکارلین مینم (Scarlatinum): اسے عمل انگیز دوا کے طور پر استعمال کرنا چاہئے نیز خسرہ کے
بخار سے قبل از وقت حفاظت کے لئے بھی استعمال کرنا چاہئے۔ 200 ذائی لیوشن کی خوراک
دیجئے۔

عقونتی بخار (خون میں زہر) (Septicaemia)

کاربو ویج (Carbo Veg): عقونتی کیفیت کے لئے حیرت انگیز دوا ہے۔ خون میں زہر پھیل
جانے کے لئے بھی یہ ایک حیران کن دوا ہے۔ خصوصاً عمل جراحی کے بعد اور صدمہ لگ جانے
کے بعد۔ جلد کا رنگ ارغوانی ہو جاتا ہے اور جلد چمک رہی ہو جاتی ہے۔

پائیروجین (Pyrogen): عقونتی بخار کے لئے یہ ایک شاندار دوا ہے۔ بستر سخت محسوس ہوتا
ہے۔ جسم کے جن حصوں کے بل مریض لیتا ہے انہی میں دکھن اور خراش محسوس ہوتی ہے۔
بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے۔ مسلسل حرکت کرتے رہتا پڑتا ہے۔ زبان لسی، پللی، صاف،
ہموار چمکے کہ سرخ وارش کی گئی ہو، ایسی ہو جاتی ہے۔ نبض غیر معمولی تیز ہو جاتی ہے۔ درجہ
حرارت ہر قسم کے تناسب سے باہر ہو جاتا ہے۔ جنین رکاوٹ جاتا ہے یا گل سڑ جاتا ہے۔ وضع
حمل کے بعد بدبودار اخراج ہوتا ہے۔ زچگی وضع حمل کے بعد والے بخار کے لئے مخصوص
دوا ہے۔ کمزوری اور تھکاوٹ (کستی وغیرہ) ہوتی ہے۔ بدبودار پھیلتا آتا ہے۔ جیسے ہی بخار ہوتا
ہے متواتر پیشاب آتا رہتا ہے۔

امونیئم کارب (Ammonium Carb): تخمیر جراثیم کے ساتھ جانور کے کالے کے باعث
خون میں زہر پھیل جاتا ہے۔ سیاہ رنگ کے سیلان خون کا رجحان ہوتا ہے۔

آرسنک البم (Ars Alb): خون کی عقونتی کیفیت، چھوٹے وقفوں میں تھوڑی مقدار پانی کی
بہت زیادہ پیاس ہوتی ہے۔ بہت زیادہ نفاہت، بے چینی اور اذیت ہوتی ہے۔ مقامی اور عمومی
جلن ہوتی ہے۔ متعفن اخراج ہوتے ہیں۔

ایکی نیکیا (Echinacea): زخموں کے باعث عقونتی کیفیت پیدا ہونے میں اس دوا کے متعلق
سوچنا چاہئے۔ وریدیں پھول جاتی ہیں جو کہ سیاہ رنگ کی ہو جاتی ہیں۔ بدن کے درجہ حرارت
میں بہت زیادہ تغیر ہوتا ہے جو کہ 97° سے 105° تک ہوتا ہے۔ سر اور ہاتھوں پاؤں میں مدہم
دکھن ہوتی ہے۔ جراثیمیت رحم سے پھیلتی ہے۔ ہیٹ پھول جاتا ہے اور حساس ہوتا ہے۔ متعفن
قسم کا اخراج ہوتا ہے۔

بپٹیشیا (Baptisia): متعفن اخراج ہوتے ہیں۔ سارے بدن میں خدت ہوتی ہے۔ عضلات

میں دکھن ہوتی ہے۔ بے چینی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ لاغری اور نکاحست ہوتی ہے۔
 لیکسیس (Lachesis): انتہا درجے کی حساسیت ہوتی ہے۔ متاثرہ حصوں کا نیلا پن اور سونے
 کے بعد علامات میں اضافہ اس دوا کی اہم علامات ہیں۔ خراشیں اور چیر پھاڑ والے زخم اس دوا
 کو آواز دیتے ہیں۔ خون میں پیپ، گنگرین اور گوشت خور پھوڑے ہوتے ہیں۔ کم مقدار میں
 متعفن اخراج ہوتے ہیں۔

آرنیکا (Arnica): خراشوں کے باعث عفونی کیفیت کے لئے یہ ایک شاندار دوا ہے۔ ٹائیفائیڈ
 کا رجحان ہوتا ہے۔ ڈھیلے پانخانے ہوتے ہیں۔ گندی بدبو آتی ہے۔ ذہنی بے چینی ہوتی ہے۔
 رٹاکس (Rhus Tox): عمل جراحی کے کیسوں کے لئے یہ ایک بہترین احتیاطی دوا ہے۔ یہ
 اڑتالیس گھنٹوں تک 30 ڈائی لیوش میں ہر تین گھنٹے کے بعد دینی چاہئے۔ یہ عفونت کو روک
 دے گی۔ گنٹھیادوی تکلیفات کے ساتھ خون کی عفونی سمیت والے کیسوں میں موزوں دوا ہے۔
 جراثیمیت والے حصے میں سرفی ہوتی ہے اور دکھن و سوزش ہوتی ہے۔ جاڑا ہوتا ہے۔ زبان
 خشک ہوتی ہے۔ اسال ہوتی ہے اور بے چینی ہوتی ہے۔

انتھراکسیس نم (Anthraxinum): عفونی سوزش اور ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔ خون میں
 پیپ ہوتی ہے۔ گنگرین والے گوشت خور پھوڑے ہوتے ہیں۔ تحلیل ہونے میں تیزی ہوتی
 ہے۔ جلن دار درد آرسنک کی نسبت زیادہ شدید ہوتا ہے۔

چھچک — (Small Pox)

ویریولیئم (Variolinum): یہ دوا علاج کے لئے بھی اتنی ہی شاندار ہوتی ہے جتنی کہ حفظ
 ماتقدم کے لئے۔ علاج کے آغاز میں اس دوا کی ایک خوراک دینی چاہئے۔ اس کے پوہیں گھنٹے
 کے بعد دیگر ادویات سے عمومی علاج شروع کرنا چاہئے۔ حفظ ماتقدم کے طور پر یہ دوا 200 ڈائی
 لیوشن میں ہفتے میں ایک بار دینی چاہئے۔ اسے کبھی 200 طاقت سے کم نہیں دینا چاہئے۔ چھچک
 کے بعد یہ دوا چہرے کی بد صورتی کا علاج کرتی ہے۔ دیگر نشاندہی کی گئی ادویات کے ساتھ اس
 دوا کی تین چار خوراکیں اس طرح سے دی جائیں کہ ہر ہفتے 200 طاقت کی ایک خوراک دی
 جائے۔ جس روز ویریولیئم دی جائے۔ اس روز کوئی دوسری دوا نہیں دینی چاہئے۔

برائی اونیا (Byonia): اونچے درجے کے بخار اور بہت زیادہ پیاس کے ساتھ یہ دوا مرض کے
 پہلے مرحلے کی ہے۔ پھنسیاں آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہیں۔ تمام علامات حرکت سے اتر ہوتی ہیں۔
 انتیم ٹارٹ (Antim Tart): کہا جاتا ہے کہ یہ دوا مرض کے پورے دورائے کو کم کر دیتی
 ہے۔ عمومی طور پر یہ دوا دوسرے مرحلے میں دی جاتی ہے جبکہ پھوڑے بن چکے ہوں۔

تھوجا (Thuja): پھنسیوں والے مرحلے میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ سیاہ سوزشی علاقہ پر دودھیا ہموار پردہ اور بدبودار پھنسیاں ہوتی ہیں۔ سائیکوٹک مریضوں میں خصوصاً سوزوں دوا ہے۔
ساراسینیا (Sarracenia): چچک کے لئے یہ ایک شاندار دوا ہے۔ اسے کسی بھی مرحلہ میں دیا جاسکتا ہے۔ یہ نہ صرف مرض کے دورانیہ کو کم کرتی ہے بلکہ چچک کے داغوں کو بھی روک دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دوا بخشی زیادہ چچک کے علاج کے لئے کامیاب ثابت ہوئی ہے۔ اتنی ہی زیادہ حفظ ماتقدم کے طور پر بھی کامیاب ثابت ہوئی ہے۔

وریرٹرم ویر (Veratrum Ver): نبض بھرپور ہوتی ہے اور تیز ہوتی ہے۔ درد سر ہوتا ہے جو کہ سر کے پیچھے حصہ میں اتر ہوتا ہے۔ پسینے کے ساتھ بخار ہوتا ہے۔ ہنس کے ساتھ سرگرم ہوتا ہے اور ہاتھ و پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔

میلینڈرینم (Maladrinum): چچک کے لئے یہ ایک اور حفاظتی دوا ہے۔ حفاظتی ٹیکوں کے بد اثرات ہوتے ہیں۔ جلد کھردری رہتی ہے۔ غیر صحت مند اور خشک ہوتی ہے۔ حفاظتی ٹیکے لگوانے کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے اگر حفاظتی ٹیکوں کے ساتھ یہ دوا دی جائے تو حفاظتی ٹیکے اثر نہیں کریں گے۔

مرکیوریس (Mercurius): جب تعدد خصوصاً کان کے نیچے والے تعدد ملوث ہوں تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ تھوک باافراط آتا ہے اور سبزی مائل پانی پانے آتے ہیں۔ یہ اس دوا کی نمایاں علامات ہیں۔ یہ دوا بھی چچک کے داغوں کو روک دے گی۔

کیوپریم ایشک (Cuprum Aet): تیز نبض کے ساتھ چچک ہوتی ہے۔ چھاتی میں اینٹھن والے کئی دورے ہوتے ہیں۔ تنفس میں دقت ہوتی ہے، نقاہت ہوتی ہے، بھوک غائب ہو جاتی ہے۔ چہرہ سرخ اور سوجا ہوا ہوتا ہے۔ ہڈیاں ہوتا ہے۔ پنڈلیوں میں اینٹھن ہوتی ہے۔ پھنسیاں مختلف جسامت کے دھبوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔

بیلادونا (Belladonna): ٹپکن والا درد سر ہوتا ہے۔ چہرہ ارغوانی ہو جاتا ہے۔ خلق خشک ہوتا ہے۔ نبض بھرپور اچھلتی ہوئی ہوتی ہے۔ بچہ سر پکڑنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کپڑے کے ساتھ کس کر باندھ دیا جائے۔

فاسفورس (Phosphorus): جب چچک نمونہ کے ساتھ مخلوط ہو جائے یا غلیاں جریان خون لاحق ہو یا یہ دونوں امراض چچک کے ساتھ مخلوط ہوں۔ پیچھے پھڑوں سے چمک دار سرخ خون آتا ہے۔ جو اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس سے غشی اور شدید تھکاوٹ لاحق ہو جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے داغوں سے خون بہتا ہے۔

ہیمامیلس (Hamamelis): جریان خون والا چچک جس کے ساتھ گہرے رنگ کا خون رستا

ہے۔ مسواڑوں سے 'ٹاک سے' اعضائے مستقیم سے اور اعضائے کاسل سے خون جاری ہوتا ہے۔
 ایسڈ نائٹرک (Acid Nitric): آتشوں سے جریان خون ہوتا ہے اور ٹاک سے شدید قسم کا سیلان خون ہوتا ہے۔ خون چمک دار اور سرگرم ہوتا ہے۔
 میورٹیک ایسڈ (Muratic Acid): مرض کے آخری مرحلہ میں یہ دوا دی جاتی ہے جبکہ ہیمنٹ بے انتہا آتا ہے اور مریض ڈوبنے والی 'تھکان والی اور دھڑن تختہ ہو جانے والی حالت میں ہوتا ہے۔ خون کی بد نظمی کے نتیجہ میں مریض اپنے افعال پر قابو کھو دیتا ہے۔
 ٹیکسیس 'کروٹیلس (Crotales, Lachesis): متعفن قسم کے امراض کے لئے موزوں ترین دوا میں ہیں۔ ایسے امراض میں عمومی تھکان 'بے ہوشی اور خون کی بد نظمی پائی جاتی ہے۔
 ہیمپٹر سلف (Hepar Sulph): یہ دوا مرض سے متاثرہ غدود یا پھوڑوں کی پیپ تیزی کے ساتھ بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔

لو لگنا (Sunstroke)

گلوٹائٹ (Glonone): لو لگ جانے کے لئے یہ ایک شاندار دوا ہے۔ اسے حملہ ہونے پر فوری دے دینا چاہئے۔ بھوک نہیں رہتی۔ آنکھیں ٹھہر جاتی ہیں۔ شدید قسم کا درد سر ہوتا ہے۔ جڑے خقی سے بھیج جاتے ہیں۔
 بیلاڈونا (Belladonna): چہرے میں خون بھر جاتا ہے۔ آنکھوں میں بھی خون اتر آتا ہے اور لپے درجے کا بخار ہوتا ہے۔ ٹیکن والا درد سر ہوتا ہے۔
 اوپیم (Opium): تنفس میں دقت ہوتی ہے یا تنفس رک جاتا ہے۔ چہرہ پھول جاتا ہے۔
 ٹیکسیس 'اناکارڈیم (Anacardium, Lachesis): یادداشت کھو جاتی ہے۔

تپ دق (Tuberculosis)

(دیکھئے "چھاتی" کے ذیل میں "تپ دق")

ٹائیفائیڈ (Typhoid)

آرسنک البم (Ars Alb): ٹائیفائیڈ بخار میں اس دوا کو بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کر چکا ہوں۔ تین قطروں کی خوراکیں ہر دو گھنٹے کے بعد دی جاتی ہیں۔۔۔ روزانہ چھ خوراکیں۔ اگر بدن کا درجہ حرارت کم نہ ہو تو سلفر 200 دیجئے۔۔۔ ایک خوراک خالی معدہ دی جائے اور اس

دن کوئی دوسری دوا نہ دی جائے۔ پھر دوبارہ آرسنک 30 اگلے روز سے شروع کر دی جائے۔ اگر آئندہ چار روز کے دوران کوئی بہتری نہ آئے تو سورنم 200 صبح سویرے دی جائے۔ تیسرا دن۔ اس روز کوئی دوسری دوا نہ دی جائے۔ پھر آرسنک 30 اگلے روز سے دوبارہ شروع کر دی جائے۔ اگر یہ بھی اگلے چار روز کے دوران ناکام ہو جائے تو ٹیوبرکولینم 200 یا 1000 صبح سویرے تیسرا دن سلفوریا سورنم کی طرح سے دی جائے۔ دو دن انتظار کیجئے اور پھر دوبارہ آرسنک 30 سے شروع کیجئے۔ آرسنک الیم کی عام علامات یوں ہیں۔ بے چینی ہوتی ہیں، پھوٹے وقتوں کے ساتھ کم مقدار پانی کی پیاس ہوتی ہے۔ نفاہت ہوتی ہے۔ اتھارہ بجے کی سرخ زبان اسال کے ساتھ ہوتی ہے۔ منہ میں سوزشی دھن ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ خشک چھلکے ہوتے ہیں۔

فاسفورس (Phosphorus): یہ دوا صرف اس صورت میں استعمال کی جاتی ہے۔ جب ٹائیفائیڈ نمونیہ کے ساتھ مخلوط ہو چکا ہو۔ اتفاقاً شروع ہو جانے کے بعد یہ دوا اسال میں بھی قابل قدر ہوتی ہے۔

ہائوسکیمس (Hyoscyamus): دماغ کا فالج ہوتا ہے۔ نچلے درجے کا ہڈیان ہوتا ہے۔ عضلات میں پھڑکن ہوتی ہے۔ نچلا جڑا گر جاتا ہے اور بلا ارادہ پاخانے خارج ہوتے ہیں۔

بپٹیشیا (Baptisia): جب ٹائیفائیڈ کے ساتھ اسال بھی لاحق ہوں تو اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ پاخانے کھنی بو والے ہوتے ہیں اور ایسی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ جس سے مریض کو کھانا مشکل ہوتا ہے۔ اچانک نفاہت طاری ہو جاتی ہے۔ مریض ایک سو الپرواہ ہو جاتا ہے۔ نیز ذہنی کابل ہوتی ہے۔ یہ دوا مرض کے دورانیہ کو مختصر کر دیتی ہے۔ بشرطیکہ ابتدائی مرحلہ میں دی جائے۔ غیر معمولی طور پر تیز اور اچانک لاحق ہونے والے ڈالائیفائیڈ۔

جیلسمیم (Gelsemium): یہ دوا ٹائیفائیڈ کے ابتدائی مراحل میں دی جاتی ہے۔ پیاس نہیں ہوتی لیکن درد سر آکھیف دہ ہوتا ہے۔ مریض خاموش، یک سو اور غیر جذباتی ہوتا ہے۔ آنکھوں کے پونے گرے رہتے ہیں، کپکپاہٹ ہوتی ہے۔ جازا لگتا ہے۔ غنودگی ہوتی ہے۔ حرکت سے خوف کھاتا ہے۔ نفاہت ہوتی ہے۔

آرم ٹریپ (Arum Trip): یہ ایک اہم دوا ہے۔ جس کے متعلق اس وقت سوچنا چاہئے۔ جب مریض ناک، ہونٹوں یا انگلیوں کے ناخنوں کو کاٹا یا رگڑتا ہے۔ یہاں تک کہ ان سے خون بہنے لگتا ہے۔ یہ اس دوا کی ایک اہم علامت ہے اور اکثر ٹائیفائیڈ کے کیسوں میں پائی جاتی ہے۔

لکسیس (Lachesis): اس میں بپٹیشیا کی مشابہ علامات پائی جاتی ہیں۔ سوائے اس کے کہ لکسیس کا مریض سوتے کے بعد ابتر ہو جاتا ہے اور اس میں سیاہ خون کے جریان کا رجحان ہوتا

ہے۔ وہ گردن اور کمر کو چھونے سے خاص طور پر حساس ہوتا ہے۔ قوت گویائی جاتی رہتی ہے۔ دماغ کے فالج کی نشانیاں پائی جاتی ہیں یعنی پچھلے جزے کا گر جانا۔ بدبودار اخراج، ہلکی بڑبڑاہٹ کا بھیان، خشک کپکپاتی زبان۔

الیمڈ میورٹیک (Acid Muriatic): آنتوں کے جریان خون میں اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ شخص متعفن ہو والا ہوتا ہے۔ اشتداد رے کی نقاہت ہوتی ہے۔ بے ہوشی کے ساتھ متواتر پاخانے خارج ہوتے رہتے ہیں۔ جزا نیچے لٹک جاتا ہے۔ حقیقت میں مریض قبر کے آخری کنارے تک پہنچ جاتا ہے۔ زبان خشک ہوتی ہے اور منہ میں لڑکھڑاتی ہے۔ نبض وقفہ دار ہوتی ہے۔

سفی لینم (Syphilinum): ٹائیفائیڈ بخار کے بعد جب مریض بہت آہستہ آہستہ صحت یاب ہو رہا ہو جو کہ آنکھ کے باعث ہو سکتا ہے۔ سفی لینم اوپھی طاقوں میں مثلاً 200 یا 1000 کی طاقت میں آزمائی جاسکتی ہے۔

ابیسینٹیم (Abisinthium): ٹائیفائیڈ میں بے خوابی لاحق ہو جاتی ہے۔ دماغ کی بنیاد میں خون کا اجتماع ہوتا ہے۔

اوپیم (Opium): فانی حالت ہوتی ہے۔ گہرا سرخ چہرہ اور خراسے دار سانس ہوتا ہے۔ کلیریا کارب، بیلادونا (Belladonna, Calcareia Carb): آنکھیں بند کرنے پر مریض چیزیں اور اشخاص دیکھتا ہے۔ آنکھیں کھولنے پر وہ سب کچھ غائب ہو جاتا ہے۔

الیمڈ فاس (Acid Phos): ٹائیفائیڈ بخار کے بعد نقاہت اور کمزوری ہو جاتی ہے۔ کیسٹوریم (Castoreum): ٹائیفائیڈ کے بعد خصوصاً عورتوں میں۔ کمزوری اور تھکاوٹ کے ساتھ چیز اپن ہوتا ہے۔

کیوپرم میٹ (Cuprum Met): بے ہوشی کے ساتھ ٹائیفائیڈ بخار ہوتا ہے۔ نبض کھو جاتی ہے۔ پیشاب دب جاتا ہے۔ ہیٹ وصول کی طرح پھول جاتا ہے۔ بے چینی ہوتی ہے۔ کئی کئی روز تک مریض فرش پر لوٹ پوٹ ہوتا رہتا ہے۔ بہت زیادہ نقاہت ہوتی ہے اور اعصابی اشتعال انگیزی یا جوش ہوتا ہے۔ 200 طاقت ڈائی لیوشن کی صورت میں یہ دوا ہر بارہ گھنٹے کے بعد دیجئے۔ یہاں تک کہ بہتری کا آغاز ہو جائے۔

سٹرامونیم (Stramonium): منہ سے خون رسنے کے ساتھ ٹائیفائیڈ بخار لاحق ہوتا ہے۔ زبان خشک ہوتی ہے اور سوجنی ہوتی ہے۔ جس سے منہ بھر جاتا ہے۔ زبان سرخ اور چھاپہ شدہ ہوتی ہے۔ سرخ ایسی جیسے کہ گوشت کا کوئی ٹکڑا ہو۔

ٹریبنتھینا (Terebenthina): ہموار چمکتی ہوئی سرخ زبان ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ ہیٹ

بے انتہا پھولا ہوتا ہے۔

کروٹن ٹیگ (Croton Tig): قوی کے ساتھ اسہال کی تکالیف کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔

کالی فاس (Kali Phos): خشک بھوری زبان ہوتی ہے۔ دانتوں پر خشک چھلکے ہوتے ہیں۔ زہنی دباؤ ہوتا ہے۔ ہڈیاں ہوتا ہے گندے اور بدبودار اخراج ہوتے ہیں۔

ویکسی نم مرٹلس (Vaccinum Myrtillus): زرد رنگ کے ڈھیلے پاخانے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ پیاس اور جاڑا ہوتا ہے۔



باب پانزدہم

متفرقات

(Miscellaneous)

اضافہ (علامات میں) — (Aggravation)

انٹیم گروڈ (Antim Crud): شام کے وقت اتھری ہوتی ہے۔ تیزابوں سے 'گری' سے 'شراب' سے 'پانی' سے 'نمائی' اور دھونے سے اتھری ہوتی ہے۔

سپیا (Sepia): قبل از دوپہر اور رات کے وقت دھونے سے 'گیلا ہونے' سے یا نمی سے اتھری ہوتی ہے۔ دائیں جانب اتھری ہوتی ہے۔ پیٹے کے بعد اتھری ہوتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا سے اور کمرچ چمک والے طوفان سے پہلے اتھری ہوتی ہے۔ تسلی دلا سے دینے سے اور آنکھیں بند کرنے سے اتھری ہوتی ہے۔

نکس و امیکا (Nux Vom): صبح کے وقت اتھری ہوتی ہے۔ ذہنی اشتعال، انگیزی سے 'ذہنی' تھکاوٹ سے اتھری ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد 'چھوٹے' سے 'شور' سے 'مصالحوں' سے 'بیجان تیزی' سے اتھری ہوتی ہے۔ فشی اشیاء سے 'خشک موسم' سے اتھری ہوتی ہے۔ کھلی ہوا میں 'سردی' سے 'ٹھنڈی میڑھیوں پر بیٹھنے' سے 'سگریٹ نوشی' سے اتھری ہوتی ہے۔ بستر میں پہلو بدلنے سے 'آزمودہ ادویات' سے نیز دیگر ادویات سے اتھری ہوتی ہے۔ خوشبودار اشیاء سے 'گزوی نباتاتی' گولیوں سے 'سستی کی عادت' سے اتھری ہوتی ہے۔

آرسنک البم (Arsenic Alb): مرطوب موسم میں سہ پہر کے وقت اور آدمی رات کو یا آدمی رات کے بعد اتھری ہوتی ہے۔ ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات یا ٹھنڈی غذا سے اتھری ہوتی ہے۔ ساحل سمندر پر 'اندھیرے' میں 'پھلوں' سے 'تھینکوں' سے اتھری ہوتی ہے۔

براہکی اونیا (Bryonia): حرکت سے 'حرارت' سے 'صبح' کے وقت کھانے سے 'گرم موسم' میں اتھری ہوتی ہے۔ تھکاوٹ سے 'چھوٹے' سے 'بلنے' سے 'بخیر درد والی جانب' لپٹنے سے اتھری ہوتی ہے۔

چائنا (China): معمولی چھوٹے سے اتھری ہوتی ہے۔ ہوا کے جھونکے سے اتھری ہوتی ہے۔ ہر

دوسرے روز ابتری ہوتی ہے۔ سیلان خون سے اور اسماں وغیرہ سے رطوبات زندگی ضائع ہوتی ہیں۔ رات کے وقت 'پھل کھانے کے بعد' شور سے ابتری ہوتی ہے۔ ہوا چلنے پر ابتری ہوتی ہے۔ رات کے وقت اور بغیر درد والی جانب لیٹنے سے ابتری ہوتی ہے۔

کیو میلا (Chamomilla): گرمی سے 'غصے سے ابتری ہوتی ہے۔ کھل ہوا میں ابتری ہوتی ہے۔ ہوا چلنے پر ابتری ہوتی ہے۔ رات کے وقت اور بغیر درد والی جانب لیٹنے سے ابتری ہوتی ہے۔

سکس کین (Cistus Can): ٹھنڈی ہوا میں بغیر کیزا لئے تھوڑا سا نکلنے پر ابتری ہو جاتی ہے۔ ذہنی تھکاوٹ اور جوش سے ابتری ہوتی ہے۔

مرکیوریس سول (Mercurius Soli): رات کے وقت یا آدمی رات سے پہلے ابتری ہوتی ہے۔ نمی سے مرطوب موسم سے 'دائیں جانب لیٹنے سے' پیٹنے سے 'گرم کمرے سے اور گرم بستر سے ابتری ہوتی ہے۔ درجہ حرارت انسانی بلند اور انسانی کم ہونے سے ابتری ہوتی ہے۔ گرمی اور سردی دونوں سے ابتری ہوتی ہے۔

کاسٹیکم (Causticum): ٹھنڈی ہواؤں کے چلنے سے 'فٹکی سے' صاف اور عمدہ موسم میں ابتری ہوتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا سے اور گاڑی کی حرکت سے ابتری ہوتی ہے۔

کالی کارب (Kali Carb): ہجاعت کے بعد ابتری ہوتی ہے۔ ٹھنڈے موسم میں 'بہنی اور کافی سے ابتری ہوتی ہے۔ صبح کے وقت تقریباً تین بجے ابتری ہوتی ہے۔ بائیں جانب لیٹنے سے اور درد والی جانب لیٹنے سے ابتری ہوتی ہے۔

سورنم (Psorinum): کافی سے ابتری ہوتی ہے۔ جس سے پرہیز کرنا چاہئے جبکہ یہ دوا دی جائے۔ موسم کے بدلنے سے 'گرم دھوپ میں اور ٹھنڈے ابتری ہوتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا کے معمولی جھونکے سے خوف آتا ہے۔

سلیشیا (Silicea): نئے چاند کے وقت یا پورے چاند کے وقت ابتری ہوتی ہے۔ صبح کے وقت 'صورتے سے' حیض کے دوران 'کپڑے اتارنے پر' نیچے لیٹنے پر 'نمی سے' بائیں جانب لیٹنے سے 'ٹھنڈے سے' دلجوئی سے ابتری ہوتی ہے۔

زکیم میٹ (Zincum Met): شراب پینے سے تمام تر تکالیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شراب مریض پر نشہ طاری کر دیتی ہے۔ حتیٰ کہ تھوڑی سی مقدار میں پینے پر بھی نشہ ہو جاتا ہے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): بہت زیادہ بلائے جانے پر تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ رطوبات زندگی ضائع ہو جانے سے 'جنسی بے اعتدالیوں سے' تھکاوٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

فسفورس (Phosphorus): چھوٹے سے 'جسمانی یا ذہنی تھکاوٹ سے' بہت زیادہ روشنی

سے 'گرم غذا یا گرم مشروبات سے' موسم کی تبدیلی سے 'گرم موسم میں گھبرا ہو جانے سے' شام کے وقت 'بائیں کروٹ لیٹنے سے یا درد والی جانب لیٹنے سے ابتری ہو جاتی ہے۔ کمرچ چمک والے طوفان کے دوران اور سیڑھیاں چڑھنے پر علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

لائی سین (Lyssin): چلتے پانی کو دیکھنے سے یا اس کی آواز سننے سے یا پانی اٹا لیٹنے سے یا حتیٰ کہ مائعات کے متعلق سوچنے سے ابتری ہوتی ہے۔ چند حیا دینے والی روشنی سے یا منعکس ہونے والی روشنی سے 'سورج کی گرمی سے' جھکنے سے ابتری ہو جاتی ہے۔

سٹرامونیم (Stramonium): اندھیرے کمرے میں جب کہ اکیلا ہو ابتری ہو جاتی ہے۔ چمک دار یا روشن اشیاء کو دیکھنے سے 'سونے کے بعد اور نکلنے پر ابتری ہوتی ہے۔

کونیئم (Conium): بچے لیٹنے سے 'بستر میں کروٹیں بدلنے سے' تجرد (غیر شادی شدہ) والی زندگی سے 'حیض سے پہلے اور حیض کے دوران' ٹھنڈ لگ جانے سے 'جسمانی یا ذہنی تھکاوٹ سے ابتری ہوتی ہے۔

سلفر (Sulphur): آرام سے ابتری ہوتی ہے اور جب مریض کھڑا ہو تب ابتری ہوتی ہے۔ بستر کی گرمی سے 'دھونے سے' نہانے سے 'صبح کے وقت گیارہ بجے ابتری ہوتی ہے۔

نیٹرم میور (Natrium Mur): شور سے 'موسیقی سے' گرم کمرے سے 'بچے لیٹنے سے' تقریباً دن کے دس بجے 'سائل سمندر پر' ذہنی تھکان سے 'ہمدردی سے' گرمی سے 'تھکاوٹ سے ابتری ہوتی ہے۔

لیکیسیس (Lachesis): سونے کے بعد ابتری ہوتی ہے۔ مریض مرض میں اضافہ کے اندر ہی سو جاتا ہے۔ سونے کے دوران لاحق ہونے والی تکلیفات میں بائیں جانب اور پھر دائیں جانب ابتری ہوتی ہے۔ موسم بہار میں 'گرم غسل سے' گرم مشروبات سے 'آنکھیں بند کرنے سے' تنگ کپڑے پہننے سے ابتری ہوتی ہے۔ حیض کے شروع ہونے پر اور حیض کے اختتام پر ابتری ہوتی ہے۔

ڈلکامارا (Dulcamara): رات کے وقت ابتری ہوتی ہے۔ عام طور پر سردی سے ابتری ہوتی ہے۔ مرطوب موسم پر سات میں ابتری ہوتی ہے۔

ارائیا ڈیاد (Aranea Diad): مرطوب موسم میں 'سہ پہر کے آخری حصہ میں اور آدھی رات کے وقت ابتری ہوتی ہے۔

نیٹرم سلف (Natrium Sulph): موسیقی سے ابتری ہوتی ہے۔ جو مریض کو اداس کر دیتی ہے۔ بائیں جانب لیٹنے سے ابتری ہوتی ہے۔ مرطوب موسم میں یا مرطوب = خانہ سے ابتری ہوتی ہے۔ طوفان سے ابتری ہوتی ہے۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): گرمی سے 'پمشنری کی طرح کی بھاری مرغن غذا کھانے سے اتھری ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد 'شام ہوتے ہوتے 'گرم کمرے میں 'بائیں کمرے لیٹنے سے یا بغیر درد والی جانب لیٹنے سے اتھری ہوتی ہے۔ جب پاؤں نیچے لٹکا دیئے جائیں تو اتھری ہوتی ہے۔ مٹکون مزاج 'مستسل تبدل ہونے والا۔ حیض سے پہلے اور حیض کے دوران۔

لیڈم پی (Ladium P): رات کے وقت اور فستہ کی گرمی سے اتھری ہوتی ہے۔ اوپر کی جانب حرکت کرنے سے اتھری ہوتی ہے۔

سنی کیولا (Sanicula): نیچے کو حرکت کرنے سے اتھری ہوتی ہے۔

امبر اگریشیا (Ambra Grisea): دوسرے لوگوں کی موجودگی اور گفتگو سے علامات میں اضافہ ہوتا ہے۔ موسیقی سننے سے اضافہ ہوتا ہے۔

لائیکو پوڈیم (Lycopodium): دائیں جانب اتھری ہوتی ہے۔ دائیں سے بائیں جانب اتھری ہوتی ہے۔ اوپر سے نیچے کی جانب اتھری ہوتی ہے۔ گرم چیزیں لگانے سے اتھری ہوتی ہے۔ سوائے طلق اور معدہ کے جن میں گرم مشروبات سے اتھری ہوتی ہے۔ دفتر سے جذبات کو نہیں پہنچنے پر اتھری ہوتی ہے۔

الیومینا (Alumina): ٹھک 'شراب' سرکہ' مرچ اور نشہ آور مشروبات کے پینے سے علامات میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوروں کی صورت میں اتھری ہوتی ہے۔ سر پہرے کے وقت اتھری ہوتی ہے۔ آٹوؤں سے اتھری ہوتی ہے۔ صبح کے وقت چمچل قدی سے اتھری ہوتی ہے۔ گرم کمرے سے اتھری ہوتی ہے۔

لیک کینیم (Lac Can): ایک روز صبح کے وقت اور ایک روز شام کے وقت اتھری ہوتی ہے۔ مٹکون مزاج 'جگہ بدلنے والا اور مستسل تبدل کرنے والا۔

کروکس سیٹ (Crocus Sat): نیچے لیٹنے سے 'گرم موسم سے 'گرم کمرے سے 'صبح کے وقت 'روزہ رکھنے سے 'ناشتہ کرنے سے پہلے اور ایک ہی چیز کو متواتر دیکھتے رہنے سے اتھری ہوتی ہے۔

بیلادونا (Belladonna): چھونے سے 'ملنے سے 'شور سے 'ہوا کے جھونکے سے 'سر پہرے کے وقت 'نیچے لیٹنے سے اور بال کائے سے اتھری ہوتی ہے۔

ہیمپٹر سلف (Hepar Sul): خشک سرد ہواؤں سے اور ٹھنڈی ہوا سے اتھری ہوتی ہے۔ معدنی جھونکے سے 'پارے سے اور چھونے سے اتھری ہوتی ہے۔ درد والے پولو پر لیٹنے سے اتھری ہوتی ہے۔

سٹیفی سٹیریا (Staphisagria): غصے سے 'جذبات کے بحروغ ہو جانے سے 'غم سے 'جذبات

کو ٹھیس لگ جانے سے 'رطوبات کے ضائع ہو جانے سے' 'خلق سے' 'جنسی بے اعتدالیوں سے' اور تمباکو نوشی سے اتھری ہوتی ہے۔ متاثرہ حصوں کو ہلکا سا چھونے سے 'دوسروں کے غلط افعال کی وجہ سے اتھری ہوتی ہے۔

کاربو ویج (Carbo Veg) : شام کے وقت 'رات کے وقت اور کھلی ہوا میں 'سردی سے اتھری ہوتی ہے۔ مرغن غذا سے 'نکھن سے' 'پیشہ سے' 'کافی سے' اور دودھ سے اتھری ہوتی ہے۔ گرم مرطوب موسم سے 'پیشاب سے اتھری ہوتی ہے۔

کولو سنٹس (Colocynthis) : فسمے سے اور جذبات کے بھروسہ ہو جانے سے اتھری ہوتی ہے۔

بوریکس (Borax) : بچے کی جانب حرکت کرنے سے اتھری ہوتی ہے۔ شور سے اتھری ہوتی ہے۔ سریت نوشی سے 'گرم موسم سے' 'حیض کے بعد اتھری ہوتی ہے۔

انیشیا (Ignatia) : بری خبروں کے سننے سے 'صبح کے وقت' 'کھلی ہوا میں' 'کھانا کھانے کے بعد' 'کافی سے' 'سگریٹ نوشی سے' 'ناکھات سے' 'بیرونی گرمی سے' اور شور سے اتھری ہوتی ہے۔

کالچیکم (Colchicum) : سورج غروب ہونے سے 'سورج طلوع ہونے تک' اتھری ہوتی ہے۔ حرکت سے اتھری ہوتی ہے۔ نیند کھو جانے سے اتھری ہوتی ہے۔ غذا کی بوسے سے اتھری ہوتی ہے۔

صبح کے وقت اتھری ہوتی ہے۔ ذہنی تھکان سے اتھری ہوتی ہے۔ شور سے اتھری ہوتی ہے۔

کوکولس (Cocculus) : کھانا کھانے کے بعد 'نیند اچٹ جانے کے بعد' 'کھلی ہوا میں' 'سگریٹ نوشی سے' 'گھڑ سواری سے' 'بی اکی سے' 'چھونے سے' 'شور سے' اور بٹنے سے اتھری ہوتی ہے۔

پہرے کے وقت 'حیض کے دوران' اتھری ہوتی ہے۔ جذباتی ظلل اندازی سے اتھری ہوتی ہے۔

کاربو انیمالس (Carbo Animalis) : داڑھی مونڈنے کے بعد اتھری ہوتی ہے۔ حیوانی رطوبت کے ضائع ہونے سے اتھری ہوتی ہے۔

رشاکس (Rhus Tox) : رات کے وقت 'دوران نیند' مرطوب برساتی موسم میں اور بارش کے بعد 'آرام کرنے کے دوران' جب کمر کے بل لیٹا جائے یا دائیں گردن لٹنے سے اتھری ہوتی ہے۔

روڈوڈنڈرون (Rhododendron) : آندھی کے بعد اتھری ہوتی ہے۔ خراب موسم میں گرم علامات دوبارہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ رات کے وقت اور صبح ہوتے ہوتے اتھری ہوتی ہے۔

کوکا (Coca) : بلند جگہ پر چڑھنے سے اتھری ہوتی ہے۔

کلیبریا فاس (Calcarea Phos) : مرطوب سرد موسم میں 'پہرے اتارنے سے' 'برف کے پھٹنے پر اتھری ہوتی ہے۔

فیرم میٹ (Ferrum Met): آرام کرنے کے دوران مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ ضیقِ انقباضی اور کمزوری میں آرام کرنے سے ابتری ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ حرکت کرنے سے بہتری ہوتی ہے لیکن ذرا سی تھکان سے علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

مگنیشیا میور (Magnesia Mur): سونے کے لئے آنکھیں بند کرنے پر ابتری ہوتی ہے۔ آنکھیں بند کرنے پر مریض بہت زیادہ پریشان، سبے چین اور چلبلا ہو جاتا ہے چنانچہ وہ ضرور کبل یا چادر وغیرہ جو کچھ اوڑھا ہوتا ہے، اتار پھینکتا ہے۔ ایک لمبا سانس لیتا ہے یا کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ نمکین چیزوں سے اور سمندر کی ہوا میں سانس لینے سے علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

مگنیشیا فاس (Magnesia Phos): دائیں کروٹ لیٹنے سے، ٹھنڈے سے، رات کے وقت چھوٹے سے ابتری ہوتی ہے۔

جیلی میم (Gesemium): مرطوب موسم سے، طوفان باد و باران کے آنے سے پہلے، جذبات سے، جوش سے، بری خبروں سے، تمباکو نوشی سے اور جب مریض اپنی بیماری کے متعلق سوچے تو ابتری ہوتی ہے۔

ڈائی سکوریا (Dioscorea): شام کے وقت اور رات کے وقت، نیچے لیٹنے سے اور جھک کر دہرا ہونے سے ابتری ہوتی ہے۔

برومیم (Bromium): شام سے آدھی رات تک ابتری ہوتی ہے۔ جب گرم کمرے میں بیٹھے تو ابتری ہوتی ہے۔ گرم مرطوب موسم میں، جب آرام کر رہا ہو اور پائیں کروٹ لیٹا ہو تو ابتری ہوتی ہے۔

سائیکلے من (Cyclamen): کھلی ہوا میں، شام کے وقت، بیٹھنے سے، کھڑے ہونے سے، ٹھنڈے پانی سے ابتری ہوتی ہے۔

اناکارڈیم (Anacardium): گرم پانی پینے سے یا لگنے سے ابتری ہوتی ہے۔ کیوپرم میٹ (Cuprum Met): حیض سے پہلے ابتری ہوتی ہے۔ تپ سے اور لمس سے ابتری ہوتی ہے۔

اپیس مل (Apis Mel): گرمی کی کسی بھی قسم سے ابتری ہو جاتی ہے۔ چھوٹے سے ابتری ہوتی ہے۔ دباؤ سے ابتری ہوتی ہے۔ سہ پہر کے آخری حصہ میں ابتری ہوتی ہے۔ سونے کے بعد ابتری ہوتی ہے۔ تنگ اور گرم کمرے میں ابتری ہوتی ہے۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): حدت کی ہر قسم کے باعث ابتری ہوتی ہے۔ رات کے وقت ابتری ہوتی ہے۔ ٹھنڈی غذا سے ابتری ہوتی ہے۔ مٹھائیوں سے ابتری ہوتی ہے۔ کھانے

کے بعد اتھری ہوتی ہے۔ حیض کے زمانے میں اتھری ہوتی ہے۔ جذباتیت سے اتھری ہوتی ہے۔
یا میں جانب اتھری ہوتی ہے۔

ہوائی سفر کی تکلیفات — (Air-Sickness)

(دیکھئے "سمندری سفر کی تکلیفات")

الرجی — (Allergy)

الرجی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں مریض پر کسی چیز کا غیر معمولی یا مبالغہ آمیز مخصوص اثر مرتب ہوتا ہے حالانکہ وہ چیز لوگوں کی اکثریت کے لئے انہی حالات اور اسی مقدار میں غیر نقصان دہ ہوتی ہے مثلاً مچھلی، بیری (رس بھری وغیرہ)، انڈے، سفید روٹی یا دیگر بہت سی غذا میں درج ذیل قسم کی علامات پیدا کر دیتی ہیں مثلاً چھپاکی، متلی، قے، درد، جلاب، درد حقیقہ، دمہ اور کئی دیگر بہت سے مزاہنوں کی علامات۔ بعض ادویات جنہیں لوگوں کی اکثریت برداشت کر لیتی ہے۔ ایسے اشخاص میں الرجی کی علامات پیدا کر دیتی ہیں۔ اسی کے ذریعے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، جو کہ مخصوص قسم کی غذا یا دوا سے حساس ہوتے ہیں۔

ٹیوبرکولینم، سلفر (Sulphur, Tuberculinum): یہ ادویات دودھ، دودھ سے بنی ہوئی چیزوں، انڈوں، سارڈائن، مچھلی، جانوروں کی پکی ہوئی غذا اور بالوں کے رنگنے وغیرہ سے لاحق ہونے والی الرجی کے لئے چوٹی کی ادویات ہیں۔ سب سے پہلے ٹیوبرکولینم 200 ڈائی یوشن کی صورت میں دینی چاہئے اگر ہر ہفتے دو خوراکیں دینے پر بہتری کی صورت پیدا نہ ہو تو سلفر 200 کی ایک خوراک ہر ہفتے دی جائے۔ اگر اس طاقت سے کوئی اثر ظاہر نہ ہو تو اسے پودھاکر 1000 کیا جاسکتا ہے اور ہر پندرہ دن میں ایک دو خوراکیں دینی چاہئیں۔ ایسے دی گئی سلفر کی علامات بھی دیکھئے۔

تھائی رائیڈین (Thyroidin): الرجی والی سوزش کے لئے یہ ایک شاندار دوا ہے۔ اس سوزش میں بے انتہا جھینکلیں آتی ہیں اور ناک کی بلنی مچھلی میں استھتائی سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ غیر کسی ظاہری وجہ کے ضیق التنفسی ہوتی ہے۔ یہ دوا شدید قسم کی ضیق التنفسی کے ساتھ الرجی کے دے میں بھی دی جاتی ہے۔ چھپاکی ہوتی ہے۔ اگر نیمالاحق ہوتا ہے۔ چکر آتے ہیں۔ درد مہر ہوتا ہے۔ متلی ہوتی ہے اور اعصابی درد وغیرہ اور یہ سب کچھ الرجی کے باعث ہوتا ہے۔

پورینیم (Psorinum): گندم کی الرجی جس کے باعث اگر نیمالاحق ہوتا ہے۔ یہ ٹیوبرکولینم کی زمین دوا ہے اور اس جگہ دینی چاہئے۔ جہاں ٹیوبرکولینم ناکام ہو جائے یا صرف جزوی طور پر

دودے۔ اسے سلفر کے ٹاکام ہو جانے پر بھی دیتا چاہئے۔

ایپیم گریو (Apium Grav): ایک خاص قسم کی انوائٹن کھانے سے الرتی ہوتی ہے۔ جس کے باعث خارش پیدا ہو جاتی ہے۔ 200 یا 1000 ذاتی یوشن کی صورت میں ہفتے کے بعد یا پندرہ دن کے بعد یہ دوا دی جائے۔

فرگنیا ورسکا (Fragaria Vasca): رس بھری کی الرتی 'ہو چھپاکی کو پیدا کر دیتی ہے۔ جنس اوقات سانس میں بھی دقت ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ چھاتی پر وزن رکھا ہوا ہو۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): مچھلی کے تیل کی الرتی 'چکنائی اور سنگترے کے رس کی الرتی 'مریض پر زمین پر مشتمل غذا سے حساس ہوتا ہے۔ اس کے جسم میں تیل یا چکنائی سے صفر پیدا ہوتا ہے۔ ٹھنڈے کھنے کا رجحان ہوتا ہے اور مریض آسانی سے تھک جاتا ہے۔

تھوجا (Thuja): پیاز کی الرتی ہو کہ مریض کے لئے زہری کی حیثیت رکھتا ہے۔
لائکوپوڈیم (Lycopodium): کستورا مچھلی کی الرتی 'کستورا مچھلی کا استعمال مریض کے لئے زہری کی حیثیت رکھتا ہے۔

سیکارم آف (Saccharum Off): شکر یا گنے سے الرتی ہوتی ہے۔
رٹیکا یورینس (Urtica Urens): دودھ سے الرتی ہوتی ہے۔ جس کے باعث چھپاکی نکل آتی ہے۔

نیٹرم یور (Natrium Mur): انڈوں 'نشاستے' دودھ' شہد' ریک جج کے دانے 'پاز' منہ م' جانوروں کی غذا وغیرہ سے الرتی ہوتی ہے۔

فیرم مینٹ (Ferrum Met): انڈوں سے الرتی ہوتی ہے۔

سلفر (Sulphur): پروں سے اور چاکلیٹ سے الرتی ہوتی ہے۔ ایک مریض کے تپ کافی کا علاج پروں والے ٹکے کے علاج سے کیا گیا۔ مریض بالوں کے رگھنے سے حساس ہوتا ہے جو کہ اکثر پیدا کر دیتا ہے۔ جانوروں کی پکی ہوئی غذا سے الرتی ہوتی ہے۔ بالوں کے رگھنے سے پیدا ہونے والی تکالیف کے لئے جب سلفر ٹاکام ہو جائے تو فیور کو لینم 200 دی جائے۔

ارجنٹم نائٹریکیم (Argentum Nitricum): الرتی کے تمام امراض کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ جن کا حلق جلد سے 'بانی بھلیوں سے' اور دیگر حصوں اور اعضاء سے خصوصاً پچھڑوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔

کمی (علامات میں) — (Amelioration)

نکس وامیکا (Nux Vom): نیند سے بہتری ہوتی ہے اگر نیند کو پورا ہونے دیا جائے۔ شام

کے وقت سونے کے بعد بہتری ہوتی ہے۔ آرام کرنے سے 'مرطوب تر موسم میں' بہت زیادہ دبانے سے بہتری ہوتی ہے۔

آرسنک البم (Arsenic Alb): حرارت سے بہتری ہوتی ہے۔ سر اوپر اٹھانے سے بہتری ہوتی ہے۔ گرم مشروبات پینے سے 'پینے سے' کمر کے بل لینے سے جبکہ کندھے اٹھائے ہوئے ہوں۔ بہتری ہوتی ہے۔

مینگانم (Manganum): نیچے لینے سے تمام علامات میں بہتری ہوتی ہے۔ لینے سے مریض کے درد 'خوف' پریشانی اور بے چینی غائب ہو جاتی ہے۔

برائی اونیا (Bryonia): درد والے پیلو پر لینے سے 'دباؤ سے' آرام سے 'ٹھنڈی چیزوں سے' بہتری ہوتی ہے۔

چائنا (China): جبکہ کردہرا ہونے سے 'سخت دباؤ سے' کھلی ہوا سے 'گرمی سے' علامات میں کمی ہوتی ہے۔

کیمومیل (Chamomilla): اٹھا کر لے جائے جانے سے 'گرم مرطوب موسم میں' پینے سے علامات میں کمی ہوتی ہے۔

سکس کس کین (Cistus Can): کھانے کے بعد بہتری ہوتی ہے۔
کاسٹیکم (Causticum): نمی سے 'مرطوب موسم میں' بہتری ہوتی ہے۔ گرمی سے 'بہتری گرمی سے' نمانے سے بہتری ہوتی ہے۔

کالی کارب (Kali Carb): گرم موسم میں گو نمودار ہو بہتری ہوتی ہے۔ دن کے دوران 'حرکت کرنے سے' بہتر بیٹھنے سے بہتری ہوتی ہے۔

سورینم (Psorinum): حرارت سے 'گرم کمپروں سے' حتیٰ کہ گرمیوں میں بھی بہتری ہوتی ہے۔

سلیشیا (Silicea): گرمی سے 'سر کو پٹینے سے' موسم گرما میں علامات میں کمی ہوتی ہے۔
ایسڈ فاس (Acid Phos): گرم رہنے سے اور پیشاب کرنے سے بہتری ہوتی ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): اندھیرے میں 'دائیں کروٹ لینے سے' 'ٹھنڈی غذا سے' سرد کھلی ہوا میں 'ٹھنڈے پانی سے' دھونے پر 'سونے سے' بہتری ہوتی ہے۔

سٹرامونیم (Stramonium): تیز روشنی سے 'رفاقت سے' گرمی سے بہتری ہوتی ہے۔

کونٹیم (Conium): روزہ رکھنے سے بہتری ہوتی ہے۔ اندھیرے میں بہتری ہوتی ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں کو ہلکانے سے بہتری ہوتی ہے۔ حرکت سے اور دبانے جانے سے بہتری ہوتی ہے۔ پاؤں کرسی پر رکھنے سے بہتری ہوتی ہے۔

سلفر (Sulphur): خشک گرم موسم میں 'دائیں کروٹ لینے سے' متاثرہ بازوؤں اور ٹانگوں کو اوپر کی جانب اٹھانے سے بہتری ہوتی ہے۔

نیٹرم میور (Natrium Mur): کھلی ہوا میں 'ٹھنڈے پانی سے' نماتے پر 'باقاعدہ کھانوں کے بغیر رہنے سے' 'دائیں کروٹ لینے سے' 'کمر کو دبانے سے' 'کسے ہوئے کپڑے پہننے سے' 'بھردی کے اظہار سے بہتری ہوتی ہے۔

لیکیسیس (Lachesis): اخراج کے ظاہر ہونے پر 'دوران حیض بہتری ہوتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا سے 'لازمی طور پر کھڑکیاں کھلی رکھنے سے بہتری ہوتی ہے۔

ڈلکامارا (Dulcamara): حرکت کرنے سے بہتری ہوتی ہے۔ بیرونی گرمی سے بہتری ہوتی ہے۔

ارانیڈیاڈ (Aranea Diad): تمباکو نوشی سے بہتری ہوتی ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): کھلی ہوا میں 'لازمی طور پر کھڑکیاں کھلی رکھنے سے' 'حرکت سے' ٹھنڈی چیزیں لگانے سے یا ٹھنڈے پانی سے دھونے سے 'نماتے سے' ٹھنڈی غذا اور مشروبات سے 'گو پیاس بالکل نہ ہو' 'آدھی رات سے دوپہر تک' 'سر اوپر اٹھا کر لینے سے بہتری ہوتی ہے۔

لیڈم پی (Ladum P): ٹھنڈے سے 'پاؤں برف کے ٹھنڈے پانی میں رکھنے سے بہتری ہوتی ہے۔

لائیکو پوڈیم (Lycopodium): حرکت سے 'آدھی رات کے بعد' گرم غذا اور گرم مشروبات سے 'ٹھنڈے لگنے سے' 'کپڑے اتارنے سے بہتری ہوتی ہے۔

اگیریکس (Agaricus): سونے سے افادہ ہوتا ہے۔

کاربو ورج (Carbo Veg): ڈکاروں سے 'پٹکا کرنے سے' 'سروی سے بہتری ہوتی ہے۔

کولوسینٹھس (Colocynthis): جھک کر دوہرا ہونے سے 'سخت دباؤ سے' 'گرمی سے' 'سر آگے کو جھکا کر لینے سے بہتری ہوتی ہے۔

سیکیل کار (Secale Cor): ٹھنڈے سے 'کپڑے اتارنے سے' 'مسلمے سے' 'بازو اور ٹانگیں پھیلانے سے بہتری ہوتی ہے۔

الیومینا (Alumina): کھلی ہوا میں بہتری ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے دھونے سے بہتری ہوتی ہے۔ شام کے وقت اور ایک ایک دن کے وقفے سے بہتری ہوتی ہے۔ مرطوب موسم میں بہتری ہوتی ہے۔

اگنیشیا (Ignatia): مریض جب کھانا کھا رہا ہو تو بہتری ہوتی ہے۔ حالت بدلتے سے بہتری ہوتی ہے۔ کوئی ٹھوس چیز نگلتے ہوئے بہتری ہوتی ہے۔ سخت دباؤ سے بہتری ہوتی ہے۔

رشاکس (Rhus Tox) گرم خشک موسم میں 'حرکت سے' چلنے سے 'حالت بدلنے سے' مسئلے سے 'گرم چیزیں لگانے سے' بازو اور ٹانگیں پھیلانے سے بہتری ہوتی ہے۔ درد کے باعث بے چہتی ہوتی ہے۔

آرنیکا ایم (Arnica M) بہتری ہوتی ہے 'مسلل حرکت کرنے سے' یا حالت بدلنے سے جو کہ دھن کے باعث ہوتی ہے نہ کہ درد کے باعث۔

روڈوڈنڈران (Rhododendron) طوفان باد و باران کے وقفوں میں 'گرمی اور کھانے سے بہتری ہوتی ہے۔

کوکا (Coca) شراب پینے سے بہتری ہوتی ہے۔ گھڑ سواری سے بہتری ہوتی ہے۔ کھلی ہوا میں تیزی سے حرکت کرنے سے بہتری ہوتی ہے۔

کلکیریا فاس (Calcarea Phos) خشک گرم موسم میں 'موسم گرما میں' خشک فضا میں بہتری ہوتی ہے۔

مگنیشیا فاس (Magnesia Phos) گرمی سے 'جھک کر دوہرا ہونے سے' دبانے سے 'دگر' سے 'مسئلے سے بہتری ہوتی ہے۔

جیلسمیم (Gelsemium) باافراط پیشاب آنے سے 'آگے کو جھکنے سے بہتری ہوتی ہے۔ کھلی ہوا میں 'مسلل حرکت سے' تحریکات سے بہتری ہوتی ہے۔

کالچیکم (Colchicum) بے حس و حرکت ہونے سے یعنی بے ہوشی سے بہتری ہوتی ہے۔ ڈالی سکوریا (Dioscorea) آنز کرکڑے ہونے سے بہتری ہوتی ہے۔ کھلی ہوا میں حرکت سے بہتری ہوتی ہے۔ دبانے سے بہتری ہوتی ہے۔

برومیم (Bromium) کسی بھی حرکت سے بہتری ہوتی ہے۔ ورزش سے بہتری ہوتی ہے۔ سمندر میں بہتری ہوتی ہے۔

جگ یلنزی سینی را (Juglans Cinera) گرم ہونے سے 'ورزش سے' کھانے سے 'صبح کو جاگنے پر بہتری ہوتی ہے۔

یوفوربیا لیتھ (Euphorbia Lath) سینے سے 'تل لگانے سے' اور بند کمرے سے بہتری ہوتی ہے۔

ہیلونیا (Helonias) کچھ بھی کرنے سے (ذہنی انتشار) بہتری ہوتی ہے۔ سیائی جیلیا (Spigelia) دائیں کمرے لینے سے جبکہ سر بلند ہو 'سانس اندر کھینچنے وقت بہتری ہوتی ہے۔

سائیکل من (Cyclamen) حیض کا خون جاری ہونے کے دوران بہتری ہوتی ہے۔ حرکت

کرنے سے بہتری ہوتی ہے۔ اعضاء کو مسلنے سے بہتری ہوتی ہے۔ گرم کمرے میں بہتری ہوتی ہے۔ لیہوں کا پانی پینے سے بہتری ہوتی ہے۔

اناکارڈیم (Anacardium): کھانے سے بہتری ہوتی ہے۔ کمر کے بل لیٹنے سے 'مسلمے سے بہتری ہوتی ہے۔

کیوپرم میٹ (Cuprum Met): ٹیپنڈ آلے کے دوران 'ٹھنڈا پانی پینے سے اور سونے سے بہتری ہوتی ہے۔

امپیس ایم (Apis M): کھلی ہوا میں 'کپڑے اتارنے سے 'ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بہتری ہوتی ہے۔

ار جینٹم نائٹ (Argentum Nit): ڈکاروں سے 'تازہ ہوا سے 'ٹھنڈے سے اور دہانے سے بہتری ہوتی ہے۔

ہیپرسلف (Hepar Sulph): مرطوب موسم میں 'سر کو لپیٹنے سے 'گرمی سے 'کھانے کے بعد بہتری ہوتی ہے۔

قلت خون — (Anaemia)

فیرم ایسی ٹیٹ (Ferrum Acetate): شدید قسم کی قلت خون لاحق ہوتی ہے۔ یہ دوا قلت خون کے لئے مخصوص ہے اور اس کو آزمانے میں دوسرے فیرم کیپاؤنڈوں پر ترجیح دینی چاہئے۔ IM یا GM ذائی یوٹن کی صورت میں دی جاسکتے۔

فیرم میٹ (Ferrum Met): وقفہ وار بخاروں کے بعد قلت خون لاحق ہوتا ہے۔ بے ہوش ہو جانے کے ساتھ دماغی قلت خون لاحق ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں میں قلت خون کا لاحق ہونا جو کبھی بھر پور خون والے ہوتے تھے لیکن اب ہاتھوں اور پاؤں میں بھراؤ کے ساتھ پیلے پڑ چکے ہوں۔ اعضاء کے بہت پیلے پڑ جانے کے ساتھ قلت خون کا لاحق ہونا اس کے ساتھ اچانک چہرے میں آگ کی طرح سے خون بھر جاتا ہے۔ مریض پھولا ہوتا ہے اور استسقاء ہوتا ہے۔ داغوں کے ساتھ جلد پیلی پڑ جاتی ہے۔

آرسنک ایلم (Arsenic Alb): اعتماد سے کی نگہبست اور پریشانی ہوتی ہے۔ استسقاءی سوجن ہوتی ہے۔ دل کی دھڑکن شدید ہوتی ہے۔ شدید قسم کی پیاس معدے کے ہیجان کے ساتھ ہوتی ہے۔ لمیرا یا اعتدال سے زیادہ کوٹنن کے استعمال کے باعث دماغ کی قلت خون لاحق ہو۔

نکلس وامیکا (Nux Vom): دماغ کی قلت خون جو کہ بہت زیادہ ہوش کے باعث اور ذہنی کام کی زیادتی کے باعث لاحق ہوتی ہے نیز دماغ کے نرم پڑ جانے کے باعث۔

زنگم میٹ (Zincum Met): قالمی حالت کے ساتھ دماغی قلت خون کے مریضوں میں یہ دوا دی جاتی ہے۔

فیرم فاس (Ferrum Phos): سر میں شدید چکن والے درد کے ساتھ قلت خون لاحق ہو جس کے ساتھ کھوپڑی کی انتہا درجے کی حساسیت بھی ہوتی ہے۔ دماغ خون سے بھرا ہوتا ہے لیکن یہ خون پانی والا ہوتا ہے۔

چائینم آرس (Chininum Ars): سونے کے دوران باافراط اور رستے والا پینہ آنے کے ساتھ قلت خون لاحق ہوتی ہے۔

چائنا (China): جب قلت خون، خون اور دیگر رطوبات کے ضائع ہو جانے کے باعث لاحق ہو۔ درد سر اور کانوں میں گرجن کے ساتھ دماغ کی قلت خون لاحق ہوتی ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): طویل عرصہ تک رہنے والے دباؤ کے باعث قلت خون لاحق ہو۔ چھاتی کے کساؤ اور دھکن کے ساتھ دل کی دھڑکن لاحق ہوتی ہے۔ ذہنی کھنچاؤ کے باعث دماغ کی قلت خون لاحق ہو۔

نیرم میور (Natrium Mur): کم مقدار میں اور مؤخر شدہ حیض کے باعث قلت خون لاحق ہو۔ مریض نزلہ ہوتا ہے۔ جب خون اور رطوبت کے ضائع ہو جانے کے نتیجے میں قلت خون لاحق ہو۔

پیکریک ایسڈ (Picric Acid): بڑھنے والی مسلک قلت خون۔

ایسٹک ایسڈ (Acetic Acid): کمزوری، لاغری، بھوک کی عدم موجودگی، موروثی سل، جلن دار پیاس اور باافراط پیلا پیتھاب آنے کے ساتھ قلت خون لاحق ہو۔

مینگانم (Manganum): ٹکڑی ہوئی جسمانی صحت، قلت خون، موی اور بیمار شکل و صورت اس وقت ہوتی ہے۔ جب اس کی وجہ سیلان خون یا دیگر زائد مادوں کا اخراج نہ ہو۔

لیسیٹین (Lecithin): یہ دوا سرخ جیسوں کی تعداد اور تیسو گلوین کی مقدار میں اضافہ کرتی ہے۔

الومینا سیلیکیٹ (Alumina Silicate): نمایاں قسم کی لاغری اور قلت خون، بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے اور مریض ہر وقت بستر پر لیٹے رہتا چاہتا ہے۔ گوشت کم ہو جاتا ہے۔

ٹرینٹروٹولوین (ٹی۔ این۔ ٹی) (Trinitrotoluene (T.N.T.)): اسلحہ کی فیکٹری میں کام کرنے والے کارکنوں میں جو ٹی۔ این۔ ٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں، ٹھیکین قسم کی قلت خون اور برقان کے لئے ایک موزوں دوا ہے۔ سانس پھول جاتا ہے۔ غنودگی ہوتی ہے۔ درد سر، بے ہوشی، دل کی دھڑکن اور بھلا برقان ہو جاتا ہے۔

ایسٹریس فاری نوسا (Aletis Farinusa): سبز رنگ، جسم اور ذہن کی تھکان کے باعث بننے والی طبیعت جو کہ طول پکڑ جانے والی بیماری کے باعث ہو۔ سبز بھس والی لڑکیوں اور حاملہ عورتوں کے لئے موزوں ہے۔ اسکا حل کی علامت ہو جاتی ہے۔

کلیکیریا کارب (Calcarea Carb): بچپن سے لاحق ہونے والی قلت خون، خصوصاً سفید پانی مزاج والوں کے لئے یہ دوا موزوں ہے۔ مونا ہونے کے رجحان کے ساتھ نرم ریشے ہوتے ہیں۔ حرکت میں اور دانت نکالنے میں مریض سست ہوتا ہے۔ بد قسمتی کے آنے کا احساس ہوتا ہے۔ کابل ہضم چیزوں کی طلب ہوتی ہے۔

تھائی رائیڈینم (Thyroidinum): گلز والے مریضوں میں خون کی کمی ہوتی ہے جو اعصابی لرزہ کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ اعصابی لرزہ چہرے، ٹانگوں اور بازوؤں میں ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن اور جاڑا لاحق ہوتے ہیں۔ لاغری ہوتی ہے۔ عضلاتی کمزوری ہوتی ہے۔ پسینہ آتا ہے اور ہجھکاہٹ کا احساس ہوتا ہے۔

ترياق — (Antidote)

لیڈم پی (Ledum P): کمزوروں اور جانوروں کے ذہر کا ترياق۔

تھوجا (Thuja): چائے اور حفاظتی ٹیکوں کا ترياق۔

الیومین (Alumina, Alumen): یہ سیسے کی ترياق دوائیں ہیں۔ یہ دوائیں چھاپے خانوں میں کام کرنے والوں میں جو کہ سیسے میں کام کرتے ہوں۔ سیسے کے ذہر کے رجحان کو ختم کرتی ہیں۔

فاسفورس (Phosphorus): یہ کلور و قلم کے اثر کو تقریباً لحالت میں ختم کر دیتی ہے اور تے کو روک دیتی ہے۔

سانس رک جانا — (Asphyxia)

انٹیم ٹارٹ (Antim T): زرد چہرے یا گہرے سرخ چہرے اور نیلے ہونٹوں کے ساتھ بے ہوشی (قوس) ہوتی ہے۔ عضلاتی پھڑکن ہوتی ہے۔ نوزائیدہ بچوں میں 'جبکہ حلق اور سینے سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔ غنودگی ہوتی ہے۔

اوپیم (Opium): کاربوئک الیڈ گیس سانس کے ذریعے اندر لے جانے سے سانس رک جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچوں میں جب انٹیم ٹارٹ ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ نبض محسوس نہیں ہوتی۔ چہرہ اور غوائی ہو جاتا ہے۔

بووٹا (Bovista): کوئلے کی گیس (کاربن مونو آکسائیڈ) کے باعث سانس کا رک جانا لاحق ہوتا ہے۔

کاربونیم سلف (Carbonium Sul): جب کوئلے کی گیس میں سانس لینے کے باعث یا الکوحل کے باعث سانس رک جائے۔

کوچلریا (Cochlearia): بظاہر مرگی والی موت ہوتی ہے۔ پیچھے زروں اور ناک سے سیلان خون ہونے کے بعد بچوں میں کالی کھانسی۔

چائنا (China): نوزائیدہ بچوں میں ماں کے ذریعے بہت زیادہ خون ضائع ہو جانے کے بعد یا جب نوزائیدہ بچہ زرد ہو۔

کیمفر (Camphor): بظاہر موت واقع ہو جاتی ہے جبکہ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔

بے ڈھنگے (Awkward)

ایگریکس ایم (Agaricum M): جسم کے عضلات کی حرکات کو متوازن بنانے میں مشکل ہوتی ہے۔ دماغ اور حرام مغز کی عدم مطابقت مریضہ جو چیزیں کھڑتی ہے انہیں گرا دیتی ہے۔ رکلیاں وغیرہ توڑ دیتی ہے۔ کیونکہ وہ انہیں گرا دیتی ہے۔ مریض گرمی سے بہتر ہو جاتا ہے یا آگ کے قریب بیٹھنے سے بہتری ہوتی ہے۔

ایپس ایم (Apis M): اگر یکس کے مماثل علامات سوائے اس کے کہ ایپس کی مریضہ ٹھنڈے سے بہتر ہوتی ہے اور آگ کی گرمی سے بچنے کے لئے پاؤں پی خانے سے باہر رہنا پسند کرتی ہے۔ کیپسکیم (Capsicum): بچے بے ڈھب اور بھڑے ہوتے ہیں۔ انہیں گھڑکی یاد ستاتی رہتی ہے اور سکول سے گھر چلے جانا چاہتے ہیں۔ یہ بچے گول مٹول ہوتے ہیں اور ان میں برداشت نہیں ہوتی۔

پس ماندہ (Backward)

(بچے جن کی نشوونما مناسب طور پر نہیں ہو پاتی اور وہ احمق اور ضعیف العقل دکھائی دیتے ہیں) (نیز دیکھئے ”بونا پن“)

بیرٹا کارب (Baryata Carb): ذہانت کا فقدان ہوتا ہے۔ ذہنی الجھاؤ ہوتا ہے۔ خاطر العقل کی کیفیت ہوتی ہے۔ سمجھنے میں سستی ہوتی ہے۔ حرکت کرنے میں سستی ہوتی ہے۔ مریض ہر آدمی سے ڈرتا ہے۔ اجنبیوں سے اور بھی زیادہ۔ غیر متوجہ اور غیر مستقل ہوتا ہے۔ بچہ اپنے والدین اور ساتھیوں کے لئے سخت دل ہوتا ہے اور تکلیف کا اظہار نہیں کرتا۔ وجہ

عمل اور عمل میں ربط نہیں ہوتا۔

سٹرامونیم (Stramonium): انتہا درجے کا تشدد اور اعصابی 'مضطرب اور غصیلہ ہوتا ہے۔ روتا ہے اور چلاتا ہے 'مارتا ہے اور کانتا ہے۔ بھاگ جانا چاہتا ہے۔ جلد خوف زدہ ہو جانے والا اور خواب میں خوفناک چیزیں نظر آنے پر چونک کر جاگ جاتا ہے۔ رفاقت پسند کرتا ہے۔ اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اندھیرے سے ڈرتا ہے۔ روشنی کو پسند کرتا ہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): مریض 'خرم' ست اور بے ہمت ہوتا ہے۔ ست قسم ہوتا ہے اور ست عمل ہوتا ہے۔ تمام ذہنی کام اسے تھکا دیتے ہیں۔ سر اور ہاتھ پر باغریا پینٹ آتا ہے۔ سر اور پیٹ بڑے ہوتے ہیں۔ معدے میں تیزابیت ہوتی ہے۔ قبض میں بہتری ہوتی ہے۔ جلد 'پیلی' سفید اور ٹیالی ہوتی ہے۔ باتیں کرنا دیر سے سیکھتا ہے۔

سفی لینیم (Syphilinum): بچوں کے بے ڈھب ہونے میں پیرٹا کارب اور سٹرامونیم کے ساتھ اس دوا کو لازماً عمل انگیز دوا کے طور پر دینا چاہئے۔ مزاج تبدیل ہونے والا ہوتا ہے۔ ہنسی پھوٹی ہے اور کھری اداسی ہوتی ہے۔

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): مندرجہ بالا دیگر ادویات کے ساتھ اس دوا کو بھی بچوں کے بے ڈھب ہونے میں عمل انگیز کے طور پر دینا چاہئے۔ بچوں کے بے ڈھب ہونے میں علاج کے آغاز میں اس دوا کو دینا ہمیشہ مفید رہا ہے۔ ذہنی اور جسمانی نشوونما رک جاتی ہے۔ دانت ظاہر نہیں ہوتے۔

اورم میٹ (Aurum Met): کم حوصلہ 'زندگی سے عاری' بری یادداشت والے مریضوں کے لئے۔ لڑکپن والی باتوں کا فقدان ہوتا ہے۔

سیلیشا (Silicea): زرد تیار ہونے جو کہ چڑچڑے ہوتے ہیں جو سیکھتے نہیں اور کھیلتے نہیں۔ معمولی ذمہ داری سے بھی بھاگتے ہیں۔ خود اعتمادی اور خود پر بھروسہ بالکل نہیں ہوتا۔

آگیرونیکس ایم (Agaricus M): دیر سے بولنا سیکھنے والے اور دیر سے چلنے والے بچے۔ ست روی سے نشوونما پانے والا دماغ۔ ایسے بچے جو یاد نہیں رکھ سکتے۔ غلطیاں کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں۔

نیٹرم میور (Natrium Mur): دیر سے باتیں سیکھنے والے۔

بیوفو (Bufo): ذہانت کی ترقی کا فقدان 'بچکانہ حالت باقی رہتی ہے۔ جبکہ جسم نشوونما پا جاتا ہے۔ خوف اور سادہ پن ہوتا ہے۔

تھوجا (Thuja): ذہنی پسماندہ بچے 'بہت گندے ہوتے ہیں۔ رات کے دوران پاخانہ اور پیشاب بلا ارادہ خارج ہو جاتا ہے۔ کتے کا فضلہ کھا جاتے ہیں۔ حفاظتی ٹیکوں کی بے اعتدالی کے

باعث ہو کہ لگوائے نہیں گئے۔ پس ماندگی لاحق ہوتی ہے۔ حفاظتی ٹیکوں کے بد اثرات۔
کیلنڈولا (Calendula): ذہنی پس ماندہ بچوں کے لئے یہ ایک شاندار دوا ہے۔
نوٹ: اوپر دی گئی تمام ادویات 200 ڈائی لیوشن کی صورت میں استعمال کی جائیں اور انہیں ہر
 ہفتے بدل بدل کر دیا جائے۔ ایک کورس میں جو کہ تین سے چار مہینوں تک کا ہوتا ہے دو سے
 زیادہ ادویات استعمال نہ کی جائیں۔ سوائے نیور کولینم اور سفی لینم کے جن میں سے ہر ایک کو
 ایک ماہ کے وقفے کے ساتھ دو ادویات کے ساتھ دینا چاہئے۔ 200 سے اوپر والی طاقت کے ڈائی
 لیوشن صرف اسی صورت میں استعمال کرنے چاہئیں۔ جب کہ بستر کی نظرنہ آئے یا جب اتفاقاً
 میں ترقی رک گئی ہو۔

داڑھی — (Beard)

(نیز دیکھئے "بال")

اینٹھنریم (Anantherum): داڑھی کے بال گر جاتے ہیں۔
سٹنگورس (Sphingurus): بال گر جاتے ہیں۔ خصوصاً داڑھی اور مونچھوں کے بال۔

بستر کے زخم — (Bedsore)

لیکسیس (Lachesis): نیچے کناروں کے ساتھ (ٹائیفائیڈ میں)
سلفر (Sulphur): بستر کے زخم نگہین کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ کھڑے والے درد ہوتا
 ہے۔

کروٹالوس (Crotalus): خون کی حالت خراب ہو جانے کے باعث۔
ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): بچ میں سے ڈھکے ہوئے زخم۔ خشک خون والے چھلکوں
 کے ساتھ۔

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): یہ دوا خصوصی طور پر کولہوں اور پیٹھ والے علاقہ پر ہونے
 والے بستر کے زخموں کے لئے موزوں ہے۔
نوٹ: ہر دلی طور پر کیلنڈولا ہر چھ زخموں پر لگاتا چاہئے۔ خواہ اصلی حالت میں یا ڈائی لیوشن کی
 صورت میں۔

کالٹنا (کالٹنے کے زخم) — (Bites)

ہائپرکیم (Hypericum): کیزے مکوڑوں کے کانٹے سے ہونے والے زخم۔ کتوں یا دوسرے

جانوروں کے کانٹے سے ہونے والے ایسے زخم جو بھرتے نہ ہوں اور جن میں جلن دار اور ڈنک لگنے جیسا درد ہو۔ اس کے ساتھ ان زخموں کے کنارے چمک دار سرخ ہوتے ہیں۔
ایٹک الیڈ (Acetic Acid): ملی کے کانٹے سے ہونے والے زخم (مٹی خواہ پاگل ہو یا پاگل نہ ہو) پھٹا ہوا زخم 'ٹانگ کا اوپر والا اور نیچے والا حصہ سوچ جاتا ہے۔ (یہ دوا بیرونی طور پر بھی لگائیں۔)

لائی سین (Lyssin): کتے کے کانٹے کا زخم 'جلن ہوتی ہے۔ گرم بھاپ سے بہتری ہوتی ہے۔ کتے کے کانٹے کے باعث درد سر ہوتا ہے۔ چو تروں پر اور ان کے قریب والے حصوں میں عجیب احساس ہوتا ہے۔ زخم میں جلن اور کھودنے کا احساس ہوتا ہے۔
لیکیسس (Lachesis): جو کلوں کے کانٹے سے کنکریں والے زخم ہوتے ہیں۔ یہ دوا کتے کے کانٹے کے لئے بھی مخصوص ہے۔

گولون ڈرینا (Golondrina): سانپ کے زہر کا تریاق ہے۔ سانپ کے زہر کے اثر کی مدافعت کے لئے استعمال ہوتی ہے اور حفظ بالقدم کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے۔
لیڈم پی (Ledum P): چوہوں یا بچھوؤں کے کانٹے کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ لیڈم پال مار پتھر بیرونی طور پر لگائیں۔ یہ پتھروں کے کانٹے میں فوری آرام دے گی۔ نیز شمد کی کھیموں وغیرہ کے ڈنک میں بھی فوری آرام دیتی ہے۔ غصیلے جانوروں کے کانٹے کے لئے یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔

سس کس کین (Cistus Can): پاگل جانوروں کے کانٹے کے لئے اور زہریلے زخموں کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔

ارنیکا یورینس (Urtica Urens): شمد کی کھیموں کے ڈنک لگنے کے لئے یہ ایک شاندار دوا ہے۔ یہ دوا مار پتھر کی صورت میں بیرونی طور پر لگائی جاتی ہے۔ جس سے فوری طور پر آرام ملتا ہے اور زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ آرنیکا مونٹ کی طرح سے بھڑکے کانٹے میں کام کرے گی۔
 کینتھرس 200 بھی اندرونی طور پر دیجئے۔

ہوانگ نان (Hoang Nan): سانپ کے کانٹے کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔
سیڈرون (Cedron): ٹانگ کے کانٹے کے لئے یا دیگر زہریلے حشرات الارض کے کانٹے کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): بھڑکے کانٹے کے لئے آرنیکا مار پتھر بیرونی طور پر لگائیں نیز کینتھرس 200 اندرونی طور پر دیں۔

اپیس ایم (Apis M): شمد کی کھیموں کے ڈنک لگنے کے باعث استسقاءی سوجن اور عام سوجن

ہوتی ہے۔ جس کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ یہ دوا شد کی کھیل پالنے والے لوگوں میں شہ کی کھیل کے اثرات سے ممانعت پیدا کرتی ہے۔ اس باب میں یہ دوا 6 یا 12 ڈائی لیوشن کی صورت میں کچھ عرصہ کے لئے دی جاتی ہے۔

اگنیشیا (Ignatia): باتیں کرتے ہوئے چپاتے ہوئے جب کہ رخسار اندر کی طرف سے کٹ جائیں تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ کھاتے ہوئے زبان کے کٹ جانے پر یہ دوا دی جاتی ہے۔
آرم ٹریپ (Anum Trip): ناخنوں کے کاٹنے پر حتیٰ کہ ان سے خون نکل آئے یہ دوا دی جاتی ہے۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): سوتے میں بلا ارادہ زبان کٹ جانے پر یہ دوا دی جاتی ہے۔
سینگا (Senega): غصے میں آئے ہوئے جانوروں کے کاٹنے پر یہ دوا دی جاتی ہے۔
کاسٹیکم (Causticum): چپاتے ہوئے زبان اور رخسار کٹ جانے پر یہ دوا دی جاتی ہے۔
اولیم انیلس (Oleum Ani): کھاتے ہوئے رخسار کٹ جانے پر یہ دوا دی جاتی ہے۔
پانی اونیا (Paeonia): تنگ جوتے کے باعث زخم ہو جانے پر یہ دوا دی جاتی ہے۔ عمومی پھوڑے کے لئے بھی یہ دوا دی جاتی ہے۔

بینزوائک ایسڈ (Benzoic Acid): کھاتے ہوئے غیر ارادی طور پر نچلا ہونٹ کٹ جانے پر یہ دوا دی جاتی ہے۔

یوفوربیا پروستاتا (Euphorbia Prostata): زہریلے کیڑوں اور سانپوں کے کاٹنے کے لئے ایک حسّی دوا ہے۔ خصوصاً ریتل (ایک امریکی سانپ جو اپنی دم سے کمر کڑا ہٹ کی آوازیں نکالتا ہے) سانپ کے کاٹنے کے لئے۔

فائی ٹولاکا (Phytolacca): دانتوں اور مسوڑھوں کو اکٹھے کاٹنے کی ناقص مزاحمت خواہش۔

سیلان خون — (Bleeding)

(نیز دیکھئے "ناک" کے ذیل میں "سیلان خون" اور "اسٹائے سستیم اور پانٹانے" کے ذیل میں "جریان خون" اور "آنکھیں")

لیکیسیس (Lachesis): جسم کے کسی بھی سوراخ سے 'مسوڑھوں سے' منہ سے اور آنکھوں وغیرہ سے خون بہتا ہے۔ ہر خراش یا معمولی کٹنے سے یا زخم سے خون بہہ لگتا ہے۔
گروتالوس ہور (Grotalus Hor): جریان خون کی طبیعت۔ خون آنکھوں سے 'کانوں سے' ناک سے اور جسم کے ہر سوراخ سے بشمول رحم کے بہتا ہے۔ سیاہ بدبودار خون رہتا ہے جو کہ جتا نہیں۔ خون والا ہیٹہ خارج ہوتا ہے۔

کریو زوٹ (Kreosote): گردوں سے 'آنکھوں سے' ناک سے 'رحم وغیرہ سے سیلان خون ہوتا ہے۔ بہت دیر تک رہنے والا جریان خون۔ انگلی مارنے سے بہت زیادہ سیلان خون ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہ ایک قطرہ خارج ہو۔ جب آنکھیں سرخ اور سوزشی ہوں تو ان سے آسانی کے ساتھ خون بہہ نکلتا ہے۔

ملی فولیم (Milefolium): خون کی ٹالیوں کی ناطاقتی والی حالت۔ کسی بھی حصہ سے 'زخموں سے' 'ٹاسوروں سے' 'پھچڑوں سے' 'معدہ سے' 'اسحائے مستقیم سے' ناک سے اور دانت نکالنے کے بعد خون بہتا ہے۔ خون عموماً چمک دار یا سرخ ہوتا ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): معمولی زخموں سے بہت زیادہ خون بہتا ہے۔
سیکیل کار (Secale Cor): معمولی زخموں سے بہتوں خون بہتا رہتا ہے۔ Sanious مانع خارج ہوتا ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں جھنجھناہٹ ہوتی ہے۔

کاربووٹیج (Carbo Veg): سوزشی سطح سے خون رستا ہے۔ ٹاسوروں سے سیاہ خون بہتا ہے۔ کسی بھی سوراخ سے خون بہتا ہے یعنی پھچڑوں سے 'رحم سے' مثلاً وغیرہ سے۔ یہ سب نرم دوران خون کے باعث ہوتا ہے۔ خون آہستہ آہستہ رستا ہے اور تیز بہاؤ کے ساتھ نہیں آتا۔

فیرم میٹ (Fermum Met): جریان خون والی طبیعت۔ چمک دار سرخ خون جو آسانی سے جم جائے۔

سنامونم (Cinnamonum): ناک سے 'آنٹوں سے' 'پھچڑوں سے' یا معدے سے خون بہتا ہے۔ کسی بھی سوراخ سے سیلان خون کے لئے یہ ایک شائعہ اور دوا ہے۔

تنفس — (Breathing)

تیز یا دقت کے ساتھ — (Fast or Difficult)

(دیکھئے "ضیق النفس")

جلن — (Burning)

(نیز دیکھئے "گرمی حدت")

آگ سے جلنا اور مائعات سے جلنا

(Burns and Scalds)

کینٹھرس (Cantharis): آگ سے جلنے اور گرم مائعات یا بھاپ وغیرہ سے جلنے کے تمام مراحل کے لئے یہ ایک شاندار دوا ہے۔ یہ آبلے پڑنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ گردوں کی جراثیمیت اور ضیق النفسی نیز پیشاب کرتے ہوئے جلن ہوتی ہے جس کے ساتھ مثانے سے خون بھی خارج ہوتا ہے۔ درد ہونے پر بھی اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اس دوا کے مدد چھگر کے چند قطرے پانی میں ملا کر زخم والے حصے کو اس میں ڈبونا چاہئے یا دھولینا چاہئے۔

آرسنک البم (Ars Alb): جب کنگرین ہونے کا احتمال ہو۔

کاسٹیکم (Causticum): جب زخم تیسرے مرحلے میں داخل ہو جائے اور مزمن صورت اختیار کر لے اور ناسور ٹھیک نہ ہوں تو اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ 6th ڈالکی لیوشن کی صورت میں استعمال کیجئے۔ جو کہ فوری طور پر درد میں افاقہ کر دے گی۔ 1 اور 10 کے تناسب میں بائیسرکیم لیوشن ہیردنی طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔

ارٹیکا یوریش (Urtica Urens): حادہ اذیت ناک درد، جلنے میں چھپاکی کی طرح کے احساس کے ساتھ ہوتا ہے۔ مدد چھگر کا لیوشن 1 اور 15 کے تناسب سے ہیردنی طور پر لگائیں۔

پٹرولیم (Petroleum): دکھن اور درد کے ساتھ جب جلد میں شکاف پڑنے کا رجحان ہو۔

سٹرامونیم (Stramonium): جلنے میں اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے جبکہ ڈیوڈنیم کی ناسوری کیفیت پائی جائے اور اعصابی مریضوں میں بھی۔

کیڈمیم سلف (Cadmium Sol): ریڈیم سے جلنے کا تریاق ہے۔ ایسا ریڈیم سے کینسر کے علاج میں ہوتا ہے۔ IM ڈالکی لیوشن کی صورت میں دیجئے۔

ہائپرکیم (Hypericum): جلنے میں ٹھنڈی چیزیں لگانے سے یا متاثرہ حصہ ٹھنڈی ہوا میں تنکا کرنے سے بہتری ہوتی ہے۔ کائنیتی ہوئی آواز کے ساتھ اعصابی مریضوں میں شدید جڑ پڑا پن ہوتا ہے۔ ذہنی خلفشار کے ساتھ درد ہوتا ہے۔ IM ڈالکی لیوشن دیجئے۔

نوٹ: فوری طور پر ہیردنی استعمال کے لئے ٹینک ایسڈ 5% یا کینٹھرس مدد چھگر استعمال کیا جاتا ہے۔ بعد میں ٹھنڈے پانی میں ایک ڈرام اور ایک اونس پانی کے تناسب سے ملا دینا چاہئے۔ جلے ہوئے حصے کو تر رکھنا چاہئے تاکہ چھالے نہ بن سکیں۔ اگر یہ دوا مسلسل کم و بیش ایک گھنٹہ تک لگائی جائے تو صرف یہی دوا ہی جلے ہوئے مریض کا علاج کر دے گی۔ مولین تیل بھی بٹی کے ساتھ جلنے میں مفید ہوتا ہے۔

جوڑوں کی جھلیوں سے برآمدہ چکنائی

(Bursae)

آرنیکا (Arnica): جب زخم لگنے کے باعث ہو۔
 شلتا (Sticta Pul): سادہ یا پھیلا ہوا (Patella) پر۔
 سیلیشیا (Silicea): پیپ بڑے کا احتمال ہوتا ہے۔ قسبی (Patella) پر۔
 آیوڈیم (Iodium): قسبی۔

سرطان (Cancer)

کینسر کا علاج کرتے وقت سب سے پہلے کینسر کی طبیعت کا تریاق سکریم 200 یا 1000 کی خوراک سے کیا جائے۔ اس کے کم از کم چوبیس گھنٹے کے بعد باقاعدہ علاج شروع کرنا چاہئے۔ دیگر ادویات جو کہ عمل انگیز دواؤں کے طور پر استعمال ہوتی ہیں وہ سورنم 200 اور میڈورنم 200 ہیں۔ یہ دونوں ادویات امیٹی سورک اور امیٹی سائیکو ٹک ہیں۔ سورا اور سائیکو کس دو غلیں ہیں جو کہ کینسر پیدا کرتی ہیں۔ نیور کیولینم 200 بھی عمل انگیز دوا کے طور پر دی جاسکتی ہے۔ بشرطیکہ خاندان میں بی۔ بی کی ہسٹری پائی جائے۔

فاسفورس (Phosphorus): متاثرہ حصے میں خون اور پیپ کے ساتھ پھاڑنے والے اور جلن دار دردوں کے ساتھ جھریاں پڑی ہوئی سطح پر ہڈی کے ظاہر ہونے سے کھلی ہوئی سوزش کے آغاز کے ساتھ ماتھے کا کینسر لاحق ہوتا ہے۔ 200 ڈائی لیوشن دیجئے اور ہر ہفتے کے بعد دہرائیے۔ زبان کا کینسر ہوتا ہے۔ جیسا کہ زبان کے درمیان میں ایک سوراخ کر دیا گیا ہو۔ اوپر کو اٹھے ہوئے اور سخت کناروں کے ساتھ۔ مریض گھٹنوں سے کہنیاں جوڑ کر سوتا ہے۔

آرسنک البم (Arsenic Alb): جلد کی خشکی اور جلن دار حدت کے ساتھ معدے کا سرطان لاحق ہو۔ پیاس لگتی ہے، بے چینی ہوتی ہے اور اندیشے ہوتے ہیں۔ 200 ڈائی لیوشن دیجئے اور ہر ہفتے دہرائیے۔

نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid): کچھ کترنے والے دردوں کے ساتھ چھینے والا درد ہوتا ہے۔ جلن دار درد اور پیاس کے ساتھ معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ پانی ناقابل بیان حد تک کھلی کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ معدہ میں غذا اپنے اندر رکھنے کی قابلیت نہیں رہتی چنانچہ جزوی طور پر ہضم شدہ غذا کو واپس نکال دیتا ہے۔ لیس دار مادے اور خون کی قے ہوتی ہے۔ چہرہ پیلا ہوتا ہے۔ لاغری ہوتی ہے۔

کاسٹیکم (Causticum): چبے والے درد کے لئے۔

الیومن (Alumen): پستانوں کا سرطان۔

ایپس ایم (Apis M): جب ڈنک لگنے جیسے درد ہوں اور درد کے ساتھ خارش بھی ہو۔

کلیئس (Clematis): ہونٹ کا کینسر۔ اگر اس کے ساتھ سے بھی آگ آئیں۔ ڈنکارا اس دوا کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔

سپیا (Sepia): سرطان کی تختی ہوتی ہے۔ ہونٹوں کا سرطان۔

سلیشیا (Silicea): جلد کی بیرونی سطح پر آہستہ آہستہ بننے والے ناسور ہوتے ہیں جو کہ چبنے بم گمرے ٹیلاہٹ مائل سفید بنیاد اور صاف کٹاؤ والے کناروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مریض کو کندھوں کے درمیان ٹھنڈ کے ساتھ جاڑا لگتا ہے۔ چکر آتے ہیں۔ یہ دوا CM ڈائی لیوشن میں دی جاسکتی ہے۔

چیلی ڈونیم (Chelidonium): معدہ میں کئی قسم کے درد ہوتے ہیں۔ جن میں گرم چیزیں لگنے سے اور پیچھے کی جانب جھکنے سے افادہ ہوتا ہے۔ درد معدہ سے شروع ہوتا ہے اور پستانوں اور دائیں کندھے کی ہڈی کے نچلے زاویے تک پھیل جاتا ہے۔ گرم پانی میں CM ڈائی لیوشن ملا کر دیتے اور کئی مہینوں تک دوہراتے رہتے۔ یہاں تک کہ درد قوی عذاب ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ اس دوا کے بعد آر سینک الیم علاج کی تکمیل کے لئے دینا چاہئے۔

یوفوربیم (Euphorbium): شدید قسم کا جلن دار درد ہوتا ہے۔ جس میں ٹھنڈی چیزیں لگنے سے افادہ ہوتا ہے۔ بجلی کے جھٹکے لگنے جیسا درد ہوتا ہے۔ جس سے مریض اچھل کر بستر سے باہر آ جاتا ہے۔ پیڑوں کی ہڈیوں کا کینسر جس میں اس دوا کی خوراکیں بار بار دینے سے افادہ ہو جاتا ہے۔

سلفر (Sulphur): معدے کے گڑھے میں غشی میں ڈوبنے کا احساس ہونے کے ساتھ معدے کا کینسر لاحق ہوتا ہے۔ یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے بسوک لگی ہوئی ہو۔ تیز دواؤں کے استعمال سے مرض دب جاتا ہے۔ بیرونی بو اسیر ہوتی ہے۔ جس میں خارش ہوتی ہے لیکن خون نہیں بہتا۔ امعاء مستقیم کا خروج ہوتا ہے۔ جب اچھی منتخب شدہ ادویات ناکام ہو جائیں تو اس دوا کو CM ڈائی لیوشن کی صورت میں عمل انگیز دوا کے طور پر بھی دینا چاہئے۔

کریوزوٹ (Kreosote): رحم کا سرطان جس کے ساتھ رحم کی بو اسیر ہوتی ہے۔ چھلک کے لئے حیض رک جاتے ہیں اور پھر خراش کے ساتھ سیاہ اور گندی بو والے خون کے ساتھ دوبارہ جاری ہو جاتے ہیں۔ پتلا سواد خارج ہوتا ہے۔ کٹن اور خارش رحم میں ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ وزن اور پیچھے کی طرف دباؤ کا احساس ہوتا ہے۔ اخراج میں خوفناک بو کے ساتھ کھوپڑی کا

سرطان لاحق ہوتا ہے۔

قائلی ٹولا کا (Phytolacca): پستانوں کا سرطان۔ اندر کو دھنسنے ہوئے سرہائے پستان کے ساتھ بے قاعدہ اور سخت رسولیاں ہوتی ہیں۔ سوزشی دکھن کا احساس بازوؤں تک پھیل جاتا ہے۔ سر پستان میں درد ہوتا ہے۔ جس میں چیرا ہوتا ہے۔ جو پوری چوٹی پر پھیلا ہوتا ہے۔

کونیم (Conium): ہونٹوں کے سرطان کے لئے یہ ایک رہنما کن دوا ہے۔ تیز درد کے ساتھ پتھر کی طرح سخت رسولی کے ساتھ سرطان ہوتا ہے۔

کیلنڈولا (Calendula): اس دوا کو جرمنی میں سرطان کے علاج کے لئے آزمایا جا چکا ہے۔ سرطان کے ہر مرحلہ پر اس دوا کو کامیابی کے ساتھ آزمایا گیا ہے۔ یہ دوا درد کو کم کرتی ہے اور مریض کو بہت زیادہ آرام پہنچاتی ہے۔

کونڈورانگو (Condurango): یہ دوا حقیقی طور پر شفا کی طاقت رکھتی ہے۔ سرطان کے بعض کیسوں میں خصوصاً ہونٹوں اور معدہ کے سرطان میں جبکہ مریض کو منہ کے زایوں میں شکافوں کے اندر درد ہوتا ہے۔

کالی فاس (Kali Phos): کینسر کے ختم ہو جانے کے بعد جب جلد ٹھیک ہوتے ہوئے زخم کے اوپر سختی سے کھینچ جاتی ہے۔

ہوانگ نان (Hoang Nan): غدودوں کا سرطان اور سانپوں کے کاٹنے کے لئے سرطان میں جریان خون کو دور کرتی ہے۔ مرض کے رفع ہونے کے عمل کو دہراتی ہے۔

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): اگر مریض کے خاندان میں ٹی۔ بی کی ہسٹری ہو تو اس دوا کو عمل انگیز دوا کے طور پر دیا جاسکتا ہے۔

اورم آئیوڈ (Aurum Iod): کینسر کی تکلیفات اور ہڈیوں کے گلنے سڑنے میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ غدودوں اور اعضاء میں اجتماع خون ہوتا ہے۔ ٹھنڈ سے بہتری ہوتی ہے اور گرمی سے اجڑی ہوتی ہے۔

نیتروم میور (Natrium Mur): ناک کا سرطان اور جلد کا سرطان جو رخساروں اور آنکھ کے پتوں تک پھیل جاتا ہے۔ کونین کی بھاری خوراکیں کھانے کے باعث طبعیہ کے دب جانے کے بعد یہ سرطان لاحق ہو۔ نمک کی طلب ہوتی ہے۔ دوسروں کی موجودگی میں پیشاب کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔

ہائیڈراستس (Hydrastis): خنازیری اور سرطانی تکلیف۔ ہونٹوں یا پستانوں کا سرطان۔ سرطان سخت ہو۔ چٹنے والا ہوتا ہے۔ پستانوں میں چاقو سے کاٹنے کا احساس ہوتا ہے۔ ہونٹوں کے سرطان میں اس دوا کا مدد پتھر جیرونی طور پر لگایا جاسکتا ہے۔

اورم آرس (Aurum Ars): چہرے اور ہونٹوں کا سرطان۔ ہونٹوں پر شکاف ہوتے ہیں۔
پھوٹے ہوتے ہیں۔ چہرے کی جلد کا دق ہوتا ہے۔ جلد بد رنگ، نیلاہٹ مائل یا نیلاہٹ مائل
جیسی شبیلی زرد ہوتی ہے۔

وجوہات (تکلیفات کی) — (Causations)

کیسفر (Caphor): ٹھنڈی ہوا سے۔
کیڈمیم سلف (Lachesis, Cadmium Sulph): ٹھنڈی ہوا کے جھونکے
سے۔

مرکیورس پروٹو (Mercurius Proto): سانس لیتے ہوئے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا لگنے سے۔
کاربووج (Carbo Veg): آگ سے، گرم ہوا سانس کے ذریعے اندر لے جانے کے
باعث۔ گرم ہوا سانس کے ذریعے اندر جانے کے باعث۔

کوشیم، سیدیا (Sepia, Conium): برقی ہوا سے۔
سلفیورک ایسڈ (Sulphuric Acid): بازو اور اٹھانے سے۔
ریشاکس (Rhus Tox): چیزیں اٹھانے کے لئے بازوؤں کو بلند کر کے اٹھانے سے۔ تازہ یا
تکین پانی سے نہانے سے۔

کاربووج (Carbo Veg): خراب انڈے کھانے سے، خراب شراب پینے سے، کچی سڑی
چربی اور تھکن کھانے سے، مرطوب گرم موسم سے، عیاشی سے۔
پلائینا (Platina): سوگ سے۔

پانی اونیا (Paeonia): تنک پوٹوں اور جوتوں سے۔ دہاؤ کے باعث ہستر کے زخموں سے۔
پیشروکیم (Petroleum): گوبھی سے۔
روٹا (Ruta): بھاری وزن اٹھانے سے۔

نیٹرم میور (Natrur Mur): چاند سے جلن ہوتی ہے اور نامیاتی ریشوں میں تھکن لگ جاتا
ہے۔

اوپیم (Opium): کونکے کے بخارات سے، شرم سے۔
آرسنک البم (Arsenic Alb): پھاڑوں پر چڑھنے سے۔
کالی سلف (Kali Sulph): جاڑا جب گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہو۔

مگنیشیا فاس (Magnesia Phos): سرد مٹی کے ساتھ کام کرنے سے، پانی میں کھڑے ہونے
سے، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے، ٹھنڈی ہوا سے۔

- کاربوائٹلس (Carbo An): گلی سڑی سبزیاں اور خراب پھل کھانے سے۔
 پائیروجینم (Pyrogenum): زخموں کی چربھاڑ سے، خون میں زہر پھیل جانے سے، جانوروں کے گل سڑ جانے سے پیدا ہو جانے والے تعفن سے۔ گندے نالے کی گیس سے۔
 ڈائیوسکوریہ (Dioscorea): پرہیز میں غلطی کرنے سے، روزہ رکھنے سے۔
 اکتیاریس (Actea Rac): کاروبار میں ناکامی سے۔
 ریوم (Rheum): کپے پھل کھانے سے، خشک آلو بخارا کھانے سے۔
 فاسفورس (Phosphorus): گیس سے، بال کنوانے یا بال کاٹنے سے۔ کپڑے دھونے سے،
 لائٹری کا کام کرنے سے، تیز بو سے، بارش میں بھیگنے سے۔
 نیٹرم کارب (Natrium Carb): گیس کی روشنی سے۔
 ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): افراط و تفریط کی عادات سے۔
 وریٹرم البم (Veratrum Alb): عزت نفس مجروح ہونے سے یا غرور سے۔
 سلیسینم (Selenium): لیموں کے پانی سے۔
 کالچیکم (Colchicum): دوسروں کے برے سلوک سے۔
 کروتالیس ہور (Crotalus Hor): گندی بو آتی ہے اور گیس بدبودار ہوتی ہے۔
 تھویجا (Thuja): پیاز۔
 کونیم (Conium): جنسی عمل سے احتراز کرنے سے۔
 ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): شکر۔
 سول (Sol): لو لگنے سے یا دھوپ میں چلنے سے۔
 کافیا (Colfea): لمبے سفر سے۔
 مگنیشیا فاس (Magnesia Phos): کیتھیز کے استعمال سے۔

سبزیرقان — (Chlorosis)

مینگانم (Manganum): تھکی ہوئی کم خون والی اور کمزور مستورات میں حیض کا خون ایک یا دو روز تک جاری رہتا ہے۔ جو کہ کم مقدار میں ہوتا ہے لیکن جلدی جلدی آتا ہے۔ حیض میں پیلے رنگ کا مادہ ہوتا ہے یا معمولی لیکوریا ہوتا ہے۔ جگرہ میں کچا پن ہوتا ہے۔ گلابینہ جاتا ہے اور آواز کھو جاتی ہے۔

امونیا کارب (Ammonia Carb): کمی خون والا چہرہ، شدید درد سر چکروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ متواتر تے ہوتی ہے۔ زبان لمع شدہ ہوتی ہے۔ پیاس ہوتی ہے۔ بھوک کم لگتی ہے۔

حیض عدم موجود ہوتے ہیں۔ تخم میں اختصار ہوتا ہے۔ ہر حرکت سے دل کی دھڑکن لاحق ہوتی ہے۔ نبض کمزور اور ست ہوتی ہے۔

انٹیم کروڈ (Antm Crud): متواتر درد سر ہوتا ہے۔ مریض قہقی اور غصے والے مزاج کی حامل ہوتی ہے۔ بھوک نہیں رہتی۔ بہت زیادہ سستی ہوتی ہے جو مریض کو دن کے وقت زیادہ سونے پر مجبور کرتی ہے۔ حیض رک جاتے ہیں جو کہ پہلے باقاعدہ ہوتے ہیں۔ جلد پیلی ہوتی ہے اور ہونٹ اور زبان اپنا قدرتی رنگ کھو دیتے ہیں۔

آرسنک البم (Arsenic Alb): سبزیرقان کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ لرزہ ہوتا ہے۔ غشی کے متواتر دورے ہوتے ہیں۔ شدید قسم کی جسمانی تھکاوٹ ہوتی ہے۔

کوکولس (Cocculus): کافی یا دیگر مسکن ادویات کے غلط استعمال کے باعث سبزیرقان لاحق ہوتا ہے۔ دبے ہوئے یا کم مقدار والے اور بے قاعدہ حیض ہوتے ہیں۔ لیکوریا ہوتا ہے۔ ضیق النفسی ہوتی ہے۔ چھاتی میں اینٹھن ہوتی ہے۔ اداسی اور بے چینی ہوتی ہے۔ کھلی ہوا سے حساسیت ہوتی ہے۔

کلکیریا کارب (Calcerea Carb): کم مقدار والے اور مؤخر حیضوں کے ساتھ سبزیرقان کے لئے یہ ایک مخصوص دوا ہے۔ شدید قسم کی دل کی دھڑکن ہوتی ہے۔ دل کے دھڑکنے کی آواز ساری چھاتی پر سنی جاسکتی ہے۔ کپٹی کی شریانوں میں شدید تنگی ہوتی ہے۔ معدے میں دبانے والا درد ہوتا ہے۔ ٹانگیں جلد ہی تھک جاتی ہیں۔ ٹانگوں میں استقامتی سوجن ہوتی ہے۔ جو رانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ چند قدم چلنے سے ضیق النفسی ہو جاتی ہے۔ پہلے 'موی' بیمار' چہرے والے مریض ہوتے ہیں۔ ہونٹ پہلے ہوتے ہیں۔ کان پہلے ہوتے ہیں اور انگلیاں پہلی ہوتی ہیں۔ یہ پیلا پن اس دوا کے استعمال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خصوصاً قلت خون والی لڑکیوں میں۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): کلکیریا کارب کے مفید عمل کے بعد یہ دوا دینی چاہئے یا جب مکمل طور پر حیض دب چکے ہوں۔ بازوؤں اور ٹانگوں کی کپکپاہٹ اور سن ہو جانے کے ساتھ سستی لاحق ہوتی ہے۔ غنودگی ہوتی ہے۔ مائلو لیا ہوتا ہے۔ رفاقت سے نفرت ہوتی ہے۔ بال کرتے ہیں۔ مٹھائیوں کی خواہش ہوتی ہے۔

کاربو ویج (Carbo Veg): لیکوریا اور تر غارش کے ساتھ سبزیرقان ہوتا ہے۔ سوڑھے سکروی ہوتے ہیں۔ دانت ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔

چائنا آف (China Off): بازوؤں اور ٹانگوں میں استقامتی سوجن کے ساتھ سبزیرقان ہوتا ہے۔ خصوصاً پاؤں کے ٹکڑوں میں سوجن ہوتی ہے۔ آنکھوں کے گرد نیلے طے ہوتے ہیں۔

جیٹ پھول جاتا ہے۔ جیٹ کے دردوں کے ساتھ قبض ہوتی ہے۔ بد ہضمی ہوتی ہے۔ تیزابی ذخار آتے ہیں۔ ناقابل ہضم اشیاء کی طلب ہوتی ہے۔

فیرم میٹ (Ferrum Met): جب دیگر ادویات ناکام ہو جائیں تو زردیرقان کے لئے یہ ایک شاندار دوا ہوتی ہے۔ سبزیرقان کے لئے فولاد بیٹھ اچھا ہوتا ہے۔ اس کے مرکبات بھی مفید ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہیں: فیرم سلف اور فیرم کارب۔ فیرم کے مریض پہلے اور پھولے ہوئے چروں والے ہوتے ہیں۔ جلد ٹھنڈی ہوتی ہے۔ دبائے سے جلد پر گہرے نشان پڑ جاتے ہیں۔ خصوصاً ٹخنوں کے گرد۔ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ تھکنے کا احساس ہوتا ہے۔ مریض جلدی روئے لگتا ہے۔ بھوک نہیں ہوتی۔ غذا سے نفرت ہوتی ہے۔ معدہ میں تیزابیت ہوتی ہے۔ حیض کم مقدار میں ہوتے ہیں یا دب جاتے ہیں۔

فسفورس (Phosphorus): حیضوں کے دب جانے سے سبزیرقان لاحق ہو۔ سانس لینے میں وقت ہوتی ہے۔ بھوک نہیں ہوتی۔ روزانہ تواتر کے ساتھ آتے ہوتی ہے۔ غذا جلد تحلیل نہیں ہوتی۔ جب فیرم ناکام ہو چکی ہو تو اس کے بعد یہ تکالیف پیدا ہوتی ہیں۔

سپیا (Sepia): جنسی اعضاء میں بہت سی اقسام کے بچان کے ساتھ۔ اس مرض کی وجہ ہمیشہ جنسی نظام میں قابل تلاش ہوتی ہے۔ بیڑو میں نیچے کی جانب درد بھرا تھو ہوتا ہے۔ بشرطیکہ رحم اندام نسائی سے باہر نکلا ہوا ہو۔ اندام نسائی میں اوپر کی جانب پکڑکن ہوتی ہے اور سونیاں چسپی ہیں۔ خون کا ایک ہی قطرہ خارج ہونے کے ساتھ۔ بیڑو والے علاقہ میں سوجن ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ جلن ہوتی ہے اور ہلقم خارج ہوتی ہے۔ چہرہ پیلا ہوتا ہے۔ موم کی طرح کا چہرہ ہوتا ہے۔ ذہنی کلاہی کے تاثرات ہوتے ہیں۔ مریض ہمیشہ جاڑا محسوس کرتا ہے۔ سر میں چکن اور جھنجھٹا ہوتی ہے۔ معمولی سی تھکاوٹ شدید دحرکن کا باعث بن جاتی ہے۔

سلفر (Sulphur): بطور عمل انگیز دوا کے استعمال ہوتی ہے۔ علاج اسی دوا سے شروع کیا جا سکتا ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): فولاد کے غلط استعمال کے باعث۔ کانوں میں جلن ہوتی ہے۔ تاغلیں ہماری ہوتی ہیں۔ ضیق النفس ہوتی ہے۔ جیٹ میں درد ہوتا ہے۔ مصالحوں والی چیزوں کی نمایاں خواہش ہوتی ہے۔ مریض ڈرپوک یا شریف الطبع ہوتا ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vom): بیشیے رہنے کی عادت کے باعث سبزیرقان ہوتا ہے۔
نیرم میور (Natrium Mur): سانس دب جاتا ہے یا مشکل سے آتا ہے۔ دیر تک رہنے والا زردیرقان۔

اگنیٹیا (Ignatia): ذہنی جذبات کے باعث زردیرقان ہوتا ہے۔ غم، خوف اور محبت میں

نکاحی کے باعث زرد برکان لاحق ہو۔

ہیضہ — (Cholera)

(نیز دیکھئے "معائے مستقیم اور پاخانے" کے ذیل میں)

انگلیوں کا ٹیڑھا ہونا

(Clubbing of Fingers)

لاروسیرا سس (Laurocerasus) انگلیوں کا ٹیڑھا ہو جانا اس مرض کی عام علامت ہے اور
سل میں بھی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ اس دوا کی بنیادی علامت ہے۔

بے ڈول — (Clumsy)

(نیز دیکھئے "بے ڈھنگ")

ٹھنڈک — (Coldness)

کیوپرم آرس (Cuprum Ars) اینٹھن اور خدی قسم کی پگلی کے ساتھ برقی ٹھنڈک جسم
میں ہوتی ہے۔ متواتر آتی ہے۔ جلاب آتے ہیں اور ٹھنڈے پسے آتے ہیں۔

ہیلوڈرما (Heloderma) سارے جسم کی ٹھنڈک، ٹھنڈک تمام اندرونی حصوں میں ہوتی ہے
مثلاً دل، دماغ، پیچھے، گردے وغیرہ۔ حتیٰ کہ سانس بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ قلع
اور لرزدہ ہوتا ہے۔ جسم ٹھنڈا ہوتا ہے جیسا کہ برف کی طرح جم گیا ہو۔ اس کے ساتھ نبض
ست اور ڈوبنے والی ہوتی ہے۔ 200 ڈائی لیوشن دیکھئے۔

سپیا (Sepia) کھوپڑی میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔

ورینٹرم البم (Veratrum Album) پورے بدن میں ٹھنڈک رہتی رہتی ہے۔ ہاتھ برقی
ٹھنڈے اور نیلے پڑ جاتے ہیں۔ ساتھ میں ٹخن بھی نیلے ہوتے ہیں جبکہ پاؤں گرم محسوس
ہوتے ہیں یا اس کے برعکس ہوتا ہے۔ باقراط اخراج ہوتے ہیں۔

وتھیا (Wyethia) گیارہ بیجے جاڑا لگتا ہے۔ جاڑا کے دوران برف کے پانی کی پیاس ہوتی
ہے۔ گرمی کے مرحلہ میں پیاس نہیں ہوتی۔ تمام رات پینہ باقراط آتا ہے۔ پینہ آنے کے
دوران شدید قسم کا درد سر ہوتا ہے۔

پٹرولیم (Petroleum) دھبوں کی صورت میں ٹھنڈک اس دوا کی بہت بڑی علامت ہے۔

معدہ میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ رحم میں اور پیٹ میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ کندھے کی ہڈیوں کے درمیان ٹھنڈک ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دل ٹھنڈا ہو گیا ہو۔

سیکیل کار (Secale Cor): چھوٹے سے ٹھنڈ لگتی ہے لیکن لپینا جانا برداشت نہیں کرتا۔
روتا (Ruta): ریزہ سے نیچے کی جانب ٹھنڈک ہوتی ہے۔

تھوجا (Thuja): پوری ریزہ کی ہڈی میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ بازوؤں میں ٹھنڈ ہوتی ہے۔
کلکیریا کارب (Calcarea Carb): ٹھنڈے پینے آتے ہیں۔ قطعات میں ٹھنڈ ہوتی ہے۔
ٹھنڈی مرطوب ہوا سے حساسیت ہوتی ہے۔ پینے قطعات میں آتا ہے۔ ٹھنڈے پینے کے ساتھ دن میں برقی ٹھنڈک ہوتی ہے۔

لکسیس (Lachesis): دوران شب ٹھنڈ سے چہرہ سرخ ہوتا ہے اور دن میں گرمی سے چہرہ سرخ ہوتا ہے۔

کیمفر (Camphor): جسم کی بیرونی جانب ٹھنڈ ہوتی ہے اور اندرونی جانب گرمی ہوتی ہے۔
ہاتھوں میں برقی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ نلیاں مٹکی ہوتی ہے۔

ویلیریانہ (Valeriana): سر میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔
لاروسیرا کس (Laurocerasus): بہت زیادہ عام ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اگر مریض آرام

حاصل کرنے کے لئے گرم کمرے میں جائے تو اسے مٹکی ہوتی ہے اور ماتھے پر پینہ بہہ نکلتا ہے جو اسے دوبارہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وہ صرف کھلی ہوا میں گرم ہو سکتا ہے۔

امونیا موریٹیکم (Ammonia Muraticum): کندھوں کی ہڈیوں کے درمیان برقی ٹھنڈک ہوتی ہے جس میں اتفاقہ گرم کپڑے لپیٹنے سے بھی نہیں ہوتا۔ کندھوں کی ہڈیوں کے درمیان برقی ٹھنڈک ہوتی ہے۔

سیکرم (Sacharum): ٹھنڈک اور گرمی دونوں کا احساس ہوتا ہے۔ برقی ٹھنڈے درد ہر سمت جاتے ہیں۔

نیٹرم فاس (Natrurn Phos): ہاتھ، ٹانگیں اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ دن کے وقت جیس کے دوران پاؤں برقی ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ جبکہ رات کے وقت بستر میں چلتے ہیں۔

لائکلوپوڈیم (Lycopodium): برقی ٹھنڈک کا احساس آنکھ کے ذیلیوں میں اور پھیپھائی وغیرہ میں ہوتا ہے۔ خصوصاً جب 4 سے 8 بجے شام کے دوران علامت میں اضافہ ہو جائے۔

حالت نزع، غشی — (Collapse)

کیمفر (Camphor): بڑھال ہو جانے کی حالت، سارے جسم میں برقی ٹھنڈک ہوتی ہے۔

اس کے باوجود مریض خود کو ڈھانپنا نہیں چاہتا۔ اچانک طاقت ڈوب جاتی ہے۔ نبض چھوٹی اور کمزور ہو جاتی ہے۔

کاربووج (Carbo Veg): رطوبات کے ضائع ہو جانے کے باعث۔ دوا کھانے کے بعد۔ قوت حیات میں کمی ہو جانے سے نڈھال ہونے کی حالت لاحق ہوتی ہے۔ بوڑھے لوگوں میں۔ مریض بے جان ہو جاتا ہے۔ سرگرم ہوتا ہے۔ بدن بھی گرم ہوتا ہے اور سانس ٹھنڈا ہوتا ہے۔ چمکا چلایا جانا پسند کرتا ہے اور کھڑکیاں کھولنا بھی یقیناً پسند کرتا ہے۔

ورٹرم البم (Veratrum Alb): حالت نزع کی مکمل تصویر ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ انتہا درجے کی ٹھنڈک کمزوری اور تپا پن ہوتا ہے۔ عمل جراحی کے بعد صدمہ جس کے ساتھ ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ ہوتا ہے۔ چہرہ زرد ہوتا ہے اور تیز نرم نبض ہوتی ہے۔

ہائیڈروسیانک ایسڈ (Hydrocyanic Acid): پھپھڑوں کی کسی خراب حالت کے باعث نزع کی سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہ دل کے مرض کی وجہ سے نزع کی کیفیت نہیں ہوتی۔ ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تشنگی جھٹکے لگتے ہیں یا ویسے ہی جھٹکے لگتے ہیں۔

انگلیوں کا ہتھیلی کی جانب کھینچ جانا

(Contraction- Duputrons)

سلفر (Sulphur): یہ دوا اچھے نتائج حاصل کرنے کے لئے لمبے عرصہ تک دینی چاہئے۔

لکسیس (Lachesis): جب یہ مرض درمیانی عصب کے باعث لاحق ہو۔

قبل از وقت موت — (Death- Premature)

الفالفا (Alfalfa): بچے یا پروان چڑھے ہوئے لڑکے جو ویسے تو صحت مند ہوتے ہیں لیکن افسارہ سال کی عمر کو پہنچنے پر مکمل مکمل کر مر جاتے ہیں۔ تقریباً چھ ماہ تک اس دوا کے مدد سے کھجور کے دو قطروں کی خوراک دیجئے۔

سلفر، کلکیریا فاس (Calcarea Phos, Sulphur): اگر بچے شیر خوارگی کے دوران مر جائیں تو سلفر 6 اور کلکیریا فاس 6 روزانہ بدل بدل کر ایک خوراک دوران حمل ماں کو دی جائیں۔

وائبرنم پرونس (Viburnum Pru): جب بچے آٹھ ماہ کے بعد پیدا ہو جائیں اور پیدا ہونے کے بعد جلد ہی مر جائیں تو یہ ایک شاندار دوا ہوتی ہے۔ یہ آٹھویں ماہ کے استقلا حاصل کو بھی روکتی ہے۔ 1x طاقت کی دوا ماں کو تین وقت روزانہ تین ماہ تک کے لئے متوقع وضع حمل سے

پہلے دی جائے۔

لاغری — (Debility)

(نیز دیکھئے ”تھکاوٹ“)

انڈول (Indol): حد اعتدال سے بڑھی ہوئی غنودگی۔ کام کرتے کرتے مریض سو جاتا ہے۔ غنودگی کے ساتھ درد سر ہوتا ہے یا غنودگی کے ساتھ ذہنی تکلیف ہوتی ہے۔
بیلز پیریٹس (Bellis Perennis): تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ لیٹ جانے کی خواہش کے ساتھ نیز گھٹنیا یا جوڑوں کے درد کے حملے کے بعد لاغری میں بھی تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔
کارل سیڈ (Carlsbad): نفاہت ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے۔ کیکپاہٹ ہوتی ہے۔ تھکاوٹ اور افسردگی کا احساس ہوتا ہے۔
کیورارے (Curare): رطوبت کے ضائع ہو جانے سے اور عمر کی زیادتی سے لاغری ہوتی ہے۔

فارمیکا (Formica): ٹانگوں میں کمزوری ہوتی ہے۔
مرکب ڈل سس (Merc Dulcis): ڈھیلے اور پھولے ہوئے چہرے کے ساتھ مردوں جیسی زردی ہوتی ہے۔ پیٹے بچے جن میں سرد کس کے غنود اور دیگر غنود کی سوجن ہوتی ہے۔
نکس موسکاٹا (Nux Mosch): جاڑے کے ساتھ غنودگی ہوتی ہے لیکن پیاس نہیں ہوتی۔
ٹیرنٹولا (Tarentula): کمزوری ہوتی ہے، سن ہو جاتا ہوتا ہے، بازوؤں اور ٹانگوں کی بے چارہ بازوؤں اور ٹانگوں میں درد ہوتا ہے۔ فالج ہوتا ہے۔ کیکپاہٹ ہوتی ہے۔ جھٹکے لگتے ہیں۔ جلد پر رینگنے اور کینڑوں کے چلنے کا احساس ہوتا ہے۔
سلیسینم (Selenium): معمولی سی تھکاوٹ سے شدید کمزوری ہو جاتی ہے۔ خصوصاً گرمی کے موسم میں، بیماری کے بعد بھی اور جنسی بے اعتدالیوں کے بعد بھی۔
گریٹیولا (Gratiola): اعصابی نفاہت ہوتی ہے۔ نمایاں سستی ہوتی ہے جس کے ساتھ ذہنی اور جسمانی کمزوری ہوتی ہے۔

سیکیل کار (Secale Cor): لاغر، مرجھائی ہوئی، جھریاں پڑی ہوئی، غیر صحت مند جلد نظر آتی ہے۔ اندرونی طور پر ہر طرف جھلن ہوتی ہے لیکن جب اعضاء کو چھوا جائے تو وہ ٹھنڈے محسوس ہوتے ہیں۔ خون رستا ہے جبکہ سوزش نہیں ہوتی۔ حلق سے، پیچھے زوں سے، منہ سے اور اسمائے مستقیم سے خون رستا ہے۔ مریض کپڑے یا چادر وغیرہ اتار دینا چاہتا ہے۔
سرسلپاریٹا (Sarsaparilla): شراب اور عورتوں کی وجہ سے لاغری، مرجھاؤ اور کمزوری

لاحق ہوتی ہے۔ بچوں کی لاغری۔ چہرہ کے بوڑھے شخص کا دکھائی دینا ہے۔ ہیٹ ہوا ہوتا ہے۔
موروثی آنکھ کے باعث بھی یہ کیفیت ہوتی ہے۔

پیکریک ایسڈ (Picric Acid): جسمانی اور ذہنی دونوں حوالوں سے نقاہت ہوتی ہے۔ جسمانی
تھکان درد سر اور بازوؤں و ٹانگوں میں درد کو لاتی ہے۔

ناجا (Naja): بہت زیادہ ناتوانی اور تھکاوٹ ہوتی ہے۔ صحن کا احساس ہوتا ہے۔ ذہنی اور
جسمانی طاقتیں دب جاتی ہیں۔ کھلی ہوا میں چلنے سے بہتری ہوتی ہے۔ مریض ٹھنڈے سے بہت
زیادہ حساس ہوتا ہے۔ بہت دنوں اور راتوں کے لئے مریض بستر پر لیٹے رہنا چاہتا ہے۔ صرف
ایک دن یا رات کا آرام اسے ٹھکانی محسوس ہوتا ہے۔ نقاہت ہوتی ہے، خصوصاً ٹانگوں میں۔
چلنے وقت لڑکھڑاتا ہے۔

سٹرکولیا (Sterculia): یہ دوا بغیر غذا کھائے اور بغیر تھکاوٹ محسوس کئے طویل عرصہ تک
جسمانی تھکان کو دور کر کے طاقت مہیا کرتی ہے۔ مدر ٹیگر کے 10 سے 12 قطروں کی ایک خوراک
دیجئے۔

کاربو ویج (Carbo Veg): دودھ پلانے کے باعث نقاہت اور لاغری لاحق ہوتی ہے۔ کسی
بھی حاد مرض کے بعد لاحق ہونے والی لاغری کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے مثلاً 'انفلوئنزا' و 'اسل
دیفرہ' ہر چار گھنٹوں کے بعد 200 طاقت کی دوا دیجئے۔ دن میں تین مرتبہ تقریباً دو ماہ تک اور
پھر طاقت کو بڑھا کر 400 کر دیجئے اور روزانہ اگلے دو ماہ تک دیجئے۔

کوکا (Coca): یہ مقوی اور طاقت کا اثر رکھنے والی دوا ہے۔ مریض گرمیوں کی گرمی
برداشت کرنے کی زیادہ استعداد رکھتا ہے۔ یہ نسبت سردیوں کی ٹھنڈے برداشت کرنے کے۔

الیومینا (Alumina): سارے جسم میں بہت زیادہ سستی ہوتی ہے۔ آہستہ لڑکھڑاہٹ والی چال
چلتا ہے۔ بہت زیادہ تھکان ہوتی ہے خصوصاً بولنے وقت۔ احتمال سے زیادہ غشی اور تھکاوٹ
ہوتی ہے۔

کیمفرا (Camphora): نبض انتہادر ہے کی سست ہوتی ہے جسے محسوس نہیں کیا جاسکتا اور
گنا بھی نہیں جاسکتا بہت تیز ہوتی ہے۔ چہرے پر موت کی طرح کی زردی کے ساتھ سارے
جسم میں برقی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ ٹھنڈا چھپچھپا اور کمزور کر دینے والا ہیٹ آتا ہے۔ چہرہ زرد یا
نیلا ہٹ مائل ہوتا ہے۔ ہونٹ سبزی مائل نیلے ہوتے ہیں۔

ایسڈ فاس (Acid Phos): اعصابی کمزوری ہوتی ہے۔ ذہنی کمزوری کے بعد جسمانی کمزوری
لاحق ہو جاتی ہے۔ پہلے دماغ ٹھکتا ہے۔ دماغ بھول جانے والا ہو جاتا ہے اور پھر جسمانی کمزوری
نشود نہا پاتی ہے۔ نامعلوم وجوہات کے باعث لاغری لاحق ہو۔

میورٹک ایسڈ (Muriatic Acid): یہ دوا ایسڈ فاس کے برعکس ہوتی ہے۔ اس میں جسمانی کمزوری پہلے آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ذہنی کمزوری لاحق ہوتی ہے۔
الیومن (Alumen): عضلات کی قافیہ کمزوری، قوت کا فقدان ہوتا ہے۔ بازو اور ٹانگیں کمزور ہوتی ہیں۔

نیٹرم میور (Natrurn Mur): کمزوری، لاغری، اعصابی نقاہت اور چڑچڑاہٹ ایسے مریضوں میں ہوتا ہے، جن کی جلد چمک دار، پٹلی، موی اور ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے اس پر گریس ملی گئی ہو۔

سٹینم میٹ (Stannum Met): بڑھتی ہوئی کمزوری، جسمانی غفلت، نرلاوی کیفیات اور اعصابی درد برسوں سے لاحق ہوتے ہیں۔ آواز بیٹھ جاتی ہے۔ کمزوری یا آواز والی ٹالی کی قافیہ کمزوری کے باعث آواز کھو جاتی ہے۔

الفالفا (Alfalfa): یہ دوا چربی پیدا کرتی ہے اور لیموں کے ضیاع کو درست کرتی ہے۔ یہ اعصابی کمزوریوں، یوریمیا، اعصابی بد ہضمی، اعصابیت وغیرہ کا علاج کرتی ہے۔ تپ دق یا ذیابیطس کے باعث ہونے والی لاغری کا علاج کرتی ہے۔ 5 سے 10 قطرے درختی روزانہ تین مرتبہ لیے عرصہ تک دیجئے۔

کاربونیم سلف (Carbonium Sul): نمایاں سستی اور لیٹے رہنے کی مسلسل خواہش ہوتی ہے۔ خصوصاً جب مسکن شرابوں کے باعث ہو۔ کمزوری اور سیڑھیاں چڑھنے کے باعث دم گھٹتا ہے۔ کھلی ہوا میں بہتری ہوتی ہے لیکن ہوا کے جھونکے سے اجڑی ہو جاتی ہے۔
آئیوڈیم (Iodium): چلنے اور بہت زیادہ لیٹنے کے باعث حتیٰ کہ معمولی محنت سے انتہا درجے کی تھکان ہو جاتی ہے۔ (کالی آئیوڈ کے مریض بغیر ٹھکے لیے فاصلے پیدل طے کر سکتے ہیں۔)

کوکولس انڈ (Cocculus Ind): دودھ پلانے کے بعد جسمانی اور ذہنی نقاہت لاحق ہوتی ہے۔ یہ دوا ایسے لوگوں کے لئے ہے جو فکر مند، پریشانی اور نیند کے کھو جانے کے باعث جھکے ہوئے ہوں۔ جسمانی کمزوری فالج کی طرف لے جاتی ہے۔ مریض ذہنی یا جسمانی تناؤ کو ختم کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اپنے تمام افعال میں بہت زیادہ وقت لگاتے ہیں۔

ایسٹک ایسڈ (Acetic Acid): کئی سالوں کی کمزوری، قلت خون، لاغری ہوتی ہے۔ بھوک نہیں ہوتی۔ درشتی سل ہوتی ہے۔ جلن دار پیاس ہوتی ہے اور پیشاب بافراط زرد رنگ کا خارج ہوتا ہے۔

سنا (Senna): ناسرد جن کے بہت زیادہ ضائع ہو جانے کے ساتھ جب نظام ہی ٹوٹ پھوٹ

جائے تو ایسے میں لاحق ہونے والی لاغری کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ تھکاوٹ ہوتی ہے۔
کھانوں کے بعد ڈوبنے کا احساس ہوتا ہے۔

کالی فاس (Kali Phos): ذہنی تھکاوٹ کے باعث لاغری۔

چائیکا آف (China Off): مادوں کے زیادہ اخراج اور خون کے ضائع ہو جانے کے باعث لاحق ہونے والی لاغری۔ 'فلو' اسہال اور دوسری بیماریوں کے حملے کے بعد لاحق ہونے والی لاغری۔ مائع ضائع ہو جانے کے باعث مثلاً خون، مٹی اور اسہال وغیرہ کے باعث لاغری ہوتی ہے۔ مریض پیلا، بے وقوف محسوس ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوتی ہے اور آنکھوں کے گرد سیاہ حاشیے ہوتے ہیں۔

ایلیٹرس ایف، ہیلونیاس (Helonias, Aletris F): رحم کے خروج کے باعث لاغری لاحق ہوتی ہے۔

نکس دامیکا (Nux Vom): ایلوپیتھک دواؤں کے استعمال سے لاغری ہو جاتی ہے۔

امونیا کارب (Ammonia Carb): نفاہت ہوتی ہے۔ توانائی، طاقت، قوت وغیرہ کا فقدان ہوتا ہے۔ جسم اور دماغ کمزور، تھکا ہوا ہوتا ہے۔ حرکت کرنے سے دھڑکن ہوتی ہے اور سانس میں دقت ہوتی ہے۔

چیلی ڈونیم (Chelidonium): جمائوں کے بغیر سستی اور غنودگی ہوتی ہے۔ کالہ، ماندگی اور طبی سستی ہوتی ہے۔ مریض یہ جانے بغیر کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ اچھا محسوس نہیں کرتا۔ لاغری اور سستی ہوتی ہے۔

آرنیکا ایم (Arnica M): چونوں کے باعث، ضرورت سے زیادہ تھکاوٹ اور عضلاتی تحلیل کے باعث لاغری لاحق ہوتی ہے۔

فیرم میٹ (Ferrum Met): قلت خون کے باعث لاغری لاحق ہو۔

الومینا سیلیکیٹ (Alumina Silicate): اعصابی نفاہت، ذہنی جوش کے باعث اور غصے اور تھکاوٹ کے باعث ہوتی ہے۔ غیر حاضر دماغی ہوتی ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں کی کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ مریض سیزمیاں نہیں چڑھ سکتا، جیسے کہ اس کا جسم بہت بھاری ہو۔

سورینم (Psorinum): حلو امراض کے بعد لاغری لاحق ہوتی ہے۔ افسردگی ہوتی ہے۔ مریض ناامید ہوتا ہے۔ رات کو پسینے آتے ہیں۔ تمام قسم کے اخراجات سے بدبو آتی ہے۔ کانوں سے آنٹوں سے 'لیکوریا' پسینے اور بلغم وغیرہ سے بدبو آتی ہے۔

دانت (نکلنے کا عمل) — (Dentition)

کیمومیلہ (Chamomilla): دانت نکلنے کی تکلیف کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ سبزی مائل اور بدبودار اسال کے ساتھ بچہ چڑھا ہوتا ہے اور خوف زدہ ہوتا ہے۔ سوڑھے سرخ اور نرم ہوتے ہیں۔ بچہ درد سے چلاتا ہے اور غذا لینے سے انکار کرتا ہے۔ نیز پینے سے اور کھلونوں سے جب اسے فراہم کئے جائیں تو انکار کرتا ہے۔ کپڑے میں لپٹا رہنا پسند کرتا ہے۔
کلیکیریا کارب (Calcarea Carb): دانت نکلنے میں سستی ہو یا جملہ دانت نکلنے میں بہت زیادہ تیزی ہو۔ پچھلے دانت نکلنے میں جب سوڑھے پیلے اور چمک دار ہوں۔ ماتھے پر بیض اس دوا کی رہنما کن دوا ہے۔

کلیکیریا فاس (Calcarea Phos): کمزور بچوں میں یہ دوا موزوں ہے۔ اس میں تلو کھلا ہوتا ہے اور دانت آہستہ آہستہ نکلتے ہیں اور دانت بہت تیزی سے تباہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہڈی کے ریشوں میں کمی ہوتی ہے۔ دانت نکلنے کے دوران اسال لاحق ہوتے ہیں۔
کولوسنٹھ (Colocynth): جب بچہ اپنی خوراک جلدی جلدی نگل جائے یا پھر اسے پسند کرتا دکھائی دے۔ ہوا بھری ہونے کے باعث پیٹ میں درد ہوتے ہیں۔
پلساٹیلہ (Pulsatilla): جب بچہ شریف ہو۔ عمدہ قسم کا ہو۔ ڈرپوک ہو اور تھپتھپانے سے پرسکون ہو جائے۔

توبریکولینم (Tuberculinum): لاغر بچوں کے لئے جبکہ ذہنی اور جسمانی نشوونما رک مکی ہو۔ کمزوری کے باعث دانت ظاہر نہیں ہوتے۔
فائی ٹولا کا (Phytolacca): جب بچہ دانت اور سوڑھے کاٹتا ہو۔

کریوزوٹ (Kreosote): جب دانت نکلنے میں تکلیف ہو اور مشکل سے دانت نکلتے ہوں تو یہ ایک عمدہ دوا ہوتی ہے۔ سوڑھے اسٹنچی اور پردرد ہوتے ہیں۔ جب دانت اس حالت میں ظاہر ہوں کہ ان پر جھکی کے نشانات نظر آئیں۔ بے چینی اور ہلے رہنا بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ قبض ہوتی ہے اور غیر منظم غذا دالے پاخانوں کے اسال ہوتے ہیں۔

زنگم میٹ (Zincum Met): وقت کے ساتھ دانت نکلنے کے دوران سوڑھوں کو آپس میں دبانے کا رجحان ہوتا ہے یا دانت پینے کا رجحان ہوتا ہے۔ دانت ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور سوڑھوں سے خون بہتا ہے۔

ذیابیطس — (Diabetes)

ایسٹک ایسڈ (Acetic Acid): شکر کے ساتھ یا شکر کے بغیر بافراط پانی کی طرح کا پیٹل

آنے کے ساتھ ذیابیطس لاحق ہوتی ہے۔ پیاس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کمزوری ہوتی ہے۔ پیلا پن ہوتا ہے اور گوشت کم ہو جاتا ہے۔

لیک ویک ڈیفیل (Lac Vacc Defl): بہت زیادہ پیاس کے ساتھ باافراط پانی کی طرح کا پیشاب ہوتا ہے۔ گاڑھا پیشاب بھی باافراط ہوتا ہے۔ کمزوری ہوتی ہے۔ قلت خون ہوتی ہے۔
آرسینکیم بروم (Arsenicum Brom): قبض اور پیاس کے ساتھ ذیابیطس کے لئے یہ ایک شامدار دوا ہے۔ 1x ڈائی لیوشن کی صورت میں تین قطروں کی خوراک دن میں تین مرتبہ دیجئے۔

تھائی رائیڈین (Thyroidin): جب علامات بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اور بے انتہا کمزوری کے ساتھ ظاہر ہوں تو ذیابیطس کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔

السد فاس (Acid Phos): اعصابی مریضوں میں ذیابیطس 'پیشاب بہت زیادہ آتا ہے۔ یہ دودھیا رنگ کا ہوتا ہے اور اس میں شکر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بہت زیادہ نگاہت ہوتی ہے اور عضلات میں خراش کا احساس ہوتا ہے۔ غم 'افسوس اور پریشانی کے باعث لاحق ہونے والی ذیابیطس۔ اس دوا سے ذیابیطس کے ابتدائی مراحل میں یقینی علاج ہوتا ہے۔ اس میں پھوڑے بھی ہو سکتے ہیں۔

سائی زینگیم (Syzygium): یہ دوا ذیابیطس اور خونی ذیابیطس میں بہت پر اثر سمجھی جاتی ہے۔ بہت زیادہ پیاس ہوتی ہے اور پیشاب بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ یہ مخصوص دوا ہے۔ اس دوا کے ہر قطرے کے 5 سے 10 قطرے ہر تین گھنٹے کے بعد دن میں چار مرتبہ دیجئے۔

یورینیم نائٹ (Uranium Nit): قوت جذبہ میں خرابی کے باعث ذیابیطس لاحق ہو۔ نظام ہضم کمزور ہو جاتا ہے۔ سستی ہوتی ہے۔ لاغری ہوتی ہے اور پیشاب میں بہت زیادہ شکر ہوتی ہے۔ بھوک اور پیاس بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہاضمہ کی خرابی کے باعث لاحق ہونے والی ذیابیطس میں اس دوا کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ پیاس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یوریا کی کثرت ہوتی ہے اور زبان خشک ہوتی ہے۔ زبان کی خشکی اور شدید بھوک ہوتی ہے حتیٰ کہ جب معدہ بھرا ہوا ہو تب بھی۔

ارجنٹم میٹ (Argentum Met): نینچے سوئے ہوئے ہونے کے ساتھ اگر ذیابیطس ہو تو یہ دوا دی جاتی ہے۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): پیشاب میں شکر کے ساتھ پیشاب اعتدال سے زیادہ آتا ہے۔

نیٹرم میور (Natrium Mur): گنصیا کے مریضوں میں ذیابیطس 'جلد کی خشکی کے ساتھ۔

سارے جسم میں خارش ہوتی ہے۔ بے چینی ہوتی ہے۔ جمائیاں آتی ہیں اور افسردگی ہوتی ہے۔ ہر گھنٹے میں پیشاب خارج ہوتا ہے۔

لیکٹک ایسڈ (Lactic Acid): گنٹھیا کے ساتھ ذیابیطس۔

تھوجا (Thuja): سوزاک میں جھلا مریضوں میں ذیابیطس۔ اعصابیت ہوتی ہے۔ بے خوابی ہوتی ہے۔ قبض ہوتی ہے۔ بعض اوقات دل کی دھڑکن ہوتی ہے۔ پیشاب میں شکر ہوتی ہے۔

گلیسرین (Glycerine): کمزوری، درد سر، ضیق النفسی، ایسی ٹون کے ساتھ پیشاب میں شکر آنے کے ساتھ ذیابیطس لاحق ہوتی ہے۔ البیومن یا مہلیوں کے ساتھ یا ان کے بغیر اور گنٹھیا کے ساتھ یا اس کے بغیر لاحق ہونے والی ذیابیطس۔

پیکرک ایسڈ (Picric Acid): شدید پیاس اور باافراط پیشاب رات کے وقت خارج ہونے کے ساتھ ذیابیطس لاحق ہو۔

موسکس (Moschus): نامردی کے ساتھ ذیابیطس لاحق ہو۔

ٹیریکسی لم (Taraxacum): پیشاب کی حاجت کے ساتھ ذیابیطس ہوتی ہے۔ پیشاب بہت زیادہ خارج ہوتا ہے۔

البیومن (Alumen): خندی قسم کی قبض کے ساتھ ذیابیطس لاحق ہو۔ پاخانے چھٹے اور پتے ہوتے ہیں۔ مکمل طور پر آنتوں کے خالی ہونے کے لئے بہت وقت لگتا ہے۔

چیونٹھس ویرے (Chionanthus Virg): ذیابیطس سے پہلے کا مرحلہ اور ذیابیطس کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ ایسے مریضوں میں جو جگر کے امراض میں مبتلا ہوں۔ پیاس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ صفراوی مادوں اور گلوکوز کی موجودگی کے ساتھ گہرے رنگ کا پیشاب بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ یہ دوا انسولین کی مزاحمت کرتی ہے۔

البیومینیم میٹ (Aluminium Met): غنودگی کے ساتھ ذیابیطس والی بے ہوشی میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ مریض لوگوں کو پہچاننے کے قابل نہیں ہوتا یا سوالات کے جوابات دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ قبض ہوتی ہے لیکن پیشاب خارج ہوتا ہے اور بلا ارادہ خارج ہوتا ہے۔ 200 ڈائی لیوشن کی صورت میں دیجئے۔

کاربوانٹیلس (Carbo Animalis): بہت زیادہ پیاس اور بار بار پیشاب خارج ہونے کے ساتھ فربہ مریضوں میں ذیابیطس لاحق ہو۔ اچھارہ اور قبض موجود ہوتی ہے۔

آر سینک البم (Arsenic Alb): یہ ایک عمدہ دوا ہے لیکن ذیابیطس کے علاج میں معالجین نے اسے بہت زیادہ نظر انداز کیا ہے۔ اس میں جلد بھر بھری، پھٹکوں والی، خشک ہوتی ہے۔ منہ خشک ہوتا ہے۔ زبان اور سانس کی نالی میں خشکی ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ نہ بچنے والی پیاس

ہوتی ہے۔ بھوک کھو جاتی ہے اور قبض ہوتی ہے۔ پیٹ میں جلن کا احساس ہوتا ہے جو منہ تک پھیل جاتی ہے۔ مریض ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ وہ اپنی طاقت کھو دیتا ہے اور بعض اوقات دانت نکل جاتے ہیں۔ مریض نازک طبع ہوتا ہے۔ اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے۔ ہر چیز مناسب جگہ پر رکھنا چاہتا ہے۔

کنتھریس (Canthris): الیومن کے اخراج کے ساتھ ذیابیطس لاحق ہو۔

کاربودیج (Carbo Veg): صبح سویرے منہ میں بہت زیادہ خشکی ہوتی ہے۔ اعتدال سے بڑھی ہوئی پیاس اور بھوک ہوتی ہے۔ جگر میں درد ہوتا ہے جیسے کہ وہ زخمی ہو۔ اچانک کمزوری اور غشی ہوتی ہے۔ جسمانی افسردگی اور سستی ہوتی ہے۔

آرنیکا ایم (Arnica M): جگر پر گھونسا لگنے کے باعث ذیابیطس لاحق ہو تو یہ دوا دی جاتی ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vom): بے ہوشی اور چکر آنے کے ساتھ ذیابیطس لاحق ہو۔ کاتوں میں جھنجھٹا ہوتی ہے۔ بے خوابی ہوتی ہے اور یہ سب کچھ دماغ اور حرام مغز کی تکالیف کے باعث ہوتا ہے۔

گرافائٹس (Graphites): ذیابیطس میں صحت تباہ ہو جاتی ہے۔ گنٹھیا اور جوڑوں کا درد لاحق ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ لاغری اور عمومی نقاہت ہوتی ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں پھرن ہوتی ہے۔ جوڑوں میں فالجی کمزوری ہوتی ہے۔ بے خواب راتوں کے ساتھ بے چینی ہوتی ہے۔

پلمبم (Plumbum): قبض کے ساتھ ذیابیطس لاحق ہو۔ پیشاب میں الیومن اور بھلیاں ہوتی ہیں۔

فاسفورس (Phosphorus): یہ دوا ذیابیطس اور لبلے والے امراض میں استعمال ہوتی ہے۔ خصوصاً تپ دق یا گنٹھیا کے مزاج والے مریضوں میں۔ بے چینی ہوتی ہے اور منہ کی خشکی لاحق ہوتی ہے۔ چوبیس گھنٹوں میں 4 سے 5 ہنٹ کی مقدار میں پیشاب خارج ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کی پیاس ہوتی ہے۔

راتانہیا (Ratanhia): ذیابیطس میں پیشاب کم مقدار میں خارج ہوتا ہے۔

پچیدہ بچے — (Difficult-Child)

کیمومیلا (Chamomilla): مضطرب، بے چین، بے مہرے بچے لیکن جب انہیں اٹھایا جائے تو مطمئن اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ کسی ایک چیز کی شدید خواہش کرتے ہیں لیکن جب وہ

فراہم کی جائے تو اسے پھینک دیتے ہیں اور کوئی دوسری چیز مانگنا شروع کر دیتے ہے۔ نوجوان نر کیوں کے پستانوں میں ناقابل برداشت درد اور حساسیت اس دوا کی نمایاں علامات ہے۔

انگیشیا (Ignatia): اعصابی اعتدال سے زیادہ جذباتی، مانگولیائی اور اداس بچے، خاموشی میں غم کا رجحان ہوتا ہے۔ چہرے کی جلد موسمی ہوتی ہے۔ ہلکا ارادہ آپس بھرتے ہیں۔ مسلسل ہنسیاں لیتے رہتے ہیں اور بلاوجہ روتے رہتے ہیں۔ دماغی افسردگی ہوتی ہے یا ذہنی دباؤ ہوتا ہے۔

پلساٹیلہ (Pulsatilla): غیر متوازن، بدلتا رہنے والا مزاج، ڈرپوک اور جذباتی مریض۔ بچے بلاوجہ روتا ہے۔ آنسوؤں کے ساتھ مسکراتا ہے۔ ذہنی تھکان ہوتی ہے۔ غیر حاضر دماغی ہوتی ہے۔ ارادے کا کچا، پریشان اور ناشکرا ہوتا ہے۔ صنف مخالف سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ بے خوابی ہوتی ہے۔ پیاس کی کھل طور پر عدم موجودگی ہوتی ہے۔ کیل صاف سے نکلتے ہیں۔

سپیا (Sepia): خشک، کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتا۔ ہر چیز سے یک سو ہوتا ہے۔ کھیل ہوا یا انعام ہو یا کوئی نمایاں پوزیشن ہو وہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتا۔ کوئی چیز اسے دلچسپ نہیں لگتی اور کوئی چیز اسے خوش نہیں کرتی۔ کم حوصلہ ہوتا ہے اور تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ ایک کونے میں جا کر خاموشی سے رو لیتا ہے۔ بہت زیادہ جذباتی ہوتا ہے۔ ناک پر زرد دھبے ہوتے ہیں۔ سرکے کی خواہش ہوتی ہے۔ گوشت سے نفرت ہوتی ہے۔ دودھ ہضم نہیں کر سکتا۔

آئیوڈیم (Iodine): لالچی، چڑچڑاہٹ اور پھلانہ رہ سکتا۔ بیش بھوکا رہتا ہے۔ کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ خوب کھانے کے باوجود بڑی تیزی سے دہلا ہوتا رہتا ہے۔ غدود سے رطوبت کا غیر ضروری اخراج ہوتا ہے مثلاً تھائیرائیڈ، بھل کے غدود، ماساریتی غدود اور جاتگھ کے غدود وغیرہ۔

ہیمپٹر سلف (Hepar Sulph): شرارتی (شیطان قسم کا) بچہ۔ غلط کام کرنے کی تحریک ہوتی ہے مثلاً مارنے کی، آگ وغیرہ لگانے کی۔ کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ بیش جبکہ بدلتا رہتا ہے۔ غیر صحت مند جلد ہوتی ہے۔ خراش دار پھیپھ یا افراط خارج ہوتا ہے۔

اناکارڈیم (Anacardium): تحریکی بچہ، جن لوگوں سے محبت کرتا ہے اور جن کا ادب کرتا ہے ان سے کبھی متفق نہیں ہوتا۔ جانتا ہے کہ ایسا ہے لیکن ایسا کر نہیں سکتا۔ متحدہ مواقع پر ہنستا ہے اور معمولی باتوں پر سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ پریشان، چڑچڑاہٹ، بد معاش، قسمیں کھانے والا اور لعنتیں بھیجنے والا کھانے کے بعد بہتر ہو جاتا ہے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): غصیلا، انتہا درجے کا چڑچڑاہٹ اپنا مدعا پر تشدد الفاظ میں بیان کرے۔ اچانک پھٹ پڑتا ہے اور اسے خود پر قابو نہیں رہتا۔ خود اعتمادی کھو جاتی ہے۔ ذمہ داریوں سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ جاگنے پر بد مزاج ہوتا ہے۔ یادداشت کھو جاتی ہے۔ لکھتے وقت حروف بھول جاتا ہے۔ اپنا مدعا بیان کرنے کے لئے اسے مناسب الفاظ نہیں مل سکتے۔

کاسٹیکم (Causticum): ڈرپوک، غیر نشوونما یافتہ بچہ، دیر سے چلتا ہے اور دیر سے بولتا ہے۔ شام کی ملکی روشنی میں پریشان اور مضطرب ہو جاتا ہے۔ بچہ بستر پر نہیں جا سکتا۔
سین کیولا (Sancula): ضدی، مضبوط سرد والا بچہ۔ بڑھتی ہوئی کمزوری کے ساتھ بچہ گندہ، عمر رسیدہ اور میلا دکھائی دیتا ہے۔ گردن کے قریب جلد پر جھریاں پڑ جاتی ہیں اور جلد تنوں میں ٹھکنے لگتی ہے۔

ار جینٹیم ٹائٹ (Argentum Nit): بچہ سکول جانا پسند نہیں کرتا۔ اس دوا کو 30 ڈائی لیوشن کی صورت میں دن میں چار مرتبہ استعمال کرنے سے سکول جانے کی عادت بن جائے گی۔
سلفر (Sulphur): مخمور بچہ، مسلسل دم، 'ایگزیمیا' صبح کے اسٹال، بے خوابی اور کمزوری میں مبتلا رہتا ہے۔ بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جسمانی مشقت سے نفرت ہوتی ہے۔ نہانے اور دھونے سے نفرت ہوتی ہے۔ جلن ہوتی ہے۔

خواب — (Dreams)

(نیز دیکھئے "برے خواب")

نکس وامیکا (Nux Vom): حادثات کے خواب مریض کو نیند سے بیدار کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ مادہ منویہ کے اخراج کے ساتھ ہر تیسرے یا چوتھے روز جنسی خواب آتے ہیں۔ علیحدہ کوٹے میں بیٹھ کر کڑھتا ہے۔ کافی یا شراب پینے کے خواب آتے ہیں۔
پلساتیلہ (Pulsatilla): کالی ہلاؤں کے خواب، بائیں جانب لینے سے دل میں اور پھیپھائی میں اجتماع خون ہوتا ہے۔

مرکیوریس (Mercurius): جانوروں کے خواب آتے ہیں۔
مگنیشیا میور (Magnesia Mur): جب مریض دوران نیند باتیں کرے اور چلائے۔ پریشانی والے خواب۔

رسٹاکس (Rhus Tox): ٹائیفائیڈ میں کاروبار کے خواب آتے ہیں۔ ہوا میں اڑنے کے خواب آتے ہیں۔

ڈیفنہ (Daphne): کالی بلیوں کے خواب آتے ہیں۔

چیلیدونیم (Chelidonium): جنازوں کے خواب آتے ہیں۔

تھوجا (Thuja): مردہ لوگوں کے خواب آتے ہیں۔ خوابوں کے ساتھ غیر آرام دہ نیند ہوتی ہے۔ بلندی سے گرنے کے خواب ہوتے ہیں۔ جنگوں کے خواب ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ حفاظتی ٹیکے توڑنے کے ساتھ گلوانے کے باعث ہوتا ہے۔ IM ڈائی لیوشن کی صورت میں دوا

دیتے۔

سلفر (Sulphur): یہ خواب آتے ہیں کہ ایک کتا اسے کاٹ چکا ہے۔ مریض خواب میں پیشاب والی جگہ پر ٹپکتی ہے لیکن حقیقت میں بستر والی جگہ کو گیلیا کر دیتی ہے۔

بیلادونا (Belladonna): آگ کے خواب آتے ہیں۔

کالی کارب (Kali Carb): بھوتوں کے خواب آتے ہیں۔ مریض تصوراتی ہوتا ہے۔ بد قسمتی کے خواب آتے ہیں۔

کیمفر (Camphor): روحوں کے خواب آتے ہیں۔

سیلیشیا (Silicea): قتل کے خوفناک قسم کے خواب آتے ہیں، لاشوں کے اور مردہ لوگوں کے خواب آتے ہیں۔ زہر دیئے جانے کے خواب آتے ہیں، دم گھٹنے کے خواب آتے ہیں۔ چوروں کے گھر میں گھس جانے کے خواب آتے ہیں جس سے نیند میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ TM ذاتی لیوٹن کی صورت میں دیتے۔

کریو زوٹ (Kreosote): بڑے مہذب انداز میں مریض، خواب میں پیشاب کرتا ہے اور حقیقت میں بستر کو گیلیا کر دیتا ہے۔

گلونائن (Glonoin): آنسوؤں کے ساتھ رونے کے خواب، خوفناک قسم کے خواب۔

برائی اونیا (Bryonia): پریشان کن اور کاروبار میں بڑا احتیاط توجہ دینے کے خواب تمام رات آتے ہیں۔ گھریلو کاموں میں منہمک رہنے کے خواب آتے ہیں۔

لیک کینیٹم (Lac Caninium): سانپوں کے خواب، پیشاب کرنے کے خواب اور حادثے کو روکنے کے لئے تیزی کرنے کی خاطر جاگ بائے۔

چائنا آف (China Off): زندہ کیڑوں کی قے کے متواتر خواب آتے ہیں۔

پیکرک ایسڈ (Picric Acid): مریض خواب دیکھتی ہے کہ وہ حاملہ ہے۔

آرنیکا ایم (Arnica M): ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ بھیانک خواب آتے ہیں۔ کچھڑ والے پانی، لیروں وغیرہ کے خواب آتے ہیں۔ رات کے وقت خوف آتا ہے۔

جیبوراندی (Jaborandi): حادثوں اور لڑائیوں کے خواب آتے ہیں۔

اریک تھاٹھس (Erechthites): ننگے پن اور شرم کے خواب آتے ہیں۔

مگنیشیا کارب (Mag Carb): آگ، خون، لیروں، جھگڑوں، روپوں، خوشیوں، بد قسمتیوں، مردہ لوگوں کے خواب آتے ہیں۔

کوکولس (Cocculus): ناپیدہ چیزوں کے خوفناک خواب آتے ہیں۔ یہ ناپیدہ چیزیں آنکھیں بند کرنے پر مریض کے اوپر بھینتی ہیں۔

اگنیشیا (Ignatia): ایک ہی موضوع پر تمام رات خواب آتے ہیں۔
نیٹرم میور (Natrur Mur): ڈاکوؤں، قاتلوں، چوروں اور آگ کے خوفناک خواب آتے ہیں، بطن دار پیاس کے خواب آتے ہیں۔
ایلو (Aloe): پاخانہ کرنے کے خواب آتے ہیں۔
کروٹیلس ہور (Crotalus Hor): قتل کے دہشت ناک خواب آتے ہیں، موت کے لاشوں کے اور مرے ہوئے لوگوں کے خواب آتے ہیں۔ موت اور لاشوں سے متعلق خواب آتے ہیں۔ قبرستان میں ہونے کے خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ لاشوں کی بو بھی خواب میں محسوس ہوتی ہے۔ مریض خوف کے باعث نیند سے جاگ جاتا ہے۔
لکسیس (Lachesis): عجیب و دم غریب خوابوں اور دم سمجھنے کے حلوں سے بہت دیر تک سونے کے بعد نیند میں خلل پڑ جاتا ہے۔
نیٹرم سلف (Natrur Sulphur): لڑائی کے خواب آتے ہیں۔
نیٹرم فاس (Natrur Phos): بہت زیادہ خواب دیکھنے والا۔ پریشانی کے، ماتم کے، مردہ لوگوں کے، رنجیدگی کے، گزرے ہوئے واقعات کے، آگ کے، خوفناک، برے خواب، خوشی کے، پریشانی کے، واضح قسم کے خواب آتے ہیں۔
فیرم آئیوڈینم (Ferrum Iodatum): چوروں کے خواب۔

بونا پن — (Dwarfishness)

(تیز دیکھنے "پس ماندہ")

ٹوبرکولینم (Tuberculin): یہ دوا اونچی طاقت کے ڈائی لیوشن میں دی جانی چاہئے جو 200 سے کم نہیں ہونا چاہئے۔ تواتر کے ساتھ اسے نہیں دہراتا چاہئے۔ علاج اسی دوا سے شروع کیجئے۔

سفی لینم (Syphilinum): ٹوبرکولینم کے تبادلہ میں یہ دوا دیجئے، ٹوبرکولینم اور سفی لینم 200 یا 1000 ڈائی لیوشن کی صورت میں ہر ہفتے یا پندرہ دن کے بعد ڈائی لیوشن کی طاقت کے مطابق بدل بدل کر دیجئے۔ یہ بھولے پن کا علاج کر دیں گی۔

برٹا میور (Baryta Mur): رکی ہوئی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ 200 ڈائی لیوشن دیجئے۔ ٹوبرکولینم دینے کے ایک ہفتہ بعد اسے استعمال کیجئے۔

ارجنٹم نائٹریک (Argentum Nitricum): جیلاہٹ مائل سبز اسہال کے ساتھ رکش (سوکھا مسلمان) میں یہ دوا 200 ڈائی لیوشن کی صورت میں دیجئے۔

سلفر، کلکیریا فاس (Sulphur, Calcareea Phos): اگر بچے شیرخواری میں انتقال کر جائیں تو دورانِ حمل مددِ کچھ سلفر 6 اور کلکیریا فاس 6 روزانہ ایک خوراک بدل بدل کر دیجئے۔
زیر و فائلم (Xerophyllum): غبی، تعلیم پر توجہ نہ دے سکے۔ نام بھول جائے، لفظ کا آخری حرف پہلے لکھ دے۔ عام لفظوں کے حروف بھول جائے۔

بریشا کارب (Baryta Carb): جسم اور دماغ کا بونا پن، دماغی یا اعضا کی پسماندگی، بچے دیر سے چلنا سیکھتے ہیں حالانکہ ان کے بازو اور ٹانگیں طاقت ور ہوتی ہیں۔ دیر سے باتیں کرنا یا سمجھنا سیکھتے ہیں۔ ایک عضو پر دان چڑھنے میں ناگام ہو جاتا ہے جبکہ دوسرے اعضاء کی نشوونما ہوتی رہتی ہے یا وہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ بچہ بزدل اور شرمیلا ہوتا ہے جس کے ساتھ اجنبیوں سے خوف کھاتا ہے۔ جیسے ہی کسی اجنبی کو دیکھتا ہے خود کو چھپا لینا چاہتا ہے۔ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ دیتا ہے اور انگلیوں کے بیچ میں سے شرابے ہوئے جھانکتا ہے۔ سن بلوغ کو پہنچنے پر لڑکیاں ایسی حرکات کرتی ہیں جیسی ایک بچہ کرتا ہے اور بچوں والا رویہ اپناتی ہیں اور گڑبازوں سے کھیلتی ہیں۔

نٹرم میور (Natrium Mur): بچے دیر سے بولنا سیکھتے ہیں۔
کلکیریا کارب (Calcareea M): بچے دیر سے چلنا اور بولنا سیکھتے ہیں۔ ان کی ٹانگیں اور بازو کمزور ہوتے ہیں۔ دانت دیر سے نکالتے ہیں۔ تالو آہستہ آہستہ ملتا ہے۔ سوکھا مسان اور ہڈیوں کا کلنا سڑنا پایا جاتا ہے۔

اگیریکس ایچم (Agaricus M): بچے دیر سے بولنا اور چلنا سیکھتے ہیں۔
الفالفا (Alfalfa): بچے یا پردان چڑھے ہوئے لڑکے جو ویسے تو صحت مند ہوتے ہیں لیکن اٹھارہ سال کی عمر میں گھل گھل کر مر جاتے ہیں۔ اس دوا کے مددِ کچھ کے دو قطروں کی خوراک چھ ماہ تک دیجئے۔

کلکیریا فاس (Calcareea Phos): یہ دوا لمبے، کمزور، پیلے اور بہت بڑے ہاتھوں والے بچوں میں بھولے پن کی نشاندہی کرتی ہے۔ تالو بڑا ہوتا ہے۔ کھلا اور باہر کو ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ جڑے کی ہڈیاں پگی ہوتی ہیں اور دھاؤں سے کڑکڑاتی ہیں جیسے کہ پتلا نشوونما ہوتا ہے۔
سیکیل کار (Secale Cor): ریزھ کی ہڈی میں پتی تبدیلیوں کے باعث جسم کی بلات خراب ہو جاتی ہے۔ ہاتھ اور ٹانگیں نشوونما نہیں پاتیں۔ وہ بڑھاپے کی فکرین کی طرح گر بھی جاتے ہیں۔

ضیق النفسی — (Dyspnoea)

(نیز دیکھئے ”دم“ ”دل“ اور ”کھلی کھانسی“)

ناجا (Naja): دم کھٹنے کے ساتھ چھاتی میں دباؤ ہوتا ہے اور سانس میں رکاوٹ ہوتی ہے۔
کلورالم (Chloralum): انتہا درجہ کی ضیق النفسی ہوتی ہے۔ چھاتی پر وزن اور چھاتی میں کھنچاؤ کے ساتھ ’بے خوابی کے ساتھ دم لاحق ہو۔

نکس واسیکا (Nux Vom): پیٹ میں ہوا جمع ہو جانے کے باعث ضیق النفسی ہوتی ہے۔
نیرم میور (Natrurn Mur): جاڑا کے ساتھ سانس کا آنا اندرون غلہ بہتری ہوتی ہے اور باہر چلنے کی خواہش ہوتی ہے۔ تھکان سے ابتری ہوتی ہے۔

کاربوووتج (Carbo Veg): سانس میں تنگی ہونے پر مریض پگھلا کرنے کو پسند کرتا ہے۔
سڈرون (Cedron): مجامعت کے دوران ضیق النفسی ہوتی ہے۔

سٹیفیسیا (Staphisagria): مجامعت کے اختتام کو پہنچتے پہنچتے ضیق النفسی ہو جاتی ہے۔
آرسنک آلم (Arsenic Alb): الیومن کے اخراج کے ساتھ ضیق النفسی لاحق ہو۔

ایپس ایم (Apis M): دماغی جھلیوں میں پانی آ جانے کے باعث ضیق النفسی لاحق ہو۔

پٹرولیم (Petroleum): سارا دن شدید قسم کی ضیق النفسی رہتی ہے۔

گلونائن (Glonoine): لو لگ جانے سے ضیق النفسی ہوتی ہے۔ الیومن کا اخراج بھی موجود ہو سکتا ہے۔

لیکسیس (Lechesis): دوران نیند دم گھٹ جاتا ہے۔ یا جاگنے پر مریض سانس کے لئے جھپٹتا ہے۔ شراب نوشی کے بعد ضیق النفسی ہوتی ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): معمولی غذا کھانے سے ضیق النفسی ہو جاتی ہے۔

امونیا کارب (Ammonia Carb): تھکاوٹ اور کمزوری کے باعث لیکن بغیر کسی افعالی یا نامیاتی خرابی کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ضیق النفسی ہوتی ہے۔ دم کے بغیر ضیق النفسی معمولی حرکت سے ضیق النفسی ہوتی ہے۔ گرم کمرے میں ابتری ہوتی ہے اور ٹھنڈی کھلی ہوا میں بہتری ہوتی ہے۔

کاربونیم سلف (Carboneum Sulph): تیز یا مشکل تنفس، شراب (الکو حل) یا کولے کی گیس کے باعث ضیق النفسی ہوتی ہے۔ شام کے وقت یا بلندی پر چڑھتے ہوئے ابتری ہوتی ہے۔ بند کمرے میں ابتری ہوتی ہے۔ جب کھانے کے بعد کھانسی ہو تو ابتری ہوتی ہے۔ معمولی تھکاوٹ سے ابتری ہوتی ہے۔

گرافٹائٹس (Graphites): جب مریض سو جائے تو دم گھٹنے لگے اور رات کے وقت سانس کے لئے ہانپتے ہوئے بیدار ہو جائے۔

اپس پی ڈوسپیرما (Aspidosperma): عارضہ قلب کے باعث ضیق النفسی ہو۔ بھیچڑسے کی شریان میں خون جم جاتا ہے۔ عارضہ بول کے باعث ضیق النفسی۔ یہ دوا خون میں آکسیجن کا اضافہ کرتی ہے۔

سلیشیا (Silicea): جھکنے پر ضیق النفسی ہو جائے۔

فیرم میٹ (Ferrum Met): آرام کے دوران تنگی تنفس میں اتھری ہوتی ہے۔ دھبھی آہستہ اور خاموش حرکت سے بہتری ہوتی ہے۔ تیز حرکات سے علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

سورینم (Psorinum): بیٹھنے سے ضیق النفسی میں اتھری ہو، بازو کھول کر پورے بستر پر پھیلا کر لیٹنے سے بہتری ہوتی ہے۔ جب بازو جسم کے قریب لائے تو اتھری ہو جائے۔

میڈوہرینم (Medocherrinum): سانس کی نالی کے منہ کا تشنج لاحق ہوتا ہے۔ ہوا باہر نکالنے میں دقت ہوتی ہے جبکہ اندر لے جانے میں آسانی ہوتی ہے۔ چہرے کے بل لیٹنے سے بہتری ہوتی ہے۔

اکوناٹم فیروکس (Aconitum Ferox): ضیق النفسی اس درجہ کو جا پہنچتی ہے کہ مریض کو سانس لینے کے لئے آدھا اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے اس طرح سے کہ اس کے دونوں ہاتھ سر کو تھامے ہوتے ہیں یعنی سر ہاتھوں پر رکھا ہوتا ہے۔

بجلی کے جھٹکے (Electric Shocks)

ایلن تھس (Ailanthus): بجلی کی رو سے بازوؤں اور ٹانگوں تک اندر سے گزرتی محسوس ہوتی ہے۔

یوفوربیم (Euphorbium): بجلی کے جھٹکے لگنے بیسا درد ہوتا ہے اور مریض اچھل کر بستر سے باہر آ جاتا ہے۔

سٹرائکنگ نیٹم (Strychninum): جب مریض لیٹا ہوتا ہے تو جب اسے چھوا جائے یا جب اس کے بستر کو چھوا جائے تو اسے بجلی کے جھٹکے لگتے ہیں۔ ایسے مریضوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب مریض موٹر کار میں ہو تو اسے چھونے سے بجلی کے جھٹکے لگتے ہیں۔

بیریم سلف (Barium Sul): سر میں بجلی کے جھٹکے لگتے ہیں۔ کہنیوں میں لہریں اٹھتی ہیں۔ نوٹ: اگر بجلی لگنے کا حادثہ پیش آجائے تو ایسی شوگر آف ملک جس میں سے بجلی کی رو گزاری گئی ہو، مریض کو دینی چاہئے۔

دیلایا — (Emaciation)
(دیکھئے ”سوکھامسان“ اور ”جھریاں“)

شریانوں میں خون کے لو تھڑے — (Embolism)

کیکٹس جی (Cactus G): سب خون کے لو تھڑے پھاتی سے آتے ہوں تو یہ دوا خون کے لو تھڑوں کے بار بار بننے کے عمل کو روک دیتی ہے۔ مریض ہذباتی اور اعصابی ہوتا ہے۔ تیز کوئی لگنے جیسی اور دم گھٹنے جیسی لہریں ہوتی ہیں۔ چلنے سے یا بائیں کروٹ پٹنے سے ابتری ہوتی ہے۔ کھچاؤ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی فولادی ہاتھ بھینچ رہا ہو۔

زنگم فاس (Zincum Phos): یا قراط جریان خون کے باعث دماغی ابتری لاحق ہوتی ہے۔ یہ جریان خون مری کے دوروں کے ساتھ مخلوط ہوتے ہیں اور اس کی وجہ پرومائیڈز کا غلط استعمال ہوتا ہے۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): سب دماغی ابتری شراب (الکوحل) اور تمباکو کے استعمال کے باعث لاحق ہو۔

کالچیکم (Calchicum): سارے جسم میں دردوں کے ساتھ دماغ کی نرمی لاحق ہو۔ قوت شامہ میں بہت زیادہ تیزی آ جاتی ہے۔

تھکاوٹ — (Fatigue)

(نیز دیکھئے ”لاغری“)

جنسنگ (Ginseng): یہ دوا قوت کے خوش کن احساس کو پیدا کرتی ہوئی تھکاوٹ کے احساس کو دور کر دیتی ہے نیز بازوؤں اور ٹانگوں میں لچک پیدا کر دیتی ہے اور دماغ کو صاف شفاف کر دیتی ہے۔

آرنیکا ایم (Arnica M): حد احوال سے زیادہ محنت کے باعث تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ مشقت طلب کھیل کھیلنے سے تیز چلنے سے اور بھاری وزن اٹھانے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ چیلینڈونیم (Chelidonium): معمولی مشقت سے کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ حرکت سے نفرت ہوتی ہے۔

ارجنٹم میٹ (Argentum Met): ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ یا دواشت اور دلیل دینے کی قوت میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ دوا کاروباری لوگوں، طلباء، قارئین اور مفکرین کے لئے اچھی دوا ہے۔ چلنے کے بعد تھکاوٹ ہوتی ہے۔

کاربووج (Carbo Veg): تھوڑی دور تک چلنے سے تھکاوٹ ہوتی ہے۔
 سیپیا (Sepia): تھوڑی دور تک چلنے سے تھکاوٹ ہوتی ہے یا معمولی مشقت سے تھکاوٹ ہو جاتا ہے۔
 پیکرک ایسڈ (Picric Acid): معمولی مشقت سے تھکاوٹ ہو۔
 سترکولیا (Sterculia): کسی بھی وجہ سے تھکاوٹ ہو تو یہ دوا دی جائے۔ خوراک پانچ قطرے
 در ہفتہ چار دن میں دو مرتبہ کھانے کے آدھے گھنٹے بعد دیجئے۔

انگیوں کا سن ہو جانا (Fingers Numbness)

نیفرم میور (Nat. Mur): اعصابی کمزوری کے باعث مریض چیزیں گرا دے۔
 میگزیریم (Megerium): ہاتھوں میں طاقت نہیں ہوتی، کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا۔
 کالی بروم (Kali Brom): مریض کچھ پکڑ رکھنے کے قابل نہیں ہو تک جلدی سے چیزیں نیچے رکھ دیتا ہے یا انہیں گرنے دیتا ہے۔

ہڈیوں کا ٹوٹ جانا (Fractures)

آرنیکا (Arnica): ہڈی ٹوٹ جانے کے بعد یہ دوا فوری طور پر دینی چاہئے لیکن ہڈی کو اپنی جگہ بٹھانے کے لئے مریض کو جراح کے پاس لے جانا چاہئے۔ پہلے بارہ گھنٹوں یا کم و بیش وقت کے لئے یہ دوا 1000 ذائی لیوشن ہر چار گھنٹے کے بعد دینی چاہئے۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل ادویات ہڈی کے جلد بڑ جانے کے لئے دی جائیں۔
 کلکیریا فاس (Calcarea Phos): یہ دوا 6x ذائی لیوشن کی صورت میں ہر دو گھنٹے کے بعد دن میں چھ مرتبہ روزانہ ایک ہفتہ تک دی جاسکتی ہے۔
 سمفیٹم (Symphytum): یہ دوا کلکیریا فاس 6x کے جوابدے میں دی جاسکتی ہے۔ ایک ہفتہ تک کلکیریا فاس دی جاسکتی ہے اور اگلے ہفتہ کے دوران سمفیٹم 3x دی جاسکتی ہے۔
 روٹا (Ruta): ٹوٹی ہوئی ہڈی کے الگ ہو جانے کے بعد یہ دوا بہت قلیل قدر ہے جو سختی اور نکلنے پن کے لئے دی جاتی ہے۔ 1x ذائی لیوشن کی صورت میں یہ دوا دی جاسکتی ہے اور رٹاکس 30 کے ساتھ بدل بدل کر ایک ایک ہفتہ کے لئے دی جاسکتی ہے۔
 اگنیشیا (Ignatia): المناک ہریان، تمکینی، سپکاپاہٹ، پھڑکن، شور برداشت نہ ہو سکے، سمفیٹم ہوئی اور بے چینی والی نیند اور درد سے بڑھی ہوئی حساسیت۔
 رٹاکس (Rhus Tox): جب ہڈیوں کو باندھتے والے پٹھے (Ligaments) پھٹ جائیں اور

مریض گنٹھیاوی مزاج کا ہو جائے۔

لیکیسس (Lachesis): بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ مریض باتونی، چلبلا اور ڈرپوک ہوتا ہے۔ بے خوابی ہوتی ہے۔ بے چینی کے ساتھ مریض بے قرار ہوتا ہے۔ ان علامات کے لئے اس دوا کو آرنیکا اور گلگیریا فاس کے ذریعے لوٹی ہوئی ہڈی میں بھری آجانے کے بعد دینی چاہئے۔

گلگیریا کارب (Calcarea Carb): قریب اشخاص میں ہڈی کے اس طرح سے ٹوٹ جانے کے لئے جس میں ہڈی ایک طرف سے ٹوٹ کر مڑ جاتی ہے، یہ دوا دی جائے۔ اس کے ساتھ یہ علامات بھی ہوتی ہیں۔ پیٹ کی سوجن اور سر پر پینہ۔ 200 طاقت کی دوا دیجئے۔

پھپھوندی — (Fungus Affections)

لیکیسس (Lachesis): گرم پسینے کے ساتھ نیلاہٹ مائل اور غوائی پھپھوندی ظاہر ہوتی ہے۔ نیلاہٹ مائل اور غوائی کناروں کے ساتھ ناسور ہوتے ہیں۔

فاسفورس (Phosphorus): پھپھوندی اور چھوٹے ناسور جن سے بہت زیادہ خون بہتا ہے۔ تھوچا، آرسینک الیم (Thuja, Arsenic Alb): اگر مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں تو دی گئی ترتیب کے مطابق ان ادویات کو آزمایا جاسکتا ہے۔

ملقوف رسولی — (Ganglion)

روٹا، ہیننزوک ایسڈ، سیلیشیا (Ruta, Benzoic Acid, Silicea): کلانی کی پشت پر۔

فساد نیچ — (Gangrene)

آرسینک الیم (Arsenic Alb): بوڑھے لوگوں میں خشک فساد نیچ (ٹنگرین) سوزشی دکن اور جلن میں گرمی سے اتفاق ہوتا ہے۔ بے چینی ہوتی ہے۔ یہ دوا اکثر پھپھوندی کے فساد نیچ میں دی جاتی ہے۔ متعفن اسال بہت زیادہ نقاہت کے ساتھ ہوتے ہیں۔

لیکیسس (Lachesis): زخموں یا چوٹ لگ جانے کے بعد خون میں زہر پھیل جاتا ہے۔ متاثرہ حصہ نیلا اور ارغوائی ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے خون اور پیپ ملا گاڑھا مادہ رستا ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں میں ہرقلی ٹھنڈک کے ساتھ جاڑا ہوتا ہے۔

سیکیل کار (Secale Cor): بھتجناہٹ، کھٹے ریگنے کے احساس کے ساتھ بوڑھے لوگوں میں ٹھنڈی گرمی سے ابتری ہوتی ہے۔ اس اور پیروں کی خشک ٹنگرین، شے اور انگلیاں

لوٹ جاتی ہیں اور گر جاتی ہیں۔ جلد پر جھریاں پڑ جاتی ہیں اور جلد خشک ہوتی ہے۔ سکڑی ہوئی اور ٹھنڈی ہوتی ہے۔ کوئی حساسیت نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے داغ اور خونی پھوڑے ہوتے ہیں جو کہ انگلی بن جاتے ہیں اور اس دوا کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مریض ٹھنڈک سے اتفاق پاتا ہے اور آرسینک الیم کے برخلاف ڈھانپ نہیں سکتا۔

کروٹیلس ایچ (Crotalus H): 'گرم' پیلاہٹ مائل، ترنگرین۔ بازو اور ٹانگیں کالے پھوڑوں اور بہت زیادہ سوجن سے بھر پڑتی ہیں۔ گندی بو آتی ہے۔

کریو زوٹ (Kreosote): پھپھڑوں کی ترنگرین۔ گوشت خور پھوڑے اور آبلے انگلی بن جاتے ہیں۔ متاثرہ حصے ارغوانی دکھائی دیتے ہیں اور برفلے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ نقابہت کے ساتھ بدبودار افرازات ہوتے ہیں۔

سلفیورک ایسڈ (Sulphuric Acid): مشینی زخموں کے بعد ترنگرین ہو جائے۔

عمومی تکلیفات (عام علامات) — (Generalities)

بیلس پیرنٹس (Bellis Perennis): ٹھنڈا پانی پینے کے باعث یا آکس لیم کھانے کے باعث جبکہ جسم گرم ہو۔ کوئی بھی بیماری لاحق ہو جائے۔ مرطوب ٹھنڈک کے باعث اچانک جائزے کے اثرات اس وقت لاحق ہوں جب کوئی شخص گرم ہو یا اسے نہیٹ آیا ہو۔

بوریکس (Borax): پیشاب سے پہلے 'پاخا' خارج کرنے پر تکلیف ہو جائے۔

ایسڈ میور (Acid Mur): مریض بستر کی پائنتی کی طرف پھسل جائے اور اکثر لازماً اٹھایا جائے۔ بستر پر نیچے کی جانب پھسلے۔

رینن کولس لی (Ranunculus B): گرمی سے 'ٹھنڈک' میں اور ٹھنڈے گرمی میں آنے جانے پر بہتری ہوتی ہے۔ درجہ حرارت کی اچانک تبدیلی کے باعث لاحق ہونے والی کوئی بھی بیماری۔

سٹرامونیم (Stramonium): میزھیوں سے نیچے جاتے ہوئے مریض ایک کی بجائے دو ذینے نیچے اترتا ہے اور ناکام ہوتا ہے۔

آرسینک الیم، کلکیر یا کارب، سیلیشیا (Arsenic Alb. Calcarea Carb. Silicea): ٹھنڈے مریضوں کے لئے جو ٹھنڈے موسم میں مبتلا ہوتے ہیں اور گرم موسم میں بہتر ہوتے ہیں اور گرم چیزیں لگانے سے بھی بہتری ہوتی ہے۔

فلورک ایسڈ، کالی آیوڈ (Fluoric Acid, Kali Iod): گرم مریضوں کے لئے جو گرمیوں

میں اترتے ہیں یا گرمی سے اترتی ہوتی ہے اور ٹھنڈی چیزیں لگانے سے بہتری ہوتی ہے۔
مرک سول (Merc Sol): غیر معمولی گرمی یا سردی برداشت نہیں ہو سکتی۔ مریض معتدل
موسم میں بہتری محسوس کرتا ہے۔

ہائیوسکیمس (Hyoscyamus): غیر مذہب حرکتیں کرے، جسم کو بگاڑے۔

ابسنٹھیم (Absinthum): تشدد، ظالم اور غیر انسانی رویے والا مریض۔ بلا مقصد مصروف
رہتا ہے۔

گرافٹیس (Graphites): دوبارہ ثبوت پر ہفتے، ٹھک کر لے۔

غدد — (Glands)

(Myxedema) (Hypothyroidism)

ٹیوبرکیولینم بووٹا (Tuberculinum Bov): گردن میں دق کے غدد۔ 200 سے 1M یا
Cm طاقت تک خوراکوں میں یہ دوا دی جائے۔ تھامی دوا غدد کی سوزش کے علاج کے لئے
کافی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ ناکام ہو جائے تو درج ذیل ادویات آزمائیے۔

کلکیریا آئیوڈ (Calcarea iod): 30 طاقت میں یہ دوا دن میں تین مرتبہ دی جاسکتی ہے۔
ٹیوبرکیولینم بووٹا کو عمل انگیز دوا کے طور پر 200 طاقت میں ہر ماہ جاری رکھا جاسکتا ہے۔

کلکیریا فلور (Calcarea Flo): غدد، خلیاتی شیج اور ہڈیوں کی بنانوں کی سختی اور سوزش،
عضلات پتھر کی طرح سخت ہوتے ہیں۔ گرمی ہڈیوں میں چاولوں جیسے اجسام ہوتے ہیں۔

برشا آئیوڈ (Baryta iod): جب غدد کی سوزش کے ساتھ ٹائسلز کی سوزش موجود ہو۔
ہیپیر سلف (Hepar Sul): لفیفیک غدد کا بڑھ جانا لاحق ہوتا ہے۔ یہ غدد سخت اور پیپ
کے بچھے ہوتے ہیں۔ موسم سرما کے آنے پر کسی مخصوص غدہ میں پیپ پڑ سکتی ہے۔

سس ٹس کین (Cistus Can): غدد کی سوزش، سوجن اور غدد میں پیپ کا پڑنا، گرہ دار
رسی کی طرح گردن کے غدد ایک قطار میں بڑھ جاتے ہیں۔

تھائرائیڈین (Thyroidin): تھائی رائیڈ غدد کا مکمل جراحی کے ذریعے دور کرنے اور غدد کی
نشوونما نہ ہونے کے باعث لاحق ہونے والے امراض۔ تین مہینے یا کم و بیش عرصہ تک یہ دوا
30 ڈائی لیوشن کی صورت میں دی جانی چاہئے۔

کالی آئیوڈ (Kali iod): ناکارہ غدد جن کے کنارے سخت اور سوجے ہوتے ہیں۔ وہی کی
طرح کی پتلی اور خراش دار رطوبت کے اخراج کے ساتھ غدد میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ غدد کی

مطابق۔ غدد سخت ہونے سے پہلے سوج جاتے ہیں، آتشکی غدد۔
 کالی میور (Kali Mur): غدد کا عمل درہم برہم ہو جانے کے باعث کیل مسا سے چرے اور گردن وغیرہ پر پیدا ہو جاتے ہیں۔ سوزش کے بعد لمفینک افرازات ہوتے ہیں۔

رشاکس، پلساٹیل، ہیوزاٹنا، سیلیشیا (Pulsatilla, Hippozaenia, Silicea): لمفینک غدد کی سوزش۔ ایسیر سلف ٹاکام ہو جانے کے بعد دی گئی ترتیب کے مطابق ان ادویات کو استعمال کیجئے۔

فیرم فاس (Ferrum Phos): لمفینک غدد کی سوزش، معمولی جوش کے باعث چہرہ خون سے بھرا، چمکدار، سرخ ہو جاتا ہے۔ حیض بہت زیادہ تواتر کے ساتھ اور بہت زیادہ افراط کے ساتھ خارج ہوتے ہیں۔ قلت خون لاحق ہوتی ہے۔

فسفورس (Phosphorus): اس سال اور پسینے میں جھلا رہنے والے کمزور مریضوں میں غدد کی شکایات۔

آئیوڈین (Iodine): تھائی رائیڈ غدد کی سوزش یا بڑھوتری۔ میڈیٹرک غدد ایک گرہ کی طرح محسوس ہو سکتے ہیں۔ جڑے کے زیریں غدد کی سوجن لاحق ہوتی ہے۔ معمولی تھکاوٹ سے دل کی دھڑکن لاحق ہو جاتی ہے۔ غدد بڑھ جاتے ہیں جبکہ جسم مرجھا جاتا ہے یا پتلا ہو جاتا ہے۔

سپونجیا (Spongia): غدد کی خارش، سوجن اور سختی، خشکی، گرمی اور بے چینی۔
 لائیوکوپس ویر (Lycopus Vir): دل کی نمایاں علامات کے ساتھ غدد کی سوجن لاحق ہو۔ یہ فشار خون کو گرا دیتی ہے۔ نبض کی رفتار کو کم کر دیتی ہے اور سس ٹول کی لمبائی کو بہت حد تک بڑھا دیتی ہے۔

کاربو انیمالس (Carbo Animalis): حلق، پستانوں اور بعض کے غدد اور غوائی ہو جاتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں جس کے ساتھ نرم ہونے کا رجحان نہیں ہوتا یا پیپ پڑنے کا رجحان نہیں ہوتا۔ غدد اتنے زیادہ بڑھتے نہیں ہیں لیکن وہ سخت ہوتے ہیں اور کونکے کی آگ کی طرح سے جلتے ہیں۔ یہ دوا سرطانی تکالیف کا علاج بھی کرتی ہے۔

کونیم (Conium): غدد سخت اور سوزشی ہو جاتے ہیں۔ بازو کے نیچے والے غدد میں سوزش اور ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔ گردن کے غدد میں اور چانگھ کے غدد میں سوزش ہوتی ہے اور ہیٹ بڑھ جاتا ہے۔ لمفینک غدد کے ساتھ ساتھ اس طرح سے سوزش ہوتی ہے کہ گروہوں کی ایک زنجیر بن جاتی ہے۔

غدد کی سوجن — (Glandular Swelling)

برومیم (Bromium): غدد بڑھ جاتے ہیں۔ خضیوں میں سوجن ہوتی ہے، پیپ پڑنے کے رجحان کے بغیر۔ غدد میں سختی واقع ہو جاتی ہے۔

کلکیریا آئیوڈ (Calcarea Iod): غدد کی سوزش لاحق ہوتی ہے۔ غدد میں سختی لاحق ہوتی ہے۔

کلکیریا فلور (Calcarea Fluor): سرویکل اور لنفیٹک غدد کی سختی کے ساتھ بلا درد غددی بڑھوتری لاحق ہو۔ بروٹکائی اور میڈیٹرک غدد کی بڑھوتری لاحق ہوتی ہے۔ مرطوب موسم میں بہتری ہوتی ہے۔ گرم خضیوں کے کرنے سے اور مسلنے سے بہتری ہوتی ہے۔ 6x طاقت استعمال کیجئے۔

بیلادونا (Belladonna): غددی سوجن، پیپ کا خدشہ پیدا کرے۔ جیزے کی ہڈیوں کے علاقہ میں ہو سکتی ہے یا سوجن پستانوں میں ہو سکتی ہے جو کہ بھاری، سرخ اور حساس ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ حرارت اور سونیاں چبھنے جیسے دردوں کے ساتھ، سوزشی غد کے باعث سرخ دھاریوں کی لہریں چلتی ہیں۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): غدد کی سوجن جن میں پیپ پڑنے کا رجحان ہوتا ہے۔ سر پر پسند آتا ہے جو کہ کھٹا اور بدبودار ہوتا ہے۔

گریفائٹنس (Graphites): بغل، جاگم اور گردن کے غدد کا بڑھ جانا جلد کی علامات کے ساتھ لاحق ہو۔ پیٹ بڑا اور سخت ہو جاتا ہے۔

سکروفولیریا (Scrophularia): یہ غدد کی سوزش اور پیپ پڑنے کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔ پستانوں میں گرہیں ہوتی ہیں۔

مرک آئیوڈ (Merc Iod): درد کے ساتھ غدد کی سوزش لاحق ہو۔ غدد سخت اور سرخ ہوتے ہیں۔ یہ بیلادونا کے بعد اچھا کام کرتی ہے۔

لیپس البس (Lapis Albus): یہ بہت سی اقسام کے اگڑا کا احاطہ کرتی ہے۔ غدد بڑے ہو جاتے ہیں، ایک خاص حد تک تری کے ساتھ۔ کلکیریا فلور کے برعکس، جس میں پتھریلی سختی ہوتی ہے۔ میڈیٹرک غدد کی بڑھوتری۔

آئیوڈم (Iodum): غدد کا بڑھ جانا (شمول ٹائسلن) پورے جسم کے دیا ہو جانے کے ساتھ عضلات سکڑ جاتے ہیں اور جلد پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ سوائے چھاتیوں کے غدد کے جو کہ گھٹتے گھٹتے بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں، تمام غدد بڑھ جاتے ہیں۔

کاربو انیمالس (Carbo Animalis): غددی سوجن، غدد آہستہ آہستہ بڑے ہو جاتے ہیں

اور پھر وہیں رک جاتے ہیں۔ ان میں چپ نہیں پڑتی اور وہ بہت زیادہ بڑے بھی نہیں ہوتے۔ وہ سخت ہوتے ہیں۔

جلسی میم (Gelsemium): دس سے گیارہ بجے صبح کے دور ان آنے والے بغیر پیاس کے بخار کے ساتھ لمفٹک غدود کی سوزش اور بڑھوتری کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ بخار شام کے وقت مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ دماغی علامات ہوتی ہیں جیسے کہ سر میں بے چینی، چکر وغیرہ موجود ہو سکتے ہیں۔ مملک قسم کا گومڑ۔

اکونائٹ لائیگو ٹونیم (Aconite Lycotonum): سروریکل، بغل کے اور پستانوں کے غدود کی سوجن اور حتیٰ کہ جس مقام پر باکن کے امراض کا خدشہ لاحق ہو۔
ایتھوزا (Aethusa): گردن کے گرد تسبیح کے دانوں کی طرح کی غدودی سوجن۔

گلنڈز (Goiter) —

آئیوڈم (Iodum): یہ گلنڈز کے لئے چوٹی کی دوا ہے اور کافی زیادہ سیاہ، چاق و چوبند مریضوں میں اس کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ 1M ڈائی لیوشن کی صورت میں دینی چاہئے۔ نمایاں ختی کھنچاؤ کے احساس کے ساتھ ہوتی ہے۔ دونوں کنارے بڑھ جاتے ہیں۔ ہر حیض کے آنے پر رسولی مزید سوج جاتی ہے اور مزید پردرد ہو جاتی ہے۔ جسامت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے خصوصاً دائیں جانب۔ نرم اور بغیر کسی کمی اور زیادتی کے۔ بغیر لو کا گومڑ، اندرونی اور درمیانی حصہ بچے کے سر جتنی بڑی جسامت کا ہوتا ہے۔ گلابی سرخ، وزن میں بہت بھاری اور نرم ہوتا ہے۔ اس دوا سے آرام آ جاتا ہے۔ مریض پتلا ہوتا ہے لیکن رغبت سے کھاتا ہے۔ حرارت اور تیز نبض کے ساتھ نرم گلنڈز ہوتا ہے۔ آئیوڈم کے مریض افسردہ، کم ہمت اور خود کشی کے رجحان والے ہوتے ہیں۔

برومیوم (Bromium): جب آئیوڈم 1M ڈائی لیوشن کی صورت میں ناکام ہو جائے تو یہ دوا اونچی طاقت کے ڈائی لیوشن یعنی 1M کی صورت میں آزمانی چاہئے۔ نرمی کے ساتھ غدود کا بڑھ جانا۔ مریض دھڑکن کے باعث دائیں کروٹ نہیں لیٹ سکتا۔ مریض کے چہرے کا رنگ ہلکا ہوتا ہے۔ خنازیری مزاج اور خوش باش ہوتا ہے۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): دائیں جانب سخت، ہموار، چمکدار صورت والا گلنڈز، کھنچاؤ کے احساس کے ساتھ ہوتا ہے۔ کھنچاؤ کا احساس رسولی میں ہوتا ہے گو یہ رسولی بہت بڑی نہیں ہوتی۔

نیٹرم میور (Natrium Mur): یہ دوا ابتدائی مراحل میں دی جاتی ہے۔ مریض طوفان بادو

باراں سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت تنہا ہونے سے گھبراتا ہے۔ دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے جبکہ مستحکم سکوپ استعمال کی جائے اور جب نبض گنی جائے تو دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ کسٹھ مالا لاغری کے ساتھ لاحق ہوتی ہے۔ کمزوری، کیکلیپاہٹ، دل کی دھڑکن، پیاس، اعصابی بھان اور بے خوابی ہوتی ہے۔

لیکیسیس (Lachesis): چہرے میں خون بھر جانے اور چہرہ گرم ہو جانے کے ساتھ ہلکا روشہ ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن اور گرمی کے احساس کے ساتھ مریض نیند سے جاگ جاتا ہے۔ اس دوا کے متعلق بھی ابتدائی مراحل میں سوچنا چاہئے۔

فیو کس ویس (Fucus Ves): مدرد پتھر قندروں والی خوراکوں کی صورت میں دیجئے۔ یہ گلز کی بنیادی دوا ہے۔ بد ہضمی ہوتی ہے۔ اچھارہ اور قبض عمومی علامات ہیں۔

کلیکیریا کارب (Calcarea Carb): سر اور گردن پر ہائیڈ آٹے کے ساتھ فربہ اشخاص میں عام گلز ہوتا ہے۔ یہ دوا 200 ڈائی لیوشن کی صورت میں ہر دو گھنٹے کے بعد روزانہ چھ مرتبہ دی جائے۔ یہاں تک کہ بہتری کا آغاز ہو جائے۔

ایڈرینالین (Adrenalin): کسٹھ مالا تیز نبض کے ساتھ تیز دل کے فعل میں تیزی اور ضیق انسانی کے ساتھ آنکھوں کے ڈھیلے باہر کو نکلے ہوتے ہیں اور گردن کی پشت پر شریانوں میں شکن ہوتی ہے۔ ایڈرینالین 200 یا TM ڈائی لیوشن کی صورت میں دی جاسکتی ہے۔ اگر یہ دوا ناکام ہو جائے تو کاسٹس آزمائیں۔

تھائرائیڈین (Thyroidin): اگر آئیڈ اور برڈیم ناکام ہو جائیں تو یہ دوا آزمائی جاسکتی ہے۔ 3x یا 6x ٹرائی ٹوریشن دیجئے۔

سپونجیا (Spongia): پردرد گلز۔ قلت حیض کے ساتھ درد ہوتا ہے۔ نکلنے وقت درد ہوتا ہے۔ وادیوں میں رہنے والوں میں گلز۔ اس دوا کی علامات میں برڈیم والی غدودوں کی بڑھوتری اور چہرے کا رنگ ہوتا ہے نیز آسجڈم والی ذہنی پریشانی اور قوت حیات کی کمی ہوتی ہے۔

فیرم میٹ (Ferrum Met): کسٹھ مالا خصوصاً حیضوں کے دب جانے کے بعد۔

لیپس آلبس (Lapis Albus): غدودوں کی خنازیری بڑھوتری، پستانوں میں 'معدہ میں اور رحم میں جلن دار اور ڈنک نکلنے جیسے درد کے ساتھ گلز لاحق ہو۔

لائکوپس (Lycopus): دل کی تکلیف اور ضیق انسانی کے ساتھ کسٹھ مالا لاحق ہو۔

ایگناتیا (Ignatia): اعصابی مریضوں میں جب گلز میں درد ہو۔

جریان خون — (Haemorrhage)

(دیکھئے ”سیلان خون“)

گرمی، حدت — (Heat)

ڈوری فوراً (Doryphora): جسم کے مختلف حصوں میں جلن ہوتی ہے مثلاً منہ، گلا، خوراک کی تلی، معدہ، پیٹ، امعاء، مستقیم اور پستانوں وغیرہ میں۔

کیمفر (Camphor): جسم کی اندرونی جانب گرمی ہوتی ہے اور بیرونی جانب ٹھنڈک ہوتی ہے۔

وریتروم البم (Veratrum Alb): جلن ہوتی ہے جبکہ ٹھنڈا پسینہ آتا ہو۔ جاڑا اور گرمی اول بدل کر آتے ہیں۔

سلفر (Sulphur): گرمی سے تھماہٹ ہوتی ہے۔ جیسے جسم کے کسی حصہ میں گرم سرسہ رہی ہو جس کا اختتام آخر کار پسینے پر ہوتا ہے۔ حدت قطعاً میں ہوتی ہے۔ پاؤں کے تلووں میں اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں حدت ہوتی ہے۔

آر سینک البم (Ars. Alb): متواتر جلن دار حدت ہوتی ہے جس میں افادہ گرم چیزیں لگانے سے یا گرم کمرے میں جانے سے ہوتا ہے لیکن سر کی اندرونی جانب کی جلن میں افادہ ٹھنڈے پانی سے دھونے پر ہوتا ہے۔ گٹھیاوی حالت میں جو کہ کھوپڑی پر اور بیرونی جانب کے اعصاب پر اثر انداز ہوتی ہے، جب جلن ہو تو افادہ گرمی سے ہوتا ہے۔

آگوناٹ این (Aconite N): بے چینی کے ساتھ جلن دار حدت ہوتی ہے اور ٹھنڈی چیزیں لگانے سے بہتری ہوتی ہے۔ یا کھلی ہوا میں جانے سے بہتری ہوتی ہے۔

لیکٹک ایسڈ (Lactic Acid): ذیابیطس کے دوران جلن ہوتی ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): جسم کے کسی بھی حصہ میں جلن ہو۔ ہڈیاں اور ٹائیفائیڈ وغیرہ میں ہو سکتی ہے۔ چکن والی حدت ہوتی ہے جس میں مسلنے سے بہتری ہوتی ہے۔

امونیئم میور (Ammonia Mur): اٹھنے کا احساس پورے جسم میں ہوتا ہے جیسے کہ خون کی ٹالیوں میں خون ابل رہا ہو۔ ٹھنڈے سے حساسیت ہوتی ہے۔ کھلی ہوا میں تکلیفات میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدت کی تھماہٹ پسینے سے ختم ہوتی ہے۔

سپیا (Sepia): ہاتھ گرم ہوتے ہیں جبکہ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں یا اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یہ رہنما کن علامت ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): جسم کے صرف ایک حصہ میں حدت ہوتی ہے، دوسرا حصہ ٹھنڈا ہوتا

تھائرائیڈین (Theridion): بازوؤں اور ٹانگوں کے علاقہ میں جلن ہوتی ہے جس کے ساتھ شور اور پھوٹنے سے ہاتھوں اور پاؤں میں حساسیت ہوتی ہے۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): کندھوں کی ہڈیوں کے درمیان بہت زیادہ جلن ہوتی ہے۔
میڈورینم (Medorrhinum): پاؤں کے ٹکڑوں میں حدت ہوتی ہے۔ کمر کے گرد جلن دار حدت ہوتی ہے جیسا کہ جلتا ہو کوئلہ رکھا گیا ہو۔

آگنیشیا (Ignatia): ایک کان اور ایک رخسار سرخ ہوتا ہے اور اس میں جلن ہوتی ہے۔
آئرس ویر (Iris Ver): منہ میں 'زبان میں' گلے میں 'نیچے معدے تک جلن ہوتی ہے۔ بازوؤں میں جلن ہوتی ہے جبکہ اس سال ناحق ہوں۔

اپیس ایم (Apis M): چہرے 'آنکھوں' آنکھوں کے پپٹوں 'ہونٹوں' زبان 'گلے' بازوؤں اور خیموں میں ذک تک کٹنے جیسے اور جلن دار دردوں کے ساتھ سرخی اور سوجن ہوتی ہے۔
بیلادونا (Belladonna): سرخی اور شدید جلن کے ساتھ حدت ہوتی ہے۔ پھوٹنے پر شدید گرم ہوتا ہے۔

پیکریک ایسڈ (Picric Acid): معمولی سا مطالعہ ریڑھ میں جلن کا باعث ہوتا ہے۔ ذہنی تھکان کے باعث جلن ہوتی ہے۔ بغیر درد کے جلن۔

پٹیلیائی (Ptelia T): جلد اور چہرے کی جلن دار حدت۔ حتیٰ کہ سانس نھنوں کو جلاتا ہے۔
روٹا (Ruta): آنکھوں میں حدت اور آگ کا احساس ہوتا ہے۔

ٹیربینٹھینا (Terabinthina): جسم کے تمام حصوں اور سوراخوں میں جلن ہوتی ہے۔ معدہ 'امعاء مستقیم' مثانہ یا پیشاب کی نالی وغیرہ میں جلن ہو سکتی ہے۔

فلورک ایسڈ (Fluoric Acid): درجہ حرارت میں اضافہ ہوئے بغیر شام کے وقت اور رات کے وقت جسم سے بہت زیادہ حدت خارج ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ پاؤں جلتے ہیں اور مریض رات کو پاؤں بستر سے باہر رکھتا ہے۔ وہ چہرے اور سر کو ٹھنڈے پانی سے دھوٹا چاہتا ہے۔

ناجا (Naja): سر اور چہرے پر مسلسل حدت ہوتی ہے۔ ہتھیلیوں میں سوجن ہوتی ہے۔ حدت کا غل برداشت احساس۔ گرم لوہے کے گلے کا احساس ہوتا ہے۔

ایومینا سیلیکیٹ (Alumina Silicate): گرمیوں کی اتحاد درجے کی حدت 'مریض کی قوت کو زائل کر دیتی ہے۔ چلنا قریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ ریڑھ میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے۔

لیکسیس (Lachesis): دن کے دوران گرم تھماہٹ ہوتی ہے اور رات کو ٹھنڈی تھماہٹ

ہوتی ہے۔ بے خوابی ہوتی ہے۔

ہبک ورم کا مرض — (Hook Worm Disease)

تھائی مول (Thymol): ہبک ورم کے مرض کے لئے یہ مخصوص دوا ہے۔ 6th طاقت کی صورت میں دن میں دو مرتبہ یعنی صبح اور شام دیجئے۔

چینو پوڈیم (Chenopodium): یہ دوا ہبک ورم کے مرض کے لئے ہے۔ ہر ٹیچر کے 10 قطرے دلی خوراکیں استعمال کیجئے۔ ہر دو گھنٹے کے بعد صرف تین خوراکیں دیجئے۔

کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ (Carbon Tetrachloride): یہ ہبک ورم کے علاج کے لئے بہترین دوا ہے۔ ایسے ملک میں جہاں یہ مرض بہت زیادہ پایا جائے۔ 3cc کی صرف ایک دوا یوں کو دیجئے جس سے 95% ہبک ورم ختم ہو جائیں گے۔

ہارمون — (Hormones)

یہ اصطلاح اندرونی افرازات کے لئے استعمال ہوتی ہے جو کہ ایڈریٹالین 'تھائیرائیڈین' انسولین وغیرہ دینے سے مسامات سے محروم غدود سے خارج ہوتے ہیں۔ جب یہ مسامات سے محروم غدود ناکافی ہو جاتے ہیں تو یہ امراض لاحق ہوتے ہیں ان کا علاج صرف ان غدود کو مناسب ہو میو پیٹھک ادویات کے استعمال کے ذریعے کافی بنانے سے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بالوں کا قتل از وقت سفید ہو جانا اور بالوں کا گر جانا تھائیرائیڈ غدود کے ناکافی ہو جانے کے باعث ہوتا ہے۔ تھائیرائیڈ کے 30 یا 200 ڈائی لیوٹرن کے استعمال سے نہ صرف بالوں کا سفید ہونا رک جائے گا بلکہ قدرتی رنگ بھی واپس لانے میں یہ دوا مدد کرے گی۔ اسی طرح سے انسولین 30 یا 200 عمل انگیز دوا کے طور پر استعمال کرنی چاہئے 'ڈیا بیٹس' میں تاکہ ان غدود کو کافی بنائے جو انسولین پیدا کرتے ہیں۔

سوزش (سوجن) — (Inflammation)

بیلادونا (Belladonna): جب جلن اور تھکن دالے درد کے ساتھ سوجن سرخ ہو۔ پھوٹے جاسے دالے جھے گرم ہوتے ہیں۔

ایپس ایم (Apis M): پھولی ہوئی سوجن ہوتی ہے جیسا کہ شمد کی کھپوں نے کانا ہو۔ پیشاب کم مقدار میں آتا ہے۔ اوپر والا ہونٹ بغیر کائے کے سوج جاتا ہے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): جب سوجن پیلی اور سخت ہو 200 طاقت کی صورت

میں دن میں تین مرتبہ دوا زائہ افادہ ہونے تک دیجئے۔
تھائرائیڈینم (Thyroidinum): فلیکس میں سوجن ہوتی ہے جو کہ عمومی اور بغیر درد کے ہوتی ہے۔

اور سلف (Aurum Sulph): بغل کے غدود کی اور پستانوں کی سوجن۔
لائیکوپس ویر (Lycopus Ver): درد کے ساتھ سوجن ہوتی ہے۔ اس دوا سے درد مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے جو بغیر درد کے سوجن متواتر برقرار رہتی ہے۔

چوٹیں، زخم (Injuries)

ہائپرکیم (Hypericum): جب نرم حصوں کے ساتھ اعصاب پر چوٹیں آئیں جیسے کہ ٹانگوں پر چلنے سے، سونیاں، پنہیں لگنے سے، کیزوں کے کانٹے اور جانوروں کے کانٹے سے۔ ہونٹوں اور انگلیوں کے پوروں جیسے زیادہ اعصاب والے حصوں کے چر جانے، پھٹ جانے یا چوٹ لگنے کے لئے یہ ایک شاندار دوا ہے۔ یہ ریزہ اور دھجی میں چوٹوں کے لئے مفید ہے۔ فوری طور پر تشیخ سے حفاظت کے لئے لیڈم پی دیجئے۔ زخم لگنے کے نتیجے میں تشیخ کے دوران ناقابل برداشت درد کی موجودگی میں یہ دوا دی جاتی ہے۔ پرانے زخموں کے نشانات میں درد ہوتا ہے جو اعصاب کے ساتھ ساتھ جسم کے اندرونی جانب دوڑتا ہے۔

سمفیٹم (Symphytum): کندہ اوزار کے لگنے سے ہونے والے زخم۔ عمل جراحی کے بعد غلہ (کٹا ہوا حصہ) پر بھجانا ہوتا ہے۔ جوڑوں کے زخموں میں روٹا کے ٹکڑے ہونے کے بعد یہ دوا آزمائی جاتی ہے۔ زخم آہستہ آہستہ مندمل ہوتے ہیں۔ تیز دھار آلے سے کٹے ہوئے زخموں میں یا جب جراح (سرجن) جراحی کے ذریعے جسم کے کسی حصے میں چیر پھاڑ کرے اور یہ جراح کا لگایا ہوا زخم غیر صحت مند دکھائی دے اور اس میں ڈنک لگنے جیسا جلن وار درد ہو تو یہ دوا دی جاتی ہے۔

لیڈم (Ladum): چھٹے ہوئے زخموں کے لئے جن میں چھوٹے سے مریض کو ٹھنڈک کا احساس ہو لیکن ٹھنڈی چیزیں لگانے سے افادہ ہو۔ ایسے زخم جن سے خون کم مقدار میں خارج ہو اور بعد میں درد ہو۔ متاثرہ حصے میں ابھار ہوتا ہے اور ٹھنڈک ہوتی ہے۔ کھونسا لگنے سے یا پریشانی کے باعث آنکھ سیاہ ہو جاتی ہے۔ چلتے ہوئے رنگ آلود کیل چھ جانے کے باعث زخم لگ جائے یا پاؤں کے کھوؤں میں یا ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں سونپوں کا خطرناک انداز میں چھ جانا جن کے باعث زہر پھیل جاتا ہے۔ یہ تشیخ کو روک دیتی ہے لیکن حسب تشیخ حقیقتاً لاحق ہو چکا ہو تو پھر لیڈم دوا نہیں ہوتی اس صورت میں ہائپرکیم دیجئے۔ زخم لگنے کے بعد یا زخم پست جانے

کے بعد بیمار بارہ دس اور ٹانگوں کا مریجا جائے۔

اناکارڈیم (Anacardium): جب جوڑوں کے بندھن متاثر ہوں۔

ارستولوچیا (Aristolochia): جوتے کے کانٹے کے باعث، گھوڑے کی پشت پر سواری کرنے کے باعث، کشتی رانی کے باعث، باغبانی وغیرہ کے باعث ہونے والے پھالے یا زخم۔

روٹا (Ruta): سوچ یا سوچ کے بعد بننے والی گلیاں، سوچ کے بعد ٹنگڑاہٹ ہو خصوصاً ٹخنوں اور گلائیوں میں۔ سوچ یا چوٹ لگنے کے باعث ہڈیوں کے بندھنوں کا ٹوٹ جانا۔ فٹ پال کھیلنے والوں اور ہاکی کے کھلاڑیوں کے جسم پر لگنے والی ٹھوکروں کی خراشوں کو یہ دوا تیزی کے ساتھ شفا دیتی ہے۔ ہڈیوں، ہڈیوں کے بندھنوں اور کری ہڈیوں کی خراشوں کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): بے انتہا دردوں کے باعث شدید قسم کی حساسیت ہوتی ہے۔ یہ گتھیا میں، جوڑوں کے دردوں میں، ہڈیوں کے ٹوٹنے میں یا دیگر چوٹوں میں ہو سکتی ہے۔ نرم حصوں کے زخم، احتدال سے زیادہ تھکاوٹ، کھنچاؤ اور سوچ۔ پورے جسم میں دھکن ہوتی ہے۔ سوچ والے جوڑوں پر سیاہ یا نیلے انکسار کو یہ دوا شفا دیتی ہے۔

کیلنڈولا (Calendula): تیز دھار آلوں سے لگنے والے زخم۔

اسٹیم سیپا (Allium Cepa): عمل جراحی کے بعد کٹے ہوئے حصوں (خٹا) میں شدید قسم کے ڈنک لگنے جیسے دردوں کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ جلن دار درد ہوتا ہے۔

ریشاکس (Rhus Tox): موچوں اور اعتدال سے زیادہ وزن اٹھانے کے باعث ہونے والی تھکائیوں کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ جب عضلات یا ہڈیوں کے بندھنوں میں کھنچاؤ ہو اور جب آرنیکا ٹاکنی طبیعت ہو تو یہ دوا آزمائی چاہئے۔

کلیکیریا فاس (Calcarea Phos): جب ہڈیوں میں دراڑیں آجائیں یا ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ یہ دوا آرنیکا IM، روٹا اور کیمیسیم کے ساتھ تباہی میں ہر روز بدل بدل کر دی جاتی ہے۔ IM طاقت کی صورت میں استعمال کرنی چاہئے۔

پائی لونیا (Paeonia): دباؤ کے باعث ناسوری کیفیت لاحق ہو مثلاً بستر کے زخم اور تنگ جوتوں کے باعث ہونے والے زخم۔

بیلز پیرینس (Bellis Perennis): چوٹوں اور موچوں کے لئے بہت بڑی دوا ہے۔ متاثر حصے پھونکنے سے نرم ہوتے ہیں۔ یہ خون کی نالیوں اور اعصاب دونوں کو متاثر کرتی ہے اور اس طرح آرنیکا اور ہائپرکیم دونوں کی خصوصیات کی حامل دوا ہے۔ پستانوں کی سختی لاحق ہوتی ہے جو کہ گھونٹا لگنے کے بعد مستقل ہوتی ہے۔

کروکس (Crocus): زخموں میں پیپ پڑ جاتی ہے۔

گھٹنے کا مڑ (ٹھک) جانا — (Knock Knee)

ٹیوبریکولینم 200 (Tuberculinum 200): اسی دوا سے علاج کا آغاز کرنا چاہئے اور اسے ہر ماہ دو ہرانا چاہئے۔ سچ کے عرصہ میں درج ذیل ادویات دینی چاہئیں، سوائے ٹیوبریکولینم دینے سے دو دن پہلے اور دو دن بعد تک۔

کلکیریا فاس (Calcarea Phos): دن میں تین مرتبہ روزانہ لمبے عرصہ کے لئے دیجئے۔
لیٹھی رس (Lathyrus): ٹکٹا ٹھک جاتا ہے جبکہ مریض چل رہا ہو۔ لڑکھڑاہٹ والی چال ہوتی ہے۔ ٹانگوں میں سختی اور اینٹھن ہوتی ہے۔

سیلیشیا 200 (Silicea 200): یہ دوا اس موقع پر جب اس کی ضرورت ہو ٹیوبریکولینم کی جگہ دینی چاہئے۔

سستی — (Lassitudes)

(دیکھئے "لاگری")

خون میں سفید ذرات کا بڑھ جانا (باکن کے امراض)

(Leukemia)

آرسینک ایلیم (Arsenicum Alb): پیلاہٹ ہوتی ہے، نقاہت ہوتی ہے، سانس چڑھ جاتا ہے، دل کا فعل کمزور ہوتا ہے۔ خون تبدیل کرنے والے عضلات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی علامات یوں ہیں: بے چینی ہوتی ہے، سہ پہر کے بعد اور آدھی رات کے بعد تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ اعصابی اندیشہ ٹانگی ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے۔ یہ علامات نظر انداز نہیں ہونی چاہئیں۔

چائنا (China): جب بخار اور جاڑا دور سے والا ہو جس کے ساتھ قلی کا بڑھ جانا نمایاں ہوتا ہے۔ پانٹنوں میں خلل واقع ہو جاتا ہے اور جلد گرم اور خشک ہو جاتی ہے۔

فیرم فاس (Ferrum Phos): جریان خون اور عمومی نقاہت و قبض کے ساتھ قلت خون لاحق ہوتی ہے۔ مؤخر حیضوں کے ساتھ نوجوان لڑکیوں میں سبزی رنگ ہوتا ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): مریض بہت زیادہ ڈھیلا اور کمزور ہو جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن لاحق ہوتی ہے اور معمولی محنت سے تنفس میں اختصار آ جاتا ہے۔ کھل تھکاوٹ کے ساتھ ڈھیلے

اور بدبودار پانخانے ہوتے ہیں۔

آرسینک آئیوڈ (Arsenic Iod) : یہ دوا کھانوں کے بعد دی جاسکتی ہے۔
نیٹرم میور (Natrium Mur) : جب جلد کا رنگ پیلا، ٹیلا ہو، جلد چکنی ہوتی ہے۔ جازے کے ساتھ قلت خون لاحق ہو۔ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں اور جازا کمر میں نیچے کی طرف ہوتا ہے۔

کلکیریا کارب، کلکیریا آئیوڈ (Calcarea Carb, Calcarea Iod) : جب لمفینک غدود اور خصوصاً سرویکل غدود ملوث ہوں تو ان دواؤں کی خاص طور سے نشاندہی کی جاتی ہے۔ لمیٹہ مریض میں تمککات کا باعث ہوتا ہے۔

نیٹرم آرسینک، نیٹرم سلف (Natrium Ars, Natrium Sulph) : یوکیما (ہاکن کے امراض) کے شدید کیسوں میں یہ ادویات دی گئی ترتیب کے مطابق آزمائی جاسکتی ہیں۔
سینو تھس (Ceanothus) : تلی کے بڑھ جانے کے لئے یہ مخصوص دوا ہے۔ تلی کے بڑھ جانے کے نتیجے میں قلت خون کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ دوا مدر جگر کے پانچ قطروں کی خوراکوں کی صورت میں دی جاتی ہے۔

جوتھیں — Louse (Lice)

شیفی سگریا (Staphisagria) : جب جوتھیں زیر ناف بالوں میں پائی جائیں (یعنی اعضائے مخصوص پر اگنے والے بالوں میں) یہ دوا سر کی جوتھوں کے لئے بھی مفید ہے۔
لائکوپوڈیم (Lycopodium) : جلد میں جوتھیں ہوتی ہیں۔ جلد کی جوتھوں کے لئے یہ دوا مخصوص ہے۔ بچے دینے والی جوتھیں۔

سورینم (Psorinum) : سر کے بالوں میں جوتھیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ دوا ناکام ہو جائے تو کاربولک ایسڈ آزمائیں۔

کاربولک ایسڈ (Carbolic Acid) : یہ بھی جوتھوں کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔

چہرے کی جلد کی دق — (Lupus)

بیسلی لینم (Bacillinum) : علاج اسی دوا سے شروع کرنا چاہئے۔ یہ 200 ڈائی یوشن کی صورت میں دی جاتی ہے۔ دیگر ادویات ایک ہفتے کے بعد شروع کی جائیں۔

ریڈیم بروم (Radium Brom) : چہرے کی دق کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔

آرسینک ایلیم (Ars. Alb) : بہت زیادہ نقاہت اور بے چینی ہوتی ہے۔ گرم جھڑیں لگانے

سے بہتری ہوتی ہے اور ٹھنڈی چیزیں لگانے سے ابتری ہوتی ہے۔
ایومین (Alumen, Alumina): چہرے کی دق یا ناک کے سرطان کے لئے۔ چہرہ
 لاش کی طرح سے چلا ہوتا ہے۔ ہونٹ نیلے ہوتے ہیں۔
 نوٹ: اوپر دی گئی ادویات میں سے ہر دوا قابل لحاظ عرصہ کے لئے آزمائی جانی چاہئے تاکہ شفا
 حاصل ہو جائے۔

سوکھا مسان — (Marasmus)

(نیز دیکھئے ”جھریاں“)

مگنیشیا کارب (Magnesia Carb): ایسے بچے جن میں کھوپڑی کی ہڈی یا سر کی پشت کا اندر
 کی جانب ڈوبنے کا رجحان پایا جاتا ہو اور پیری ٹل (Parietal) ہڈیاں باہر کو نکل آتی ہیں جس
 سے دھاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ حالت عموماً ناجائز بچوں میں پائی جاتی ہے جن کا حاصل چوری چھپے کے
 جملع سے ٹھہر جاتا ہے۔

ایبروٹینم (Abrotanum): ایسے بچوں کی دوا جن میں نمایاں لاغری پائی جاتی ہے خصوصاً
 ناکوں کی لاغری، جلد پٹیلی ہوتی ہے اور تھوں کی صورت میں ٹٹک جاتی ہے۔ سر کمزور ہوتا ہے
 وہ سر کو اوپر اٹھا نہیں سکتے۔

کلکیریا فاس (Calcarea Phos): سوکھا مسان کے لئے یہ ایک عمدہ دوا ہے۔ یہ دوا 6x
 نرائی ٹوریشن کی صورت میں دینی چاہئے۔ جلد خشک اور جھریوں والی ہوتی ہے۔
نایٹرم میور (Natrum Mur): بچوں میں گردن کا سوکھا مسان، پانی کی شدید کمی ہوتی ہے۔
 بچے مغموم اور پراز حسرت ہوتے ہیں۔ بچہ ایک بغیر بالوں والے بندر کی طرح دکھائی دیتا ہے۔
پیکریک ایسڈ (Picric Acid): بہت زیادہ بھوک کے ساتھ بچہ کمزور ہوتا ہے۔

سینی کیولا (Sanicula): بچہ بوڑھا، گندا اور پٹکنا دکھائی دیتا ہے۔ دھلا پن بڑھتا رہتا ہے۔
 گردن اور ہاتھوں کی جلد جھریوں دار اور تہ دار ہوتی ہے۔ ذہنی طور پر خدائی اور سخت سر
 والا مسلسل بدلنے والا ہوتا ہے۔ رات کے وقت سر پر پینٹ آتا ہے جو کہ تھکنے کو گندا کر دیتا
 ہے۔ پاؤں میں بدبودار پینٹ آتا ہے۔

برٹیا کارب (Baryta Carb): سن بلوغ کو پہنچ کر عضلاتی کمزوری میں اس دوا کی نشاندہی کی
 جاتی ہے۔ ایسے اشخاص کا بتدریج گھٹتے گھٹتے پتلا ہو جانا جو کبھی موٹے اور خوب صحت مند ہوتے
 تھے۔ قہر دوا اور پیٹ کے بڑھنے کے ساتھ بچوں کی لاغری۔

آئیوڈم (Iodum): جب سوکھا مسان کا رجحان ہو تو یہ دوا مفید ہوتی ہے۔ چڑچڑاہٹ پن ہوتا

ہے۔ بچہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا چاہتا۔ بہت زیادہ کھاتا ہے لیکن پھر بھی کمزور ہوتا ہے۔ ہڈیوں کے جوڑ سوج جاتے ہیں اور بد وضع ہو جاتے ہیں۔
ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): یہ دوا عمل انگیز کے طور پر 200 ڈائی لیوشن کی صورت میں ہر چھتے دی جاتی ہے۔

کنیشیوں کی ہڈیوں کی سوزش — (Mastoid Process)

کیپسکیم (Capsicum): ہاتھ لگانے سے درد ہوتا ہے، سوجن ہوتی ہے، کنیشیوں کی ہڈیوں کا گھٹنا سڑنا لاحق ہوتا ہے۔

سیلیشیا (Silicea): کنیشیوں کی ہڈیوں کا گھٹنا سڑنا۔
پلاٹینا (Platina): کنیشیوں کی ہڈیوں کا سن ہو جانا۔ کنیشیوں کی ہڈیوں کے شدید سن ہو جانے کا احساس۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انہیں سر کے ساتھ جھجوں کے ذریعے کسا گیا ہو۔
کینتھارس (Cantharis): پھاڑنے والا درد ہوتا ہے جیسے کہ ہڈیوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔

مرک آئیوڈ (Merc. iod): کنیشیوں کی ہڈیوں کی سوزش۔
بیلادونا (Belladonna): ابتدائی مراحل میں یہ دوا دی جاتی ہے جبکہ سوزش ہوتی ہے اور متاثرہ حصے سرخ ہوتے ہیں۔

فلورک ایسڈ (Fluoric Acid): کنیشیوں کی ہڈیوں کے پھوڑے، مسلسل پیلے رنگ کی گاڑھی پیپ کے اخراج کے ساتھ۔ شکر کے اونچے درجے کے فیصد قاسب کے ساتھ اور پیاس کے ساتھ ذیابیطس لاحق ہوتی ہے۔ سخت قسم کی جنسی تحریک ہوتی ہے۔

ملک لیگ — (Milk Leg)

(ٹانگ کی ایک خاص قسم کی سوزش)

پلساٹیل (Pulsatilla): اوپر دیئے گئے مرض کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ پیلی سفید سوجن ہوتی ہے۔ وریدوں کے تنے کے ساتھ ساتھ درد اور نرمابٹ ہوتی ہے۔ مریض کو جازا لگتا ہے لیکن خود کو ڈھانپنا نہیں چاہتا۔

لائکوپوڈیم (Lycopodium): سفید ورید کی سوجن جو بڑھ جاتی ہے اور نرم ہو جاتی ہے۔ یہ آخر تک معلوم کی جاسکتی ہے۔

سیلیشیا (Silicea): ریشوں (شیج) اور ہڈیوں کے جوڑوں کے بیچ میں کھنچاؤ کے ساتھ۔

لیکسیس (Lachesis): جب پلسائیلا ناکام ہو جائے اور جب دل متاثر ہو جائے تو اس دوا کے متعلق سوچنا چاہئے۔ اس میں صبح کے وقت علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
ہیمامیلین (Hamamelis): یہ ایک دوسری دوا ہے جسے پلسائیلا کے ناکام ہو جانے پر آزمانا چاہئے اور جب لیکسیس کی علامات موجود نہ ہوں تب اسے آزمانا چاہئے۔

طریق کار (کمی و بیشی) — (Modalities)
 (دیکھئے ”زیادتی“ اور ”کمی علامات میں“)

موسیقی — (Music)

سابینا (Sabina): موسیقی ناقابل برداشت ہوتی ہے اور اعصابیت پیدا کرتی ہے۔ موسیقی ہڈیوں اور ہڈیوں کے گودے سے گزر جاتی ہے۔
ٹھوجا (Thuja): موسیقی کے باعث مریض روتا ہے۔

پیدائشی نشانات — Naevus (Birth Marks)

ٹھوجا ایم (Thuja 1M): علاج اسی دوا سے شروع کیا جائے۔ اسی دوا کا مدر ٹھوجا روئی طور پر صبح شام لگائیے۔

ریڈیم بروم 200 (Radium Brom 200): اوپر دی گئی دوا یعنی ٹھوجا کے ساتھ چھتے میں ایک مرتبہ دیجئے جس روز یہ دوا دی جائے اس روز ٹھوجا ضمیں دیں چاہئے۔
فاسفورس (Phosphorus): اگر اوپر دی گئی ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دوا آزمائیں۔
وکیسی نم (Vaccinium): اس دوا کو 200 ڈائی لیوشن کی صورت میں بطور عمل انگیز دوا چھ دن میں ایک بار استعمال کرنا چاہئے۔ اس روز کوئی دوسری دوا ضمیں دیں چاہئے۔

ہڈیوں کا گلنا سڑنا — (Necrosis)

سلیشیا (Silicea): جب شفا یابی میں سستی ہو تو یہ دوا دی جائے۔ اونچے درجے کی طاقتوں میں یعنی 200 یا 1000 کی صورت میں دیجئے اور لمبے وقفوں کے ساتھ دو ہر ایک۔
کلکیریا فاس، کلکیریا فلور (Calcarea Phos, Calcarea Fluor): ہڈیوں کے گلنے سڑنے کے علاج کے لئے یا روکنے کے لئے یہ اہم ادویات بدل بدل کر دی جائیں۔
یوفوربیم (Euphorbium): جڑے کی ہڈی کا گلنا سڑنا لاحق ہوتا ہے۔ نچلے جڑے کے غدہ میں

جسپ ہوتی ہے اور سوچن ہوتی ہے۔
 فاسفورس (Phosphorus): نچلے جڑے کا گلنا سڑنا لاحق ہوتا ہے۔
 کالی آیوڈ (Kali Iod): جب آنکھ یا پارے کے غلط استعمال کے باعث مرض لاحق ہو۔
 کوکولس (Cocculus): سریاران کی ہڈی کے ٹوٹ جانے کے بعد یہ دوا اسے نکالنے میں مدد دیتی ہے۔
 ایسڈ فلور (Acid Fluor): نکلے سڑتے ریشوں (نہج) کو نکالنے کے عمل کو تیز کرتی ہے۔

چہرے کا اعصابی درد — (Neuralgia-Facial)

(نیز دیکھئے "اعصابی نظام" کے ذیل میں "اعصابی درد")
 مگنیشیا کارب (Magnesia Carb): ایک ہفتہ یا کم و بیش عرصہ کے بعد تین چار روز کے لئے چہرے کا اعصابی درد لاحق ہوتا ہے اس میں گولی نکلنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ چہرے کی بائیں جانب کا اعصابی درد دوران شب مریض کو بستر سے باہر نکل دیتا ہے۔ مسلسل حرکت کرنے سے بہتری ہوتی ہے اور حرکت کو روک دینے سے ابتری ہوتی ہے۔
 کولو سنٹھس (Colocynthis): جذبات یا جنگ عزت کے باعث درد لاحق ہوتے ہیں جو لمبوں کی صورت میں آتے ہیں اور گرمی سے اور دبائے سے بستر ہوتے ہیں اور آرام کرنے کے دوران ابتر ہو جاتے ہیں۔ بائیں جانب کا اعصابی درد۔ درد کے دوران چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ رخساروں کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے نیز آنکھ کے نیچے گڑھے میں اعصابی درد ہوتا ہے۔
 بیلادونا (Belladonna): سرخ چہرے، پرخوان آنکھوں، گرم سر اور چھوٹے جانے والے حصے کی بہت زیادہ حساسیت کے ساتھ شدید دریں ہوتی ہیں۔ ٹھنڈ کے باعث دائیں جانب کا اعصابی درد ہوتا ہے۔

مگنیشیا فاس (Magnesia Phos): پھاڑنے والے اور گولی نکلنے جیسے درد بجلی چمکنے کی طرح سے اعصاب کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں جن میں گرمی سے اور دبائے سے افادہ ہوتا ہے۔ آنکھ کے اوپر والے اور نیچے والے گڑھے میں شدید قسم کے درد ہوتے ہیں۔
 سینڈرون (Cedron): آنکھ کے اوپر والے گڑھے میں اعصابی درد ہوتا ہے جبکہ دوروں میں دردوں کا آنا بہت نمایاں ہو۔

میڈریم (Mezerium): جب درد چہرے کی گرمی سے دور ہوں (کوئی دوسری حدت تریا گرم افادہ نہیں کرتی) اور گھٹانے کے بعد دردوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ بائیں رخسار میں درد آنکھ کی طرف دوڑتا ہے۔ رات کے دوران ابتری ہوتی ہے۔

لیکسیس (Lachesis): جب چنڈی کی ہڈی میں درد ہو۔
 ویلیریانہ (Valeriana): جب آرام کرنے کے دوران درد میں اضافہ ہو جائے۔
 اکونائٹ این (Aconite N): متاثرہ حصوں میں جھنجھناہٹ کے ساتھ درد ہوتا ہے۔
 سپائی جیلیا (Spigelia): شدید جلن دار اور چھڑیاں لگنے جیسے درد پائیں جانب ہوتے ہیں جو کہ ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔
 سلفر (Sulphur): چہرے کا اعصابی درد، حرام مغز کے پانچویں عصب کا اعصابی درد جو اسے چہرے تک پہنچاتا ہے۔
 کالچیکم (Colchicum): جب اعصابی درد کے ساتھ عضلات کی فالجی کمزوری بھی لاحق ہو لیکن سپائی جیلیا والی شدت نہیں ہوتی۔
 سفلینیم (Syphilinum): جب اعصابی درد رات کے وقت اتر ہو جائیں۔ اس میں بھی چہرے کے ایک جانب کا فالج ہوتا ہے۔ بہت اونچی طاقت کی دوا دیکھئے (1000 یا CM)۔
 آر جینٹم ٹائٹ (Argentum Nit): آنکھ کے اوپر والے اور نیچے والے گڑھے کے درد کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ جب درد شروع میں بہت جگے ہوں پھر آہستہ آہستہ پتلے جائیں اور پھر بہت ہی اونچے درجے تک پتلے جائیں اور پھر آہستہ آہستہ کم ہو جائیں۔ آنکھ کے اوپر والے گڑھے کا درد۔
 کیمومیل (Chamomilla): جب درد بہت شدید اور ناقابل برداشت ہو۔ اس کے ساتھ دانت کا درد، کان کا درد اور گردن کا درد ہوتا ہے۔
 پلاتینا (Platina): ٹھنڈک اور سن ہو جانے کے ساتھ اینٹھن والے درد ہوتے ہیں۔
 پلانٹگو میجر (Plantago Major): یہ دوا تقریباً تمام قسم کے اعصابی درد کے لئے بہت مفید ہے۔ درد سحر لگائیے۔
 کالی آئیڈ (Kali Iod): جلد کی امداد سے بڑھی ہوئی حساسیت۔ خدی قسم کے کیسوں میں دی جاتی ہے۔ آتشگی۔
 ور بیس کم (Verbascum): کان میں ناقابل برداشت کھنچاؤ کے ساتھ 'ہتماہٹ والا درد' معمولی حرکت سے تحریک ہوتی ہے۔ نریض دانتوں کو بھیچتا ہے یا زبان سے دانتوں کو چھوتا ہے۔ چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ خراش دار ڈکار آتے ہیں۔
 سینگویریہ (Sanguinaria): چہرے کا اعصابی درد جس میں گھٹنوں کے بل بیٹھنے اور سر کو زور سے فرش کے ساتھ دبانے کے ذریعے اتفاق ہوتا ہے۔ درد بالائی جڑے سے تمام سمتوں میں پھیل جاتا ہے۔

شیشنی سیکریا (Staphisagria): اعصابی درد ہونٹوں کو چبچے یا کاٹنے سے چھوٹنے پر شدید قسم کا درد گولی کی طرح ہونٹوں سے چہرے کی طرف جاتا ہے۔

اعصابی رسولیاں — Neuromata (Nervous Tumors-Nods)

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): یہ دوا اعصابی رسولیوں کے لئے ہے۔ 200 طاقت کی دوا دن میں تین مرتبہ روزانہ چھ ماہ تک دیجئے۔ اگر یہ دوا ناکام ہو جائے یا افاقہ میں ترقی رک جائے تو درج ذیل ادویات آزمائیں۔

ہائپرکیم (Hypericum): جب آرنیکا ایم ناکام ہو جائے تو اعصابی رسولیوں کے لئے یہ دوا ہوتی ہے۔ 200 طاقت کی دوا چار گھنٹے کے وقفے کے ساتھ دن میں تین مرتبہ روزانہ دیجئے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): اعصابی رسولیاں ہر چار ہفتے کے بعد ظاہر ہوں۔ رسولیوں میں پیپ ہوتی ہے جو کہ خون آلود مواد پر مشتمل ہوتی ہیں۔

برائی اونیا (Bryonia): سر کے گوشہ جلد کے بہت سے حصوں میں چھوٹے سخت غدودوں کی طرح سے ہوتے ہیں۔

کیلنڈولا (Calendula): زخموں والی اور اعصابی رسولیاں۔

سفی لینم (Syphilinum): سر پر گوشہ ہوتے ہیں۔

بڑے خواب — (Nightmare)

(A dream characterised by great distress and a sense of oppression or suffocation)

کونیم (Conium): دلخ میں قلت خون کے باعث۔

پائی اونیا (Paeonia): بھوت کا خواب جیسے کہ بھوت اس کی پھانسی پر بیٹھتا ہو، متواتر کراچے ہوئے جاگ جائے۔

سائیکل من (Cyclamen): نیند میں ڈوب جانے کے بعد۔

لیڈم (Ledum): مریض کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر وہ سو گئی تو مر جائے گی۔ کلم میں سو جین محسوس ہوتی ہے۔ دم گھٹنے کا احساس ہوتا ہے۔

امونیا کارب (Ammonia Carb): دل کے امراض میں ہر رات بھیا تک خواب آتے ہیں۔

نکس دامیکا (Nux Vom): آخر شب کے بھاری کھانے کے بعد یا شراب نوشی کے بعد۔

ڈیجی ٹیکس (Digitalis): جریان منی یا احتلام وغیرہ میں۔

موٹاپا — (Obesity)

(Accumulation of fat in the body)

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): یہ چربی کو کم کرنے کے لئے ایک بنیادی دوا ہے۔
 ماتھے پر پچھند آتا ہے جس سے نگلیہ بھیگ جاتا ہے جبکہ مریض سو رہا ہے۔ 200 ڈائی لیوشن کی
 صورت میں یہ دوا دینی چاہئے اور ہر ہفتے دو ہرانی چاہئے۔

فیرم میٹ (Ferrum Met): قلت خون کے ساتھ موٹاپا لاحق ہوتا ہے۔ چہرہ پھولا ہوا ہوتا
 ہے جس کے ساتھ جسم کا گوشت ایسا ہوتا ہے کہ دہانے پر گڑھا پڑ جاتا ہے۔

امونیا میور (Amm. Mur): چوترا بہت بڑے ہوتے ہیں۔ چربی والی رسولیاں ہوتی ہیں۔ جسم
 موٹا اور ٹانگیں پتلی ہوتی ہیں۔

فیوکس ولس (Fucus Ves): جب کلکیریا کارب ناکام ہو جائے تو یہ دوا آزمائیں۔ مدد کچھ
 قطروں کی صورت میں دیتے۔

تھائرائیڈینم (Thyroidinum): چربی کو گھٹانے کے لئے یہ بھی ایک اچھی دوا ہے۔

اورم میٹ (Aurum Met): دل کی چربی کی اتھری کے ساتھ۔

ایم کروڈ (Antim Crud): نوجوان لوگوں میں موٹاپا۔

گرافائٹس (Graphites): موٹاپے کا رجحان خصوصاً مستورات میں مؤخر جینوں کے
 ساتھ۔

استسقاءئی سوجن — Oedema (Dropsical Swelling)

اورم میور (Aurum Mur): الیہومن کے اخراج کے ساتھ استسقاءئی سوجن۔ جیت کے
 اعضاء کی سختی کے باعث 'دقہ دار بخاروں کے ساتھ' تپ کاہی 'جگر و کلی کے امراض کے
 باعث۔

نیٹرم کلورینم (Natrium Chloratum): چلنے پر ہاتھ سوج جاتے ہیں۔

ایپس مل (Apis Mel): جیت کے استسقاء میں استسقاءئی سوجن۔ پیشاب کے کم مقدار اخراج
 کے ساتھ گردوں کی سوزش والے امراض ہوتے ہیں۔ پھوڑے پھنیوں کے دب جانے کے

بعد استسقاءئی سوجن۔ جلد کے شفاف ہونے کے ساتھ اور پیاس نہ ہونے کے ساتھ گردوں کی

اصل والے امراض میں استسقاءئی سوجن ہوتی ہے۔ پیشاب میں بہت زیادہ الیہومن خارج ہوتی

ہے۔ بھل کی استسقاءئی سوجن 'اعصابی استسقاءئی سوجن' جلد پھول جاتی ہے جسے پہلے سے گڑھے
 پڑتے ہیں۔

ایپوسائٹم (Apocynum): استسقاء میں پیشاب کے کم مقدار اخراج کے ساتھ استسقاءی سوجن ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بہت زیادہ پیاس ہوتی ہے۔ یہ ابھس مل کے برعکس ہے۔ حیضوں کے اجراء کے رک جانے کے باعث استسقاءی سوجن ہوتی ہے۔ ہیٹ پھولا ہوتا ہے اور نرم ہوتا ہے یا یہ استسقاءی سوجن تھکاوٹ کے ساتھ سانس کے لئے اور خراثوں کے لئے جھپٹنے کے ساتھ بہت زیادہ حیض کے اجراء کے باعث بھی ہو سکتی ہے۔

آر سینک البم (Ars. Alb): شرابیوں کے دل کے بڑھ جانے کے باعث لاحق ہونے والے دل کے امراض میں استسقاءی سوجن ہوتی ہے۔ آنکھوں، چہرے اور ٹخنوں کے قریب والی جلد کی استسقاءی سوجن زیادہ تر لاحق ہوتی ہے۔ مریض بے چین، پریشان اور بے خواب ہوتا ہے۔ منہ خشک ہوتا ہے۔

فاسفورس (Phosphorus): گردوں کی سوزش میں اس سال کے ساتھ استسقاءی سوجن لاحق ہوتی ہے۔ قلت خون کے ساتھ استسقاءی سوجن لاحق ہو۔

وکی کیریا (Vesicaria): گردوں کے مکمل طور پر لیل ہو جانے کے باعث استسقاءی سوجن لاحق ہوتی ہے جو کہ پیشاب کے افراز کو روک دیتی ہے۔ گردوں کے فضل کے رک جانے کے باعث پیشاب خارج نہیں ہوتا۔ مدر ٹھیکر کی ایک ڈرام کی خوراکیں دیجئے۔

کالی آئیوڈ (Kali Iod): سوچے ہوئے غدود کے دیاؤ کے باعث استسقاءی سوجن لاحق ہو۔ دل کے امراض میں استسقاءی سوجن لاحق ہوتی ہے۔ پسلے دائیں ٹانگ میں اور پھریائیں ٹانگ میں۔ ٹیری ستم (Terebinth): گردوں میں اجتماع خون کے باعث استسقاءی سوجن لاحق ہو۔ گردوں کی تکالیف کے ساتھ اور نقاہت کے ساتھ استسقاءی سوجن لاحق ہوتی ہے۔

چائنا (China): لاغری اور قلت خون کے ساتھ استسقاءی سوجن لاحق ہو۔

فیسولس این (Phaseolus N): جگر اور گردے کی پیچیدگی کے ساتھ دل کے امراض کے باعث استسقاء لاحق ہو۔ گردوں کا اور دل کا استسقاء تیزی سے شفا پاتا ہے۔ پیشاب بڑھی ہوئی مقدار میں بہت زیادہ خارج ہوتا ہے۔ البیومن تیزی کے ساتھ غائب ہو جاتا ہے۔

ہائیڈرو کوٹائل (Hydrocotyle): استسقاءی سوجن، لیل پا اور قلیریا لاحق ہو۔ یہ دوا مخصوص اور مستند ہے۔ 1x ڈالی لیوشن دیجئے۔

تھائیرائیڈینم (Thyroidinum): بغیر کسی ظاہری وجہ کے بازوؤں، ٹانگوں اور چہرے کا استسقاء لاحق ہو۔

رشاکس (Rhus Tox): خضیوں کی، عضو تناسل کی، لب ہائے فرج کی اور منہ کی استسقاءی سوجن لاحق ہوتی ہے۔ یہ جلد پر اثر انداز ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ جھلی پر ہو۔

قبل از وقت پڑھلپا (Old Age-Premature)

امبر اگریشیا (Ambra Grisea): قبل از وقت پڑھلپا لاحق ہو جائے اس طرح سے کہ پچاس برس کی عمر میں وہ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں جو کہ اسی برس کی عمر میں ظاہر ہونی چاہئیں۔ یادداشت بھول جانے کے ساتھ دماغ کی لڑکھڑاہٹ اور خواب دہلی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔
برٹا کارب (Baryta Carb): قبل از وقت پڑھلپا لاحق ہوتا ہے۔ مریض بچوں جیسے کام کرتا ہے اور بچوں جیسی باتیں کرتا ہے۔ بوڑھے لوگوں میں بچوں والا رویہ ہوتا ہے۔ عضلات جواب دے جاتے ہیں۔ ذہانت میں خرابی آ جاتی ہے۔

قبل از جراحی تکالیف (Operation-Pre)

بعد از جراحی تکلیفات (Operation-Post)

(دیکھئے "خدمات (جراحی کے باعث)")

پیشہ (Perspiration (Sweat))

کلیریا کارب (Calcarea Carb): لمبے اشخاص یا بچوں میں اتنا زیادہ پیشہ خارج ہو کہ جس سے نگہ بھیک جائے۔ یہ بنیادی دوا ہے۔ لاغر کردینے والا پیشہ 'دوران نیند سر پر پیشہ' آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گلڑوں میں پیشہ آتا ہے۔ جب پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو ان پر پیشہ آتا ہے۔

سلیشیا (Silicea): سینے کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے خصوصاً ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر اور پاؤں کے ٹکڑوں میں پیشہ آتا ہے۔ گندی بو والا پیشہ آتا ہے۔

سمبوکس (Sambucus): جاگنے کے عرصہ کے دوران 'لاغری پیدا کئے بغیر پیشہ' آتا ہے۔ مریض جیسے ہی نیند میں ڈوبتا ہے 'پیشہ' رک جاتا ہے۔

مگنیشیا میور (Magnesia Mur): پاؤں میں پیشہ آتا ہے یا پاؤں کے ٹکڑوں میں جلن ہو۔
ورٹرم ایلیم (Veratrum Alb): جلن ہوتی ہے جب کہ پیشہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جاڑا اور گرمی بدل بدل کر آتے ہیں۔ چہرے پر عام طور پر ٹھنڈا پیشہ آتا ہے۔

مگنیشیا کارب (Magnesia Carb): کٹھا پیشہ خارج ہوتا ہو۔

پٹرولیم (Petroleum): بدبودار پیشہ خصوصاً بغلوں میں آتا ہے جیسے ہی مریض کمرے میں داخل ہوتا ہے سب کو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ پیشہ اتنا بدبودار ہوتا ہے۔

بیمنزویک ایسڈ (Benzoic Acid): مریض جس کرویٹ لیٹا نہیں ہوتا اس جانب پینہ آتا ہے۔ پیشاب میں یورک ایسڈ ہوتا ہے۔ گرے رنگ والا اور بہت بدبودار پیشاب خارج ہو جیسا کہ گھوڑے کا پیشاب ہوتا ہے۔

ٹیرنٹ (Tarent): موسیقی سننے سے باافراط پینہ خارج ہوتا ہے۔
کونیئم (Conium): مریض جیسے ہی سوتا ہے پینہ بننے لگتا ہے خواہ دن میں سوئے یا رات میں حتیٰ کہ آنکھیں بند کرنے پر بھی پینہ بہہ لگتا ہے۔ (سمبوکس کے برعکس)

مرکوریس (Mercurius): جب مریض چل رہا ہو تو باافراط پینہ آئے۔ پینہ دن رات آتا ہے گو رات کے دوران زیادہ آتا ہے۔ پکٹائی والا، تیل والا اور بدبودار پینہ خارج ہوتا ہے جس سے بستر کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ بدبو ہر کہیں ہوتی ہے۔ پیشاب، پاخانہ اور پینہ سب بدبودار ہوتے ہیں۔ تیز میٹھی اور ناک میں کھس جانے والی بو ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے ریٹانی ہوتی ہے اور ٹھنڈا پینہ آتا ہے۔

لکیسیس (Lachesis): دل کی دھڑکن کے ساتھ پینہ خارج ہو۔ خون آلود پینہ خارج ہوتا ہے۔

اکونائٹ این (Aconita N): ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر ٹھنڈا پینہ آتا ہے۔ جس کرویٹ لیٹے اسی کرویٹ پینہ آتا ہے۔

کالی کارب (kali Carb): پر درد اعضاء میں پینہ آتا ہے۔

ہیمپٹر سلف (Hepar Sul): پاؤں میں ٹھنڈا اور بدبودار پینہ آتا ہے۔

پلساٹیل (Pulsatilla): پینہ جسم کے صرف ایک حصہ پر آتا ہے اسی طرح سے جسم کے ایک حصہ میں حدت ہوتی ہے جبکہ دوسرا حصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔

سلی سلک ایسڈ (Salicylic Acid): باافراط بدبودار پینہ پاؤں میں آتا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے پاؤں پر پینہ آیا ہوا ہو۔

سنی کیولا (Sanicula): بہت زیادہ کمزور بچوں میں رات کے وقت سر پر پینہ آتا ہے جس کے ساتھ پاؤں کا بدبودار پینہ بھی ہوتا ہے۔ صرف ڈھنگے ہوئے حصوں پر پینہ آئے (تھو جا کے برعکس) جب ہاتھوں کو ملایا جائے تو ہاتھوں میں پینہ آجائے۔

ٹوبرکولینم (Tuberculinum): ذہنی تھکان کے باعث پینہ آتا ہے جس سے کپڑے پر پتلا داغ پڑ جاتا ہے۔ رات کو آنے والے پسینے، مریض موسم کی تبدیلی، ٹھنڈ، نمی، گرم یا برساتی موسم سے حساس ہوتا ہے۔ طوقان کے بعد ابتری ہوتی ہے۔

نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): ہاتھوں اور پاؤں میں باافراط پینہ آتا ہے۔

انٹم ٹارٹ (Ant Tart): متاثرہ حصوں پر باافراط پیند آتا ہے۔
 ٹیلوریم (Tellurium): پاؤں کا بدبودار پیند۔
 نیفٹھالین (Naphthaline): رات کا تھکا دینے والا پیند، دن کے دوران پتے، بدبودار اسل ہوئے ہیں۔

کاربو انیلنس (Carbo Ani): چٹا داغ ڈال دینے والا پیند۔
 گرافٹس (Graphites): پسینے سے چٹا داغ پڑ جاتا ہے۔ کھٹا بدبودار پیند ہوتا ہے۔
 بیلادونا (Belladonna): ڈھکے ہوئے حصوں پر پیند آتا ہے۔
 سورینم (Psorinum): معمولی تھکاوٹ سے پیند آ جاتا ہے۔
 سٹیفیسگیا (Staphisagria): گندے انڈوں کی بو والا پیند، 'دق کے آخری کنارے پر آئے ہوئے مریضوں میں رات کو پسینے آتے ہیں۔

اوسیم (Osmium): بغل کا پیند، لمسن کی طرح سے بدبودار ہوتا ہے۔
 جیورا انڈی (Jaborandi): باافراط پیند، چہرے اور ہاتھوں سے شروع ہو کر سارے جسم پر پھیل جاتا ہے اور اس کے بعد ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور اس کا اختتام کھٹے بکھم والی تپ سے ہوتا ہے۔

اکونائٹ لائیگلوٹونم (Aconite Lycotonum): ہاتھوں پر پیند آتا ہے۔
 لاروسیرا سس (Laurocerasus): سرد مزاج مریضوں میں گرم کمرے کے اندر پیند آتا ہے جن میں افادہ کھلی ہوا میں چلنے سے ہوتا ہے۔
 اورم میٹ (Aurum Met): پیند گاڑھے پیشاب کے ساتھ آتا ہے جو گدلا اور بہت زیادہ متعفن ہوتا ہے۔

کروٹن ٹگ (Croton Tig): خون آلود پیند آئے۔
 چائینی نم آرسینک (Chininum Ars): سوتے میں باافراط تھکا دینے والا پیند آتا ہے۔
 ایگناتیا (Ignatia): چہرے کے کسی پھوٹے سے جھپٹے پر صرف پیند آتا ہے جبکہ مریض کھاربا ہو۔

کیلڈیم (Caladium): مٹھی بو والا پیند آتا ہے جو کھمبوں کو کھینچ لیتا ہے۔
 تھوچا (Thuja): جسم کے ٹنگے حصوں پر پیند آتا ہے اور ڈھکے ہوئے حصوں پر پیند نہیں آتا۔ اعضاء قاسل کے قریب بدبودار پیند آتا ہے۔ قیل والا، مٹھا، بدبودار پیند آتا ہے۔
 مریض جس کو کھٹ نہیں لیتا ہوتا اس جانب پیند آتا ہے۔
 نیٹرم میور (Natrium Mur): کھاتے ہوئے پیند آتا ہے۔

کیمومیل (Chamomilla): کھانے یا پینے کے بعد چہرے پر پھیند آتا ہے۔
فلورک ایسڈ (Fluoric Acid): ہاتھ اور پاؤں مسلسل سینے میں نمائے رہتے ہیں۔

سینے کا دب جانا — (Perspiration-Suppressed)

اکونائٹ (Aconite N): جب سینے کے دب جانے سے نزلہ، بخار اور بیرونی سوزش لاحق ہو۔
نکس و امیکا (Nux Vom): سینے کے دب جانے کے باعث بخش لاحق ہو جائیں۔
کالچیکم (Colchicum): اچانک سینے کے بند ہو جانے کے باعث انگڑاہٹ ہو جائے خصوصاً
پاؤں پر سارا جسم گھبرا ہو جانے کے باعث سینے کا دب جانا لاحق ہوتا ہے۔
برائی اونیا (Bryonia): دوران زندگی پھیند دب جائے۔
ڈلکامارا (Dulcamara): متواتر بیماریوں کے ساتھ اچانک ٹھنڈ لگ جانے کے باعث پھیند
دب جاتا ہے۔

ٹانگ کی سوزش — (Phlegmasia Alba Dolens)
(دیکھئے "ٹانگ لیگ")

رسولی — (Polypus)

مٹانہ (کی رسولی) — (Bladder)

کلییریا کارب (Calcarea Carb): مٹانے کی رسولی۔

کان (کی رسولی) — (Ear)

ہائیڈراستس (Hydrastis): کان کی ہتھی جلی کی بکثرت رسولی کی نشوونما۔

ٹھوجا (Thuja): کان کے وسط میں رسولی ہوتی ہے۔

مرکیورس (Mercurius): سماعت کی ٹالی بہت زیادہ سیلان خون والی نرم رسولی کے باعث

بالکل بند ہو جاتی ہے۔

کلییریا کارب (Calcarea Carb): کان کی رسولی۔

حنجرہ (کی رسولی) — (Larynx)

سنگوئیریا (Sanguinaria): حنجرہ کی رسولی۔

برب دل (Berb Vul): آواز کی ٹالی کی رسولی جو سرخ ہوتی ہے۔ ڈنخل کی بنیاد دلتی۔

ناک (کی رسولی) — (Nose)

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): قوت شامہ کے کھو جانے کے ساتھ ناک کی رسولی لاحق ہوتی ہے۔

ٹیو کریم (Teucrium): رسولی پورے نتھنے پر قابض ہو جاتی ہے۔ مریض جس کمرٹ لیتا ہے اس جانب سے ناک بند ہو جاتا ہے۔ نزلے کے غلط علاج کے بعد بڑی سی رسولی پیدا ہو جاتی ہے۔ سبزی مائل سفید مادہ خارج ہوتا ہے۔ مرطوب موسم میں رسولی بڑھ جاتی ہے۔ رسولی (Polypus) کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔

کالی نائٹ (Kali Nit): درد سر کے ہر حملے کے بعد رسولی بہت تیزی سے نشوونما پاتی ہے۔ ناک دائیں جانب سے پھیلا ہوا بڑا ہوتا ہے۔

ہکٹالادا (Hedia Lava): چہرے کی بدہی کے ساتھ ناک کی رسولی ہوتی ہے جو آنکھ کے ذیلیوں کو اوپر کی جانب دھکیلاتی ہے۔ پگھوں کو است دیتی ہے، نتھنوں کو بند کر دیتی ہے۔ نیچے کی جانب منہ میں پھیل کر سانس اور چبانے کے عمل کو مشکل بنا دیتی ہے۔

الومینا (Alumina): نتھنے کی رسولی۔۔۔ بائیں جانب۔

امعائے مستقیم (کی رسولی) — (Rectum)

ٹیو کریم (Teucrium): پولی پس کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ اسی دوا سے علاج کا آغاز کیجئے۔ اگر یہ ناکام ہو جائے تو درج ذیل ادویات آزمائیں۔

کلکیریا فاس (Calcarea Phos): امعائے مستقیم کی رسولی۔

فاسفورس (Phosphorus): مقعد کی سوزش کے ساتھ امعائے مستقیم کی رسولی۔

روکنے والی (حفظ مانقہم) — (Preventives)

بیلادونا (Belladonna): سرخ بخار کے مقابلے میں۔

کالی آیوڈ (Kali Iod): جانوروں میں منہ اور پاؤں کے امراض کے مقابلے میں۔

پائیکلو کارپنی غم، پیروٹائیڈ غم (Pilocarpinum, Parotidinum): کن پیڑوں کے مقابلے میں۔

لیتھرس سٹیوا (Lathyrus Sat): ریڑھ کی ہڈی کے پیلے رنگ کے مادے کی سوزش کے

مقابلے میں۔

میلینڈرینم، مورینی لینم (Malandrinum, Morbillinum): خسرو کے مقابلے میں۔

سٹرانسیم (Strontium): تابکاری شعاعوں کے اثرات کے مقابلے میں۔

پرتوسین (Pertussin): کالی کھانسی کے مقابلے میں۔

انفلوئنزینم (Influenzinum): انفلوئنزا کے مقابلے میں۔

ڈیپتھیرینم (Diphtherinum): خناق کے مقابلے میں۔

مانعات سے جلنا (Scalds)

(دیکھئے "جلنا")

اسقریوط (Scurvy)

آرسینک البم (Arsenic Album): شدید قسم کی لاغری ہوتی ہے۔ بچہ دبلا ہوتا ہے۔

معدے کی آنتوں میں شدید قسم کا غفل ہو جاتا ہے۔ منہ سے بہت زیادہ متعفن بو آتی ہے۔

سلفر (Sulphur): جب مسوڑھوں سے خون آئے اور متعفن سانس کے ساتھ مریض کی جلد

پرانی جھریوں والی، مرجھائی ہوئی اور غیر صحت مند ہو تو اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ خون

اور متعفن پیپ دانٹوں کی جڑوں سے خارج ہوتی ہے۔

مرکیورس (Mercurius): جب مسوڑھے دانٹوں سے الگ ہو جائیں اور نیلے اور غیر صحت

مند رنگ والے ہو جائیں تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ ٹانگیں سوجنی ہوئی اور بہت پرورد ہوتی ہیں۔

جلد کی غیر صحت مند نیلاہٹ مائل سوزش اس دوا کی بنیادی علامت ہے۔

کریوزوٹ (Kreosote): منہ بدبودار اور غردوں جیسا ہوتا ہے۔ مسوڑھوں میں ٹاسوری

کیفیت ہوتی ہے۔ کسیر پھوٹی ہے اور اعضاءے نکاسل سے اخراج ہوتا ہے۔

کاربوویج (Carbo Veg): ٹانگ اور مسوڑھوں سے مسلسل جریان خون ہوتا ہے۔ یہ

گردوں اور آنتوں سے بھی ہو سکتا ہے۔

آرنیکا ایم، سمفیٹم (Arnica M, Symphytum): ٹانگوں میں دردوں کے لئے دی گئی

ترتیب کے مطابق آزمائیں۔

نوٹ: سکروی کے علاج کے لئے پرہیز بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ پھلوں کے رس اور میزیاں

بنیادی غذا ہونی چاہئیں جو افادہ دینے میں بہت اچھے نتائج ظاہر کریں گی۔ ایک حصہ کیلنڈولا

دبہ پچھروس حصہ مقطر پانی میں ملا کر کھلی کھینے ہر دو گھنٹہ کے بعد اس سے بہت جلد مرض جاتا

رہے گا اور بدبو ختم ہو جائے گی۔

بحری سفر کی تکلیفات (Seasickness)۔

(بحری جہاز 'موٹر گاڑی یا گاڑی وغیرہ میں سفر کرتے ہوئے لاحق ہونے والی متلی' قے اور چکر وغیرہ)

پٹرولیم (Petroleum): سفر میں ہونے والی تکلیف (قے، متلی، چکر وغیرہ) کے لئے مخصوص دوا ہے۔ مریض شدید قسم کی متلی اور قے میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کے ساتھ چکر اور چاند میں درد سر ہوتا ہے۔ گاڑی میں سواری کے باعث متلی لاحق ہو۔

اپومورفیا (Apomorphia): دماغی علاقہ کی قے 30 ڈائی لیٹن یا اونچے درجے کی غمراہیوں استعمال کیجئے۔

ٹاباکم (Tabacum): معمولی حرکت سے ابتری ہوتی ہے اور عرش پر ٹھنڈی تازہ ہوا میں بہتری ہوتی ہے لیکن اس مرض کی طبی علامات پیلاہٹ، ٹھنڈا پسینہ اور سردی خصوصاً ہاتھوں کی، کے ساتھ۔

سٹیفی سگریا (Staphisagria): اعصابی مریضوں میں سفر کی تکلیفات کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔ یہ دوا اس لئے لینی چاہئے جب غنودگی اور متلی کا آغاز ہو، قے کے شروع ہونے سے پہلے۔

گوکولس انڈ (Cocculus Ind): گاڑی میں سواری کرتے ہوئے، جھولنے کے باعث۔ تھیرائیڈین (Theridion): سفر کی تکلیفات، اعصابی عورتوں کے لئے جو بحری جہاز کی حرکت سے بچنے کے لئے آنکھیں بند کر لیتی ہیں۔

پلساتیلہ (Pulsatilla): عرش پر کھلی ہوا میں بہتری ہوتی ہے لیکن مریض پیسے ہی کرے میں داخل ہوتا ہے۔ سفر کی تکلیفات لاحق ہو جاتی ہیں۔ مریض مزاجاً خوش باش ہوتا ہے لیکن جلد ہی آنسو بہانے لگتا ہے۔ بے چینی ہوتی ہے۔

بوریکس (Borax): متلی اور قے، اس نمایاں ترین علامت کے ساتھ "بچے کی جانب حرکت سے خوف کھاتا ہے" جہاز یا گاڑی کی نیچے کی جانب حرکت متلی اور قے کا باعث بنتی ہے۔

برائی اونیا (Bryonia): جب مریض خاموش لیٹنے سے بہتری محسوس کرے۔ ہر قسم کی غلغلہ اندازی حتیٰ کہ دوا کا پیش کرنا بھی اس کی تکلیف کو بڑھا دیتا ہے۔

کافیا (Coffea): درد سر کے ساتھ ہیٹ میں تکلیف (متلی وغیرہ) جاری رہتی ہے۔ مسلسل قے کا رجحان خلق میں محسوس ہوتا ہے۔ درد شقیقہ کے شدید حملوں کے ساتھ ہمیشہ قے ہوتی

احساسات۔ (Sensations)

کاربو انیمالس (Carbo Animalis): تمام اعضاء کا ڈھیلا پڑ جانے کا احساس۔ آنکھیں اپنے غلوں میں اور دماغ سر میں ڈھیلا محسوس ہوتا ہے۔

امونیا میور (Amm. Mur): کانڈھوں کے درمیان کمر میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔

ڈسٹنی (Daphna): یہ احساس کہ جسم کا کوئی حصہ بازو اور ٹانگوں سے الگ ہو رہا ہے۔

سپیا (Sepia): اسحائے مستقیم میں سیب یا آلو کی طرح کا گیند ہونے کا احساس۔ اس علامت کے ساتھ اسہال اور قبض کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ آنکھوں میں ریت ہونے کا احساس۔

کروکس (Crocus): کوئی زندہ چیز بیٹ یا چھاتی میں حرکت کرتی ہونے کا احساس اشد جسم کی جنبش کی حرکت کے لئے اور اسی طرح سے تصوراتی حمل والے کیسوں میں یہ دوا دی جاتی ہے۔

سکیل کار (Secale Cor): جلن کا احساس ہوتا ہے جیسا کہ چنگاریاں اڑ رہی ہوں یا جلتا ہوا کوئلہ متاثرہ حصوں پر گرے جو کہ چھونے سے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ ڈھانپنے کو مریض برداشت نہیں کر سکتا۔

میزریم (Mazenum): یہ احساس کہ جیسے دانت بہت لمبے ہوں۔

مرکوریس پیرینس (Mercurialis Perennis): دوناگ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔

مایریکا سیرنٹرا (Myrica Centera): نچوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے حشرات الارض چرے پر رینگ رہے ہوں۔

لوبیلیا انفلیٹا (Lobelia Inflata): یہ احساس کہ حلق میں ہڈی موجود ہے۔

لیٹیم ٹگرینم (Lium Tigrum): کندھے سے نیچے کی جانب کھینچاؤ۔ یہ احساس کہ جیسے گریں لگا کر پاندھ دیا گیا ہو۔

لیپٹانڈرا (Leptandra): یہ احساس کہ جیسے کوئی چیز اسحائے مستقیم سے خارج ہو رہی ہو۔

لاروسیراس (Laurocerasus): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے نکھیاں اور نکھڑیاں جسم پر رینگ رہی ہوں۔

کیپسکیم (Capsicum): جلن کا احساس ہوتا ہے جیسے کہ مریضیں چھڑک دی گئی ہوں۔

آرسنک البم (Ars. Alb): جلن کا احساس جس میں گرمی سے اتفاق ہوتا ہے۔

سلفر (Sulphur): کسی بھی حصہ میں جلن کے احساس کے لئے یہ چوٹی کی دوا ہے۔ سر کے

گرد کس کر پٹی بندھی ہونے کا احساس۔ حلق میں باہوں کا کچھا ہونے کا احساس۔ چھاتی میں برف کا ڈھیلا ہونے کا احساس۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے چوہا بازوؤں اور چھاتی پر دوڑ رہا ہو۔

فاسفورس (Phosphorus): جلن کا احساس۔

بوریکس (Borax): ککڑی، کھٹل یا کیزوں کے چرے پر ریگنے کا احساس ہوتا ہے۔

چیلڈونیم (Chelidonium): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے پر چل رہی ہو۔ ہوا کی ٹاپوں میں گرد کا احساس ہوتا ہے جس کے باعث کھانسی ہوتی ہے۔

ڈلکامارا (Dulcamara): ڈوبنے کا احساس۔

اگنیٹیا (Ignatia): غلغلہ پن کا احساس۔

ٹیربینٹینا (Terebinthina): یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس نے ایک چھوٹا گیند گل لیا ہو جو کہ محلے کے گڑھے میں رہ گیا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے جیسے آنتیں ریڑھ کی طرف کھینچی جا رہی ہوں۔

ٹیوبرکولینم (Tuberculinum): ریڑھ پر گیلے کیزوں کا تکلیف دہ احساس۔

تھوجا (Thuja): یہ احساس ہوتا ہے جیسے دماغ میں کیل گاڑ دیئے گئے ہوں۔ یہ احساس کہ جیسے ابلتا ہوا میہ اگلے مستقیم سے گزر رہا ہو۔ یہ احساس کہ جیسے پاخانے کے دوران مقعد کے ٹکڑے اڑ جائیں گے۔ یہ احساس کہ جیسے ٹانگیں ٹکڑی کی بنی ہوں۔ یہ احساس کہ جیسے بدن شیشے کا بنا ہو اور ٹوٹ جائے گا۔ یہ احساس کہ جیسے کوئی زندہ چیز جسم کی اندرونی جانب اچھل کود کر رہی ہو۔

تھیرائیڈین (Theridion): یہ احساس کہ جیسے کوئی زندہ چیز جسم کی اندرونی جانب اچھل کود کر رہی ہو۔ تھوجا کے ٹکڑے ہو جانے کے بعد اسے آزلیا جاسکتا ہے۔

کیمومیل (Chamomilla): یہ احساس کہ جیسے مریض ٹانگوں کی ہڈیوں کے سروں پر چل رہا ہو اور اس کے پاؤں نہ ہوں۔

گرافائٹس (Graphites): چہرے پر ککڑی ہونے کا احساس۔ مریض اسے اتار پھینکنے کے لئے جھانڑنے کی سخت کوشش کرتا ہے۔

کیمفر (Camphor): کیزے اٹارنے کی خواہش کے ساتھ جسم کی سطح پر بہت زیادہ ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ جسم ڈھانچنے کی خواہش کے ساتھ بہت زیادہ گرمی یا ٹھنڈک آتا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے ٹھنڈی ہوا جسم کے چھپے ہوئے حصوں پر چل رہی ہو۔

ایلین تھمس (Allanthus): چوہا ٹانگوں پر اوپر کی جانب دوڑنے کا احساس۔ سر سے ٹانگوں اور بازوؤں کی جانب بجلی کی رو دوڑنے کا احساس ہوتا ہے۔

کروٹیلس سی (Crotalus C): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی زندہ چیز سر میں دائرے کی صورت میں چل رہی ہو۔ کھوپڑی میں سرخ گرم لوہے کا احساس ہوتا ہے۔ پیٹ ایک جگہ سے کھلا ہونے کا احساس ہوتا ہے جہاں سے ہوا گزر رہی ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد معدہ میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے دل پانی میں ڈوبا گیا ہو یا جیسے پھاتی میں پانی موجود ہو۔ دایاں پاؤں یا بازو چھوٹا ہونے کا احساس۔

پائروجن (Pyrogen): سر پر ایک ٹوپی ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے مریض کا سر ایک ٹکٹے پر رکھا ہے لیکن باقی ماندہ جسم کہاں ہے وہ نہیں جانتی۔

نائٹریک ایسڈ (Nitric Acid): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے سر کھوپڑی کے اوپر سے ایک کان سے دوسرے کان تک کسی ٹکٹے میں جکڑا ہوا ہو۔ حلق میں مچھلی کے کانٹوں کی طرح سے ٹکٹے پھینے ہونے کا احساس۔

اکونائٹ این (Aconite N): یہ احساس کہ چہرہ لہائی میں نشوونما پا رہا ہے۔
 ایومینا (Alumina): بازوؤں اور ٹانگوں اور جسم کے ٹیوں میں بندھے ہونے کا احساس۔ حلق میں مچھلی کے کانٹے کا احساس۔ مریض جیسے ہی غذا کا لقمہ لگتا ہے تو ہر مرتبہ خوراک کی ٹالی کے معدے کی جانب نیچے کو کھینچنے کا احساس ہوتا ہے۔ کمر اور ٹانگوں پر چھوٹیوں کے رینگنے کا احساس ہوتا ہے۔ چہرے پر ٹکڑی یا انڈے کی خشک سفیدی یا خشک خون کے طے ہونے کا احساس۔

اکٹیاریس (Actea Race): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے ایک سیاہ بادل مریض کے اوپر چھایا ہوا ہو اور مریض کا سر لٹکانے کی طرح اس بادل میں پھنسا ہوا ہو جس سے ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے اور پریشانی ہوتی ہے۔ یہ سر پر سیسے کی طرح سے بھاری محسوس ہوتا ہے۔ دماغ میں لہروں کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے گردن سے کھوپڑی تک سچ کس دیا گیا ہو۔

سس ٹس کین (Cistus Can): جسم کے تمام حصوں میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے مثلاً معدہ، حلق، چھاتی، انگلیوں کے پور وغیرہ میں۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے کہ لینے پر پریشانی اور حلق میں دقت کے ساتھ پورے جسم میں چھوٹیاں دوڑ رہی ہوں۔ مریض اٹھنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور کھڑکیاں کھولنی پڑتی ہیں، تازہ ہوا کے لئے جس سے اتفاق ہوتا ہے۔ لیٹ جانے پر فوری طور پر دوبارہ یہ احساس لوٹ آتا ہے۔

کوکولس (Cocculus): کمزوری، کھوکھلے پن اور سر میں کچھ نہ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔
 گلوٹائین (Glonoine): یہ احساس کہ جیسے ٹھوڑی ٹکٹے تک لمبی ہو گئی ہو۔

کالی پائیکریم (Kali Bich): یہ احساس کہ جیسے سر اور ناک پھٹ جائیں گے۔ یہ احساس کہ

جیسے ڈھلی ہڈیاں ٹاک میں ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھا گئی ہوں۔ یہ احساس کہ جیسے ٹاک کے نقتوں میں بہت اوپر ایک ہال ہو۔ یہ احساس کہ جیسے زبان کے پیچھے ایک ہال ہو۔ پیشاب کا ایک قطرہ پیشاب کی ٹالی میں رہ جانے کا احساس ہوتا ہے۔ لیٹنے پر دم گھٹنے کا احساس ہوتا ہے۔ کاربونیم سلف (Carbonium Sulph) قریب ہی ایک گڑھا یا سوراخ ہونے کا احساس جس میں گر جانے کا خطرہ ہو۔ دونوں کندھوں کی ہڈیوں کے درمیان وزن ہوتا ہے جو مریض کو آگے کی جانب جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔

کالی کارب (Kali Carb) معدہ میں کوئی کھونہ، صدمہ یا بری خبر محسوس ہوتی ہے۔ حلق میں مچھلی کا کٹنا یا لکڑی کی پچر ہونے کا احساس۔ دوپہر کے وقت شدید جائے کا احساس ہوتا ہے۔

لکسیس (Lachesis) حلق میں مچھلی کی ہڈی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس کہ جلد پر ایک جوں رنگ رہی ہے۔ گرمی سے اتھری ہوتی ہے نیز حرکت سے اور رات کے وقت اتھری ہوتی ہے۔

میڈورینیم (Medorrhinum) یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے ایک کیزا دائیں کان میں رنگ رہا ہو اور سماعت کی ٹالی کی اندرونی دیوار میں سوراخ کرنے کا آغاز کر رہا ہو۔ معدہ کے گڑھے میں کٹھ یا پن زور لگا رہی ہو جس سے مریض صبح مار کر اٹھ جاتی ہے اور جھک کر دوہری ہو جاتی ہے۔ ہمیں ہر جانب سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ آنکھ کے پچھلوں کے نیچے ریت کا احساس ہوتا ہے۔

مرکیورس (Mercurius) حلق میں سیب کے گودے کے چپک جانے کا احساس ہوتا ہے۔

اوپیم (Opium) کسی بھی مرض میں غیر موجودگی کا احساس اس دوا کی نشاندہی کرتا ہے۔

کوکس کیکٹائی (Coccus Cacti) حلق میں ہال کی موجودگی کا احساس۔

اونوس موڈ (Onosmod) یہ احساس کہ جیسے روٹی پر پل رہا ہو۔

ورہٹرم ایلیم (Veratrum Alb) یہ احساس کہ جیسے جو پانی اس نے پیا ہے وہ نیچے خوراک

والی ٹالی میں نہیں گیل۔ کھوپڑی میں ٹھنڈا کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے ٹھنڈا

پانی دریدوں میں دوڑ رہا ہو۔ حاملہ ہونے کا احساس۔ یہ احساس کہ وہ کسی جرم کا مرتکب ہو چکا

ہے۔ جیسے اس نے پودہ کھایا ہو۔ منہ اور حلق میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ یہ احساس کہ جیسے کوئی

زندہ چیز معدہ سے حلق کی جانب چڑھ رہی ہو۔ یہ احساس کہ جیسے آتشیں چاقوؤں سے کاٹی جا

رہی ہوں۔ یہ احساس کہ جیسے پیٹ میں اور اعصاب مستقیم میں گرم کوئلے ہوں۔

ایسڈ فاس (Acid Phos) یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے جب تک وہ کھڑا رہتا ہے اس کے

پاؤں بندہ ہوتے رہتے ہیں۔

وہلریاٹ (Valeriana): یہ احساس کہ جیسے ایک دھماکہ حلق میں نیچے کی جانب لٹک رہا ہو۔

نیتروم میور (Natrurn Mur): یہ احساس کہ جیسے ایک دھماکہ زبان پر لٹک رہا ہو۔

زانٹھوکسی لم (Xanthoxylum): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے کھلی کے ہلکے جھٹکے اس کے سارے جسم میں سے گزر رہے ہوں۔

پالادیئم (Palladium): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جانور بیت کی اندرونی جانب چھوٹے چھوٹے حصوں کو چیر پھاڑ رہا ہو۔ کمر، باندوں، پیٹ، رانوں اور گتھوں پر پھوٹوں کے چلنے کا احساس ہوتا ہے۔ پھوٹوں کے کانٹے کی طرح کے حقیقی خشکیت بہت سی جگہوں پر ظاہر ہوتے ہیں مثلاً ہونٹوں پر اور گتھوں وغیرہ پر۔ اس میں شدید خارش ہوتی ہے۔

پٹریولیم (Patroleum): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے دل ٹھنڈا ہو گیا ہو۔ ٹھنڈک چھوٹے چھوٹے حصوں میں ہوتی ہے۔

پلاٹینم (Platinum): یہ احساس ہوتا ہے جیسے رانیں سختی سے لیٹ دی گئی ہوں۔ ماتھے پر پانی کا احساس ہوتا ہے۔ ٹھنڈک کا اور ریگنے کا احساس ہوتا ہے۔ ٹانگوں میں سن ہو جانے کا احساس ہوتا ہے۔ پیٹ کے اندر کی جانب سمجھنے کا احساس ہوتا ہے۔

پٹیلیا ٹی (Ptella T): دماغ میں کیل گارنے کا احساس ہوتا ہے۔

راننکولس بی (Ranunculus B): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے کمرے سے باہر نکلنے پر گھبراہٹ یا جسم پر لگایا گیا ہو۔

روتا (Ruta): آنکھوں میں گرمی اور آگ کا احساس ہوتا ہے۔ رینجہ کی ہڈی میں نیچے کی جانب ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔

سلیک ایسڈ (Salicylic Acid): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے پاؤں پر لینہ آ رہا ہو۔

سینی کیولا (Sanicula): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے سر ٹھنڈا ہوا ہے اور ہوا اس میں سے گزر جاتی ہے۔ دماغ کے گرد ٹھنڈے کپڑے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے کمرہ ٹھنڈے ہو گئی ہو۔ سانس کی ٹہلی میں ٹھنڈے وقت کوئی تخت ملا ہونے کا احساس ہوتا ہے۔

سلیسیا (Silicea): زبان کے اگلے حصہ پر بال پڑنے ہونے کا احساس۔

سٹیفیساگیا (Staphisagria): یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے پیٹ اور معدہ ڈھیلے ہو کر نیچے کو لٹک رہے ہوں۔

وسکم الیم (Viscum Alb): مریض کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چچ اے کرے نیچے سے نیچے رہی ہو اور اس کے فوری بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے جسم کا اوپر والا حصہ ہوا میں تھ

رہا ہو۔

الیومینا سیلیکیٹ (Alumina Silicate) : دماغ میں خیر نہیں رہیگئے گا احساس ہوتا ہے جو جسم میں نیچے کی طرف سفر کرتی ہیں اور ٹخنوں میں آکر ٹھہر جاتی ہیں۔ مریض جسم کو لپیٹ لینا چاہتی ہے لیکن سر کو ٹھنڈی ہوا میں رکھنا چاہتی ہے۔

ہیرویم سلف (Barium Sulph) : سر میں حرکت کا احساس ہوتا ہے۔ دماغ کا ڈھیلا ہونے کا احساس ہوتا ہے۔

آرمینک سلف فلیوم (Arsenic Sul Flavum) : ٹانگوں اور پاؤں کے بھاری ہونے کا احساس۔ ٹانگیں من ہو جاتی ہیں اور ان میں جھٹکے لگتے ہیں۔

پیڈی کولس (Pediculus) : یہ احساس جیسے پاؤں سے پکڑ کر اٹھایا گیا ہو۔

کالی سلف (Kali Sulph) : سر پر کسی ہوئی لوہی ہونے کا احساس۔

کیٹائلس انڈیکا (Cannabis ind) : یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے پانی کے قطرے دل سے ٹپک رہے ہوں۔

کالی بائی (Kali Bi) : دل کے قریب ٹھنک کا احساس۔

اوسمیم (Osmium) : یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے مریض نے ٹوٹے ہوئے پتھر نکل لئے ہوں۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے کمر اور کندھوں پر کینے رہے ہوں۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے سر کے گرد ایک ہاتھ ہو۔

اکوٹائٹیم (Aconitum Cam) : سینہ میں خیر تھیں کے رنگ کر پتھر لگانے کا احساس۔

کلیمنٹس (Clematis) : صبح کے وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے اس کی خیند پوری نہیں ہوئی۔

ایٹھوزا (Aethuza) : یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے معدہ کا اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا ہو۔ اس کے ساتھ چھاتی میں جلن کا احساس ہوتا ہے۔

سورینم (Psonnum) : یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے کانوں سمیت سراسر اس کا اپنا نہ ہو۔

الیومن (Alumen) : بازوؤں اور ٹانگوں کے گرد رسی یا پٹی بندھے ہوئے کا احساس خصوصاً ٹانگ کے گرد گھٹنے کے نیچے۔ چلتے وقت ٹکڑے وزن سے حساس ہوتے ہیں۔

ہیپٹیم ٹائٹ (Argentum Nit) : حلق میں ٹھکے یا مچھلی کا لٹکا ہونے کا احساس مریض ہرچہ ٹھنڈی رکھنا چاہتا ہے۔

ہیپیر سلف (Hepar Sulph) : ٹھکے وقت حلق میں ٹھکے کا احساس ہوتا ہے لیکن ہرچہ ٹائٹ کی طرح سے نہیں۔ ہیپیر سلف کے مریض گرم چیزیں پسند کرتے ہیں۔

چائنا (China): آنکھوں میں ریت کا احساس ہوتا ہے۔
 مگنیشیا میور (Magnesia Mur): یہ احساس کہ جیسے ہال کھینچے گئے ہوں۔ ہالوں کے مسامات میں دشمن ہوتی ہے۔ سر کو کس کر لپیٹنے سے بہتری ہوتی ہے۔
 نیٹرم میور (Natrium Mur): حلق میں پھللی کا کاٹنا ہونے کا احساس۔
 سلفیورک ایسڈ (Sulphuric Acid): نظر آنے والی کیکپاہٹ کے بغیر سارے جسم میں اور بازوؤں اور ٹانگوں میں تھر تھراہٹ کا احساس ہوتا ہے۔
 ایبروٹانم (Abrotanum): یہ احساس ہوتا ہے جیسے معدہ ٹکا ہوا ہو یا پانی میں تیر رہا ہو۔
 ایلیم سٹی وا (Allium Sat): زبان پر ہال ہونے کا احساس۔ پڑھتے وقت بہتری ہوتی ہے۔
 مگنیشیا کارب (Mag. Carb): دانت بہت لمبے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔

صدماٹ (Shocks)

اکونائٹ این (Aconite N): خوف کے باعث ذہنی صدمہ پیدا ہو۔ لپٹے ہونے کی حالت سے اٹھنے پر سرخ چہرہ مردے کی طرح پٹا پڑ جاتا ہے اور مریض دوبارہ اٹھنے سے ڈرتا ہے۔
 کرتے سے یا چوٹ لگنے سے پکڑ آتے ہیں۔
 اونیوم (Opium): تصوراتی خوف جیسے بھوتوں وغیرہ کا خوف ہو، کے باعث ذہنی صدمات۔
 جنگلی جانوروں وغیرہ کے خوف کے باعث صدمات۔
 آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): دماغی چوٹ لگنے کے باعث بصارت اور سماعت کو جاتی ہے۔ بے ہوشی ہوتی ہے۔ چوٹ لگنے کے باعث بے ہوشی لاحق ہو۔
 کیمفر (Camphor): زخم کے باعث صدمہ، بازو اور ٹانگیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ زبان کیکپاتی ہے نیز ہاتھ اور پاؤں کیکپاتے ہیں۔ اعتدال سے بڑھی ہوئی کمزوری، ٹھانہ اور تھکاوٹ ہوتی ہے۔ پھوٹنے سے بے حس ہوتی ہے۔
 اگنیشیا (Ignatia): خاندان میں اموات یا دیگر اسی قسم کے واقعات کے باعث ذہنی صدمات لاحق ہوتے ہیں جن کے باعث ذہنی دباؤ اور پرے محسوسات ہوتے ہیں۔
 کنٹھرس (Cantharis): آگ سے جلنے یا گرم مائعات وغیرہ سے جلنے کے باعث صدمات لاحق ہوں تو یہ 2x ذاتی لیوشن کی صورت میں دیکھئے اور مدد انگلی پانی میں ملا کر جٹے ہوئے جھے پر لگائیے۔
 کاربووج (Carbo Veg): پگھلا کئے جانے کی بہت زیادہ خواہش کے ساتھ سانس، حلق، منہ، دانت، بازو اور ٹانگیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔

چائے آف (China off): خون ضائع ہو جانے کے باعث مریض قریب المرگ ہو جائے۔
 ڈھانچے جانے کی خواہش کے ساتھ کالوں میں گھینٹاں بھتی ہیں۔
 ہائپرکیم (Hypericum): ذہنی صدمات جو ذہنی دباؤ کے نتیجے میں لاحق ہوں۔ مریض مسکراتا
 نہیں ہے اور ہرگز بات کرنا نہیں چاہتا۔ غذا اس کے لئے کوئی کشش نہیں رکھتی۔ زندگی میں
 کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ یہ صدمات علیحدگی (طلاق وغیرہ) محبت میں ٹانگہ یا اور کسی نامعلوم وجہ
 کے باعث ہو سکتے ہیں۔ زخم کے باعث ذہنی صدمات اعصابیت 'من ہو جانا اور کپکپاہٹ کا باعث
 بنتے ہیں۔

صدمات (جراحت کے باعث)

Shocks (Surgical, Post-Operation Ailments)

فاسفورس (Phosphorus): پیٹ کے آپریشن (عمل جراحی) سے ایک دن پہلے مٹکی اور
 آپریشن کے بعد کی دیگر تکالیف سے بچنے کے لئے اس دوا کی اونچی طاقت کی ایک خوراک دینی
 چاہئے۔ اعصابی مریضوں میں کسی عضو کے کاٹنے میں جبکہ آپریشن سے پہلے یا بعد اعتدال سے
 زیادہ خون بکے تو اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ یہ کلوروفارم کے اثرات کو زائل کر دیتی ہے
 اور آپریشن کے بعد قے کو روکتی ہے۔ دانت لگانے کے بعد پینے والے خون میں یہ دوا مفید
 ہے۔

آرنیکا مونٹ (Arnica Mont): جراحت کے صدمات کے لئے یہ دوا بھی استعمال کی جاتی
 ہے۔ عمل جراحی سے پہلے یا بعد دی جاسکتی ہے۔ عمل جراحی کے فوری بعد دینے سے یہ دوا
 صدمات پر قابو پالے گی اور دکھن کو روک دے گی۔ یہ سر کے زخموں میں درد سر کو رفع کرتی
 ہے۔ عمل جراحی کے بعد مثانے کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔

اکونائٹ این (Aconite N): نیچ پر عمل جراحی میں جو کہ بہت حساس ہوتی ہے 'یہ دوا دینی
 چاہئے۔ مثلاً آنکھ یا پیشاب کی ٹالی وغیرہ کی عمل جراحی میں۔ یہ آرنیکا مونٹ کی نسبت بہتر نتائج
 فراہم کرے گی۔ جبکہ آرنیکا مونٹ بڑے بڑے آپریشنوں میں دی جاتی ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): دکھن 'بے چینی اور دیگر عمل جراحی کے بعد لاحق ہونے والی
 تکالیف کو رفع کرنے میں یہ ایک نمایاں دوا ہے۔ ایسے عمل جراحی میں جو جیت کے دائیں جانب
 کے نچلے چوتھائی حصہ سے متعلق ہو۔

پلساٹیل (Pulsatilla): جب مریض اپنے ہاتھ سر سے اوپر کئے لیٹا ہو۔ ہوا کا خواہاں رہتا ہو
 اور متواتر کلی کرنا چاہتا ہو تو ایسے میں اس دوا کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

نکس و امیکا (Nux Vom): عمل جراحی کے بعد تے کو رفع کرتی ہے جبکہ اس کے ساتھ بہت زیادہ ابکائیاں آتی ہیں۔ مریض میں چڑچڑاہٹ ہوتا ہے۔

اٹلیس سیمپا (Allium Cepa): کٹے ہوئے بازو یا ٹانگ کے ٹنڈ میں اعصابی درد ہوتے ہیں۔ درد دھانگے کی طرح باریک اور گولی لگتے جیسے مزاج کے ہوتے ہیں۔

امونیا میور (Ammonia Mur): پاؤں کے کانٹے کے بعد پھاڑنے والے اور سونیاں چبھنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ رات کے وقت بستر میں اتھری ہوتی ہے اور مالش سے بہتری ہوتی ہے۔

ہائپرکیم (Hypericum): کسی انگلی کے کاٹ دینے کے باعث تیز گولی لگنے جیسے درد ہوتے ہیں جب کہ انگلی کسی حادثے کے باعث اوپر سے کٹ جائے یا پھلی جائے۔ درد ناقابل برداشت ہوتے ہیں اور زخم لگنے پر ہونے والے دردوں سے تناسب میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔

سٹیفنی سگریا (Staphisagria): جب عمل جراحی کے بعد لمبے عرصہ تک چاقو سے کانٹے جیسے درد کا احساس متواتر ہو تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ عمل جراحی کے بعد درد اور تکلیف بڑی تیزی سے اس دوا کی ایک خوراک کے ذریعے رک جاتی ہے۔ پیشاب کی ٹالی کے پھیل جانے کے بعد یا تن جانے کے بعد درد ہوتا ہے۔ عمل جراحی کے بعد زخم غیر صحت مند دکھائی دیتا ہے۔

وریرٹرم البم (Veratrum Alb): عمل جراحی کے بعد غنڈے پسینے جسم کے ٹھنڈا ہونے خصوصاً بازوؤں اور پاؤں کے ٹھنڈا ہونے، چہرہ پیلا پڑ جانے، چہرے کے خدو خال بگڑ جانے، بے چینی، تشنگی، دردوں کے ساتھ بہت زیادہ تھکات ہوتی ہے۔

کیمفر (Camphor): یہ دوا وریرٹرم البم کی نسبت زیادہ سنجیدہ کیسوں پر قابو پاتی ہے۔ صدر زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ سانس ٹھنڈی ہوتی ہے۔ نبض نرم لیکن تیز ہوتی ہے۔ زبان اور ہونٹ کپکپاتے ہیں۔ بہت آہستہ آہستہ آتا ہے اور چمکدار ہوتا ہے۔

کاربو ویتج (Carbo Veg): قریب المرگ حالت کے لئے جو کہ زیادہ شدید اور مایوس کن مزاج کی ہوتی ہے۔ بے ہوشی ایسی ہوتی ہے جو کہ محرکات سے ختم نہیں ہوتی۔ نبض بدقت محسوس کی جاسکتی ہے اور سانس کھڑکھڑاہٹ والا ہوتا ہے۔

سٹرانسیم کارب (Strontium Carb): عملی جراحی کے بعد والے صدمات۔ آپریشن کے بعد بہت زیادہ خون رستا ہے اور ٹھنڈک اور پھینک ہوتا ہے۔

اوپیم، ہیپلی بورس (Opium, Eleborus): مسلسل رہنے والی بے ہوشی کے لئے یہ ادویات دی جاتی ہیں۔ اگر اوپیم ناکام ہو جائے تو ہیپلی بورس آزمائیں۔

پائرودیمینیم (Pyrogenium): عمل جراحی کے بعد کسی کیفیت کے لئے یہ دوا دی جاتی ہے۔

جوتے کا کاٹنا — (Shoe-Bites)

(دیکھئے "کاٹنا" کے ذیل میں)

کو تاہ قامتی — (Short Stature)

ٹوبریکولینم، برشا کارپ، تھوچا (Tuberculinum, Baryta Carb, Thuja) : 200
ڈاکٹر لیون کی صورت میں یہ ادویات ہر چھتے بدل بدل کر چھ ماہ تک یا زیادہ عرصہ کے لئے دی
جانی چاہئیں۔ تھ کے پوسنے کی توقع صرف دس سے سترہ سال کی عمروں کے درمیان رکھی جاسکتی
ہے۔ جتنی کم عمر میں دوا دی جائے گی اتنے بہتر نتائج ظاہر ہوں گے۔

بو — (Smell)

بووشا (Bovista) : بظلوں کے نیچے بو ہوتی ہے۔
نکس موسکاٹا (Nux Mosch) : بازوؤں کے نیچے بدبو ہوتی ہے اور عورتوں کے پستانوں کے
درمیان بدبو ہوتی ہے۔

خواب خرابی — (Somnambulism)

ارنی میزیا ولگ (Artemisia Vulg) : مریض سوتے میں چلتا ہے یا کوئی دوسرا کام کرتا ہے۔
نیرم میور (Natrium Mur) : سوتے میں مریض اٹھتا ہے اور کمرے میں ادھر ادھر بیٹھتا
ہے۔
اگنیٹیا (Ignatia) : مریض گلی میں سے گزرنے والی ہر چیز کو دیکھتا ہے لیکن جاننے پر بھول جاتا
ہے۔ دماغ کی اندرونی کیفیت کی صاف طور پر وضاحت کرتا ہے (عزت نفس کے مجروح ہو جانے
کے اثرات)۔

غنودگی — (Somnolence)

ہیلی بوریس (Helleborus) : شعور کو نقصان پہنچانے بغیر کوئی چیز دیکھی یا سنی نہیں جاتی۔ ہر
چیز اپنا ذائقہ کھودیتی ہے۔

ریڑھ کی ہڈی سے کسی چیز کا خروج — (Spina Bifida)

(ریڑھ کی ہڈی کے اجزاء کا خروج، ریڑھ کی ہڈی کی چھلی دار رسولی کی صورت میں ہوتا ہے)

ٹوبریکولینم (Tuberculinum): علاج اسی دوا سے شروع کرنا چاہئے۔ 200 طاقت کی ایک خوراک دیجئے۔

سیلیشا (Silicea): ٹوبریکولینم 200 دینے کے ایک ہفتہ بعد 200 طاقت کی اس دوا کی ایک خوراک دیجئے۔

آرسنک آئیوڈ (Arsenic iod): سیلیشا 200 دینے کے تین دن بعد یہ دوا چدرہ روز تک روزانہ تین مرتبہ دیجئے۔ آرسنک آئیوڈ کے بعد سیلیشا 200 دوبارہ دینی چاہئے۔ ٹوبریکولینم 200 صرف دو ماہ میں ایک مرتبہ دہرائی چاہئے۔

کلکیریا کارب (Calcarea Carb): جب آرسنک آئیوڈ پراثر ثابت نہ ہو تو یہ دوا آزمائی چاہئے۔

ریڑھ کے مہروں کی سوزش — (Spondylitis)

کلکیریا فلور (Calcarea Flour): گردن کے غدد اور نیچ سخت ہوں۔ ٹیٹیم کا جھکا ہوتا ہے۔ پتھر ملی سخت ہوتی ہے۔ ریڑھ کے جوڑوں کے درمیان سوجن ہوتی ہے۔ پتھر آتے ہیں۔ درد کمر ہوتا ہے۔ جوڑے جھٹکتے ہیں۔ مریض لمبھٹ سے اور مرطوب موسم سے حساس ہوتا ہے۔ آرام کرنے کے دوران بہتری ہوتی ہے۔ گرمی سے علامات میں کمی ہوتی ہے۔

نیپالیم (Gnaphalium): سر پکراتا ہے خصوصاً اٹھنے پر۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں درد کے ساتھ اولتی بدلتی ہوئی سن ہو جانے کی کیفیت ہوتی ہے۔ ٹانگ کے اگلے عصب میں تیز کانٹے والا درد ہوتا ہے۔ رانوں میں پھاڑنے والا درد ہوتا ہے، عرق انشاء والے عصب میں۔ لیٹنے سے علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیٹنے سے افادہ ہوتا ہے۔

میڈورینم (Medorrhinum): جھٹکنے پر پتھر آتے ہیں۔ گردن اکڑی ہوتی ہے۔ گردن کے عضلات میں تشنجی دورے ہوتے ہیں۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں سن ہو جانے کی کیفیت ہوتی ہے۔ گردن کی ہڈی میں جلن دار درد، بھاری پن اور دباؤ ہوتا ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں میں جلن ہوتی ہے۔ اعصاب تھر تھراتے ہیں اور ان میں جھنجھناہٹ ہوتی ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں استقامتی سوجن ہوتی ہے۔ درد ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ اذیت ناک اعصابی درد ہوتا ہے۔ صبح کی روشنی سے سورج کے غروب ہونے تک بہتری ہوتی ہے۔ ساحل سمندر پر بہتری ہوتی ہے۔ معدے کے بل لیٹنے سے بہتری ہوتی ہے۔

روڈوڈنڈرون (Rhododendron): گردن کی گدی کے عضلات میں تھکاؤ اور کھنچاؤ ہوتا ہے۔ گردن اکڑ جاتی ہے۔ گدی میں سختی ہوتی ہے۔ کانڈھوں اور کمر میں پھٹن ہوتی ہے۔

بازوؤں اور انگلیوں کے پوروں میں جھنجھناہٹ اور بھاری پن ہوتا ہے جیسے کہ ان میں دوران خون نہ ہو۔

لیڈم (Leadum): کندھوں میں ہاتھوں اور بازوؤں میں اٹھنے پر یا بازوؤں کو حرکت دینے پر پھاڑنے والا درد ہوتا ہے۔ ہاتھوں میں ڈنگ لگتے ہیں۔ بازوؤں میں کھینچ اور پھین ہوتی ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں میں سن ہو جانے کا اور بے حس کا احساس ہوتا ہے۔

فلورک الیسڈ (Fluoric Acid): گردن کی گدی میں آکڑن اور درد ہوتا ہے۔ انگلیوں میں جیسے والا درد ہوتا ہے۔ لکھنے میں دقت ہوتی ہے۔ کولے کی ہڈیوں میں اور پاؤں کے تلوے کے نیچے ٹانگے سے لگتے ہیں۔ ٹانگیں سو جاتی ہیں۔ یہ دوا گرہوں اور دیگر ہڈیوں کی غیر معمولی نشوونما کو نرم کرتی ہے اور تحلیل کرتی ہے یا جذب کرتی ہے۔

کاسٹیکم (Causticum): گردن کے عضلات کی سوجن۔ گردن کی گدی میں قفاؤ اور اکڑاؤ ہوتا ہے۔ کندھے کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ بازوؤں اور ہاتھوں میں کھنچاؤ اور درد ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ میں قافی کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔

کالوفاسم (Caulophyllum): گردن کی گدی کا اکڑاؤ سر کو حرکت دینے والے پٹھے میں کھنچاؤ ہوتا ہے چنانچہ سر بائیں جانب کھینچ جاتا ہے۔ انگلیاں بہت کھینچی ہوئی اور اکڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہاتھ بند کرنے سے کانٹے والا درد ہوتا ہے۔

اکٹیسایاکی کاٹا (Actea Spicata): بازوؤں میں ٹنگڑاہٹ کا احساس ہوتا ہے خصوصاً دائیں بازو میں۔ قافی کمزوری ہوتی ہے اور ہاتھوں میں درد ہوتا ہے۔ ہتھیلیاں دباؤ سے بہت حساس ہوتی ہیں۔

موچ (Sprain) —

(بیز دیکھے "چوٹ" و "ختم")

آرنیکا ایم (Arnica M): یہ دوا عر ٹکچر کی صورت میں متاثرہ حصے پر لگائی جاسکتی ہے اور پھر اس جگہ کو سینک دیا جائے۔ اندرونی طور پر یہ دوا 1000 ذائی لیوشن کی صورت میں ہر پانچ گھنٹے کے بعد ایک خوراک دی جائے۔ جب افادہ ہونے لگے تو دوا لمبے وقفوں میں دوہرائی جائے مثلاً پہلے میں دو مرتبہ۔ موچ آئے ہوئے جوڑ پر سیاہ اور نیلے انکمار کو یہ دوا بہت تیزی سے شفا دیتی ہے۔ مریض اس بات سے خوف زدہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف بھاگ رہے ہیں۔

رشاکس (Rhus Tox): جب آرنیکا ناکام ہو جائے یا موچ کو جزوی طور پر افادہ دے تو یہ دوا استعمال کی جائے گی۔ یہ دوا بہت تھوڑے وقت میں مکمل شفا دے گی۔ 1M طاقت کی دوا دیتے۔

اگیشیا (Ignatia): کم اور بے سکون نیند کے ساتھ ذہنی مریضوں میں اس دوا کی نشاندہی کی جائے گی۔ شور برداشت نہیں ہوتا۔ پیشاب پانی کی طرح ہوتا ہے۔ کپکپاہٹ اور پھڑکن ہوتی ہے۔

روٹا جی (Ruta G): خصوصاً کلائی یا صفحے کی سوچ۔ TM ذاتی لیوٹن کی صورت میں آریکا TM کے ساتھ ہر تیسرے دن بدل بدل کر دیجئے۔ یہاں تک کہ صحت یابی ہو جائے۔

قد — (Stature)

(دیکھئے "کوئٹہ قاضی")

سختی — (Stiffness)

آرسنک سلفر فلیوم (Arsenic Sul. Flavum): زہر خورانی سے شغلیاب ہونے کے بعد تمام جوڑوں میں سختی ہوتی ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): سختی جس میں بہتری حرکت سے اور اتھری آرام سے ہوتی ہے۔
انٹیم ٹارٹ (Antim Tart): گردن کی سختی گردن باہر کو پھیلی ہوتی ہے۔ سر پیچے کو جھکا ہوتا ہے۔

اکونائٹ این (Aconite N): اکڑی ہوئی گردن جو ہوا گھٹنے یا جاڑا گھٹنے کے باعث ہو جس کے ساتھ درد بھی ہوتا ہے۔ گردن کو حرکت دینے سے اتھری ہوتی ہے۔ درد گردن سے کندھوں تک پھیل جاتا ہے۔

کالچیکم (Colchicum): فالج اور درد کے ساتھ سختی ہوتی ہے۔
روڈوڈنڈرون (Rhodohundron): ٹھنڈی خشک ہواؤں کے باعث سختی۔ طوفانی موسم کے آنے پر درد میں اتھری ہوتی ہے۔

چلیڈونیم (Chelidonium): دائیں جانب درد اور سختی ہوتی ہے۔
برائی کھونیا ایلیم (Bryonia Alb): درد کے ساتھ سختی ہوتی ہے۔ حرکت سے اتھری ہوتی ہے۔

چوسنا — (Sucking)

نیٹرم میور (Natrur Mur): بچی اپنا انگوٹھا چوستی ہے اور اپنے ٹانگوں کو کالتی ہے۔ TM ذاتی لیوٹن کی صورت میں ہر ہفتے دوا دیجئے۔ کیڑوں پرندوں اور پھوٹے جانوروں سے خوف زدہ ہوتی ہے۔

دھوپ سے جلنا — (Sunburn)

سال (Sal): دھوپ سے جلنے کے لئے خصوصی دوا ہے۔
ٹوشہ ارمیکا پورفیس کا مرہم جلے ہوئے حصوں پر لگایا جاسکتا ہے۔
اکونائٹ (Aconite): پریشانی اور موت کے خوف کے ساتھ۔ مریض کند ذہن ہے وقوف ہوتا ہے اور بیٹھنے سے اتھری ہوتی ہے۔
جلسی میم (Gelsemium): چکر آتے ہیں۔ پلکوں کے بھاری پن کے ساتھ سر کے گرد پٹی بندھے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ کپٹی میں درد ہوتا ہے جو کان اور ناک کے پہلو تک پھیل جاتا ہے۔ ہڈیاں ہوتا ہے۔ سر ٹکٹے کے اوپر اٹھا کر رکھنا چاہتا ہے۔
اوپیم 200 (Opium 200): جب بے ہوشی اور تھکاوٹ ہو تو یہ دوا پٹاؤنا کے بعد آزمائی جائے۔

گلوٹائین (Glonoine): پیلے چہرے کے ساتھ 'آنکھیں ایک جگہ ٹھہری ہونے کے ساتھ زباں سفید' بھرپور دائرے والی نبض 'بست زیادہ لمبید آنے کے ساتھ' دماغی قے اور معدہ کے گڑھے میں ڈوبنے کے احساس کے ساتھ شدید قسم کا درد سر ہوتا ہے۔ یہ دوا شروع میں ہر پانچ منٹ کے بعد دیجئے اور پھر وقفے کو بڑھاتے جائیے۔

بیلادونا (Belladonna): چہرے میں خون بھرے ہونے اور چہرہ گرم ہونے کے ساتھ 'غنودگی اور بے ہوشی کے ساتھ درد سر ہوتا ہے۔ ڈھانپے ہوئے حصوں پر لمبید آتا ہے۔ کانوں میں سینٹیاں بجتی ہیں اور چھاتی میں کھینچ ہوتی ہے۔

نیٹرم میور (Natrium Mur): گرم موسم میں لوٹ آنے والے درد سر کے ساتھ لو ٹگنے کے مزمن اثرات۔ سورج کی گرمی سے لاغری اور درد سر ہوتا ہے۔

لیکسیس (Lackesis): جب سورج کی گرمی مریض کو غنودہ اور بے ہوش کر دے۔ گرم پانی سے بست زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔

عرق (پیشہ) — (Sweat)

(دیکھئے "لمبید")

سوجن — (Swelling)

(دیکھئے "سوزش")

گھٹنوں کے جوڑوں کی سوزش — (Synovitis)

سلیشیا (Silicea): گھٹڑے مریضوں میں جوڑوں کی پکنائی خارج ہونے کے باعث جوڑوں کی سوزش لاحق ہوتی ہے۔ ایسے مریض گرم موسم میں بھی گرم کپڑے استعمال کرتے ہیں۔ متاثرہ حصوں کو گرم کپڑوں سے لپیٹنا چاہئے ہیں خصوصاً گردن اور کندھوں میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ 200 یا 1000 ڈال کی لیوٹن کی صورت میں دوا دیجئے۔

اپیس مل (Apis Mel): گھٹنے کے جوڑ میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔ زیادہ تر بیرونی جانب اور سامنے کی طرف سفید سوجن اور جلن کے ساتھ گھٹنے میں گولی لگنے جیسا درد ہوتا ہے۔

رشاکس (Rhus Tox): گھٹنے کے جوڑ کا گنٹھیاوی درد دوران شب اور مرطوب موسم میں درد میں ابتری ہوتی ہے۔

برائی اونیا (Bryonia): گھٹنوں کے جوڑ میں پکنائی والی سوزش۔ حرکت کرنے سے سختی اور ٹانگے لگنے کا احساس ہوتا ہے۔ گھٹن اور جکڑن ہوتی ہے۔

آئیوڈم (Iodum): بہت زیادہ سوجن ہوتی ہے۔ جبکہ بدلنے والے پھاڑنے جیسے درد ہوتے ہیں۔

پلساٹیل (Pulsatilla): گھٹنے کی بغیر درد کی سوجن۔ گھٹنوں میں پھاڑنے والا جھٹکے لگنے جیسا اور گھٹنے والا درد ہوتا ہے۔ گھٹنے میں گرم سوزشی سوجن ہوتی ہے۔

سلفر (Sulphur): گھٹنوں کے جوڑوں کا استسقاء۔ گھٹنوں کے جوڑوں کی نیم حاد اور مزمن سوجن۔

کلیکیریا کارب (Calcarea Carb): گھٹنے کے جوڑ کے امراض کے لئے بنیادی دوا ہے۔

لیڈم (Ledum): گھٹنے کے جوڑوں کی زخموں والی سوزش جس سے مواد خارج ہوتا ہے۔ متاثرہ حصے حساس ہوتے ہیں۔ درد سوزشی و کھن والے اور پھاڑنے والے ہوتے ہیں۔

روٹا جی (Ruta Gi): گھٹنے کے جوڑوں کی جھلی کی سوزش۔ گھٹیلو کام کرنے والی ملازمین کے گھٹنوں کی سوزش۔

پیاس — (Thirst)

لائکوپس ورگ (Lycopus Virg): خوفناک پیاس ہوتی ہے۔ مریض بہت زیادہ مقدار میں پانی پیتا ہے۔ سرد ترین پانی کے علاوہ کسی چیز سے مطمئن نہیں ہوتا۔

الیئم سیٹی وا (Allium Sat): ایسی پیاس جو نیند کو ختم کر دے۔

سلفر (Sulphur): جب مریض بے زیادہ اور کھائے کم۔

ڈیجیٹلس (Digitalis): بھوک کے نہ رہنے کے ساتھ شدید پیاس لاحق ہو۔ جب سلفر کاسم ہو جائے تو اسے آزمایا جاسکتا ہے۔
 آرسنک البم (Arsenic Alb): چھوٹے وقفوں میں پانی کی تھوڑی مقدار کی پیاس ہوتی ہے۔ منہ خشک ہوتا ہے۔
 کلسیریا آرسنک (Calcarea Ars): ٹھنڈے پانی کی پیاس ہوتی ہے لیکن غذا کی خواہش نہیں رہتی۔
 کنٹھارس (Cantharis): حلق میں پیاس ہوتی ہے لیکن دماغ میں پانی سے نفرت ہوتی ہے۔ حلق میں جلن ہوتی ہے۔
 گواکیم (Guaicum): بہت زیادہ پیاس کے ساتھ غذا یا دودھ سے بیزاری ہوتی ہے۔

انجماد خون — (Thrombosis)

بوٹروپس لین (Bothrops Lan): انجماد خون کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ یہ انجماد خون والے اطباء کے لئے بھی مفید ہے۔
 کلسیریا آرس (Calcarea Ars): ضمنی وریدیں 'دور' میں غیر معمولی ترقی۔
 ایپس ایم (Apis M): رانوں کے جھکاؤ کے وسط میں ایک موٹی 'حساس' دسی رانوں کی اندرونی جانب پائی جاتی ہے۔
 لیکسیس (Lachesis): بلند فشار خون کے ساتھ انجماد خون کے لئے ایک دوا ہے۔
 سبل (Sumbul): کہا جاتا ہے کہ انجماد خون میں بہت مفید ہوتی ہے۔

ریل گاڑی کے سفر کی تکلیفات — (Train Sickness)

(دیکھئے "بحری سفر کی تکلیفات")

رسولیاں — (Tumors)

(نیز دیکھئے "اعضائے کامل" مستورات" کے ذیل میں "رسولیاں")
 کلسیریا فلور (Calcarea Flour): سخت قسم کے ڈھیلے اور گرہیں ہوتی ہیں۔ پتھرلی سختی والے سخت عضلات ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے پھوڑوں کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔ یہ سرطان کی نشوونما کو روکتی ہے۔ مستورات کے پستانوں میں سخت گولے ہوتے ہیں۔
 کونیم (Conium): سونیاں لگنے جیسے دردوں کے ساتھ جھٹکا والے غصہ کی شدید قسم کی سختی

جس میں رات کے وقت ابتری ہوتی ہے۔ سرطان پستانوں کی رسولیاں یا سرطان کا آغاز۔ غرودی چونوں اور خراشوں کے لئے سب سے بڑی دوا ہے۔

میگ کارب (Mag Carb): یہ جسم کی رسولیوں کا علاج کرتی ہے۔

یَرَبُّوْا (Berb Vull) : رسولوں کے لئے اور اگلاؤ وغیرہ کے لئے۔

تھوجا (Thuja): پتہ پتہ ہے اور جلد باز لوگوں میں رسولیاں ہوتی ہیں۔ قبض کے باعث اچھارہ ہو ہے۔ خالی زکار آتے ہیں۔ سورج کی گرمی برداشت نہیں ہو سکتی۔ ٹھنڈے پانی سے نہانا چاہتا ہے۔ ننگے حصوں میں پیوہ آ ہے۔

بیلنس پی (Bellis P): زخموں والے علاقہ کی رسولیاں (چٹنوں کے باعث) اگر اس کے ساتھ تکی متاثر ہو تو سیوینٹس 1x جاوے لے میں دیتے۔

ریڈیم بروم (Radium Br): یہ دوا سرطان میں عمل انگیز دوا کے طور پر آزمائی جاسکتی ہے۔
 یہ تمام مراحل میں مفید ہوتی ہے۔

لیپس ابس (Lapis Albus): یہ دوا پستانوں کے سرطان کے پہلے مرحلے کا علاج کرتی ہے۔

کھالوا (Hecla Lava) = رسولوں کے لئے سفید ہے اور درد کو روک دیتی ہے چنانچہ

میں ضروری ہو وہاں مار دیا کے۔ بیکے کی جگہ کام کرتی ہے۔ مریض مخصوص قسم کی برقی شکل والا کھائی دیتا ہے۔ زرد تھکا ہوا اور خرچ شدہ نظر آتا ہے۔

کلیئر یا کارپ (Calcareo Carb): خٹنا زبری مریضوں میں رسولیاں، یہ دوا قلعی رسولیوں

س آزمائی جلی چاہئے۔ پیپ والی رسولیاں یا ہر چوتھے ہفتے ظاہر ہونے والی رسولیاں۔ افراط
 دن والی رسولیاں جن میں خون ملا مواد شامل ہوتا ہے۔

شاکارب (Bar yta Carb): خصوصاً گردن سے متعلق رسولیاں چھلی والی رسولیاں

مخصوصاً کمر پر ہوتی ہیں۔ کمر کے عضلات میں تھکا ہوتا ہے۔

سورس (Phosphorus): کرون پر رسولیاں ہوتی ہیں۔

یاد رہے (Hydrastis): شیر اور روم کے سرطان میں مفید ہے۔ یہ دو پستانوں کے غدد عام رسولیوں میں پائے جانے والے وردوں کو روکتی ہے۔

ربو (Carb Animals): پستانوں کی رسولیوں یا سرطان یا پھوٹی گرہیں جو پھر کی

وہوتے ہیں۔

کالی سائی (Kali Cynatum): دماغ کی رسولی جس کے باعث شدید درد سر ہوتا ہے۔

نیکا ایم 200، ہائپر کیم 200 (Arnica 200, Hypnicum 200) دی گئی ترتیب کے

مطابق چھ ماہ تک یہ ادویات آزمائیں۔ صبح شام دن میں دو مرتبہ دی جائے۔
برٹا آئیوڈ (Baryta Iod): سخت رسولیاں۔

سارکوما (رسولیاں) — (Tumors-Sarcoma)

برٹا کارب (Baryta Carb): جلن ہوتی ہے خصوصاً گردن میں۔
کروٹیلس ہور (Crotalus Hor): جلن کے ساتھ مسلک قسم کی رسولیاں ہوتی ہیں۔
سٹیفی سگریا (Staphisagria): جب کلی کارب ناکام ہو جائے تو عصی رسولی کے لئے یہ دوا
دی جاتی ہے۔

حفاظتی ٹیکے (کی تکلیفات) — (Vaccination)

تھوجا (Thuja): اگر حفاظتی ٹیکوں کے ساتھ یہ دوا دی جائے تو حفاظتی ٹیکوں کے بد اثرات
ختم ہو جائیں گے۔ یہ دوا حفاظتی ٹیکوں کے بد اثرات کے لئے دی جاتی ہے مثلاً انگیزما وغیرہ کے
لئے۔

ویکسی نیم (Vaccinium): سوزش اور متاثرہ حصوں سے مواد رکنے کے ساتھ حفاظتی ٹیکوں
کے برے اثرات کے لئے دی جاتی ہے۔

انٹیم ٹارٹ (Antim Tart): جب تھوجا ناکام ہو جائے تو حفاظتی ٹیکوں کے بد اثرات کے لئے
دیتے۔

حیاتین (وٹامن) — (Vitamin)

ہومیو پیتھی کے نقطہ نظر کے مطابق وٹامن کا نظریہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وٹامن کی
گولیاں اور کیپسول جو کہ وٹامن اے، بی، سی وغیرہ پر مشتمل ہوتے ہیں، بہت سے نمکیات کی
کمی کو پورا کرنے کے لئے تجویز کئے جاتے ہیں جو کہ عام خوراک مہیا کرنے سے قاصر رہتی
ہے۔ صرف وٹامن دینے کا نظریہ ہی کافی نہیں ہے۔ ایک نظریے کے مطابق انسانی نظام کو فعال
بنانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ نظام وہ تمام وٹامن غذا سے کھینچ لیتا ہے۔
ہومیو پیتھی اس کا نظم البدل فراہم کرتی ہے۔ ہومیو پیتھی میں ایسی مناسب ادویات موجود ہیں جو
نہ صرف نمکیات کی کمی کو پورا کر دیتی ہیں بلکہ نظام کو بھی درست کر کے اس قابل بناتی ہیں کہ
وہ غذا سے ضروری وٹامن حاصل کر سکے۔ مثال کے طور پر کینیشیم کے نمکیات کی کمی ٹکیریا فاس
کے ذریعے آسانی سے دور ہو جائے گی۔ اس کی طاقت چھ سے کم نہ ہونی چاہئے۔

مے (Warts)

تھوجا (Thuja): زیادہ مقدار میں اگنے والے مے۔ سر کے پچھلی جانب مسوں کی طرح ہونے والی پھنسیاں نیز ٹھوڑی وغیرہ پر۔ چپٹے کالے مے، لمبے نیچوں والے 'توں والے' بعض اوقات ان سے رطوبت رستی رہتی ہے اور خون آسانی سے خارج ہوتا ہے۔

کالکیریا کارب (Calcarea Carb): چھوٹے سینگوں والے بہت زیادہ تعداد میں مے ہوتے ہیں جن میں خارش اور ڈنک لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ سوزش ہوتی ہے اور ناسوری کیفیت ہوتی ہے۔

سلفر (Sulphur): سخت 'نر درو' چکن والے مے ہوتے ہیں۔

نیرم میور (Natrum Mur): ہتھیلیوں پر مے ہوتے ہیں۔

کالی میور (Kali Mur): ہاتھوں پر مے ہوتے ہیں۔

سیپیا (Sepia): سر و کر (حقد) کے کنارے پر مے ہوتے ہیں۔ جسم پر لمبے 'سخت اور سیاہ مے ہوتے ہیں۔

کاسٹیکم (Causticum): نرم بنیاد والے مے ہوتے ہیں۔ جلد پر سینگوں والے مے ہوتے ہیں۔ بازوؤں اور ہاتھوں پر 'آنکھوں کے پٹوں اور چہرے پر مے ہوتے ہیں۔ کئی چھوٹے چھوٹے مے ہوتے ہیں۔

روٹا جی (Ruta G): دکھن والے درودوں کے ساتھ مے ہوتے ہیں۔ چپٹے 'ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر ہموار مے ہوتے ہیں۔

ڈلکامارا (Dulcamara): ہاتھوں کی پشت پر مے ہوتے ہیں۔

سٹیفی سیکریا (Staph): آتھک یا سوزاک والے مے 'شنگ تے والے مے' پھول گو بھی جیسے 'پارے کے غلط استعمال کے بعد۔

نائٹرک ایسڈ (Nitric Acid): مے 'آلات قاسل والے مے' سائیکوٹک یا آتھکی سے 'بڑے بڑے دانے دار مے' تے والے مے ہونے پر جلد خون بہہ نکلتا ہے۔ رطوبت رستی ہے۔ چھری لگنے جیسا درد ہوتا ہے۔

مگنیشیا سلف (Magnesia Sul): پورے چہرے پر مے ہوتے ہیں۔

سبنا (Sabina): آتھکی یا سوزاک سے جن کے ساتھ ناقابل برداشت اور جلن ہوتی ہے۔ بکثرت دانے دار مے ہوتے ہیں۔

فیریم پیکریم (Ferrum Pic): آنکھوں کی صورت میں مے 'مسوں سے ہاتھ بھر جاتے ہیں۔ یہ دوا پافراط مسوں کے لئے مخصوص ہے۔

نیزم کارب (Nat. Carb) ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر سے ہوتے ہیں۔ چھوٹے سے دھن ہے۔

سفید ٹانگ (ٹانگ کی سوزش) — (White Leg)
(دیکھئے "ملک لیگ")

جھریاں — (Wrinkles)

(نیز دیکھئے "سوکھا مسان")

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): مریض کے جسم کے اوپر والے حصہ پر جھریاں ہوتی ہیں اور مریض بیمار محسوس ہوتا ہے۔ ماتھے پر بھی جھریاں ہو سکتی ہیں۔ مریض چڑچڑا اور بیچلانی ہوتا ہے۔ مخالفت برداشت نہیں کر سکتا۔

وربٹرم البم (Veratrum Alb): جھریوں والی جلد تپتے ہوئی ہے اور پانی والے اسال ہوتے ہیں۔ چہرے کا رنگ نیلا ہٹ مائل ہوتا ہے۔ ناک ٹوک دار ہوتی ہے۔

ایبروٹانم (Abrotanum): جب پورا جسم لاغر اور جھریوں والا ہو۔ چہرہ بوڑھا دکھائی دیتا ہے۔ نوزائیدہ بچہ بوڑھا شخص معلوم ہوتا ہے۔ چہرے پر جھریاں ہوتی ہیں اور مریض بیمار دکھائی دیتا ہے۔ جلد پٹیلی ہوتی ہے اور ڈھیلی ہو کر تھوں میں لٹک جاتی ہے۔

اورم میور (Aurum Mur): آنکھ کے باعث چہرے پر جھریاں ہوتی ہیں۔ جسم لمبا اور موٹا ہوتا ہے لیکن ٹانگیں بہت پتلی ہوتی ہیں۔

ارجنٹم نائٹ (Argentum Nit): بڑھتی ہوئی لاغری خصوصاً ٹانگوں میں 'مریض مرجھایا ہوا' سوکھا ہوا اور بوڑھا دکھائی دیتا ہے۔

سینی کیولا (Sanicula): بڑھتی ہوئی کمزوری 'بچہ گندا' چمکتا اور بھورا نظر آتا ہے۔ گردن کے قریب والی جلد پر جھریاں ہوتی ہیں جو تھوں میں لٹک جاتی ہیں۔

جمائیاں — (Yawning)

اکونائٹ این (Aconite N): نیند کے بغیر متواتر جمائیاں آتی ہیں۔

لائیکوپوڈیم (Lycopodium): کھانے کے بعد جمائیاں آتی ہیں۔


نکس وامیکا (Nux Vom): کھانے کے بعد گھٹنوں جمائیاں آتی ہیں۔

اگنیشیا (Ignatia): سونے کے بعد جمائیاں آتی ہیں۔ کھاتے ہوئے جمائیاں آتی ہیں۔ اعتدال

دودھ جمائیاں آتی ہیں جیسے کہ جڑا اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔
 رشاکس (Rhus Tox): جڑا اپنی جگہ سے ہل جانے کے خدشے کے ساتھ شدید قسم کی
 جمائیاں آتی ہیں۔ نچلا جڑا سخت اور پُر درد ہوتا ہے۔
 ٹیٹرم میور (Natrium Mur): اندرونی جائزے کے ساتھ جمائیاں آتی ہیں۔
 سلفر (Sulphur): دن کے دوران ڈکاروں کے ساتھ متواتر جمائیاں آتی ہیں۔
 چیلڈونیم (Chelidonium): کھنچاؤ اور نیند آنے کے ساتھ جمائیاں آتی ہیں۔
 لیکسیس (Lachesis): بے چینی اور کمر میں درد کے ساتھ جمائیاں آتی ہیں۔
 ٹیلوریم (Tellurium): ابکائیوں کے بعد جمائیاں آتی ہیں۔ کھانے کے بعد غنودگی ہوتی ہے۔
 آئیل نائٹ (Amyl Nit): بکثرت اور بار بار جمائیاں آتی ہیں۔ کھنچاؤ گھنٹوں تک مسلسل رہتا
 ہے۔ مریض بستر پر لیٹ جائے گا اور انگڑائی لینے کے لئے مدد کے لئے بلائے گا۔
 پلمبم (Plumbum): متواتر انگڑائیاں (کھنچاؤ) اور جمائیاں آتی ہیں۔



| | |
|-----|--------------------------------|
| 180 | • آنکھیں اور بصریت |
| 189 | • آواز کا بیٹھ جانا (حالا) |
| 192 | • آواز کا بیٹھ جانا (مزمین) |
| 21 | • اہتدائی دیوانگی |
| 465 | • ایہار (فرج سے اوچے والی جگہ) |
| 297 | • ایہارہ |
| 474 | • ایہارہ (رحم) |
| 642 | • احساسات |
| 409 | • احکام |
| 78 | • اختناق الدم |
| 163 | • اخراج |
| 412 | • اخراج (برونشیت) |
| 60 | • اداسی (تمکینی) |
| 59 | • اوراک (شعور، سمجھ وغیرہ) |
| 71 | • اویوں میں اینٹھن |
| 10 | • اورنگاز توجہ |
| 462 | • استقاء |
| 290 | • استقاء (حیث میں) |
| 473 | • استقاء (رحم کا) |
| 633 | • استقاء کی سوچیں |
| 448 | • استقاء (صل) |
| 640 | • استقاء |
| 337 | • اسہال |
| 317 | • اشتیاء |
| 565 | • اضافہ (علامات میں) |
| 10 | • احتیاط کا فقدان |
| 106 | • اعصاب |
| 53 | • اعصابی تحکات |



| | |
|-----|---------------------------------|
| 547 | • آبلے |
| 209 | • آبلے اچھالے (ہوتوں کے) |
| 397 | • آنکھ |
| 137 | • آشوب چشم |
| 389 | • آنزلیٹ (چشام میں) |
| 585 | • آگ سے جلنا اور مانتات سے جلنا |
| 300 | • آنسو کی تھلیف |
| 300 | • آنشیں (رکاوٹ) |
| 151 | • آنسو |
| 150 | • آنکھ کا بیچکین |
| 146 | • آنکھ کا درد |
| 143 | • آنکھ کی پتلیوں کی سوزش |
| 145 | • آنکھ کے امراض |
| 147 | • آنکھ، ہالکی پتلیوں کا قلع |
| 140 | • آنکھ کے پتلیوں کے دانے |
| 151 | • آنکھ کے ذیلے کا باہر کو ابھار |
| 130 | • آنکھ کے پردہ خشکی کا سکڑاؤ |
| 141 | • آنکھ کے سفید روئے کا دورم |
| 139 | • آنکھ کے سیاہ حلقے کی سوزش |
| 130 | • آنکھ کے عضلات کی کمزوری |
| 142 | • آنکھ میں زخم |
| 160 | • آنکھوں سے پانی سے |
| 144 | • آنکھوں سے پانی کا اخراج |
| 133 | • آنکھوں کا بھپکنا |
| 139 | • آنکھوں کی چھپکات |
| 138 | • آنکھوں کے ذیلے |

| | | | |
|-----|--|----------|--------------------------------|
| 268 | •• انجائیکا | 630 | •• اعصابی درد چہرہ کا |
| 657 | •• انجھاد خون | 418 | •• اعصابی درد (خضیوں کا) |
| 477 | •• اندام نسائی | 231 | •• اعصابی درد (زبان کا) |
| 510 | •• اندمال زخم کے بعد کا نشان | 207 | •• اعصابی درد (مسوڑھوں کا) |
| 6 | •• اندیشہ | 75 | •• اعصابی مرض زہر میں عضلات |
| 132 | •• اندھا پن | | - یہ اختیار نہ پھڑکتے ہیں |
| 387 | •• اندی کین (پیشاب میں) | 73 | •• اعصابی نظام کے امراض |
| 549 | •• انفو کنزا | 194 | •• اعصابی --- ورم علق |
| 593 | •• انگلیوں کا ٹیڑھا ہونا | 50 | •• اعصابیت (تکیرا ہٹ) |
| 612 | •• انگلیوں کا سن ہو جانا | 431 | •• اعضائے قاسل کی غارش |
| 595 | •• انگلیوں کا پتیلی کی جانب کھینچ جانا | 394 | •• اعضائے قاسل کے امراض |
| 179 | •• اوزینا | 394 | •• اعضائے قاسل --- مشترک امراض |
| 519 | •• اپنی ذر مولائی سن | 425 | •• اعضائے قاسل میں مسرت کا |
| 404 | •• ایٹا دکیاں | | احساس |
| 187 | •• ایک کے دو نظر آنا | 22 | •• افسردگی --- کیلاؤ |
| 71 | •• اینٹن (ایبوں قلم کاروں وغیرہ میں) | 514 | •• آگزیما (کھجلی و غارش) |
| 78 | •• اینٹن (تشخی) | 459 | •• الیومن کا اخراج (دوران حمل) |
| 472 | •• اینٹن (رحم) | 571 | •• الریجی |
| 499 | •• اینٹن (عضلات) | 2 | •• آلکلی --- القولیت |
| | | 222 | •• انگ ہونا (دانت) |
| | | 28 | •• انتھن |
| | | 275 | •• امراض قلب (عمومی) |
| 383 | •• باقراط 'پیشاب آنا | 331 | •• امعائے مستقیم اور پاخانہ |
| 450 | •• باقراط حیض | 357 | •• امعائے مستقیم کا خروج |
| 68 | •• باتونی پن | 357, 639 | •• امعائے مستقیم کی رسولی |
| 388 | •• باس (پیشاب) | 356 | •• امعائے مستقیم کی سوزش |
| 140 | •• بال (کھوں کے) گرین | 358 | •• امعائے مستقیم کی کھنکھانی |
| 397 | •• بال (زیر ناف) | 356 | •• امعائے مستقیم میں درد |



| | | | |
|-----|---------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 474 | •• برہادی (رسم کی) | 541 | •• بالوں کا لگاؤ |
| 529 | •• برص | 542 | •• بالوں کا سفید ہونا، قفل از وقت |
| 632 | •• بڑے خواب | 540 | •• بالوں کا گرنا |
| 635 | •• بڑھاپا، قفل از وقت | 466 | •• بانجھ پن |
| 412 | •• بڑھ جانا (پروفٹنٹ غدود کا) | 610 | •• بکلی کے بھینٹے |
| 317 | •• بڑھی ہوئی خیریت | 328 | •• بچوں کا یرقان |
| 414 | •• بڑھی ہوئی خواہش بملع | 535 | •• بچوں کی جلد کے ایک حصہ کی تختی |
| 581 | •• بستر کے زخم | 530 | •• بچھوا بچھوت، پھینے |
| 538 | •• بسری۔۔ جلد | 467 | •• بچے ماں کا دودھ نہیں پیتے |
| 153 | •• بصارت | 641 | •• بحرئ ستر کی تکلیفات |
| 157 | •• بصارت دوہری | 549 | •• بخار۔۔ انفلوئنزا |
| 158 | •• بصارت، قریب نظر | 561 | •• بخار۔۔ ٹائیفائیڈ |
| 130 | •• بصارت میں دھندلاہٹ | 548 | •• بخار، جسم کا بہت شدید |
| 635 | •• بعد از جراحت تکلیفات | 557 | •• بخار، خسرے کا |
| 375 | •• بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جانا | 538 | •• بخار، سرخ |
| 388 | •• بلغم (پیشاب میں) | 545 | •• بخار، عام |
| 651 | •• بو | 558 | •• بخار، عضوی (خون میں زہرا) |
| 367 | •• بو اسیر | 547 | •• بخار، ٹکڑ توڑ (ڈیگلو) |
| 352 | •• بو اسیری جریان خون | 548 | •• بخار، ٹکڑ دن توڑ |
| 509 | •• بوئیاں | 551 | •• بخار۔۔ طیریا |
| 391 | •• بو (پیشاب) | 49 | •• بقل |
| 220 | •• بوسیدگی (دانتوں کی) | 349, 356 | •• بدبودار پانخانے |
| 208 | •• بوسیدگی، لگنا، مڑنا | 449 | •• بدبودار حوض |
| 183 | •• بو کا دھم | 512 | •• بد رنگ ہونا (جلد کا) |
| 183 | •• بو کی حساسیت | 513 | •• بد صورتی |
| 216 | •• بوٹنے میں وقت | 67 | •• بد نمائی (تھک و شہ) |
| 181 | •• بو، متعفن | 222 | •• بد نمائی (دانتوں کی) |
| 607 | •• بوٹا پن | 346 | •• بد چھٹی |

| | | | |
|----------|-------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 366B | • پتھری ہنگروں کی | 161 | • سوہا پن |
| 637 | • پتی | 386 | • بھورا (پیشاب) |
| 327 | • پتے کی پتھری | 305 | • بھوک بڑھی ہوئی یا پیٹوں والی |
| 325 | • پتے کی سوزش (بغیر پتھری کے) | 307 | • بھوک نہ کھ جائے |
| 499 | • پنوں کا ڈھیلا پن (جب پیٹے | 32 | • بھول جانا |
| | سکڑنے کے قابل نہ رہیں) | 62 | • بے خوابی |
| 502 | • پنوں کی سوزش ہڈی کے سینے کے | 463 | • بے خوابی (دوران حمل) |
| | عمل کے ساتھ | 693 | • بے ذول |
| 536 | • پیاس | 679 | • بے دستے |
| 382 | • پرورد پیشاب آنا | 41 | • بے رخی 'بے اعتنائی' لاپرواہی |
| 443 | • پرورد میض | 231 | • بیرونی استحصال کے لئے ازبان |
| 426 | • پرورد (جماعت) (زنانہ) | 511 | • بیرونی کچان کے باعث جلد کی حالت |
| 148 | • پرورد ٹھکی اور عصب بصارت کے | | سوزش |
| | امراض | 6 | • بے زاری |
| 137 | • پردہ ٹھکی کی علیحدگی | 460 | • بے زاری (دوران حمل) |
| 71 | • پر مزاج | 456 | • بیضہ دانیاں |
| 412 | • پروٹینٹ | 77, 124 | • بے ہوشی |
| 287 | • پرہیز (دل کے امراض) | | |
| 11 | • پریشانی | | |
| 436 | • پستان | 65 | • پاخانہ |
| 437 | • پستانوں کا بڑھ جانا | 358 | • پاخانہ کرتے وقت زور لگانا |
| 436 | • پستانوں کا گھٹ جانا | 120 | • پار کسن کے امراض |
| 579 | • پس ماندہ | 47 | • پاگل (جنون) |
| 635, 655 | • پیچہ | 463 | • پاگل پن (دوران حمل) |
| 638 | • پیٹے کا دب جانا | 99 | • پانی سے خوف |
| 407 | • پکڑنا (عضو تناسل) | 137 | • پانی کا اخراج (آنکھ سے) |
| 144 | • پگھوں کا اندر کی جانب آگنا | 321 | • پانی منہ میں بھرنا |
| 131 | • پگھوں کی سوزش | 206 | • پانی پینا |




| | | | |
|----------|-------------------------------|-----|---------------------------------|
| 629 | • پیدائشی نشانات | 135 | • بچوں کے امراض |
| 370 | • پیشاب آنا | 138 | • بچلیں |
| 378 | • پیشاب آنا متواتر | 631 | • بچہ بندی |
| 382 | • پیشاب خطا ہو جانا | 209 | • بچھٹا (ہونٹوں کا) |
| 387 | • پیشاب 'دور حیا' سفید | 152 | • بچڑکن |
| 371 | • پیشاب کرنے کی خواہش | 210 | • بچڑکن (ہونٹوں کی) |
| 389 | • پیشاب کم مقدار | 130 | • بچوڑا (آنکھ کے پردے کا) |
| 380 | • پیشاب کی بندش | 435 | • بچوڑا (ایستار کا) |
| 455 | • پیشاب (کی بندش 'دوران حمل') | 351 | • بچوڑا (ناسور) (اسوائے مستقیم) |
| 362 | • پیشاب کی جراثیمیت | 181 | • بچوڑا 'ٹانگ کی نالی کا |
| 384 | • پیشاب میں البیومن | 204 | • بچوڑے اور سوزش |
| 387 | • پیشاب میں پگھلائی | 519 | • بچوڑے پھنسیاں (جلد) |
| 379, 386 | • پیشاب میں خون | 407 | • بچوڑے پھنسیاں (عضو تناسل کی) |
| 383 | • پیشاب میں رکاوٹ | 524 | • بچوڑے پھنسیوں کا وہب جانا |
| 389 | • پیشاب میں قاسمیت | 506 | • بچوڑے (جلد) |
| 386 | • پیشاب میں کھار | 153 | • بچوڑے 'قرنیہ کے |
| 393 | • پیشاب میں پورا | 207 | • بچوڑے 'ناسوری کیفیت |
| | | 556 | • بچاس |
| | | 389 | • بچپ (پیشاب میں) |
| | | | • بچیت |
| 27 | • بچہ کن | 288 | • بچیت کا بڑھ جانا |
| 245, 561 | • بچہ وق | 297 | • بچیت کے کیزے |
| 303 | • بچہ وق (بیت) | 359 | • بیت میں محسوس ہو 'زندہ چیز |
| 420 | • بچہ وق (غصیوں کا) | 288 | • بیت ... ناسور |
| 177 | • بچہ کای | 303 | • بیت ... بچے کی جانب کنجاؤ |
| 40 | • بچہ نکات | 292 | • بچیش |
| 578 | • بچہ زباز | 344 | • بچیش 'مزمین |
| 78, 121 | • بچہ شج | 296 | • بچہ و بچے |
| 150 | • بچہ شجی بچکے | 603 | |



| | | | |
|----------|----------------------------------|----------|------------------------------------|
| 628 | • ہانگ کی ایک خاص قسم کی سوزش | 121, 358 | • تھنسی دور سے |
| 638, 661 | • ہانگ کی سوزش | 6 | • تشویش |
| 561 | • ہائیپنیز | 14 | • تشاویا ترویج |
| 472 | • نل جانا (رحم کا) | 390 | • تھجست (پیشاب) |
| 484 | • نوئی ہوئی قدیوں کی سوزش | 331 | • تکی کے امراض |
| 387 | • ٹھنڈا (پیشاب) | 282 | • ٹھنڈا (زبان کا) |
| 407 | • ٹھنڈا (عضو تناسل) | 212 | • ٹھنڈا (زبان کے نیچے والی حصی دار |
| 693 | • ٹھنڈک | | رسول) |
| 172 | • ٹھنڈ (نزل) | 58 | • ٹنگ مڑائی |
| | | 241 | • ٹنگ پھاتی |
| | | 368 | • ٹنگی (امعاء مستقیم) |
| | | 584 | • ٹنٹس |
| 499 | • جب ٹپے سکڑنے کے قابل نہ رہیں | 584 | • ٹنٹس --- تیز یا وقت کے ساتھ |
| 207 | • جزا | 461 | • ٹنٹس (دوران عمل) |
| 208 | • جزے کا بند ہو جانا | 399 | • تولیدی جراثیموں کی غیر موجودگی |
| 208 | • جزے کا گھٹا سونا | 67 | • تہات |
| 208 | • جزے کی ریشہ دار رسولی | 53, 611 | • تھکاوٹ |
| 207 | • جزے کی کوکڑاہٹ | 212 | • تھوک |
| 528 | • جذام | 217 | • تھوکانا |
| 620 | • جریان خون | 137 | • حیل (آنکھ میں ہوا) |
| 352 | • جریان خون (امعاء مستقیم) | 468 | • تھیلیاں |
| 548 | • جسم کا بہت شدید بخار | 369 | • تھیراپیا حرکت کرتا کر |
| 322 | • جگر اور تکی | 306 | • تھیراپیت |
| 322 | • جگر کے امراض | 530 | • تلل والی (جلد) |
| 46 | • جلایا | | |
| 504 | • جلد | | |
| 530 | • جلد ارتقا | | |
| 603 | • جلد پالوں اور ناخنوں کے امراض | 200 | • ٹائسلو دور کرنے کے بعد کی تکالیف |
| | • جلد --- بچوں کی جلد کے ایک حصہ | 197 | • ٹائسلو کا درم |



| | | | |
|-----|---|----------|------------------------------------|
| 586 | •• جوڑوں کی جھلیوں سے برآمدہ | 535 | کی تختی |
| | چکنائی | 538 | •• جلد۔۔۔ سسری |
| 478 | •• جوڑوں کے امراض | 530 | •• جلد۔۔۔ تیل والی |
| 626 | •• جوئیں | 525 | •• جلد۔۔۔ پٹنی |
| 35 | •• جوئے بازی | 526 | •• جلد۔۔۔ سخت |
| 601 | •• جھریاں | 611 | •• جلد کا رنگ |
| 60 | •• جھڑاؤ | 533 | •• جلد۔۔۔ گھردری |
| 386 | •• جھلیاں (پیشاب میں) | 526 | •• جلد کی وق "چہرے کی |
| 6 | •• جھنڈا ہٹ | 538 | •• جلد۔۔۔ کیل |
| |  | 518 | •• جلد۔۔۔ لاغری |
| | | 535 | •• جلد۔۔۔ منوٹی |
| 65 | •• چرانا | 535 | •• جلد۔۔۔ ناسور |
| 125 | •• چکر | 518 | •• جلد۔۔۔ باقوسی کھال والی |
| 388 | •• چکنا (پیشاب) | 441 | •• جلق (زنا) |
| 526 | •• چکنی (جلد) | 406 | •• جلق (مروانہ) |
| 101 | •• چٹنے کی یا ایک جگہ سے دوسری جگہ | 161, 584 | •• چلن |
| | جانے کی نااہلیت | 100 | •• چلن (اعصابی) |
| 133 | •• چمک (آنکھوں کی) | 370 | •• چلن دار (پیشاب) |
| 511 | •• چنڈیاں | 407 | •• چلن (مقصود حاصل کی) |
| 142 | •• چوٹ (یا زخم آنکھ میں) | 661 | •• چمائیاں |
| 623 | •• چوٹیں زخم | 455 | •• چنسی جنون (زنا) |
| 440 | •• چوڑھیں | 406 | •• چنسی جنون (مروانہ) |
| 69 | •• چوڑی کرنا | 417 | •• چنسی (مروانہ) |
| 654 | •• چوہنا | 47 | •• چنوں |
| 240 | •• چھاتی میں دھاؤ | 462 | •• چھین۔۔۔ اپنی جگہ سے ہٹ جانا اور |
| 528 | •• چھپاکی | | حرکت کرنا |
| 530 | •• چھٹے | 651 | •• جوتے کا کاٹنا |
| 604 | •• چہرے پر کیل ماسے | 484 | •• جوڑوں کا درد |

| | |
|-----|--|
| 194 | ••••• خلق --- ورم (اعصابی) |
| 194 | ••••• خلق --- ورم (گنٹھیاوی) |
| 194 | ••••• خلق --- ورم (نزلاوی) |
| 193 | ••••• خلق --- ورم (مزمن) |
| 458 | ••••• حمل |
| 455 | ••••• حمل کے دوران صبح کے وقت کی تکلیف |
| 461 | ••••• حمل کے دوران کھانسی |
| 545 | ••••• حیات |
| 638 | ••••• حنجرہ کی رسولی |
| 169 | ••••• حنجرہ کے امراض |
| 202 | ••••• حنجرہ کے تشہی جسکے |
| 201 | ••••• حنجرہ، نرفہ |
| 201 | ••••• حنجرہ --- ورم |
| 659 | ••••• حیاتین (وٹامن) |
| 443 | ••••• حیض، پروفرو / مؤخر |
| 441 | ••••• حیض --- غیر موجودگی |
| 449 | ••••• حیض، قبل از وقت |
| 441 | ••••• حیض کا وہب جانا یا رک جانا |
| 454 | ••••• حیض، کم مقدار |
| 422 | ••••• حیض موقوفی |

خ

| | |
|-----|--------------------------|
| 528 | ••••• خارش |
| 514 | ••••• خارش (جلد) |
| 583 | ••••• خارش، کھلی |
| 410 | ••••• خارش (کھونٹکست کی) |
| 184 | ••••• خراستے |

| | |
|-----|--|
| 630 | ••••• چہرے کا اعصابی درد |
| 626 | ••••• چہرے کی جلد کی وق |
| 408 | ••••• چھوٹا (عضو تاسل) |
| 184 | ••••• چھتھیں |
| 559 | ••••• چھپک |
| 350 | ••••• چہرے (معدا) |
| 509 | ••••• چیلونیز (زخم کے نشان پر دانے وار اجمارا) |

ح


| | |
|-----|--|
| 511 | ••••• حاد سوزش (بیرونی بجان کے باعث جلد کی حاد سوزش) |
| 80 | ••••• حالت غشی یا دیوانگی، سرسام |
| 594 | ••••• حالت نزع، غشی |
| 505 | ••••• حجام کی غارش |
| 620 | ••••• حدت |
| 74 | ••••• حرام معز کی مصلیوں کا ورم |
| 501 | ••••• حرکت کرنے پر عضلات کی بڑھی ہوئی لیکن |
| 121 | ••••• حساسیت |
| 108 | ••••• حساسیت، ضرورت سے زیادہ |
| 46 | ••••• حسد (جلایا) |
| 405 | ••••• حشد (عضو تاسل) کا سرا |
| 659 | ••••• حشاشیہ کے ایک تکلیفات |
| 639 | ••••• حفظ، مقدم |
| 184 | ••••• خلق |
| 201 | ••••• خلق کا کوا |
| 169 | ••••• خلق کے امراض |

| | | | |
|-----|---------------------------------|----------|--------------------------------------|
| 23 | • خوابش (طلب) | 460 | • خروں |
| 402 | • خوابش ٹھنی ہوئی (نامردی) | 476 | • خروج (رحم کا) |
| 15 | • خوابش (موت کی) | 554 | • خسرہ |
| 65 | • خود کشی کا رجحان | 557 | • خسرے کا بخار |
| 32 | • خوشامد | 230 | • خشک (زبان) |
| 29 | • خوف | 477 | • خشکی (اندام خالی) |
| 59 | • خوف، زہر خورائی کا | 210 | • خشکی (مذہ کی) |
| 14 | • خوف (موت کا) | 343 | • خصوصاً بچوں میں اسہال کے لئے |
| 461 | • خوف موت کا، دورانِ حمل | 417 | • خینے |
| 380 | • خون (پیشاب میں) | 417 | • خینے۔۔۔ ناخوشی |
| 576 | • خون، قلت | 414 | • خینے۔۔۔ ورم |
| 125 | • خون کی ٹاپوں کا ٹھیل جانا | 420 | • خیموں کا چڑھ جانا |
| 268 | • خون کی ٹاپوں کی پھیلاوٹ | 406 | • خیموں کی جھلی میں پانی بھرنا |
| 558 | • خون میں ذہر (بخار) | 421 | • خیموں کی رنگوں کا پھول جانا |
| 625 | • خون میں سفید ذرات کا بڑھ جانا | 418 | • خیموں کی سوزش |
| | (ہاکن کے امراض) | 479 | • خمیدگی (ریڑھ کی) |
| 412 | • خورش | 239 | • خنازیر |
| | | 186, 548 | • خنای |
| | | 605 | • خواب |
| 526 | • خواب۔۔۔ سمندے کے کنارے | 81 | • خواب آنوکی |
| | پھونکے کول پتھر جیسی دوا | 632 | • خواب، بڑے |
| 581 | • خوابی | 651 | • خواب خرابی |
| 220 | • دانت | 61 | • خوابی دورے |
| 223 | • دانت کا درد | 403 | • خوابش بڑھی ہوئی (مردانہ) |
| 464 | • دانت کا درد (دورانِ حمل) | 371 | • خوابش (پیشاب کرنے کی) |
| 600 | • دانت (ٹکٹے کا عمل) | 428 | • خوابش، جیسی، بڑھی ہوئی |
| 222 | • دانتوں کا گزنا | 429 | • خوابش، جیسی، دلی ہوئی یا ٹھنی ہوئی |
| 222 | • دانتوں کا تاسور | 461 | • خوابش (دورانِ حمل) |

| | | | |
|-----|---|----------|---|
| 275 | • دل کی بھلی کی سوزش | 240 | • دہانہ (چھائی میں) |
| 281 | • دل کی دھڑکن | 511 | • دھاپا |
| 101 | • دماغ کی مصلیوں کا ورم | 429 | • دہلی ہوئی یا گھٹی ہوئی (جنسی خواہش) |
| 100 | • دماغ میں خون کا غیر معمولی اثر و حاکم | 229 | • دوران میں (زبان کی) |
| 1 | • دماغی امراض | 110 | • درد اعصاب (درد جو اعصاب پر اثر انداز ہوا) |
| 123 | • دماغی رسولیاں | 630 | • درد اعصابی چہرے کا |
| 184 | • دم گھٹنا | 484 | • درد (جوڑوں کا درد) گھٹیا وجہ |
| 248 | • دم | | المقاسل) |
| 504 | • دخیل (جلد) | 223 | • درد دانت کا |
| 508 | • دخیل گوشت خور پھوڑے | 463 | • درد (دوران حمل) |
| 438 | • دودھ (پستان) | 475 | • درد (برجم) |
| 387 | • دودھ (منقہ پیشاب) | 89 | • درد سر |
| 461 | • دوران حمل گھٹائی | 408 | • درد (مختصہ تاسل) |
| 465 | • دوران حمل صبح کے وقت کی تکلیف | 292 | • درد قویج |
| 461 | • دوران حمل خوف و موت کا | 481 | • درد کمر |
| 460 | • دوران حمل مقصد | 163, 166 | • درد کان کا |
| 460 | • دوران حمل نفرت و بیزاری | 310 | • درد معدہ |
| 144 | • درد کی نظر کی کمزوری | 463 | • درد (وضع حمل کے غلط) |
| 157 | • دوہری بھارت | 47 | • درد کمر |
| 184 | • دوہرے (ناک پر) | 1 | • دشنام طرازی |
| 27 | • دہشت | 372 | • وقت (پیشاب) |
| 655 | • دھوپ سے جانا | 195 | • دھن (گلے کی) |
| 15 | • دھوکہ بازی | 214 | • دھن (معدہ کی) |
| 9 | • دھوکہ دہی | 206, 218 | • دھن و زخم مند |
| 42 | • دیوانگی (مانگولیا) | 268 | • دل اور خون کی ٹائیوں کا مرض |
| | | 13 | • دلجوئی یا دلاسا |
| | | 280 | • دل کا بڑھ جانا |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 638 | • رسولی۔۔۔ ستانہ | | |
| 207 | • رسولی۔۔۔ سوزھے | | |
| 180, 639 | • رسولی۔۔۔ تاک | 308 | • زکاء |
| 613 | • رسولی۔۔۔ لطف | 548 | • زینگو (مکر توڑ بھار) |
| 210 | • رسولی۔۔۔ ہونٹ | | |
| 152, 657 | • رسولیاں | | |
| 123 | • رسولیاں، دماغی | 242 | • ذات الحب |
| 659 | • رسولیاں۔۔۔ سارکوا | 243 | • ذات الحب سے حلق (مرض) |
| 468 | • رسولیاں (سرطان، تھیلیاں، گومری) | 218 | • ذائقہ |
| 119 | • رعشہ | 8, 53 | • ذاتی تحکات |
| 10 | • رفاقت کی تمنا | 600 | • ذیابیطس |
| 9 | • رفاقت یا صحبت | | |
| 301 | • رکاوت (پیش) | | |
| 496 | • رکش (بڈیوں کا نرم پڑ جانا) | 470 | • رحم |
| 137 | • رکمت (کی تبدیلی) | 474 | • رحم کی بچی |
| 532 | • رنگ ورم | 430 | • رحم کی یا پیشہ دان کی سوزش |
| 229 | • رنگینی (زبان کی) | 474 | • رحم۔۔۔ گھٹا سوتا |
| 9 | • روشن خمیری | 474 | • رحم۔۔۔ گوشت کا لہو تھوڑا |
| 146 | • روشنی کا خوف (نور ترسی) | 476 | • رحم۔۔۔ گومز |
| 639 | • روکنے والی (حفظ مانگدم) | 476 | • رحم۔۔۔ تاسور |
| 70 | • روتا | 470 | • رحم۔۔۔ نیچے کی جانب دباؤ |
| 651 | • ریڑھ کی ہڈی سے کسی چیز کا خروج | 474 | • رحم۔۔۔ ہوا (اچھا روا) |
| 106 | • ریڑھ کی ہڈی کا ورم یا سوزش | 638 | • رسولی |
| 652 | • ریڑھ کے صوبوں کی سوزش | 639 | • رسولی۔۔۔ امعاء مستقیم |
| 139 | • ریشوں کی نشوونما | 638 | • رسولی۔۔۔ خنجر |
| 657 | • ریل گاڑی کے سفر کی تکلیفات | 212 | • رسولی۔۔۔ زبان کے نیچے والی، حیل |
| | | | • دار |
| | | 638 | • رسولی۔۔۔ کان |

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 387 | • سبز (رنگ کا پیشاب) |
| 139 | • سبز موتیا |
| 590 | • سبزیرقان |
| 526 | • سخت (جلد) |
| 654 | • سختی |
| 409 | • سرخ باد (گھونگھٹ) |
| 524, 648 | • سرخ بادہ |
| 583 | • سرخ بخار |
| 389 | • سرخ (پیشاب) |
| 526 | • سردی کا لانا |
| 80 | • سرمام (سالت غشی یا دیوانگی) |
| 586, 468 | • سرطان |
| 331 | • سرطان (امعاء مستقیم) |
| 412 | • سرطان (پروٹھیٹ کا) |
| 437 | • سرطان (پستانوں کا) |
| 418 | • سرطان (خصیوں کا) |
| 226 | • سرطان (زبان) |
| 422 | • سرطان (زنانہ اعضاء کا) |
| 400 | • سرطان (مردانہ امراض) |
| 98 | • سرمیں پانی (رطوبت) کا بھر جانا، سر |
| | میں رطوبت کا اکٹھا ہو جانا |
| 440 | • سرمائے پستان (چوچیاں) |
| 625 | • سستی |
| 661 | • سفید ٹانگ (ٹانگ کی سوزش) |
| 539 | • سکری |
| 180 | • سکڑاؤ (آنکھ کے پردہ چھکی کا) |
| 408 | • سکڑاؤ (عضو عاقل کا) |
| 59 | • سمجھ |



| | |
|-----|-------------------------------------|
| 226 | • زبان |
| 230 | • زبان تنگ |
| 226 | • زبان کاٹنا |
| 231 | • زبان کا قالج |
| 229 | • زبان کی دراڑیں |
| 212 | • زبان کے نیچے والی تھیلی دار رسولی |
| 142 | • زخم آنکھ میں |
| 581 | • زخم، بستر کے |
| 623 | • زخم، چوٹیں |
| 232 | • زخم، زبان کی ناسوری کیفیت |
| 581 | • زخم، کانٹے کے |
| 509 | • زخم کے نشان پر دانے دار ابھار |
| 528 | • زخم کے نشان کے پاس ریشہ دار |
| | ابھار |
| 206 | • زخم، منہ کا |
| 172 | • زکام (نزلہ) |
| 422 | • زنانہ (اعضاء کا) |
| 424 | • زنانہ --- مجامعت |
| 435 | • زندہ بچے کی پیدائش |
| 463 | • زندہ پیدائش (وضع حمل) |
| 288 | • زندہ (چیز جیت میں محسوس ہو) |
| 59 | • زہر خورانی (کا خوف) |



| | |
|-----|---------------------|
| 659 | • سارکوما (رسولیاں) |
| 578 | • سانس رک جانا |

| | | | |
|----------|---|----------|---------------------------------|
| 141 | • سوزش 'ورم' (آنکھ کے سفید پردے کا ورم) | 114 | • سن ہو جانا |
| 83 | • سوزش (ورم دماغ) | 106 | • سن ہو جانا (اعصاب) |
| 281 | • سوزش 'دریدوں کی' | 144, 655 | • سوجن |
| 480 | • سوزش 'ہڈیوں کی' | 633 | • سوجن 'استسقاء کی' |
| 234 | • سوزش 'ہوا کی ٹالیوں کی (حلقہ) | 617 | • سوجن 'خود کی' |
| 236 | • سوزش 'ہوا کی ٹالیوں کی (مزمین) | 142 | • سوجن 'قریب کی' |
| 218 | • سوزشی دکن 'منہ کی' | 411 | • سوجن (گھونٹھ کی) |
| 627 | • سوکھا مسان | 210 | • سوجن (ہونٹ) |
| 518 | • سوکھا مسان 'لاغری' | 69 | • سوچنا |
| 386 | • سیاہ (پیشاب) | 394 | • سوزاک |
| 683, 140 | • سیان خون | 134 | • سوزش (آنکھ کے سیاہ ملتے کی) |
| 437 | • سیان خون (پیتلوں سے) | 100 | • سوزش (اعصابی) |
| 205 | • سیان خون (مسوڑھے) | 437 | • سوزش (پیتلوں کی) |
| 170 | • سیان خون 'ناک سے' | 638, 661 | • سوزش 'ٹانگ کی' |
| 209 | • سیان خون (ہونٹ) | 628 | • سوزش 'ٹانگ کی ایک خاص قسم کی' |
| 234 | • سینہ اور پیچھے | 418 | • سوزش 'فصیوں کی' |
| 234 | • سینہ 'پچھے اور کھانسی کے امراض' | 430 | • سوزش 'زخم کی یا بیضہ دان کی' |
| 240 | • سینہ میں درد | 105 | • سوزش 'ریبہ کی ہڈی کی' |
| | | 652 | • سوزش 'ریبہ کے سروں کی' |
| | | 230 | • سوزش (زبان کی) |
| | | 622 | • سوزش (سوجن) |
| | | 501 | • سوزش 'عضلات کی' |
| | | 302 | • سوزش 'خفائے مصلیٰ' |
| | | 628 | • سوزش 'کپٹیوں کی ہڈیوں کی' |
| | | 363 | • سوزش 'مگروں کی' |
| | | 656 | • سوزش 'گھٹنوں کے جوڑوں کی' |
| | | 409 | • سوزش (گھونٹھ کی) |
| | | 169 | • سوزش 'ناک کی' اسٹنٹھی |
| 60 | • شرمیلا | | |
| 69, 472 | • شعور | | |
| 87 | • شک و شبہ | | |
| 535 | • شگل 'اسٹنڈر کے کنارے چھونے' | | |
| | • گول پتھر جیسی دانا | | |
| 166 | • شور | | |



ع

- 257 عارضہ قلب کے ساتھ دہرہ
264 عارضہ قلب والی کھانسی
545 عام بخار
497 عرق النساء
655 عرق (خیرہ)
71 عزت نفس، مجروح
499 عضلات
501 عضلات کی بڑھی ہوئی کھینچ
حرکت کرنے پر (مائیوٹونیا)
120 عضلات کی خلی
501 عضلات کی سوزش
500 عضلات کی کمزوری
501 عضلات کی لاغری (ایڈھی ہوئی)
478 عضلات کے امراض
407 عضو تناسل
405 عضو تناسل کا سر
409 عضو تناسل کا گھونٹ
408 عضو تناسل کھینچنا
408 عضو تناسل - نامور
558 عقوقی بخار (خون میں زہر)
35 علامات یا دوا وطن
565 علامات میں اضافہ
572 علامات میں کمی
614 عمومی تکلیفات (عام علامات)
542 عمومی تکلیفات (ناشر)

- 268 شریانوں (خون کی نالیوں) کی
پھیلاؤ
270 شریانوں کی دیواروں کی خلی
281 شریانوں کی سوزش
274 شریانوں میں خون کے لوتھڑوں کا
بہا

ص

- 9 صحت
648 صدمات
649 صدمات (جراحت کے بعد)
73 صرع (مرگی)

ض

- 58 ضعی
108 ضرورت سے زیادہ حساسیت
53 ضعف اعصاب (اعصابی تھکاوٹ)
ذہنی تھکاوٹ یا تھکاوٹ
40 ضعف عقل (فائر اعقلی)
609 ضیق (نشی)

ط

- 556 طاعون
629 طریق کار (کی میٹھی)
14, 23 طلب

ظ

- 71 ظریف (پر مزاج)

271

• فشار خون --- بلند

ق

334

• قبض

636

• قبل از جراحت تکلیف

542

• قبل از وقت بالوں کا سفید ہونا

635

• قبل از وقت پڑھنا

449

• قبل از وقت (غش)

595

• قبل از وقت موت

654

• قد

142

• قرنیہ کی سوجن

153

• قرنیہ کے ناسور (یا پھوڑے)

576

• قلت خون

71

• قلعہ کاروں (ادویوں وغیرہ) میں ایشمن

71

• قوت ارادی

182

• قوت شامہ (دھیمی یا کھو جائے)

217

• قوت گویائی جاتی رہے

318

• قے

466

• قے (دوران حمل صبح کے وقت کی

تکلیف)

ک

226

• کانا (زبان)

681

• کانا (کامی کے زخم)

264

• کالی کھانسی

166

• کان ہستا

163, 166

• کان کا درد

388

• کان (کی رسولی)

غ

615

• غرور

617

• غرور کی سوجن

310

• غدا کا زہر

59

• غرور

88

• غش کھانا

61, 594

• غش

4

• غصہ

462

• غلہ تصور (حمل کا)

50

• غلطیاں

60

• غمگینی

651

• غنودگی

61

• غنودگی، خراب آلودگی (خوابی

دورے غشی)

1

• غیر حاضر دماغی

407

• غیر موجود (عضو کا سل)

ف

40

• فائر (عقل)

389

• فاسٹ (پیشاب میں)

231

• فالج (زبان کا)

192

• فالج (گلے کا)

28

• فرار

455

• فرج سے اوپر والی جگہ

35, 158

• فریب نظر

136

• فریب نظر (رنگوں کا)

613

• فساد نیچ

| | | | |
|---------------|---|-----|------------------------------------|
| 248, 259 | • کھانسی | 168 | • کان کے پردہ کا سوراخ |
| 266 | • کھانسی 'اضطراری' مستورات میں | 161 | • کانوں کے اور سماعت کے امراض |
| 461 | • کھانسی (دوران حمل) | 123 | • کیکلپاٹ |
| 514, 531, 533 | • کھجلی | 508 | • کتے پھنے، ہاتھ اور انگلیوں کے |
| 533 | • کھروری (جلد) | | • پوروں میں شگاف |
| 212 | • کھانا (مت کا) | 392 | • کثافت اضافی (پیشاب) |
| 209 | • کھینچا (ہونٹوں کا) | 185 | • کدوپ کھانسی (غیر منتقلی) |
| 408 | • کھینچا (مضوعہ سفل کا) | 207 | • کڑکڑاہٹ (پتڑے کی) |
| 538 | • کیل (جلد) | 9 | • کڑھنا |
| 504 | • کیل ماسے | 121 | • کڑا (تعلی) |
| 308 | • کیسٹر (معدہ) | 152 | • گھرے |
| | | 315 | • کھینچنے کی جہن |
| | | 317 | • کم تجرہیت (ہائیڈروکلورک ایسڈ کی) |
| | | | • کمی |
| 484 | • گھٹیا | 548 | • کمزور بخار 'ڈیکو' |
| 194 | • گھٹیاوی --- ورم، حلق | 130 | • کمزوری (آنکھ کے عضلات میں) |
| 206 | • گر جانا (مسوڑھوں کا) | 454 | • کم مقدار (جین) |
| 547 | • گردن توڑ بخار | 389 | • کم مقدار (پیشاب) |
| 101 | • گردن توڑ بخار (دماغ کی مہلیوں کا ورم) | 572 | • کمی (عضلات میں) |
| 366 | • گردوں کی پھری | 555 | • کمین جڑے |
| 363 | • گردوں کی سوزش | 49 | • کچھ سی --- بکل |
| 369 | • گردوں میں رکاوٹ کے باعث | 651 | • کوئٹہ کا سنی |
| | • پیشاب کا اجتماع | 75 | • کوریا (احصائی غرض جس میں |
| 362 | • گروے، مثانہ اور پیشاب | | • عضلات بے اختیارانہ پھڑکتے ہیں) |
| 369 | • گروہ --- ورم | 77 | • کوبا (بے ہوشی) |
| 620 | • گری حدت | 385 | • کمدار (پیشاب میں) |
| 222 | • گرنا (ناخوشی کا) | 28 | • کمدار |
| 184 | • گھا (حلق) | 512 | • کمال کا ارتقا |

| | | | |
|--------|---|----------|----------------------------------|
| 501 | • لاغری، عضلات کی (بڑھی ہوئی) | 208 | • گنا، سونا |
| 547 | • لاکڑ، کاٹڑا | 474 | • گنا، سونا (درجم) |
| 302 | • لبلہ | 478, 629 | • گنا، سونا، ہڈیوں کا |
| 425 | • لذت جلاع (اعضائے تکامل میں) | 618 | • گنڑ |
| | • مسرت کا احساس | 394 | • گیت |
| 123 | • لڑو (کچپا ہٹ) | 192 | • گلے کا فالج |
| 425 | • لطف — غیر موجود | 195 | • گلے کی دکن |
| 561 | • لو گنا | 169 | • گلے کے امراض |
| 432 | • لیگوریا | 508 | • گوشت خور پھوڑے (دنبیل) |
| 530 | • لیور سپائٹس | 474 | • گوشت کا لو تھڑا (درجم) |
| | | 539 | • گنباپن |
| | | 468 | • گومز |
| 414 | • مادۂ منویہ کا اثران | 476 | • گومز (درجم) |
| 42, 49 | • مالتو لیا | 151 | • گوبانہیں |
| 640 | • مانتات سے جلتا | 50 | • گمبرا ہٹ |
| 105 | • مائی لی فیئر (دریڑھ کی ہڈی کا درم یا سوزش) | 358 | • گھٹن (ٹنگلی) (اسماعائے مستقیم) |
| 501 | • مائیوٹونیا (حرکت کرنے پر عضلات کی بڑھی ہوئی گھٹن) | 656 | • گھٹنوں کے جوڑوں کی سوزش |
| 181 | • متعفن | 625 | • گھٹنے کا مڑ (ٹھک) جانا |
| 349 | • متعفن پانخانے (بدبودار پانخانے) | 409 | • گھونگھٹ (عضو تکامل کا) |
| 565 | • متفرقات | 410 | • گھونگھٹ کی غارش |
| 318 | • محلی | 410 | • گھونگھٹ کے پردہ کی جھگی |
| 378 | • متواتر (پیشاب آنا) | | |
| 638 | • مشانہ (کی رسولی) | 41 | • لاپرواہی |
| 368 | • مشانہ — درم | 596 | • لاغری |
| 424 | • مجامعت (زنا) | 436 | • لاغری (پستانوں کا گھٹ جانا) |
| 400 | • مجامعت (مزدانہ) | 518 | • لاغری (جلد) |
| | | 417 | • لاغری (غصیوں کی) |

ل

| | | | |
|-----|---|--------|--|
| 628 | • ملک لپک (تلمک کی ایک خاص قسم کی سوزش) | 424 | • مجامعت کے دوران و بعد کے امراض |
| 551 | • ملیسا | 35 | • مجرم ضمیر |
| 210 | • منہ | 71 | • مجروح عزت نفس |
| 50 | • منہ چڑانا | 47 | • محبت میں گرفتار ہونا |
| 212 | • منہ کا کھانا | 46 | • محبت میں مایوسی |
| 210 | • منہ کی خشکی | 36 | • مراقبہ |
| 214 | • منہ کی دکھن | 399 | • مردانہ امراض |
| 218 | • منہ کی دکھن (سوزش) | 400 | • مردانہ — مجامعت |
| 206 | • منہ کی دکھن و زخم | 84, 73 | • مرگی |
| 220 | • منہ — ماسوری کیفیت | 358 | • مروڑ (پاخاندہ کرتے وقت زور لگانا) |
| 14 | • موت | 296 | • مزمن نچیش |
| 595 | • موت، عمل از وقت | 138 | • مسامت اشکی کی خرابی (بندش) |
| 14 | • موت کا خوف | 266 | • مستورات میں اضطرابی کمائی |
| 461 | • موت (کا خوف دوران حمل) | 206 | • مسوزھوں کا گر جانا |
| 15 | • موت کی خواہش | 204 | • مسوزھوں 'منہ' دانتوں اور زبان کے امراض |
| 134 | • موتیا بند | | |
| 633 | • موٹاپا | 204 | • مسوزھے |
| 535 | • موٹی (جلد) | 660 | • سے |
| 653 | • موج | 394 | • مشترک امراض (اعضائے تناسل) |
| 443 | • مؤخر اور / یا پچہ درو (جین) | 305 | • معدہ |
| 829 | • موسیقی | 308 | • معدہ کا کینسر |
| 422 | • موقوفی حیض | 315 | • معدہ کا ناسور |
| 504 | • مہاسے (ہرے پرکیل مہاسے) | 318 | • معدہ — ماسوری کیفیت |
| 168 | • میل | 16 | • مخالف پادوسوت |
| | | 460 | • مقعد (دوران حمل) |
| | | 510 | • مکڑی کا جلا |
| 132 | • مٹوانی (اندھا پن) | 613 | • ملخوف رسولی |

| | | | |
|-----|------------------------------|---------|---------------------------------|
| 240 | ● نزل (درم نرخرہ والا) | 542 | ● ناسن |
| 194 | ● نزلادی... درم حلق | 542 | ● ناسن... عمومی تکلیفات |
| 27 | ● نشوونما | 543 | ● ناسنوں کا لکنا |
| 362 | ● نظام بول کے امراض | 303 | ● ناسور (بیٹ) |
| 288 | ● نظام ہضم کے امراض | 535 | ● ناسور... جلد |
| 35 | ● نفرت | 222 | ● ناسور دانتوں کا |
| 460 | ● نفرت بخاری (دوران حمل) | 476 | ● ناسور (رحم کے) |
| 196 | ● نگنا | 408 | ● ناسور (عضو حاصل کے) |
| 243 | ● نمونہ | 153 | ● ناسور قریب کے |
| 146 | ● نورتری | 315 | ● ناسور معدہ کے |
| 460 | ● نیچے کو دباؤ (خروج) | 209 | ● ناسور ہونٹوں کا |
| 470 | ● نیچے کی جانب دباؤ (رحم) | 207 | ● ناسوری کیفیت (پھوڑے وغیرہ) |
| 292 | ● نیچے کی جانب کھینچاؤ (بیٹ) | 232 | ● ناسوری کیفیت (زخم وغیرہ) زبان |
| 61 | ● نیند | 318 | ● ناسورنی کیفیت (معدہ) |
| | | 301 | ● ناک |
| | | 169 | ● ناک |
| 659 | ● دناسن | 184 | ● ناک پر دھبے |
| 484 | ● وجع الفاصل | 170 | ● ناک سے سیلان خون |
| 589 | ● وجوہات (تکلیفات کی) | 169 | ● ناک کی استغنی سوزش |
| 192 | ● درم حلق | 180,639 | ● ناک کی رسولی |
| 194 | ● درم حلق (اعصابی) | 181 | ● ناک کی نالی کا پھوڑا |
| 194 | ● درم حلق (گنشیادی) | 169 | ● ناک، گلے، حلق اور حنجرہ کے |
| 193 | ● درم حلق (مزمن) | | امراض |
| 194 | ● درم حلق (نزلادی) | 406 | ● ناسودی |
| 201 | ● درم حنجرہ | 285 | ● نبض |
| 414 | ● درم خصبہ | 201 | ● نرخرہ |
| 83 | ● درم دماغ | 238 | ● نرخرہ کا نمونہ |
| 101 | ● درم دماغ کی مصلیوں کا | 172 | ● نزل |



| | | | |
|---------|--------------------------------|---------|---|
| 478,629 | • ہڈیوں کا گلٹا سڑنا | 105 | • درم ریزھ کی ہڈی کا |
| 496 | • ہڈیوں کا نرم پڑ جانا | 288 | • درم زائکدہ |
| 480 | • ہڈیوں کی سوزش | 100 | • درم، سوزش، جلن (اعصابی) |
| 299 | • ہرنیا | 369 | • درم گردہ |
| 37 | • ہسٹریا | 197 | • درم لوزتین (ٹانسلز کا درم) |
| 217 | • ہیکلامبٹ | 368 | • درم مٹانہ |
| 622 | • ہپک درم کا مرض | 238 | • درم نرخرہ کانموئیے |
| 68 | • ہمدردی | 240 | • درم نرخرہ۔۔۔ نزول |
| 50 | • ہنسی اڑاتا (منہ چراتا) | 281 | • دریو دل کی سوزش |
| 474 | • ہوا (اپجارہ) (رحم) | 286 | • دریوریں (پھولی ہوئی) |
| 234 | • ہوا کی ٹالیوں کی سوزش (حلو) | 16 | • دوسے |
| 236 | • ہوا کی ٹالیوں کی سوزش (مزمن) | 426 | • وضع حمل |
| 571 | • ہوائی سفر کی تکلیفات | 426 | • وضع حمل سے پہلے دوران اور بعد کی تکلیفات |
| 209 | • ہونٹ | 463 | • وضع حمل کے درد (غلط) |
| 209 | • ہونتوں کا کھینچا | | |
| 209 | • ہوتنوں کا تاسور | | |
| 332,593 | • ہیضہ | | |
| | | | |
| | کی | | |
| 49 | • یادداشت | 518 | • باقعی کمال والی جلد |
| 329 | • یرقان | 622 | • بارمون |
| 590 | • یرقان، سبز | 625 | • ہاکن کے امراض |
| 330 | • یرقان (مسک) | 548 | • بالائی پرپائی ریگسیا (جسم کا بہت شدید بخار) |
| 393 | • یوریا (پیشاب میں) | 317 | • ہایڈروکلورک ایسڈ کی کمی |
| 369 | • یوریسیا | 316 | • بگی |
| | | 478 | • ہڈیاں اور جوڑ |
| | | 478 | • ہڈیوں، جوڑوں اور عضلات کے امراض |
| | | 483,612 | • ہڈیوں کا ٹوٹ جانا |